

चित्र-सूची

चि०	संकेत	पृ०	चि०	संकेत	पृ०
१	जीवकोषाणु	३	२१	पेशी-संकोचमापक यन्त्र	४९
२	शक्ती आवरक तन्तु	७	२२	सामान्य पेशी-रेखा	४९
३	स्तम्भाकार आवरक तन्तु	८	२३	तारविद्युद्धारामापक	५८
४	रोमिकामय आवरक तन्तु	८	२४	दो उत्तेजकों का प्रभाव	६१
५	स्तरित आवरक तन्तु	९	२५	दीर्घसंकोच के विभिन्न रूप	६२
६	श्वेत सौत्रिक तन्तु	१०	२६	रक्तकण	९६
७	सान्तरित	११	२६क	श्वेतकण	१०८
८	वसामय तन्तु	१२	२७	लसीकाग्रन्थि	१२१
९	शुभ्र तरणास्थि	१४	२८	हृदय	१२९
१०	अस्थि का अनुप्रस्थ परिच्छेद	१६	२९	रक्तसंवहन	१३६
११	अस्थि का अनुलम्ब परिच्छेद	१७	३०	रक्तभारमापन	१४८
१२	परतन्त्र पेशी का अनुलम्ब परिच्छेद	२२	३१	नाडीस्पन्दमाप	१६५
१३	पेशी की सूक्ष्म रचना	२४	३२	शवासपथ	१७९
१४	स्वतन्त्र पेशी-सूत्र	२६	३३	फुफ्फुस के वायुकोष	१८०
१५	हार्दिक पेशी-तन्तु	२७	३४	श्वसितवायुमापक यन्त्र	१८४
१६	शक्तिकण से युक्त एक नाडीकोषाणु	३१	३५	सान्तर श्वसन	१९६
१७	विभिन्न आकार के नाडीकोषाणु	३५	३६	कला द्वारा वस्तुओं का प्रसरण	२१८
१८	नाडीकोषाणु में सूक्ष्म-सूत्रिकायें	३६	३७	व्यापन-भारमापक	२१९
१९	मेदस नाडीसूत्र	३८	३८	पाचननलिका	२५४
२०	अमेदस नाडीसूत्र	३९	३९	क्षुद्रान्त्र की सूक्ष्म रचना	२६८
			४०	बृहदन्त्र	३१४
			४१	यकृत	३१६
			४२	शुक्ल	३२६

४३ वृक्ष की सूक्ष्म रचना	३२७	५८ नासा की श्लेष्मल कला	४८२
४४ यूरियामापक यन्त्र	३५१	५९ नेत्रगोलक	४९०
४५ एसबैक का अल्यूमिनोमीटर	३६७	६० दृष्टिवितान	४९३
४६ कार्बूरहाइन का सकारोमीटर	३७०	६१ दृष्टिवितान पर वस्तुओं	
४७ अस्थिवृद्धि	३८८	का प्रतिबिम्ब	५०६
४८ श्लैष्मिक शोथ	३९२	६२ कर्ण	५३५
४९ बहिर्नेत्रिक गलगण्ड	३९४	६३ अन्तः कर्ण	५३८
५० स्वरयन्त्र (अनुलम्ब परिच्छेद)	४०३	६४ स्वरदानिका	५३९
५१ विभिन्न अवस्थाओं में		६५ त्वचा	५४८
स्वरयन्त्र की स्थिति	४०७	६६ घृणप्रस्थ	५६७
५२ मस्तुलुंग पिण्ड	४२३	६७ शुक्रकीटाणु	५६६
५२क मस्तिष्क के क्षेत्र	४४०	६८ गर्भाशय और बीजकोष	५७०
५३ प्रत्यावर्तित क्रिया	४४८	६९ स्त्रीबीज	५७२
५४ ज्ञान्दीय प्रत्यावर्तन	४५७	७० शुक्रकीटाणु का विकास	५७५
५५ पिण्डिकाकुक्षन	४५८	७१ स्त्रीबीज का विकास	५७६
५६ रसना	४७५	७२ पौंव सप्ताह का भ्रूण	५८२
५७ नासा	४८२	७३ आठ सप्ताह का भ्रूण	५८३
		७४ गर्भाशय-स्थित प्रगल्भ गर्भ	५८५
		७५ भ्रूण का रक्त संवहन	५८७

प्राक्थन

डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा

प्रिन्सिपल, आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ।

शरीरक्रियाविज्ञान चिकित्सा-शास्त्र का एक मुख्य आधार है । शरीर-रचना-शास्त्र तथा विकृति-शास्त्र के साथ यह एक त्रिभुज आधार बनाता है जिस पर चिकित्सा-शास्त्र आश्रित है । इन तीन विज्ञानों का पूर्ण ज्ञान न होने से चिकित्सा का पूर्ण ज्ञान होना ही असंभव है । शारीरिक अंगों में विकृति आ जाने तथा उनकी क्रियाओं का स्वाभाविक रूप में न होने का ही नाम रोग है । अतः अंगों की रचना और स्वाभाविक क्रिया का समुचित ज्ञान हुए बिना उनकी वैकृत दशा का अनुमान ही नहीं किया जा सकता । यही शरीरक्रियाविज्ञान का महत्त्व है ।

दो-तीन दशकों से आयुर्वेदिक कालेजों के पाठ्यक्रम में अर्वाचीन शरीरक्रियाविज्ञान पाठ्यक्रम में नियत है जिसका पठन-पाठन अंगरेजी पुस्तकों के आधार पर ही किया जाता है जिससे हिन्दी-भाषी छात्रों और जिज्ञासुओं को विषय समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है । हिन्दी में अभी तक इस विषय पर कोई मान्य पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई जिसमें विषय का पूर्णरूप से विवेचन उपस्थित किया गया हो । भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् देशवासी विद्वानों पर दायित्व और बढ़ गया है । यद्यपि विगत सात वर्षों की अवधि में राष्ट्रभाषा में अनेक विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और अभी भी हो रही हैं किन्तु विषय के मर्मज्ञ मनीषियों, जिन्होंने उसी विषय को अपना

जीवन-ध्येय बनाया हो तथा उसी के अनुसंधान एवं शोध में संलग्न हों, द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनकी संख्या अत्यल्प है।

पं० प्रियव्रत शर्मा ने इस ग्रन्थ की रचना कर वैज्ञानिक एवं साहित्यिक जगत् की इस बहुत बड़ी श्रुति की पूर्ति की है। उनका विषय का अध्ययन गंभीर है तथा वे एक प्रतिभाशाली लेखक हैं। उन्होंने इस विषय के अनेक ग्रन्थों का मन्थन कर अपने अध्यापन-जन्य अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक का निर्माण किया है। अतः उनकी यह अभिनव कृति 'अभिनव शरीर-क्रिया-विज्ञान' विद्यार्थियों एवं विषय के जिज्ञासुओं के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

काशी
४-९-५४ }

मुकुन्दस्वरूप वर्मा

आमुख

सन् १९४६ की बात है। जब मैं संयोग से बेगूसराय के आयुर्वेदिक कालेज में एक अध्यापक के रूप में प्रविष्ट हुआ तब मुझे अन्य विषयों के साथ शरीरक्रिया-विज्ञान भी अध्यापन के लिए मिला। आधुनिक विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेदीय शरीर भी मुझे ही पूरा करना पड़ता था। इस विषय की कौन सी पुस्तक पाठ्यक्रम में निर्धारित थी यह मुझे आज तक पता नहीं, किन्तु यह अवश्य अनुभव करता हूँ कि उस समय अपना रास्ता मुझे आप ही बनाना पड़ा। हिन्दी माध्यम से इस विषय की कौन सी शिखा दी जाय, इसके लिए मुझे कोई पुस्तक उपयुक्त नहीं प्रतीत हुई। फलतः मैंने अंगरेजी में प्रकाशित शरीरक्रियाविज्ञान की अनेक प्रचलित पुस्तकों का अवलोकन कर उनके आधार पर एक अपना नोट बनाना आरम्भ किया और वही ३-४ वर्षों में पुस्तक के आकार में परिणत हो गया। अध्ययन-अध्यापन की कठिनाइयों तथा छात्रों के विशेष आप्रह को देखते हुए मैंने इसे प्रकाशित करा देना अच्छा समझा और इस निमित्त सन् १९५० में इसकी पाण्डुलिपि मुद्रण के लिये प्रेस में दे दी गई। किन्तु कुछ कठिनाइयाँ बीच में आ जाने से मुद्रण का कार्य स्थगित कर देना पड़ा। गत वर्ष जब मैं महा आया तब मेरे अन्तरंग मित्रों तथा छात्रों ने इस पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित कर देने के लिये मुझे विशेष प्रोत्साहित किया। उसी के फलस्वरूप आज यह पुस्तक आप लोगों के हाथों में है।

यह ग्रन्थ पूर्णतः आधुनिक शरीरक्रियाविज्ञान का प्रतिपादिक है, आयुर्वेदीय मन्तव्यों का इसमें समावेश नहीं किया गया है। उनके लिए एक स्वतन्त्र ग्रंथ लिखने का विचार है। आधुनिक विचारों को हिन्दी माध्यम से अभिव्यक्त करना ही इसका एक मात्र उद्देश्य है जिससे हिन्दी भाषी इस महत्त्वपूर्ण विषय से लाभ उठा सकें। भारत के आयुर्वेदिक कॉलेजों में पठन-पाठन का माध्यम हिन्दी है और भविष्य में मेडिकल कॉलेजों में भी हिन्दी का प्रवेश होने की आशा है, इस लिए यह आवश्यक था कि इस विषय में उच्च कोटि का एक ग्रन्थ वैज्ञानिक शैली से लिखा जाय। प्राचीन और नवीन विषयों का समन्वयात्मक अध्ययन करने के

लिए समन्वयात्मक प्रणाली से ग्रन्थ लिखे जाय, यह भी कुछ लोगों का विचार है किन्तु व्यवहारतः अभी यह आदर्शमात्र है। मेरे विचार से, समन्वय का उप-युक्त समय अभी नहीं आया है। परस्पर समान वस्तुओं का समन्वय (अन्वय) ही समन्वय कहलाता है (परस्परसमानानामन्वयः समन्वयः-वाचस्पति मिश्र) और तभी दोनों के तत्व एक सूत्र में मणिमाला के समान पदार्थों का प्रव्रण कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि दो असमान वस्तुओं को एकत्र करने की असमय चेष्टा की गई तो एक की कट पर ही दूसरे का महल खड़ा हो सकता है अथवा दोनों मिलकर 'दाढ़ी-बोटी-सम्मेलन' के समान एक हास्यास्पद स्वरूप का विधान कर सकते हैं। अतः वर्तमान के लिए आवश्यक यह है कि नवीन विषयों को अपने रूप में सुलभ माध्यम से सार्वजनीन और हृदयंगम बनाया जाय तथा दूसरी ओर सहस्राब्दियों से उपेक्षित आयुर्वेद के विभिन्न अङ्गों का पर्याप्त अध्ययन और मनन किया जाय तथा विभिन्न संहिताओं का मन्थन कर उनके सूत्ररूप सैद्धान्तिक, रहस्यों को विशद रूप में प्राञ्जल शैली से अभिव्यक्त किया जाय। आधुनिक चिकित्साविज्ञान का जितना बड़ा साहित्य है उसको देखते हुए आयुर्वेदीय जगत् में अभी स्वतन्त्र साहित्य के निर्माण की बड़ी आवश्यकता है। विषय तथा साहित्य, तथ्य और परिमाण दोनों दृष्टियों से जब दोनों समक्ष हो जाय तभी समन्वय होगा। अभी तो अपने ही शास्त्र को पूर्णरूप में हम नहीं समझते। समन्वय अत्यन्त उच्च लक्ष्य और कठिनतम कार्य है तथा यह उच्चस्तर पर ही सम्भव है। अभी उसके अनुरूप हमारी शिक्षा और साहित्य का स्तर नहीं है।

आधुनिक और प्राचीन विज्ञान के दृष्टिकोण में महान् अन्तर है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि विश्लेषणात्मक तथा प्राचीन विज्ञान की दृष्टि संश्लेषणात्मक रही है। शरीरक्रियाविज्ञान के क्षेत्र में भी यही बात दृष्टि गोचर होती है। प्राचीनों ने शरीर के मौलिक तत्त्वों पर विशेष ध्यान दिया है इसलिये शरीर के सूक्ष्म नियामक तत्त्वों का स्पष्टीकरण इससे होता है। 'दोषघातुमलमूलं हि शरीरम्' इस वाक्य में संपूर्ण शरीरक्रियाविज्ञान का सार निहित है। इन्हीं तीन उपादानों से शरीर के विविध व्यापार समालिप्त होते हैं। इन तीनों के स्वरूप का भी विशदीकरण प्राचीन संहिताओं में किया गया है। आधुनिक विज्ञान ने शरीर के स्थूल अघिष्ठानों में उन सूक्ष्म मौलिक तत्त्वों के जो कर्म प्रकट होते हैं

उन्हीं का वर्णन उपरिष्ठ किया है । अतः आधुनिक शरीरक्रियाविज्ञान में शरीर के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का कार्य स्वतन्त्र रूप से प्रतिपादित किया गया है । स्थूल का ऐसा विस्तार प्राचीन में नहीं मिलता । इस प्रकार सूक्ष्म-स्थूल अपने स्वतन्त्र और विकसित रूप में एक दूसरे के उत्तम पूरक हो सकते हैं । स्वतन्त्र शैली होने के कारण प्रतिपाद्य विषयों के प्रति दोनों का अपना-अपना विशिष्ट दृष्टिकोण है, उसे उसी रूप में समझना होगा । उदाहरणार्थ, शुक की स्थिति समस्त शरीर में रस के रस की तरह या दूध में मक्खन की तरह आयुर्वेद ने प्रतिपादित की है । आधुनिक विज्ञान से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता, अतः समन्वय की चेष्टा में कई विद्वानों ने यह बतलाया कि शुक दो प्रकार का होता है—जो बाहर निकलता है वह तो वृषण का यहिःस्राव है और जो सर्वशरीरव्यापी है वह उसका अन्तःस्राव है जिससे पुंस्त्व के अन्य लक्षण श्मश्रुप्रादुर्भाव आदि प्रकट होते हैं । यह विचारने का विषय है कि क्या यह मन्तव्य प्राचीन महर्षियों के भाव को यथार्थ रूप में प्रकट करता है ? प्राचीन आचार्यों ने तो उसी शुक को सर्वशरीरव्यापी बतलाया है जो संकल्प आदि कामजन्य मानस विकारों से द्रवित और निःस्यन्दित होकर बाहर निकलता हैः—

‘रस इक्षौ यथा दक्षि सर्पिस्तैलं तिले यथा ।

सर्वत्रानुगतं देहे शुकं संस्पर्शने तथा ॥

तत्स्त्रीपुरुषसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात् ।

शुकं प्रच्यवते स्थानाज्जलमार्द्रात् पटादिव ॥’ च० चि० अ० २

‘यथा पयसि सर्पिस्तु गूढश्चेक्षौ रसो यथा ।

शरीरेषु तथा शुकं नृणां विद्याद् भिषग्वरः ॥

द्वयंगुले दक्षिणे पार्श्वे बस्तिद्वारस्य चाप्यधः ।

मूत्रस्रोतःपथाच्छुकं पुरुषस्य प्रवर्तते ॥

कृत्स्नदेहाश्रितं शुकं प्रसन्नमनसस्तथा ।

स्त्रीषु व्यायच्छतश्चापि हर्षात् तत् संप्रवर्तते ॥ सु० शा० अ० ४

‘विशस्तेष्वपि देहेषु यथा शुक्रं न दृश्यते ।

सर्वदेहाश्रितत्वाच्च शुक्रलक्षणमुच्यते ॥

तदेव चेष्टयुवतेदर्शनात् स्मरणादपि ।

शब्दसंश्रवणात् स्पर्शात् संहर्षाच्च प्रवर्तते ॥’ सु० नि० अ० ११

इसी प्रकार मूत्रनिर्माण की प्रक्रिया है जिसमें आयुर्वेद वृत्तों को महत्त्व नहीं देता । आयुर्वेद इदम में चेतना का स्थान मानता है और भस्तिष्क का वह महत्त्व वहां नहीं है जो आधुनिक विज्ञान में है । अतः शारीर प्राक्रियाओं को व्याख्या करते समय हमें विज्ञान के मौलिक दृष्टिकोण को शुद्धरूप में समझना आवश्यक है । प्रस्तुत ग्रन्थ इस दिशा में सहायक होगा, ऐसी आशा करना मेरे लिए स्वाभाविक है ।

यह ग्रन्थ मेरा मौलिक अनुपग्यान नहीं, अपि तु अनेक ग्रन्थों का सार लेकर यहां संकलित किया गया है । इस क्रम में जिन-जिन पुस्तकों का आधार लिया गया है उनका मैं आभारी हूँ, विशेषतः मैं ‘वजीरुद्दार साहब का अत्यन्त उपकृत हूँ जिनकी हृदयंगम शैली से आकर्षित होकर मैंने उनकी कृति ‘ए हैंडबुक ऑफ फिजियालॉजी’ से पर्याप्त सहायता ली है । अनेक कठिनाइयों के कारण चाहते हुए भी चित्रों की संख्या मनोनुकूल नहीं हो सकी । आशा है, इसकी पूर्ति अगले संस्करण में हो जायगी ।

इस ग्रन्थ में जो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किये गये हैं उनमें अधिकांश स्वनिर्मित है । जो शब्द पाठक-जगत में अधिक प्रचलित हैं उन्हें ले लिया गया है । शब्दों के निर्माण में अर्थ-साम्य और शब्द-साम्य दोनों पर ध्यान रक्खा गया है । आजकल जो नये-नये शब्द आधुनिक विद्वानों द्वारा निर्मित हुये हैं उनका उपयोग मैं जानबूझ कर इस ग्रन्थ में नहीं कर सका, इसके लिए क्षम्य हूँ । इसका कारण मेरी अदमन्यता या अज्ञानता नहीं है बल्कि पाठकों की सुविधा का ध्यान है । इसी कारण हिन्दी पारिभाषिक शब्दों के आगे कोष्ठक में अंगरेजी प्रति-शब्द भी दिये गये हैं । संभव है, अगले संस्करण में नये शब्दों का उपयोग कर सकूँ । कुछ शब्द ‘प्रत्यक्ष-शारीर’ से भी लिये गये हैं, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ ।

इस पुस्तक के प्रणयन में मेरे सहकर्मी बन्धुवर श्री गौरीशंकर मिश्र ए० एम० एस० प्रोफेसर, आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय ने अपनी बहुमूल्य सम्मतियों से अत्यधिक सहायता पहुंचाई है। वह तो इतने निकट हैं, कि धन्यवाद की रूढ़ विधि से मैं उन्हें कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। इसकी पाण्डुलिपि प्रस्तुत करने में हमारे तत्कालीन छात्र श्री गोकुलानन्द मिश्र बी० ए० एम० एस० (आनर्स) ने पर्याप्त परिश्रम किया, इसके लिए मैं उन्हें शुभवाद देता हूँ। इसके प्रकाशक महोदय भी परम धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं जिन्होंने विगत चार वर्षों की लम्बी अवधि में समापन्न अनेक बाह्य और आन्तरिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर अन्त में ग्रन्थ का प्रकाशन कर ही लिया।

अब, यह पुस्तक आपके हाथ में है। यदि इससे विद्वानों का कुछ मनोरंजन और छात्रों का कुछ उपकार हो सका तो मैं अपना परिश्रम सार्थक मानूंगा।

हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी
नागपञ्चमी
सन् २०११

प्रियव्रत शर्मा

आधारभूत ग्रन्थों की सूची

1. Vazifdar's—A handbook of Physiology.
 2. Starling's—Physiology.
 3. Halliburton's—Physiology.
 4. Morgan & Gililand—An introduction to
Psychology.
 ५. डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा—मानवशरीर रचना विज्ञान ।
 ६. डा० गणनाथ सेन—प्रत्यक्ष शार र ।
 ७. डा० घाणेकर—सुश्रुत शरीर की व्याख्या ।
 ८. ऐतरेय ब्राह्मण ।
 ९. चरकसंहिता ।
 १०. सुश्रुत संहिता ।
 ११. डा० निहालकरण सेठी—प्रारम्भिक भौतिकी ।
-

विषय-सूची

पृष्ठसंख्या

प्रथम अध्याय-कोपाणु

कोपाणु-कोपाणु की रचना-श्लोस सार का रासायनिक संघटन-श्लोस सार के गुणधर्म-केन्द्रक-आकर्षकमण्डल-तन्तु-आवरकतन्तु-संयोजकतन्तु-सौत्रिकतन्तु-तटणास्थि-अस्थि-पेशी-तन्तु-नाडीतन्तु ।

१-४१

द्वितीय अध्याय-मांसपेशी

मांसपेशी के गुणधर्म-संकोचशाल के पेशीगत परिवर्तन-सामान्य पेशीरेखा पर प्रभाव डालने वाले कारण-रासायनिक परिवर्तन-वैद्युत परिवर्तन-दीर्घसंकोच-पेशीभ्रम-मृद्यूत्तर संकोच-शक्ति काठिन्य-पेशी का रासायनिक संघटन-व्यायाम का शरीर पर प्रभाव-स्वतन्त्र पेशियों-शारीरिक चेष्टाएँ-प्रत्यावर्तित क्रिया ।

४१-८५

तृतीय अध्याय-रक्त

रक्त-रक्त के कार्य-सूक्ष्म रचना-रक्त की मात्रा-रक्तरस-रक्त-रस का रासायनिक संघटन-रक्तस्कन्दन-रक्तकण-रक्तकणों की गणना-रक्तस्रजकद्रव्य-श्वेतकण-रोगक्षमता-रक्तकणिका-रक्तवर्ग ।

८५-११८

चतुर्थ अध्याय-लसीका

भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक संघटन-लसीकासंस्थान-लसीकाप्रणियों-लसीका का प्रवाह-लसीका का निर्माण ।

११८-१२८

पञ्चम अध्याय-रक्तवह संस्थान

हृदय-हृदय के कोष्ठ-धमनियों-सिरायें-केशिका जालक-रक्त-संवहन-रक्तसंवहनक्रम-रक्तसंवहन के भौतिक कारण-हृत्कार्यचक्र-हृदयस्पन्द-हृदय-विद्युन्मापन-हृदयध्वनि-हृत्प्रतीघात-हृत्पेशी के गुणधर्म-हृदय का रक्तनिर्गत-रक्तभार-रक्तप्रवाह की गति-नाडी-नाडी की स्पर्शन परीक्षा नाडीस्पन्दमापक यन्त्र-रक्तसंवहन की

स्थानिक विशेषतायें-रक्तमंदहन पर प्रभाव डालने वाले कारण-
हृत्कार्य का नियन्त्रण-रक्तप्रवाह का नियमन-हृदय पर औषधों का
प्रभाव ।

१२८-१७७

षष्ठ अध्याय-श्वसनसंस्थान

श्वसनयन्त्र-श्वसनक्रिया-श्वसन के प्रकार-श्वसित वायु का
आयतन-श्वसनदर्प का नाडीजन्य नियन्त्रण-श्वसन-केन्द्रों पर गैसों
का प्रभाव-पर्वतरोग-श्वसन प्रक्रिया का स्वरूप-श्वसावरोध-रक्त में
गैसों की स्थिति-फुफुसों में वायवीय विनिमय की प्रक्रिया-धातु-
श्वसन-श्वसनांक ।

१७८-२१०

सप्तम अध्याय-शरीर का रासायनिक संघटन

शक्तत्व-स्नेह-मांसतत्व-मांसतत्वों का वर्गीकरण ।

२१०-२१५

अष्टम अध्याय-भौतिक रसायनशास्त्र और शारीरक्रियाविज्ञान

मे उसका महत्त्वपूर्ण उपयोग

ग्रामपरमाणु विलयन-प्रसरण-निस्पन्दन-मांसतत्वों का
व्यापनभार-पृष्ठमार-अधिशोषण ।

२१६-२२५

नवम अध्याय-आहार

आहार-आहारतत्वों का तापमूल्य-मांसतत्व के प्रभाव-
जीवनीय द्रव्य-आहार के रजक द्रव्य-निरिन्द्रिय लवण ।

२२५-२३५

दशम अध्याय-पाचन संस्थान

पाचन-किण्वतत्वों का वर्गीकरण-रासायनिक पाचन-लाला के
के कार्य-आमाशयिक पाचन-आन्त्रिक पाचन-आन्त्ररस-जीवाणुज
किण्वीकरण-आहार का शोषण-मात्मीकरण-इथुमेह-उपवासकाल में
मात्मीकरण-अम्लभाव, कटुभाव और क्षारभाव-क्षार और अम्ल
आहार का सन्तुलन-वृद्धजन केन्द्रीभवन-चर्वण-निगारण-परिसरण-
गति-वृद्धदन्त्र की गति ।

२३६-२१५

एकादश अध्याय-यकृत

यकृत-यकृत के कार्य-पित्त-पित्त का निर्माण-पित्तलवण
पित्तरजकद्रव्य-कोलेष्टरौल ।

२१६-२२४

द्वादश अध्याय-प्लीहा

प्लीहा-प्लीहा के कार्य ।

३२५

त्रयोदश अध्याय-मूत्रवहसंस्थान

शृक्-शृक् का कार्य-मूत्रनिर्माण की प्रक्रिया-शृक्कार्य का निय-
न्त्रण-शृक् की कार्यक्षमता-मूत्रत्याग-मूत्र का सामान्य स्वरूप-
मूत्र का सामान्य संघटन-यूरिया-यूरिक अम्ल-क्रियोटन-थमो-
निया-मूत्र के निरिन्द्रिय लवण-मूत्र के वैकृत अवयव और उनकी
परीक्षा ।

३२६-३७५

चतुर्दश 'अध्याय-अन्तःस्राव ग्रन्थियाँ

अन्तःस्राव ग्रन्थियाँ-कार्य-अन्तःस्राव-अधिशृक् ग्रन्थि-पोप-
णक ग्रन्थि-प्रैवेयक ग्रन्थि-परिप्रैवेयक-पीयूषग्रन्थि-वाल्प्रैवेयक-
प्लीहा-यौन ग्रन्थियाँ ।

३७५-४०२

पञ्चदश अध्याय-वाक्

स्वरयन्त्र-स्वरतन्त्री की गतियाँ-वाक् की उत्पत्ति-वाक् का
स्वरूप-शब्द ।

४०२-४१०

षोडश अध्याय-नाडीसंस्थान

वेन्द्रीय नाडीमण्डल-सुपुम्ना-मस्तुलुंगपिण्ड-घम्मिल्लक-मस्तिष्क
के कार्य-मस्तिष्क में विभिन्न क्षेत्रों का निरूपण-सुपुम्नाकाण्ड के
कार्य-प्रत्यावर्तित क्रिया-उत्तान प्रत्यावर्तित क्रियायें-स्वतन्त्र नाडी-
मण्डल-निद्रा ।

४११-४७१

सप्तदश अध्याय-संज्ञा

संज्ञा-वर्गीकरण-संज्ञा के गुणधर्म-आशयिक संज्ञायें-क्षुधा-
तृष्णा ।

४७१-४७४

अष्टादश अध्याय-रसना

रसना-स्वादकोरक-रस का प्रदूषण-रस का संवहन-रसों का
वर्गीकरण-रससंज्ञा का वितरण-रससंज्ञा का संमिश्रण-रस और
रासायनिक संघटन-रसनेन्द्रिय का महत्त्व ।

४७५-४८१

एकोविंश अध्याय-घ्राण

घ्राण-गन्धसंज्ञा का आदान-गन्धसंज्ञा का संवहन-गन्धसंज्ञा का वर्गीकरण-गन्धवैषम्य-घ्राणमापन-घ्राणमापक यन्त्र-गन्धसंज्ञा का स्वरूप और महत्त्व ।

४८२-४८६

विंश अध्याय-चक्षु

नेत्र-रचना-नेत्रगतभार-दर्शन-प्रतिबिम्ब का निर्माण-रश्मि-केन्द्रीकरण-दृष्टिसम्बन्धी विकार-तारामण्डल के कार्य-तारामण्डल पर औपद्यो का प्रभाव-दृष्टिवितान के कार्य-दृष्टिवितान में परिवर्तन-दृष्टिनेत्र-अनुप्रतिबिम्ब-नेत्र और कैमरा-वर्णदर्शन-वर्णदर्शन के सिद्धान्त-वर्णान्धता-नेत्र की गति-द्विनेत्र-दर्शन ।

४८७-५३४ ।

एकविंश अध्याय-श्रोत्र

श्रोत्र-स्वेदादानिका-शब्द का संवहनमार्ग-शब्द के गुणधर्म-शब्द की गति-श्रवण के सिद्धान्त ।

५३५-५४७

द्वाविंश अध्याय-त्वचा

त्वचा-यहिस्त्वक्-अन्तस्त्वक्-त्वचा के परिशिष्ट भाग-पिङ्गु-प्रन्थियाँ-स्वेदप्रन्थियाँ-स्वेद-स्पर्शाङ्कुरिका-त्वचा के कार्य ।

५४८-५५३

त्रयोविंश अध्याय-नाभ

ताप-ताप का नियमन-रासायनिक नियमन-भौतिक नियमन-तापनियामक केन्द्र-तापनियमन के विचार ।

५५३-५६०,

चतुर्विंश अध्याय-प्रजनन-संस्थान

अमर जीव-प्रजनन-पुरुषप्रजनन यन्त्र-स्त्रीप्रजनन यन्त्र-बीजक्रिणपुट-शुक्रक्रीडाणुओं का विकास-स्त्रीबीज का विकास और परिपाक-गर्भाधान-गर्भविकास-गर्भकला-भ्रूणावरण गर्भोदक के कार्य-अपरा-गर्भस्थ शिशु का रक्तसंवहन ।

५६०-५८८



अभिन्न शरीर-क्रिया-विज्ञान

प्रथम अध्याय

कोषाणु (Cell)

सृष्टिके अन्य पदार्थों के समान मानवशरीर भी त्रिष्वकलाकारकी एक रहस्यमय रचना है। जिस प्रकार ईंटों के समूह से बड़ी २ अट्टालिकायें खड़ी हो जाती हैं, उसी प्रकार प्राणियों का शरीर भी ऐसे ही सूक्ष्म अवयवों के संयोग से निर्मित होता है। शरीर के इन सूक्ष्म आरम्भक भागों को 'कोषाणु' कहते हैं। छोटे शरीरवाले प्राणियों में इनकी संख्या कम तथा बड़े शरीरवाले प्राणियों में इनकी संख्या अधिक होती है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोषाणु से ही बना होता है। इसप्रकार कोषाणुओं की संख्या के अनुसार प्राणियों के दो विभाग किये जा सकते हैं —

(१) एककोषाणुधारी-(Unicellular)-यथा अमीबा, ऐलगी आदि।

(२) बहुकोषाणुधारी-(Multicellular)-यथा मनुष्य, घोड़ा आदि।

एककोषाणुधारी प्राणियों में जीवन की सारी क्रियायें एक ही कोषाणु के द्वारा संपादित होती हैं। यथा अमीबा एक ही कोषाणु में भोजन भी ग्रहण करता श्वसन का कार्य भी करता और मल को भी बाहर निकालता है। विकासक्रम से जब कोषाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, तब इनका कार्य भी विभाजित होता जाता है। इसप्रकार जब समान कार्य करनेवाले कोषाणु एकत्रित होकर एक निश्चित शरीर रचनाओं का निर्माण करते हैं, तब उन्हें यन्त्र या अंग (Organs) कहते हैं। ये यन्त्र अपने २ विशिष्ट कार्य का सम्पादन करते हैं, किन्तु इनके कार्यनिरपेक्षरूप

से न होकर अन्य यन्त्रों के सहयोग के आधार पर ही होते हैं। ऐसे समान क्रिया-वाले सहयोगी अंगों के समूह को 'तन्त्र' या 'संस्थान' (System) कहते हैं। शरीर में विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित तन्त्र हैं:—

(१) पाचनतन्त्र (Digestive system) :—इसका कार्य आहार का पाचन करना है।

(२) श्वसनतन्त्र (Respiratory system) :—इसका कार्य वायु से ऑक्सिजन ग्रहण करना तथा कार्बनडाइऑक्साइड को बाहर निकालना है।

(३) रक्तसंवहनतन्त्र (Circulatory system) :—इसका कार्य पोषक पदार्थ को शरीर के धातुओं तक पहुँचाना है।

(४) मलोत्सर्गतन्त्र (Excretory system) :—इसका कार्य शरीर की प्राकृत क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न मलों को शरीर से बाहर निकालना है।

(५) पेशीतन्त्र (Muscular system) :—अंगों में गति उत्पन्न करना इसका कार्य है।

(६) अस्थिसंस्थान (Skeletal system) :—यह शरीर को स्थिर करता है तथा शरीर के सुकोमल अवयवों की रक्षा करता है।

(७) नाडीतन्त्र (Nervous system) :—यह अन्य तन्त्रों की क्रियाओं का संचालन, नियन्त्रण एवं नियमन करता है।

(८) ग्रन्थिसंस्थान (Glandular system) :—यह विभिन्न स्रावों के द्वारा शरीर की क्रियाओं में सहायता पहुँचाता है।


कोषाणु की रचना

वस्तुतः जीवकोषाणु भोजनसार का 'केन्द्रकयुक्त समूह' है। इसकी रचना अतीव सूक्ष्म होती है और सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से ही देखी जा सकती है। मनुष्य-शरीर में इसका व्यास $\frac{1}{1000}$ से $\frac{1}{500}$ इंच तक होता है। इसमें निम्नलिखित अवयव होते हैं:—

(१) भोजनसार (Protoplasm) :—यह कोषाणु का मुख्य भाग होता है, जो समूचे कोषाणु में भरा रहता है।

(२) केन्द्रक (Nucleus) :—यह कोषाणु के केन्द्र में पाया जाता है।

(३) आकर्षक मण्डल और आकर्षक बिन्दु (Centriome and Centriole)—यह ओज सार में केन्द्रक के निकट स्थित रहते हैं ।



चित्र १—जीव कोषाणु

ओज सार

यह एक अर्धद्रव पिच्छिल पदार्थ है, जो संपूर्ण कोषाणु में भरा रहता है । परिस्थितियों के अनुसार इसकी अवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं और तदनुसार इसकी रचना में विभिन्नता दिखाई देती है । अवस्थाओं के अनुसार यह कभी स्पष्ट, कभी कणयुक्त, कभी फेनिल और कभी जालाकार दिखाई देता है । रचना की परिवर्तनशीलता के कारण इसके स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों में अनेक मत प्रचलित हैं, किन्तु अधिकांश जालाकार रचना के ही पक्ष में हैं । इसके अनुसार ओज सार के दो भाग होते हैं :—जालकसार और स्वच्छसार । भिन्न-० कोषाणुों में दोनों के अनुपात में भेद होता है । नवजात कोषाणुओं में प्रायः स्वच्छसार अधिक और जालकसार बहुत कम होता है, किन्तु ज्यों ज्यों कोषाणुओं के आकार में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों जालकसार की मात्रा बढ़ती जाती है । स्वच्छसार में कुछ अन्य वस्तुओं के कण भी पाये जाते हैं, जिनमें घसा के कण, तैल, सूत पदार्थ, रसाकण तथा शर्कराजनक के कण मुख्य

हैं। इस बात पर भी सब विद्वान् एकमत हैं कि ओज सार के दो भाग होते हैं—सक्रिय और निष्क्रिय। ओज सार की प्राकृत क्रियाओं का कारण सक्रिय भाग ही है।

ओज-सार का रासायनिक सघटन

परिवर्तनशीलता तथा कोमलता के कारण जीवित अवस्था में कुछ भी इसके सम्बन्ध में पता लगाना असम्भव है। ओज सार का रासायनिक सघटन निम्नलिखित है—

(१) जल— $\frac{3}{4}$ (२) ठोस पदार्थ— $\frac{1}{4}$

ठोस पदार्थों में निम्नलिखित द्रष्टव्य हैं—

(क) खनिज लवण—विशेषतः सोडियम, पोटेशियम और कैल्सियम के फास्फेट और क्लोराइड।

(ख) मांसतत्त्व। (ग) स्नेह।

(घ) शाकतत्त्व—श्वेतसार और शर्करा।

ओज-सार के गुणकर्म

ओज सार जीवन का मूलतत्त्व है। उसके जीवित रहने पर ही शरीर में जीवन के लक्षण पाये जाते हैं और उसके निर्जीव हो जाने पर शरीर का जीवन भी गष्ट हो जाता है। ओज सार के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जो जीवन के लक्षण भी कहे जाते हैं—

(१) उत्तेजितत्व (Excitability)—यह ओज सार का प्रधान गुण है। अभीष्ट म इसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यदि जलविन्दु से उसके शरीर का संपर्क कराया जाय, तो ओज-सार के उत्तेजित होने से वह शीघ्र दूसरी ओर की भागने लगेगा। शरीर में कौटा चुभने पर इसी गुण के कारण उसका अनुभव होता है।

(२) आहरण (Assimilation)—पोषक पदार्थों का ग्रहण एवं सामीकरण जीवित पदार्थों का प्रधान गुण है।

(३) वर्धन (Growth)—जीवित शरीर में उसके प्रत्येक भाग की आहरण एवं विभजन के द्वारा वृद्धि होती है।

(४) उत्पादन (Reproduction)—इसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने वंश की रक्षा एवं वृद्धि करता है।

(५) मलोत्सर्ग (Excretion)—भोजन के ग्रहण तथा शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं से उत्पन्न मलों का त्याग करना भी जीवन के लिए आवश्यक होता है ।

केन्द्रक (Nucleus)

स्वरूप—यह गोल या अंडाकार होता है और प्रायः कोषाणु के बीच में पाया जाता है । कभी २ इसका आकार अनियमित होता है और कुछ कोषाणुओं में एक से अधिक केन्द्रक मिलते हैं ।

रचना—इसके चार भाग होते हैं । सबसे बाहर की ओर केन्द्रकावरण (Nuclear membrane) होता है जिसमें वह चारों ओर के भोजन सार से घृयक् रहता है । इसके भीतर दो भाग होते हैं । एक कोपसार की भांति स्वच्छ, पिच्छिल और अर्धद्रव पदार्थ होता है जो केन्द्रक में भरा रहता है, इसको केन्द्रकसार (Karyoplasm) कहते हैं । दूसरा भाग सूत्रों का बना होता है जो केन्द्रकसार में जाल की भांति फैले रहते हैं । यह केन्द्रकसूत्र (Chromoplasm या Nuclear fibrils) कहलाते हैं । इन सूत्रों को रञ्जित करने से इन पर गहरे रंग की सूक्ष्म ग्रन्थियां दिखाई देती हैं, जो क्रोमेटिन नामक वस्तु की बनी होती हैं । केन्द्रक के भीतर एक बड़ा गोल कण पाया जाता है जिसको केन्द्रकाणु (Nucleolus) कहते हैं । कभी २ इनकी संख्या अनेक होती है ।

उपादानतत्त्वः—केन्द्रक प्रोटीन सट्टश पदार्थों से बना होता है । उसके मुख्य पदार्थ का नाम न्यूक्लीन है । इसमें साधारण मोसतत्त्व से फास्फोरस का भाग अधिक होता है । कभी २ लौह भी पाया जाता है । इस पर आम्लिक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः यह अमाशय में नहीं घुलता ।

कार्यः—कोषाणु के पोषण और विभजन का नियन्त्रण केन्द्रक के द्वारा होता है । अतः कोषाणु की वृद्धि, उत्पादन सब क्रियाये केन्द्रक पर ही अवलम्बित रहती हैं । यदि कोषाणु से केन्द्रक को छुट्का दिया जाय, तो इसकी मृत्यु हो जायगी ।

केन्द्रकाणु के कार्य के सम्बन्ध में अभी तक कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है । कुछ विद्वान् इसका कार्य कोषाणुविभजन के समय क्रोमोसोमों के निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुओं का सग्रह मानते हैं । दूसरे मत के अनुयायी यह मानते

हैं कि यह केन्द्रक के त्याज्य भाग हैं, जो उसमें पृथक् हो कोपसार में जाने पर वहाँ नष्ट हो जाते हैं।

आकर्षकमण्डल (Attraction sphere)

यह सब कोषाणुओं में नहीं पाया जाता। जिनमें विभजन और उत्पत्ति होती है, उनमें यह अवश्य पाया जाता है। इसमें बीच में एक बिन्दु होता है, जिसे 'आकर्षकबिन्दु' कहते हैं। इसमें ओजसार को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है, जिससे इसके चारों ओर सूर्य या चन्द्रमा के समान रश्मियों का एक मण्डल निकलता हुआ दिखाई देता है। कोषाणुओं के विभजन के पूर्व ही इसका दो भागों में विभार हो जाता है।

कार्यः—आकर्षक बिन्दु कोषाणुओं के विभजन में प्राथमिक प्रेरणा प्रदान करता है। कुछ विद्वानों के मत में यह कोषाणु की कर्मशक्ति का केन्द्र है।

तन्तु (Tissues)

समान आकार तथा क्रिया वाले कोषाणुओं के अगनिर्माणकारी समुदाय को तन्तु कहते हैं। यह चार प्रकार के होते हैं:—

१. आवरक (Epithelial)
२. संयोजक (Connective)
३. पेशी (Muscular)
४. नाडी (Nervous)

आवरक तन्तु

कार्यः—इसका कार्य शरीर के बाह्य एवं आन्तर्य पृष्ठों को आच्छादित कर उनकी रक्षा करना है। यह निम्नलिखित स्थानों में पाया जाता है:—

अधिष्ठानः—(१) चर्म का बाह्य स्तर—इसका कार्य त्वचा को आघात से बचाना है।

(२) श्वासप्रणाली, नासिका और मुखकुहर के अन्तःपृष्ठ—यहाँ इसका कार्य तापक्रम को समान रखना तथा निरन्तर स्राव के द्वारा सारे पृष्ठ को आर्द्र रखना है।

(३) पाचनप्रणाली, आमाशय, अंत्र, गुदा इत्यादि का अन्तःपृष्ठ—यहाँ उसका कार्य पाचकरसों को बनाना तथा आहाररस का शोषण है।

(४) शरीर की स्नेहिक गुहायें—यहाँ उनका कार्य अपने स्निग्ध स्राव द्वारा कटा के पृष्ठों को आर्द्र और स्निग्ध रखना है।

(५) जननेन्द्रियों और मूत्रमार्ग का अन्तःपृष्ठ।

- (६) शरीर की सब ग्रन्थियों और उनकी नलिकाओं का अन्तःपृष्ठ ।
- (७) रक्त तथा रसवाहिनी नलिकाओं का अन्तःपृष्ठ ।
- (८) मस्तिष्क के कोष्ठों का भीतरी आवरण ।
- (९) सुषुम्ना की मध्य नलिका और उसका अन्तःस्तर ।
- (१०) ज्ञानेन्द्रियों के अन्तिम सूक्ष्म भाग ।

प्रकारः—आवरक तन्तु कोषाणुओं की एक या अधिक पक्तियों से बना होता है । इसी आधार पर पहले इसके दो प्रकार किये गये हैं :—


- (१) सामान्य (Simple)
- (२) स्तरित (Stratified)

कोषाणुओं की एक पंक्ति से बने हुए तन्तु को सामान्य तथा अनेक पंक्तियों से निर्मित तन्तु को स्तरित कहते हैं ।

सामान्य आवरक तन्तु पुनः तीन प्रकार का होता है :—

१. शल्की (Squamous)
२. स्तम्भाकार (Columnar)
३. रोमिकाय (Ciliated)


(१) शल्की :—यह चपटे प्रायः पञ्च या षट्कोणाकार कोषाणुओं से बना होता है । इससे निर्मित कला देखने में 'मोजेक' नामक फर्श के समान दिखलाई देती है । ऐसी कला फुफ्फुस के वायुकोषों में पाई जाती है ।



(२) स्तम्भाकार :—यह लम्बे लम्बे स्तम्भ के आकार के कोषाणुओं से बना होता है । इस कला से पाचनसंस्थान का दलैप्तिक स्तर तथा उसकी ग्रन्थियों का अन्तःपृष्ठ, मूत्रमार्ग, शुक्रवहनलिका, पौरुषग्रन्थिनलिका तथा कुछ अन्य ग्रन्थियाँ भी आच्छादित हैं ।

चित्र २—शल्की आवरक तन्तु

कभी २ इस कला के ऊपरी पृष्ठ के कुछ कोषाणुओं की चौड़ाई अधिक हो



जाने से, ये मद्यपात्र के समान दिखाई देने लगते हैं। उनके भीतर 'ग्लूसिनोजन' नामक श्लेष्मल पदार्थ भर जाता है। इन्हें 'पिटक कोषाणु' (Goblet Cells) कहते हैं। ये आमाशय, आमाशयकी श्लैष्मिक कला, वृहदन्त्र की प्रन्धियों, धासमार्ग तथा क्षुद्रान्त्र अणुरों को आच्छादित करने वाली उपकला में अधिक पाये जाते हैं।

चित्र ३—स्तम्भाकार आवरकतन्तु

(३) रोमिकामय — इसके कोषाणुओं के ऊपरी पृष्ठ से अत्यन्त सूक्ष्म




चित्र ३—रोमिकामय आवरक तन्तु

गतिसपन्न सूत्र निकले रहते हैं, जिन्हें 'रोमिका' (Cilia) कहते हैं। रोमिकाओं की मख्या के सरध में मतभेद है, तथापि इनकी सख्या १ से २४ तक हो सकती है। इन रोमिकाओं से अत्यन्त सूक्ष्म तन्तु कोषाणु के दूसरे सिरे तक जाते हुये दिखाई देते हैं। यह सपूर्ण धासमार्ग, श्रोत्रगुहा, श्रोत्रनलिका, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय का गात्र और उसकी गुहा, डिम्बवह नलिकाएँ, मरितपक्क के कोष्ठ और सुषुम्नाकाण्ड की मध्यनलिका इसीसे आच्छादित है।

स्तरित आवरक तन्तु कोषाणुओं की कई पक्तियों का घना होता है। इसमें

नीचे के कोषाणु स्तम्भाकार और ऊपर के चपटे होते हैं । यह त्वचा, नेत्राच्छादनी, नासिका, मुखकुहर, ग्रसनिका के अधोभाग और पाचनप्रणाली में पाया जाता है ।



चित्र ५—स्तरित आवरक तन्तु

संयोजक तन्तु (Connective tissue)

इस तन्तु का कार्य विभिन्न तन्तुओं एवं भागों को परस्पर जोड़ना है । शरीर में अन्य तन्तुओं की अपेक्षा इसका परिमाण अधिक पाया जाता है । कोषान्तरिक पदार्थों में भिन्न २ अवस्थाओं के एकत्र होने से इनके आकार में बहुत भिन्नता आ जाती है । तदनुसार ही उनके गुणकर्म में भी अन्तर आ जाता है ।

संयोजक तन्तु तीन प्रकार के होते हैं:—

१. सौत्रिक तन्तु (Fibrous tissue)

२. तहगास्थि (Cartilage) ३. अस्थि (Bone)

कुछ लोगों के मत में:—


४. रक्त और ५. हसीका भी संयोजक तन्तु के ही अंतर्गत हैं ।

सौत्रिक तन्तु

सौत्रिक तन्तु अत्यन्त सूक्ष्म सूत्रों के गुच्छों से बना होता है । ये सूत्र एक अर्धतरल पदार्थ में स्थित होते हैं, जिसके द्वारा वे परस्पर मिले रहते हैं । इसी पदार्थ की मात्रा के अनुसार संयोजक तन्तु के कई प्रकार किये गये हैं:—

(१) श्लेष्मल (Mucoid) :—इसमें भूमिपदार्थ का भाग अधिक होता है और सूत्रों की न्यूनता होती है । यह नवजात शिशु के नाल में, संयोजक तन्तु के विकास के समय भ्रूण में तथा नेत्र के सान्द्रजल में पाया जाता है ।

(२) श्वेत सौत्रिक (White fibrous) :—यह श्लेष्मल तन्तु के कोषाणुओं से बना है । इसमें श्वेत सूत्रों की प्रधानता होती है । किन्तु कुछ पीत सूत्र भी होते हैं । भूमिपदार्थ बहुत थोड़ी होती है । सूत्र सूक्ष्म, पारदर्शी, समानान्तर तरंगवत गुच्छों के रूप में पाये जाते हैं । यह तन्तु अत्यन्त चमकीला श्वेत, दृढ़ और स्थितिस्थापकतारहित होता है । कण्डराओं में इस तन्तु के विशेष आकार के कोषाणु पाये जाते हैं, जिन्हें 'कण्डरा-कोषाणु' कहते हैं । इस तन्तु से कण्डरा, स्नायु, प्रावरणी और पेश्यान्तरिक फलक बनते हैं ।




(३) पीत स्थितिस्थापक (Yellow elastic) :—इस तन्तु में पीत स्थितिस्थापक सूत्रों की अधिकता होती है, जिनके कारण इसमें स्थितिस्थापकता का गुण आ जाता है । यह पीत स्नायु, स्वरकपाट, श्वासप्रणाली की श्लैष्मिक कला, रक्तनलिकाओं के स्तर और स्वरयन्त्र से सरइ स्नायु में अधिक होता है ।

चित्र ६—श्वेत सौत्रिक तन्तु

(४) सान्तरित (Areolar) :—इस तन्तु का विशेष गुण स्थितिस्थापकता और विस्तृतत्व है । यह त्वचा के नीचे, पाचनप्रणाली में श्लैष्मिक कला के नीचे, पेशी, रक्तनलिकाओं तथा नाडियों के पिधानरूप होता है तथा उन्हें


निकट ५ अंगों के साथ जोड़ता है । इसके अतिरिक्त शरीर के विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ने तथा उनके आवरणों के स्तर बनाने का कार्य करता है ।



चित्र ७—सान्तरित तन्तु

शरीर के किसी किसी भाग में यह तन्तु बसा कोषाणुओं से युक्त होता है और तब उसे वसामय तन्तु (Adipose tissue) कहते हैं । प्रत्येक कोषाणु के चारों ओर एक कोमल कला घड़ी रहती है और उसके भीतर बसा पदार्थ भरा रहता है । यह वसापदार्थ जीवन में तरलरूप में रहता है, किन्तु मृत्यु के बाद जम जाता है ।

उदर के अधस्त्वग्भाग, वृक् के चारों ओर तथा अस्थियों की मज्जा



में जस्ता की मात्रा अधिक होती है। नेत्रपटल, शिशु, अङ्कोप, लघुमगोष्ठ के अधस्त्वग्भाग, करोटिगुहा तथा पुच्छों में इस तन्तु का अभाव होता है।

(५) जालकतन्तु (Retiform tissue).—इस तन्तु का भूमिपदार्थ सरल होता है जिसके भीतर संयोजक

चित्र ८—जसामय तन्तु तन्तु के अत्यन्त सूक्ष्ममूत्रों का जाल सा फैला रहता है। कुछ स्थानों में जाल में रक्त तथा लसीका के समान कण पाये जाने के कारण इसे 'लसिका' या 'प्रस्थितन्तु' (Lymphoid tissue) कहते हैं। यह तन्तु शरीर की लसीकाप्रस्थियों, जन्त्र की प्रस्थियों तथा गलप्रस्थियों में अधिक पाया जाता है।

रंगयुक्त संयोजक तन्तु कोषाण (Pigment cells)

यह कोषाण बड़े और शाखायुक्त होते हैं। इनमें स्थित रजक कणों का रंग भूरा, काला या कभी २ पीला होता है। यह नेत्र के अन्तःपटल के बाह्य स्तर, तारामण्डल के पश्चिम पृष्ठ, नासा के गन्धघाटक ग्रन्थि, अन्तर्कर्ण के कलामय भाग, बाह्यचर्म के भीतरी स्तर तथा बालों में पाये जाते हैं। श्वेतमांसपातियों की त्वचा में इसकी अधिकता होती है। इनका कार्य नीचे के अंगों को सीधे सूर्यप्रकाश से बचाना है।

संयोजक तन्तु की रक्तनलिकायें और नाडियाँ

संयोजक तन्तु में रक्तवाहिनियों की न्यूनता तथा रसायनियों की प्रधानता होती है, तथापि श्वेतसूत्रिक तन्तु में अपेक्षाकृत रक्त का सञ्चार अधिक होता है। इसमें नाडियाँ भी पाई जाती हैं, किन्तु सान्तरित प्रकार में नाडियों का अभाव होने से वह चेतनारहित होता है।

तरुणास्थि (Cartilage)

इस तन्तु में रक्त का सञ्चार नहीं होता तथा कोषान्तरिक पदार्थ अत्यन्त

सघन और सूत्ररहित रहता है । तरुणास्थि कठिन और स्थितिस्थापक होती है । किन्तु तीव्र धार के चाकू से कट जाती है तथा उसका टुकड़ा अपारदर्शी सीप के समान नीलिमामय रंग और वहाँ २ पीला भी दिखलाई देता है । शरीर के अनेक भागों, सन्धियों, वक्ष, श्वासनलिका, नासिका और नेत्र में यह पाई जाती है । भ्रूणावरथा में कंकाल तरुणास्थियों का ही बना होता है जो क्रमशः अस्थि में परिणत हो जाती है ।

प्रकार—रचना के अनुसार इसके चार प्रकार किये गये हैं:—

- (१) कोषमय (Cellular) (२) शुभ्र (Hyaline)
- (३) श्वेतसौत्रिक (White fibrocartilage)
- (४) पीतसौत्रिक (Yellow fibro cartilage)


स्थिति के अनुसार भी इसके भेद किये गये हैं । यथा—

- (१) सन्धिक (Articular) (२) सन्धिकान्तरिक (Inter-articular)
- (३) पशुकीय (Costal) (४) कलावत् (Membraneform)

(१) कोषमय तरुणास्थि—यह केवल नोपों से ही बनी होती है तथा चूहे और कुछ स्तनधारी जन्तुओं की कर्णपाली में पाई जाती है । मानवभ्रूण के पृष्ठदण्ड में भी यह पाई जाती है ।

(२) शुभ्र तरुणास्थि—शरीर में इस प्रकार की तरुणास्थि अधिक पाई जाती है । इसका भूमिपदार्थ स्वच्छ, सूत्ररहित और तरुणास्थियोपाणुओं से युक्त होता है । कोषाणु कोणयुक्त दो या अधिक के समूह में स्थित होते हैं । कोषाणु अपारदर्शी और कणयुक्त होता है । इसके भूमिपदार्थ में एक प्रकार के गड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें 'गर्तिका' (Lacunae) कहते हैं । कुछ लोग यह मानते हैं कि तरुणास्थि में अत्यन्त सूक्ष्म नलिकायें होती हैं जो गर्तिकाओं को परस्पर संबन्धित करती हैं और ऊपर की ओर आवरक कला से मिली रहती हैं । इस प्रकार इन नलिकाओं द्वारा तरुणास्थि में पोषण पहुँचता रहता है । यह

तरुणास्थ्यावरक कला (Perichondrium) से ढँकी रहती है, किन्तु सन्धि के तरुणास्थियों का अधिकांश भाग स्नेहिक कला से ढँका रहता है ।



चित्र ९—शुभ्र तरुणास्थि

है । इसका कार्य सन्धि की गति में सहायता प्रदान करना है ।

(ख) संयोजक सौत्रिक (Connecting fibrocartilage).—यह कशेरुकासन्धि और भगमंधानिका जैसी अत्यल्पपेष्टाशील संधियों में पाई जाती है ।

(ग) परिधिस्थ सौत्रिक (Marginal fibrocartilage).—कुछ सन्धियों में अस्थि के सिरों की परिधि पर यह एक कुण्डल के रूप में लगा रहता है, जिसके कारण सन्धि की गहराई अधिक हो जाती है । न्यन्ध और वंछणसंधि में ऐसी ही तरुणास्थि रहती है ।

(घ) स्तराकार सौत्रिक:—(Stratiform fibrocartilage).—यह कण्डरा की परिखाओं और नलिकाओं पर लगी रहती है, जिससे अस्थि के साथ कण्डरा का संघर्ष नहीं होने पाता । कुछ पेशियों की कण्डराओं में तरुणास्थि के

(३) श्वेत सौत्रिक तरुणास्थि—यह श्वेतसूत्रों के गुच्छों और कोषाणुओं से बनी है । इसमें स्थिति-स्थापनता और दृढ़ता दोनों गुण होते हैं । यह चार समूहों में विभक्त है :—

(क) सन्ध्यन्तरिक:—यह चपटे गोल या त्रिकोण पट्ट के समान होती है और हनुसंयोजक, उरोऽस्तक, असाक्षक, मणिबन्ध तथा जानुसंधियों में पाई जाती

छोटे २ टुकड़े इसी कार्य के लिए होते हैं, उन्हें चमकदारगस्थि (Sesamoid fibrocartilage) कहते हैं ।

(४) पीत या स्थितिस्थापक सौत्रिकः—इसके भूमिपदार्थ में कोषाणु और पीत वर्ण के स्थितिस्थापक सूत्र फैले रहते हैं । यह वर्णपाली, श्रवणनलिका, स्वरगन्ध और स्वरगन्धच्छद में पाई जाती है ।

तरुणास्थियों में रक्तनलिकायें और नाड़ियाँ

तरुणास्थियों में रक्तनलिकायें और नाड़ियों का अभाव रहता है । इनका पोषण पार्श्ववर्ती धानुओं, विनोपतः अग्नि से होता है ।


अस्थि

स्वरूप—अस्थि कठिन और दृढ़ होती है, किन्तु उसमें कुछ स्थितिस्थापकता भी होती है । उसके भीतर मज्जा भरी रहती है और अस्थियों के पोषण के लिए रक्तनलिकायें भी होती हैं ।

वर्णः—अस्थि का वर्ण बाहर की ओर श्वेत होता है, जिसमें नीले और गुलाबी रंग की आभा मिली रहती है । काटने पर वह भीतर से गहरी लाल दिवाई देती है ।

रचनाः—अस्थि को काटकर सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखने से उसमें दो भाग स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं । एक की रचना अत्यन्त सघन होती है, उसे संहत भाग (Compact layer) कहते हैं तथा दूसरे की रचना विच्छिन्न एवं सच्छिद्र होती है, उसे सुपिर भाग (Spongy layer) कहते हैं । अस्थि के बाहर की ओर संहत भाग तथा भीतर की ओर सुपिर भाग होता है । भिन्न २ अस्थियों में इन दोनों भागों की मात्रा में अन्तर होता है । छोटी कोमल अस्थियों में सुपिर भाग तथा दृढ़ अस्थियों में संहत भाग अधिक रहता है । रक्तनलिकायें अस्थ्यावरण होकर अस्थि में पहुँचती हैं । अस्थि

के भीतर एक लगी नलिका होती है जो मज्जपरा कहा से घेयित रहती है ।



चित्र १०—अस्थिका अनुग्रस्थ परिच्छेद


रासायनिक संगठन:—

(१) ज्ञान्तव पदार्थ $\frac{1}{3}$ (२) अनैन्द्रिक पदार्थ $\frac{2}{3}$

ज्ञान्तव पदार्थ के कारण अस्थि में स्थितिस्थापकता तथा अनैन्द्रिक पदार्थ के कारण कठिनता और दृढ़ता उत्पन्न होती है । यदि अस्थि को किसी धातुवीय अम्ल में डाला जाय तो अनैन्द्रिक लवण घुल जाते हैं और केवल एक लचीली वस्तु रह जाती है । ज्ञान्तवपदार्थ कोलेजिन नामक वस्तु का बना होता है ।

अनैन्द्रिक भाग में चूने के लवण होते हैं, जिनमें विशेषतः खटिक के फास्फेट, फ्लोराइड, क्लोराइड और कार्बोनेट लवणों का भाग रहता है। कुछ मैगनेशियम के लवण भी पाये जाते हैं।

अस्थ्यावरक कला (Periosteum)



चित्र ११—अस्थिका अनुच्छेद परिच्छेद

tissue) का एक स्तर रहता है, जिसमें आस्थुपादक कण (Osteoblast) होते हैं। इन्हीं कणों से अस्थि का विकास होता है। आस्थु अधिक होने पर यह तन्तु नष्ट हो जाता और कला भी पतली हो जाती है। वस्तुतः अस्थि के जीवन और विकास का स्रोत यही कला है और इसलिए उसे 'अस्थिधरा कला' भी कहते हैं। इस कला के घट या नष्ट होने से अस्थि में चय उत्पन्न हो जाता जाता है। कला में रक्तनलिकाओं के साथ २ गादियाँ नीर रसायनियाँ भी पाई जाती हैं।

मज्जा

अस्थि के भीतर लम्बी नलिकाओं, सुपिर धातु के छिद्रों तथा हेवर्शियन नलिकाओं में मज्जा भरी रहती है। लम्बी नलिकाओं में पीतवर्ण की मज्जा होती है, जिसमें अधिकांश वसा होती है। सुपिर अस्थि में रक्तवर्ण की मज्जा होती है, जिसमें वसा की अत्यल्प मात्रा होती है। यह मज्जा रक्त को उत्पन्न करने का विशेष अंग है, अतः इसमें भिन्न २ अवस्थाओं में रक्तवर्णों की उपस्थिति देखी जाती है।

अस्थि की सूक्ष्म रचना

ऊपर कहा जा चुका है कि अस्थि में दो भाग होते हैं, महत और सुपिर। अस्थि का व्यवस्त परिच्छेद कर उसकी परीक्षा करने से उसमें अनेक गोल २ प्रान्त दिखाई देते हैं, जिनके बीच में एक बड़ा छिद्र होता है और उसी चारों ओर केन्द्रीय रेखाएँ स्थित होती हैं। बीच का छिद्र वास्तव में एक नलिका का मुख है, जिसको 'हेवर्शियन नलिका' कहते हैं। अनुदैर्घ्य परिच्छेद करने पर ये नलिकाएँ चारों ओर फैली हुई स्पष्टतः दिखाई पड़ती हैं। इस नलिका के चारों ओर जो रेखाएँ हैं, वे अस्थि तन्तु की स्तरांशों (Lamellae) हैं जो मध्य नलिका के चारों ओर एवकेन्द्रिक क्रम में स्थित हैं। इन स्तरांशियों के बीच अथवा उन्हीं की रेखाओं पर गर्तिमाये (Lacunae) स्थित हैं, जो परस्पर तथा हेवर्शियन नलिकाओं से अत्यन्त सूक्ष्म प्रणालियों (Canaliculi) द्वारा सन्निहित हैं। इस प्रकार का प्रत्येक प्रान्त 'हेवर्शियन माडल' कहलाता है। प्रत्येक गर्तिमा में एक अस्थिमोषण स्थित होता है।

अस्थि में रक्तसंवहन

अस्थिधरा कला के नीचे रक्तग्राहिनियों का जाल-सा फैला रहता है जिससे शाखाये निकल संपूर्ण अस्थि का पोषण करती हैं। रसायनियां हेवसियन नलिका में स्थित होती हैं और अस्थिधरा कला की नलिकाओं से सम्बन्धित रहती हैं। नाडियों भी अस्थिधरा कला में फैली रहती हैं और बमनियों के साथ भीतर चली जाती हैं। अस्थियों के सहायक पृष्ठ, यही चपटी अस्थियों और कशेरुकाओं में इनकी सख्या पर्याप्त रहती है।

अस्थियों का विकासक्रम

भ्रूणावस्था में सर्वप्रथम अस्थियों का कोई चिह्न नहीं होता और सारे शरीर की रचना एक समान होती है। कुछ समय के बाद क्रमशः अस्थियों के स्थान पर तरुगास्थियां उत्पन्न होती हैं और फिर धीरे-धीरे २ इन्हीं से अस्थि का विकास होता है।

सामान्यतः इसी प्रकार तरुगास्थि से ही अस्थि का विकास होता है, किन्तु बहुत-सी अस्थियों का निर्माण भ्रूणावस्था के कलारूप सञ्जक तन्तु से होता है, यथा—करोटि की अस्थियां। इस प्रकार अस्थिविकास दो प्रकार से होता है:—

१. कलान्तरिक (Intramembranous)

२. तरुगारध्यन्तरिक (Intra-Cartilaginous)

(१) कलान्तरिक विकास:—अस्थिजनक कलाके भूमिपदार्थ में कण-युक्त कोषाणु और सूत्र स्थित होते हैं तथा वहां रक्त का भी पर्याप्त वितरण होता है। ये कोषाणु 'अस्थिजनक कोषाणु' (Osteogenetic Cells) कहलाते हैं। अस्थिनिर्माण प्रारंभ होने पर किसी केन्द्रस्थान से चारों ओर सूत्र निकलने लगते हैं और संपूर्ण कला में फैलकर जाल-सा बना देते हैं। इन सूत्रों को 'अस्थिजनक सूत्र' (Osteogenetic fibres) कहते हैं। इसी समय इन सूत्रों के बीच २ में खटिक पदार्थ पृष्ठ होने लगता है। कुछ समय में खटिक-कण परस्पर मिलकर एक समान हो जाते हैं और इस समय सूत्र भी नहीं दिखाई देते। अस्थिजनक कोषाणु ही अस्थिकोषाणु हो जाते हैं और खटिक पदार्थ में उनका स्थान ही गर्तिका का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार क्रमशः अस्थि-

तन्तु का एक जाल-सा बन जाता है जिसमें रक्तवाहिनियाँ, अस्थिजनक कोषाणु और सयोजक तन्तु स्थित होते हैं। अस्थिजनक कोषाणुओं से नवीन अस्थि निरन्तर बनती रहती है और जाल के छिद्रों में भरती जाती है। अस्थिधरा कला के नीचे के स्तर में नया तन्तु बनता रहता है जो रक्तवाहिनियों के चारों ओर स्थित हो जाता है। ये रक्तनलिकाएँ 'हेमरिशियन नलिका' बन जाती हैं।

(२) तरुणास्थ्यन्तरिक विकास—अधिकांश अस्थियों का विकास तरुणास्थि से ही होता है। प्रारम्भ में छद्मी अस्थियों के स्थान में उन्हीं के आकार का तरुणास्थि का टुकड़ा होता है। अस्थिविकास इसी के मध्यभाग में प्रारम्भ होता है जिसे प्राथमिक विकासकेन्द्र कहते हैं। यहाँ से प्रान्त की ओर अस्थिनिर्माण का कार्य बढ़ता है। कुछ समय के बाद सिरों में भी इसी प्रकार के केन्द्र बन जाते हैं और अस्थिनिर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जाता है, किन्तु बहुत समय तक सिरों पर तरुणास्थि का एक स्तर चढ़ा रहता है जो 'प्रान्तीय तरुणास्थि' (Epiphyseal Cartilage) कहलाता है।

अस्थिविकास का कार्य इस प्रकार होता है

प्रथम अवस्था—अस्थिविकास के केन्द्रस्थान पर तरुणास्थि कोषाणु आकार में बड़े हो जाते हैं और पहिले के अरों की भाँति क्रमबद्ध हो जाते हैं। भूमिपदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें कुछ समय में खटिक पक्का होने लगता है। तरुणास्थि कोषाणुओं के चारों ओर कोटर बन जाते हैं, जिनके भीतर तरुणास्थि कोषाणु स्थित होते हैं। इन कोटरों की भित्ति खटिकयुक्त होने के कारण उनके भीतर पोषण नहीं पहुँच पाता, जिससे कोषाणु नष्ट होने लगते हैं। इनके नाश में वहाँ जो रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, वह 'प्राथमिक प्रान्त' (Primary aleola) कहलाता है। इसी समय बाहर की ओर आवरककला के अस्थिजनक कोषाणुयुक्त निचले स्तर से भी अस्थिनिर्माण होने लगता है और परिणामस्वरूप तरुणास्थि के बाहरी पृष्ठ पर अस्थि का अत्यन्त सूक्ष्म स्तर बन जाता है जिससे उत्पत्ति कला-तरिक विकास के समान होती है। इस प्रकार इस अवस्था में दो क्रियाएँ होती हैं :—तरुणास्थि के भीतर नष्टप्राय तरुणास्थि कोषाणु युक्त कोटरों की रचना तथा तरुणास्थि के बाह्य पृष्ठ पर कलान्तरिक अस्थि की उत्पत्ति।

द्वितीय अवस्था:—इस अवस्था में तरुणास्थि की आवरक कला के प्रवर्धन तथा अस्थिधरा कला के निचले पृष्ठ के प्रवर्धन, जिनमें अस्थिभञ्जक (Osteoclasts) तथा अस्थिजनक दोनों प्रकार के कोषाण होते हैं, तरुणास्थि के भीतर प्रवेश करते हैं । अस्थिभञ्जक कोषाणों का काम अस्थिशोषण होता है और इस गुण के कारण वह प्राथमिक प्रान्त की खटिकामय भित्तियों का शोषण करते हुये खटिकामय भूमिपदार्थ तक पहुँच जाते हैं । कोटरों की भित्तियों के टूट जाने से बड़े २ कोटर बन जाते हैं, जो गौणप्रान्त (Secondary areola) या मज्जाकोष (Medullary Space) कहलाते हैं । इनमें भ्रूणावस्था की मज्जा भरी रहती है, जिसमें अस्थिजनक कोषाण और रक्तनलिकाएँ होती हैं ।

गौणप्रान्त के कोटरों की भित्ति टूट और स्थूल होने लगती है तथा मज्जा के अस्थिजनक कोषाणों की सख्या में वृद्धि होती है । इसके बाद कोटरों की भित्तियों में स्थित पूर्वजात अस्थि के कर्णों का शोषण होता है । इस प्रकार नवीन अस्थि का निर्माण होता है तथा प्रथम उत्पन्न हुए अस्थि के कर्णों का अस्थिभञ्जक कोषाणों द्वारा नाश भी होता जाता है ।

बीच के भाग में तो अस्थि घनती रहती है, किन्तु सिरों पर तरुणास्थि की मात्रा घटती जाती है । कुछ काल में उसमें भी एक या इससे अधिक विकासकेन्द्र उत्पन्न हो जाते हैं और क्रमशः तरुणास्थि अस्थि में परिणत हो जाती है ।

भिन्न २ अस्थियों में अस्थिविकास केन्द्रों की सख्या में भिन्नता पाई जाती है । प्रायः छोटी अस्थियों में उनके मध्य में एक केन्द्र तथा लंबी अस्थियों में एक मध्यभाग में तथा एक २ प्रान्तभागों में होता है । यह केन्द्र भिन्न २ समय पर उद्भूत होते हैं । सर्वप्रथम केन्द्र का उद्भूत मध्यभाग में होता है ।

अस्थि का कार्य

अस्थि के निम्नलिखित कार्य हैं:—

१. शरीर के अंगों को आश्रय देना । २. सन्धियों की गति का आधार ।
३. मांसपेशियों का आधार । ४. शरीर की आकृति का धारक ।

पेशी तन्तु (Muscular tissue)

शरीर में त्वचा के नीचे वसा और प्रावरणी से आच्छादित मांसपेशियों का

स्तर होता है। यह तन्तु लाल वर्ण के हमें सूत्रों के गुच्छों से बना है जिन्में समोच्च का गुण होता तथा जो बाहर की ओर संयोजक तन्तु द्वारा परस्पर आपस होते हैं।

पेशीतन्तु का वर्गीकरण कई दृष्टिकोणों से किया गया है। क्रियाविज्ञान की दृष्टि से पेशिया दो प्रकार की होती हैं —

१. स्वतन्त्र (Involuntary) २ परतन्त्र (Voluntary)

सूक्ष्म रचना की दृष्टि से पेशिया तीन प्रकार की होती हैं —

१. रेखाकित (Striated) परतन्त्र (Skeletal)

२. " " हार्दिक (Cardiac)

३. अरेखाकित (Unstriated) या स्पर्श (Plain)

परतन्त्र पेशी

यह पेशी सूत्रों के गुच्छों (Fasciculi) के सान्तर तन्तु से निर्मित

आवरण द्वारा परस्पर आपस होने से घनती

है। इस आवरण को एपिमासावरण

(Epimysium) कहते हैं। प्रत्येक गुच्छ

पर भी पृथक् २ आवरण होता है, उसे परिमा

सावरण (Perimysium) कहते हैं। गुच्छ

भी कला द्वारा अनेक पेशीसूत्रों में विभक्त है

तथा अन्तर्मासावरण (Endomysium)

नामक आवृत्ति से आच्छादित है। इस आवरण


में पेशीसूत्र की रक्तवाहिनियाँ तथा नाड़ियाँ

होती हैं। प्रत्येक सूत्र पुनः सूत्रावरण (Sarco-

lemma) नामक स्थितिस्थापक कोष से

समाच्छन्न है, जो अन्तर्मासावरण के समान

सा तर तन्तु से निर्मित नहीं होता।



चित्र १२—परतन्त्र पेशी का अनुलम्ब परिच्छेद

पेशीसूत्र

ये आकार में त्रिपार्श्व या चतुष्पाद हैं और इनकी लम्बाई लगभग १ इंच तथा व्यास $\frac{1}{16}$ इंच होता है । कुछ जिह्वा और मुख की पेशियों को छोड़कर इनमें शाखायें या विभाग नहीं होते ।


पेशीसूत्र की सूक्ष्म रचना

सूत्रावरण नामक स्थितिस्थापक कोष में तात्त्विक संकोचशील द्रव्य (Essential Contractile Substance) स्थित होता है जिससे पेशीसूत्र का कलंघर निर्मित है । स्तनधारी जीवों में, इसके अन्तःपृष्ठ पर अण्डाकार केन्द्रक देखे जाते हैं, जिन्हें पेशीकण (Muscle Corpuscle) कहते हैं । जीवन-काल में सूत्रावरण आम्पन्तर संकोचशील द्रव्य से संसक्त होता है ।

संकोचशील द्रव्य अनेक क्रमिक शुक्ल तथा कृष्ण खण्डों (Light and dark bands) में विभक्त है । प्रकाशपर्यन्त के बाद अणुपरीक्षण यन्त्र द्वारा यह स्पष्ट प्रतीत होता है । ध्यान में देखने पर प्रत्येक शुक्ल खण्ड की सीमा पर अनेक कणों की पक्ति स्थित मिलती है । यह कण कृष्णखण्ड के आसपास जाती हुई अनुलम्ब रेखाओं द्वारा परस्पर सन्धि हैं तथा पार्श्विक दिशा में अनुप्रस्थ रेखाओं से संबद्ध हैं । अनुलम्ब रेखायें पेशीसूत्र के अनेक अनुलम्ब विभागों को सूचित करती हैं जिन्हें 'सूत्रिका' (Fibrils or Sarcostyles) कहते हैं । इस प्रकार अनुलम्ब तथा अनुप्रस्थ रेखाओं से निर्मित जाल के भीतर सूत्रिकाओं के बीच में विद्यमान द्रव्य को 'सूत्रमार' (Sarcoplasm) कहते हैं । शुक्ल तथा कृष्ण खण्ड पुनः दो में विभक्त होते हैं । कृष्णखण्ड एक स्पष्ट रेखा के द्वारा जिसे 'स्वच्छरेखा' (Hensen's line) कहते हैं, दो में विभक्त है । शुक्लखण्ड एक बिन्दुमय रेखा के द्वारा, जिसे 'बिन्दुरेखा' (Dobies line or krause's membrane) कहते हैं, दो में विभक्त है ।

यदि पेशीसूत्र के अनुप्रस्थ परिच्छेद की परीक्षा की जाय तो वह अनेक कोणीय भागों में विभक्त प्रतीत होता है । इन भागों को 'कोणीय क्षेत्र' (Areas of Cohnhein) कहते हैं । ये भाग पुनः सूक्ष्मबिन्दुयुक्त क्षेत्रों में विभक्त

हैं। बृहत् क्षेत्रसूत्रिकासमूहों तथा सूक्ष्म क्षेत्रसूत्रिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।



चित्र १३—पेशी की सूक्ष्म रचना

ख त स्तम्भक के विन्दुरेखा व सकुचित दशा में अ प्रलम्बित दशा में

सूत्रिका के एक विन्दुरेखा से दूसरी विन्दुरेखा तक के भाग को सूत्रकाणु (Sarcomeres) कहते हैं। इसमें एक पूर्ण कृष्ण रंगक तथा उसके दोनों ओर आधा शुक्लरंगक आ जाते हैं। इसमें स्थित कृष्णरंगक को 'सूत्रतत्व' (Sarcous element) कहते हैं। यह सूत्रतत्व सूत्रकाणु में स्वतंत्र नहीं रहते, बल्कि दोनों ओर सूक्ष्म रेखाओं या कलाओं द्वारा विन्दुरेखा से संयुक्त हैं। प्रत्येक सूत्रकाणु पेशीसूत्र का क्रियामक आद्यभाग माना जाता है।

पेशी के सकोचप्रसार के समय सूत्रकाणु में परिवर्तन और उसके कारण

जब पेशी सकुचित होती है, तब सूत्रतत्व और विन्दुरेखा के मध्य का अवकाश बहुत छोटा हो जाता है तथा सूत्रतत्व फूल जाता है। इसके विपरीत, जब पेशी का प्रसार होता है, तब सूत्रतत्व स्वच्छरेखा के पास स्पष्टतः अपने दो विभागों में विभक्त हो जाता है।

उपर्युक्त परिवर्तनों के कारण की विवेचना शेफर नामक विद्वान् ने युक्ति पूर्वक की है। उनके मत के अनुसार सूत्रतत्व अनेक अनुलम्ब तलिकाओं से बना है। ये तलिकाएँ वि-सय रेखा की ओर स्वच्छ अवकाश में खुलती हैं

और स्वच्छरेखा की ओर बन्द रहती हैं । पेशी के संकोचकाल में स्वच्छ अवकाश का पदार्थ इन नलिकाओं में चला जाता है जिससे सूत्रतत्व फूल जाता है तथा सूत्रकाणु चौड़ा और छोटा हो जाता है । इसके विपरीत, पेशी के प्रसार काल में उक्त पदार्थ नलिकाओं से बाहर आकर स्वच्छ अवकाश में चला जाता है और दृष्टिगोचर होने लगता है । सूत्रतत्व भी सिकुड़ जाता है तथा सूत्रकाणु फलस्वरूप लम्बा और छोटा हो जाता है ।

पेशीसंकोच के कारणों के सम्बन्ध में शीफर का यह मत अमीबिक, रोमिकामय तथा पेशीजन्य चेष्टाओं में परस्पर सामान्य स्थापित करने में सहायक होता है । अमीबिक गति में कोषावरण अनियमित रूप से होने के कारण कोषसार का किसी भी दिशा में प्रवाह हो सकता है । रोमिकामय गति में, कोषावरण एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होने के कारण कोषसार का आवागमन एक निश्चित दिशा में ही संभव है । इसी प्रकार पेशीजन्य गति में पेशीसार सूत्रतत्व की अनुलम्ब नलिकाओं में व्यवस्थित होने के कारण कोषसार (स्वच्छ पदार्थ) का उसी अनुलम्ब दिशा में यातायात होता है । इन प्रकार मांसपेशी का संकोच विभिन्न सूत्रकाणुओं के पृथक् २ संकोच का संयुक्त रूप है । परतन्त्र पेशियाँ प्रायः अपनी कण्डराओं द्वारा अस्थियों में निबद्ध होती हैं ।

परतन्त्र पेशी का पोषण

पेशी के भीतर उसके अन्तःमांसावरण में केशिकाओं का जाल फैला रहता है । चर्बी २ धमनियाँ और सिरायें केवल परिमांसावरण तक रहती हैं, उसके भीतर नहीं जा सकती । नाड़ियाँ भी बहुत सूक्ष्मरूपा में फैली रहती हैं । रसायनियों का प्रवेश पेशीतन्तु में नहीं होता, केवल उसके बाह्य आवरण में ही पाई जाती है ।

स्वतन्त्र पेशीः—स्वतन्त्र पेशी अरेखांकित होती है और घेमाकार कोषाणुओं से बनी होती है । ये कोषाणु समूहों में स्थित रहते तथा संयोजक द्रव्य द्वारा परस्पर सयद्ग रहते हैं । ये समूह पुनः चड़े २ गुच्छों में एकत्रित हो जाते हैं जो परस्पर सामान्य संयोजक तन्तु द्वारा परस्पर आयद्ग रहते हैं । इस तन्तु की तुलना परतन्त्र पेशी के बहिर्मांसावरण से की जा सकती है ।

इसी प्रकार पृथक् २ कोषाणु समूहों को आपस करने वाला तन्तु परिमोसावरण तथा कोषाणुओं के बीच में स्थित 'संयोजक पदार्थ' अन्तम सावरण का प्रतिनिधित्व करता है।

स्वतन्त्र पेशी के मूत्र लम्बे, पैमाने पर केन्द्रयुक्त कोषाणुओं के रूप में होते हैं जिनकी लम्बाई लगभग १.३० से ३.० इंच तक तथा चौड़ाई १.०० इंच होती है। इसकी रचना सामान्य होती है और इसके कोषावरण में संकोचशील द्रव्य भरा रहता है। संकोचशील द्रव्य में बहुत हल्की लम्बी रेखाएँ होती हैं जो उस द्रव्य के मूत्रकाणुओं में विभाग को सूचित करती हैं। इसमें भीतर एक अण्डाकार या दण्डाकार केन्द्रक होता है। स्वतन्त्र पेशियों का संकोच परतन्त्र पेशियों की अपेक्षा नियमित तथा मन्द होता है, यथा 'अन्तर्प्रतिमरणगति'। स्वतन्त्र पेशी शरीर के निम्नलिखित भागों में पाई जाती है:-

चित्र-१४ स्वतन्त्र पेशी-मूत्र

१. प्रसनिका के मध्यभाग से आभ्यन्तर गुदसंकोचनी तक।
२. श्वासनलिका, श्वासप्रणालिकाएँ तथा फुफुस के वायुकोष।
३. पित्तकोष तथा साधारणी पित्तनलिका।
४. लालिक तथा अग्न्याशयिक ग्रंथियों की बड़ी नलिकाएँ।
५. धोणिगुहा, वृषक की उत्सिकाएँ, गव्दीनी, वस्ति तथा मूत्रमार्ग।
६. दिग्गप्रस्थि, डिग्गवह नलिकाएँ, यमरिक्क, योनि, पृष्ठ स्नायु और भगांकुर।
७. वृषण, शुक्रग्रह नलिकाएँ, उवाण्ड, शुक्रकोष, पौरुषप्रस्थि, मूत्रपण्डिका तथा मूत्रप्रसेकिनी।


८. प्लीहा के कोप तथा अन्तर्वन्धु ।
९. शल्यमलशला ।
१०. त्वचा की रंजक ग्रन्थियाँ तथा रोम हर्षिणी पेशियाँ ।
११. धमनियाँ, सिरायेँ तथा रसायनियाँ ।
१२. तारामण्डल तथा नेत्रसन्धान की पेशियाँ ।

हृत्पेशी

हृत्पेशी दो प्रकार के विशिष्ट सूत्रों के समूहों से बनी होती है —

- (१) हृत्पेशीसूत्र (शाखाग्रान्)
- (२) प्रकिञ्जय सूत्र (शाखारहित)

हृत्पेशीसूत्र (Cardiac fibres)



चित्र १५ हादिक पेशीतन्तु

यह चतुष्कोणाकार कोषाणु है जो पर-
तन्त्र पेशीसूत्रों से ३ छोटे होते हैं । इनमें
अनुलम्ब तथा हल्की अनुप्रस्थ रेखायें होती
हैं । सूत्र अपने प्रान्त भागों के द्वारा
परस्पर सम्पर्क है । उनके प्रा-त भागों से
शाखायें निकली रहती हैं जो परस्पर मिल
कर सूत्रों की सन्धि बनाती हैं । यह इस
रीति से सज्ज रहती है कि संपूर्ण हृत्पेशी
में क्रिया मक अव्यवहितता बनी रहती है ।
के द्रभाग के पास एक अण्डाकार स्वच्छ
केन्द्र होता है । इसमें कोई विशिष्ट मासा-
चरण नहीं होता ।

प्रकिञ्जय सूत्र (Purkinje fibres)

हृदय के कुछ प्रदेशों में उसके अन्त स्तर तथा सामान्य हृत्तन्तु के मध्य में
यह कोषाणु पाये जाते हैं । मनुष्य के हृदय में यह मध्यविभाजक कला के साथ २
जाते हुये दिखाई देते हैं तथा अलिन्दों और निलियों के बीच में सवन्ध

स्थापन का कार्य करते हैं। इन कोषाणुओं के समूह को 'अलिन्दनिलय गुच्छ' (Bundle of His) कहते हैं।

यह हृत्पेशी सूत्रों की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं तथा उनकी आकृति चतुर्भुजी होती है। केन्द्र में एक या अधिक केन्द्रक होते हैं। ओजःसार का केन्द्रीय भाग कणयुक्त तथा रेखाहीन है तथा ग्रान्तीय भाग अनुप्रस्थ रीति से रेखायुक्त है। सूत्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं। उनमें मांसावरण नहीं होता और शाखायें भी नहीं होती।

हृत्पेशी तथा प्रकियय सूत्रों का तुलनात्मक कोषक

	हृत्पेशीसूत्र	प्राकियय सूत्र
१. अधिष्ठान	संपूर्ण हृदय	अलिन्दनिलय गुच्छक
२. परिमाण	स्वल्प	बृहत्
३. आकृति	चतुष्कोणाकार	चतुर्भुजी
४. केन्द्रक	एक, स्वच्छ और अण्डाकार	दो, गोल तथा अस्वच्छ रंगयुक्त
५. ओजःसार	अनुलम्ब तथा हल्की अनुप्रस्थ रेखाओं से युक्त	केन्द्रीय भाग कणयुक्त तथा ग्रान्तीय भाग अनुप्रस्थ रीति से रेखायुक्त
६. सम्बन्ध	शाखाओं तथा सयोजक द्रव्य के द्वारा	घनिष्ठरूप से सम्बद्ध
७. शाखायें	विद्यमान	अनुपस्थित

हृत्पेशी का पोषण तथा नाड़ियाँ

इन पेशियों में रक्तग्रह श्रोतों तथा रसायनियों की अधिकता पाई जाती है। नाड़ियाँ भी दोनों प्रकार की होती हैं। मेदस नाड़ी के सूत्र प्राणदा नाड़ी की शाखाओं तथा अमेदस नाड़ी के सूत्र डडा और पिंगला नाड़ियों की शाखाओं के रूप में पहुँचती हैं।

पेशी सन्तु का कार्य

पेशीसन्तु का कार्य शरीर में गति उत्पन्न करना है। शरीर में जितनी भी चेष्टायें होती हैं, वह पेशियों के आधार पर ही होती हैं।

नाड़ी तन्तु (Nervous tissue) सूत्रक समूचे कोपसार में

सूक्ष्म रचना की दृष्टि से नाडीतन्तु के मुख्यतः च देखा जा सकता है । इस

१. नाडीकोषाणु (Nerve cells) । अनुमानतः उनका स्वरूप

२. नाडीसूत्र (Nerve fibres) । दम रिक्त नलिका के समान

३. नाड्याधारकोषाणु (Neuroglia cells) हैं, जिसका समर्थन नाडियों

४. नाड्याधार सूत्र (Neuroglia fibrelet) के कुछ परिच्छेदों के देखने

पे होता है ।

नाडीकोषाणु नाडीतन्तु का विशिष्ट अवयव है जो

तथा सुपुम्नाकाण्ड के दूसरे भाग में एकत्र पाये जाते । नाडीसूत्रक तथा शक्ति-
होते हैं, उनमें भी कुछ कोषाणु पाये जाते हैं । इन हृग ये दो नाडीकोषाणुओं
छत्रे २ प्रसर भागों को नाडीसूत्र कहते हैं । मस्तिष्क के विशिष्ट उपादान हैं जो
विशेषतः इन्हीं का बना हुआ है । नाड्याधारवस्तु के अन्य तन्तुओं के कोषाणुओं
शीर्षक में नाडीकोषाणुओं के बीच में स्थित पाई जाती नहीं मिलते ।

(७) शक्तिकण
नाडीकोषाणु (Nissl's granules)-

ऊपर बतलाया जा चुका है कि यह मस्तिष्क के पूर्ण कोषाणु के शरीर में
जाते हैं । इन कोषाणुओं से एक लम्बा प्रसर निकलता नाडीसूत्रकों के बीच २ में
(Aron) कहलाता है । यद्यपि कुछ कोषाणुओं से के नियमित आकार के कुछ
हैं, तथापि अधिकतर कोषाणुओं में उनके कोनों से कर्दण होते हैं जिन्हे 'शक्ति-
से केवल एक नाडीसूत्र का अक्ष बन जाता है । शेष (Nissl's granu-
विभक्त हो जाते हैं । इन शाखायुक्त सूत्रों को 'दन्द्र' (dendrites) कहते हैं । यह कण
यह समीपवर्ती कोषाणु के चारों ओर फैले रहते हैं । अधिलिप्त बल्यु से अवधि

कोषाणु का गात्र, दन्द्र और अक्ष सत्र मिलकर जित होते हैं । यह दन्द्रों
कहलाते हैं । नाड्यणु के दन्द्र वृक्ष की शाखाओं के समान कुछ दूरी तक चले जाते
द्वारा कोषाणु में उत्तेजना जाती है और अक्ष के द्वारा कुछ किन्तु अक्ष में या
नाडी कोषाणुओं के सन्ध में निम्नलिखित बातें देखावण में नहीं होते ।

(१) परिमाण—नाडी कोषाणुओं के परिमाण विभिन्न कोषाणुओं में उनकी
देखी जाती है । कुछ बहुत छोटे होते हैं तथा कुछ कोषाणु में विभिन्न परिस्थियों
निम्नलिखित अवस्थाओं

में बहुत सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाते हैं तथा केंद्रल कोषाणुगात्र से ही नहीं, अपितु दन्तों से भी लुप्त हो जाते हैं:—

- (क) अत्यधिक क्रिया से कोषाणुगात्र का श्रम—यथा अपस्मार में
- (ख) अक्ष में विभिन्न कोषाणु में
- (ग) अनेक विषों की क्रिया से—
- (घ) अनेक मातृरोगों में
- (च) पक्वम नाडीमूलों का विच्छेद

ये कण "रंगसार" (Chromatoplasm) नामक द्रव्य से बने हैं जो एक प्रकार का केन्द्रकसांस्तत्व है जिसमें लौह का भी अंश रहता है। इसे "शक्तिसार" भी कहते हैं क्योंकि यह नाडीगत शक्ति धोप का द्योतक है।

नाडी कोषाणु के जीवन में इन कणों का विशेष महत्व है। ये कण कोषाणु की सा भीकरण संबन्धी क्रिया से घनिष्ठतः संबद्ध हैं और नाडीजणु के पोषण से भी उनका निकट संपर्क है। नाडीशक्ति के आविर्भाव के बाद ये कण लुप्त हो जाते हैं, अतः इनकी तुलना स्थावर कोषाणुओं के कणों से की जा सकती है। शक्ति-प्रादुर्भावकाल में उनके लोप तथा विध्वंसकाल में नये कणों के निर्माण से यह सिद्ध है कि वह नाडीकोषाणु की क्रिया के लिए संचित शक्तिसाली पदार्थों के समूहरूप है। कोषाणु तथा सूत्रों के पोषण पर भी यह प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि नाडीसूत्र का विच्छेद करने पर उसका केन्द्रीय भाग कोषाणु से संबद्ध रहने के कारण बिना परिवर्तन के चिरकाल तक बना रहता है, किन्तु ग्रन्थीय भाग शीघ्र ही क्षीण होने लगता है। रक्त के द्वारा इन कणों का निर्माण होता है, इसलिए कोषाणुओं के चारों ओर अत्यधिक सघन रूप में स्थित हैं।

(८) उत्तान जालक (Superficial reticulum)—यह कोषाणुओं के पृष्ठ पर सूत्रों का एक जालक है। यह कोषाणु के बाह्य पृष्ठ पर स्थित रहता है और उसके बाह्यारण की पूर्णतः आच्छादित किये रहता है।

(९) गभीर जालक (Deep rediculum of golgi) :—यह उपयुक्त जालक के समान होता है, किन्तु कोषाणु के गभीर भागों में स्थित होता है।

इन जालकों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अब तक नहीं हुआ है । कुछ विद्वानों के मत में इसका निर्माण नाडी सूत्रों से है तथा कुछ विद्वान् इसकी रचना नाड्यावरधस्तु से मानते हैं ।

(१०) पोषणद्विद्र (Trophosphonium)—कोषाणुगात्र के कोपसार में प्रविष्ट अनेक शाखायुक्त नलिकायें हैं जो कोषाणुओं के पोषण के लिए रक्तस पहुँचाती हैं ।

(११) अक्ष (Axon or Axis Cylinder process) :—यह कोषाणु का मुख्य प्रसर भाग है । इसका उत्पत्ति स्थान उद्भवकोण (Cone of origin) कहलाता है, जहाँ शक्तिशेषों का अभाव तथा नाडीसूत्रों का बाहुल्य होता है । यह कोषाणुगात्र से शक्ति को बाहर ले जाने का स्रोत है ।

यह अनेक प्रारम्भिक सूत्राणुओं के मिलने से बनता है । इसके चारों ओर भोजःसार वस्तु भरी रहती है । यह सूत्र के प्रारंभ से उसके अन्त तक समान रूप से उपस्थित रहता है । सामान्यतः इससे शाखायें नहीं निकलती, किन्तु मस्तिष्क और सुषुम्ना में उससे समकोण पर कुछ शाखायें निकलती हैं जो सहायक शाखा (Collaterals) कहलाती हैं । ये अक्ष से निकल कर दूसरे वस्तु में पहुँच कर दृन्द्र की भाँति समाप्त हो जाती हैं ।

अक्ष की लम्बाई लगभग १ मिलीमीटर से १ मीटर तक या उससे कुछ अधिक होती है । अन्तिम स्थान पर पहुँच कर यह अत्यन्त सूक्ष्म सूत्रों में विभक्त हो जाता है ।

(१२) दृन्द्र (Dendrons) :—यह नाडीकोषाणुओं के दूसरे प्रसरभाग हैं । यह अनेक होते हैं तथा कोषाणु से निकलते ही वृक्ष के समान अनेक शाखा प्रसारण देते हुये नाडीतन्तु के अन्य भागों में विलीन हो जाते हैं और इस प्रकार कोषाणु अनेक अन्य कोषाणुओं से क्रिया संचन्ध रखता है ।

दृन्द्र स्वरूपतः कोपसार के ही प्रवर्धित भाग हैं, अतः गौलगी नामक विद्वान् ने इन्हें 'भोजःसारप्रवर्धन' की संज्ञा दी है तथा उनका कार्य पोषण माना है । कुछ कोषाणुओं में दृन्द्र नहीं होते उन्हें 'दृन्द्रहीन' (Adendritic) कहते

हैं। ऐसे कोषाणुओं में यान्त्रिक, रासायनिक या तापसंचयी उत्तेजना होने से अमीबिक गति होती है। ये उत्तेजना को ग्रहण करके कोषाणुगात्र तरु पहुँचाने का कार्य करते हैं।

अक्ष और दन्द्र में अन्तर

अक्ष

दन्द्र

- | | |
|--|---|
| १. बहुत दूर जाने के बाद इसकी अन्तिम शाखायें होती हैं, जिन्हें 'अन्तर्दन्द्र' कहते हैं। | १. इसकी शाखायें बहुत होती हैं। |
| २. यह चिकने होते हैं तथा इनके परिमाण में बहुत कम अन्तर होता है। | २. यह रुच होते हैं तथा अतिशीघ्र परिमाण में घटने लगते हैं। |
| ३. आवरणयुक्त हैं। | ३. आवरण रहित अन्त तक। |
| ४. सहायक शाखायें— | ४. अनियमित शाखायें— |
| ५. शक्तिवैपक | ५. शक्तिग्राहक |

(१३) रञ्जक कण (Pigment)—कुछ नाडीकोषाणुओं में केन्द्रक के निकटमें रञ्जककणों के समूह होते हैं, जिससे उनमें एक विशिष्ट रंग आ जाता है।

(१४) कलामय-कोष (Membranous sheath)—प्रत्येक नाडी कोषाणु कलामय कोष से आवृत रहता है। यही कोष नाडीमूत्रों पर नाड्यावरण के रूप में चला जाता है।

नाडी कोषाणुओं का वर्गीकरण

रचनात्मक दृष्टिकोण से अक्ष की उपस्थिति एवं सत्या के अनुसार नाडी कोषाणु के निम्नांकित प्रकार किये गये हैं:—

१. अक्षक (Apolar)
२. पक्षक (Unipolar)
३. द्व्यक्षक (Bipolar)
४. बहु पक्षक (Multipolar) or Type 1 of Golgi.
५. स्तूपार (Pyramidal)

६. प्रकिञ्चय कोषाणु (Purkinje cells)

७. दीर्घ वृद्धत्क (Cells type II of Golgi)


क्रियात्मक दृष्टिकोण से नाड़ीकोषाणु के निम्नांकित विभाग किये गये हैं:—

१. सञ्जावह मूलकोषाणु (Afferent root cells)

२. चेष्टावह मूलकोषाणु (Efferent root cells)


३. मध्यस्थ कोषाणु (Intermediary cells)

४. वितरक कोषाणु (Distributing cells)



चित्र १७—विभिन्न आकार के नाड़ी कोषाणु

१ सञ्जाकार (बहुध्रुवीय) । २ एकध्रुवीय । ३ द्विध्रुवीय । ४ बहुध्रुवीय ।



चित्र १८—नाडी कोषाण में सूक्ष्म मृत्रिकायें
नाडीसूत्र (Nerve Fibres)

ये सूत्र नाडीकोषाणों से ही निकलते हैं और कोषाण से निकला हुआ अक्ष सूत्र का अक्ष बन जाता है। ये सूत्र प्राचीन नाड़ियों तथा मस्तिष्क और सुषुम्ना के श्वेत भाग में पाये जाते हैं।

नाडीसूत्रों का वर्गीकरण

रचना की दृष्टि से—ये सूत्र प्रथम दो प्रसार के किय गये हैं और पुनः

प्रत्येक के दो भाग किये गये हैं । 'इस' प्रकार चार प्रकार के नाड़ी सूत्र होते हैं:—

१. आवृत मेदस नाड़ीसूत्र (Medullated Nerve fibres with Neurilemma Sheath)
२. अनावृत मेदस नाड़ी सूत्र (Medullated Nerve fibre without N. Sheath)
३. अनावृत अमेदस नाड़ीसूत्र (Non-Medullated N. fibres with thin N. Sheath)
४. अनावृत अमेदस नाड़ीसूत्र (Non-medullated fibres without N. Sheath)

प्रथम प्रकार के सूत्र मस्तिष्क सौकुम्भिक नाड़ियों में तथा द्वितीय प्रकार के सूत्र मस्तिष्क एवं सुषुम्ना के श्वेत भाग में पाये जाते हैं । ये सूत्र श्वेतवर्ण होने के कारण श्वेत सूत्र भी कहे जाते हैं । तृतीय प्रकार को 'रेमक के सूत्र' (Remak's Fibres) भी कहते हैं और वह सांवेदनिक नाडीतन्त्र में अधिक संख्या में पाये जाते हैं । चतुर्थ प्रकार में कोई आवरण नहीं होता अतः उसे 'नग्न सूत्र' (Naked fibres) भी कहते हैं और वह विशेषतः मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के धूसर भाग में पाये जाते हैं । यह सूत्र धूसर वर्ण होने के कारण धूसर सूत्र भी कहे जाते हैं ।

क्रिया के दृष्टिकोण से भी इसके चार विभाग किये गये हैं:—

१. अन्तर्मुखीया सञ्चारक—(Afferent or Sensory)—प्रान्तीय तन्तुओं से
२. वहिर्मुखी या चेष्टाक—(Efferent or Motor)—मस्तिष्क और सुषुम्ना से
३. संयोजक—(Association fibres)—सुषुम्नाकाण्ड के समानान्तर
४. स्वस्तिक—(Commisural)—स्वस्तिकार स्थित

नाड़ीसूत्रों की लम्बाई में बहुत भिन्नता होती है । कंकाल पर लगी पेशियों को जाने वाले सूत्र बहुत लम्बे होते हैं । सब से छोटे सूत्र स्वतन्त्र नाडीमण्डल में मिलते हैं, जो आशयों को जाते हैं ।

मेदस सूत्र

इस नाड़ीसूत्र के बीच में अन्त रहता है और उसके चारों ओर वसानिर्मित आवरण चढ़ा रहता है जिसे 'मेदस पिधान' (Medullary Sheath) कहते हैं । इन सब को बाहर से आच्छादित किये हुये एक सूक्ष्म आवरण

होता है, जिसे 'नाड्यावरण' (Neurilemma) कहते हैं।



अ मेदस पिधान वसामय वस्तु का बना होता है, जो तरल अवस्था में रहती है और अक्ष की चारों ओर से रखा करती है। सूत्र में लगभग आधा भाग इस च पिधान का होता है। यह सूत्र की लम्बाई में निरन्तर नहीं होता। स्थान स्थान पर वह अनुपस्थित हो जाता है जिसमें पिधान के दो भागों के बीच में अन्तर दिखाई देने लगता है। इसमें सूत्र के बीच में ग्रन्थि के समान रचना दिखाई देती है। इसे 'नाडी ग्रन्थि' (Ranvier's nodes) कहते हैं इन ग्रन्थियों का क नाडीसूत्र के पोषण में महत्त्वपूर्ण स्थान है। दो ग्रन्थियों के बीच का भाग नाडीपर्व (Internode) कहते हैं और प्रत्येक नाडी पर्व के मध्य में एक केन्द्रक होता है। यद्यपि ये केन्द्रक मेदस पिधान में स्थित प्रतीत होते हैं, तथापि वस्तुतः इनका सम्बन्ध नाड्यावरण से ही पाया जाता है। जिन सूत्रों में यह आवरण नहीं होता, उनमें ये केन्द्रक नहीं पाये जाते। मेदस पिधान जिस वस्तु का बना होता है उसे 'मायलिन (Myelin)' कहते हैं। सूत्र को कोषाणु से विच्छिन्न करने पर सर्वप्रथम इसी पिधान में क्षय की क्रिया प्रारम्भ होती है।

चित्र १९-मेदस नाडीसूत्र

अ-नाडीसूत्रावरण

क-सूत्रावरण वा केन्द्रक जिसके भीतर की ओर गहरेकाल रङ्ग का मेदस पिधान स्थित है।

च-रेनवियर का नोड।

नाड्यावरण का स्तर सूत्र पर निरन्तर चढ़ा रहता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह आवरण वस्तुतः निरन्तर नहीं होता, किन्तु ग्रन्थि-भाग पर दो भागों के आवरण परस्पर संयोजक तन्तु द्वारा जुड़े रहते हैं। यदि सूत्र पर सिलवर नाइट्रेट का विलयन डाला जाय, तो ग्रन्थि पर विलयन आवरण

में प्रविष्ट हो जाता है और प्रकाश डालने पर यह स्थान काला दिखाई देता है । इसके कारण अक्ष में इस इन स्थानों पर काले रङ्ग की स्वस्तिकायें बन जाती हैं, जिन्हें 'रेनवियर की स्वस्तिकायें' (*Ranvier's Crosses*) कहते हैं ।

अमेदस सूत्र



ये सूत्र स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल के गण्डकोषाणुओं से संबद्ध रहते हैं और उनके अक्ष बनाते हैं । प्रत्येक सूत्र केवल अक्ष का बना होता है जिसमें स्थान स्थान पर केन्द्रक पाये जाते हैं । इस प्रकार के सूत्र स्वतन्त्र पेशियों तथा उद्ग्रेचक प्रथियों के कोषाणुओं में मिलते हैं ।

चित्र २०—अमेदस नाड़ीसूत्र

नाड्याधारवस्तु

यह नाडीतन्त्र की आधारवस्तु है जो कोषाणुओं और मृत्रों से बनी होती है । इसके सूक्ष्म सूत्रों के जालक नाडी कोषाणुओं और सूत्रों के बीच में फैले रहते तथा उनको आश्रय प्रदान करते हैं । सुषुम्नाकाण्ड की मध्यनलिका में इसका अधिक परिमाण पाया जाता है । धूसरवस्तु में इसके सूत्रों के जालक विशद एवं श्वेतवस्तु में सघन होते हैं ।

नाडी

एक सामान्य नाडी अनेक नाडी सूत्रों के गुच्छों से बनती है । नाडी का सबसे बाहरी आवरण वहिःसूत्रावरण (*Epineurium*) गुच्छों के ऊपर का आवरण परिसूत्रावरण (*Perineurium*) तथा गुच्छगत प्रत्येक सूत्र के आवरण को अन्तःसूत्रावरण (*Endoneurium*) कहलाता है ।

नाड़ीसन्धि (Synapse)

दो नाड्यणुओं की परस्पर सन्धि को 'नाड़ीसन्धि' कहते हैं। नाड़ी की क्रियाओं में इसका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग होता है, जो आगे बतलाया जायगा।

नाड़ीसन्धि की विशेषतायें

(१) इसमें अक्ष और दन्द्र की शाखाओं में परस्पर साक्षात् संवन्ध नहीं होता, बल्कि उनकी शाखायें एक दूसरे में ऊपर और नीचे (दन्द्र की शाखायें ऊपर और अक्ष की नीचे) रहती हैं जिससे वहाँ पर उन शाखाओं का जाल सा बन जाता है।

(२) इस सन्धितक में नाडीगत उत्तेजना की दिशा निश्चित होती है। अक्ष के द्वारा जो उत्तेजना आती है, उसे दूसरे केन्द्र के दन्द्र ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तेजना के प्रवाह की दिशा अक्ष से दन्द्र की ओर रहती है। विपरीत दिशा में उत्तेजना की गति नहीं हो सकती है।

(३) नाडीमूत्र में स्वतन्त्ररूप से जो उत्तेजना की गति होती है, साधस्थल में उससे कम होती है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर उत्तेजना के प्रवाह में एक प्रकार की बाधा होती है, जिसमें उसको दूसरे कोषाणु तक पहुँचने में अधिक समय लगता है।

चेष्टावह नाड़ियों का पेशियों में वितरण

परतन्त्र पेशियों में चेष्टावह नाड़ियों का अन्त विशिष्ट रचनाओं में होता है, जिन्हें 'अन्त्य भाग' (Endplates) कहते हैं। पेशियों में जाने पर नाडी सूत्रों का विभाग होने लगता है, जिसमें प्रत्येक पेशीमूत्र में एक २ नाडीसूत्र पहुँच जाता है। मेदसपिधान समाप्त हो जाता है, किन्तु नाड्यावरण निरन्तर बढ़ता जाता है और सास्ताग्रण में परिणत हो जाता है। चेष्टावह नाड़ियों के अतिरिक्त मज्जावह नाड़ियों के अन्त्य भाग भी पेशी में होते हैं।

स्वतन्त्र पेशियों में नाडीमूत्र जो अधिकांश अमेदस होते हैं, चक्रों और जालकों के रूप में पहुँचते हैं।

नाड़ी सूत्र का कार्य

नाड़ीमूत्र के अणु का कार्य नाड़ीजन्य उत्तेजना का बहन करना है । मेदस कोष का कार्य मूत्र की रक्षा और पोषण करना है । यह नाड़ीगत उत्तेजना को निश्चित दिशा में रखने का भी कार्य करता है । नाड्यावरण आधारभूत एवं रसक बला के अतिरिक्त नाड़ी की पुनरुत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण योग देता है ।

नाड़ी में सन्नाह नाड़ीसूत्र

नाडियों में छोटे २ सन्नाह सूत्र होते हैं जिन्हें 'सूत्रगत नाड़ी' (Nervi Nervosum) कहते हैं । यह बाह्य नाड्यावरण में समाप्त हो जाते हैं ।

द्वितीय अध्याय

मांसपेशी के गुणधर्म

सभी मांसपेशियों में तीन विशिष्ट गुणधर्म पाये जाते हैं:—

१. उत्तेजनीयता (Irritability)
२. संकोचशीलता (Contractility)
३. ग्राह्यता (Conductivity)

उत्तेजनीयता

किसी बाह्य साधन (उत्तेजक) की क्रिया के परिणामस्वरूप अपने भीतर कुछ परिवर्तनों के रूप में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की शक्ति कुछ तन्तुओं में होती है । ये परिवर्तन स्थूल ('यथा पेशियों में) या सूक्ष्म (यथा नाडियों में) दोनों प्रकार के हो सकते हैं । इसकी परिभाषा दूसरे 'प्रकार' से भी की जाती है । यथा उत्तेजनीयता कुछ जीवित अंगों का ऐसा गुण धर्म है जिसके कारण शोभकों या उत्तेजकों से प्रभावित होने पर इसमें विशिष्ट भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं ।

शरीर के निम्नांकित तन्तु उत्तेजनीय हैं:—

१. सामान्य ओजःसार (यथा अभीवा, स्वेतकण)
२. रोमिकामय आवरक तन्तु
३. मांसपेशी
४. नाडी
५. उद्देचक ग्रन्थियाँ

पेशियों की सहज उत्तेजनीयता

पीछे बतलाया जा चुका है कि मांसपेशी में प्रविष्ट होने पर नाडी की अनेक शाखायें होने लगती हैं और इस प्रकार प्रत्येक पेशीसूत्र में नाडी की एक शाखा चली जाती है। ऐसी स्थिति में, यदि किसी उत्तेजक का प्रयोग सीधे पेशी पर किया जाय तो उससे नाडीसूत्रों तथा पेशीसूत्रों दोनों में उत्तेजना उत्पन्न होगी। पहले यह समझा जाता था कि पेशी की उत्तेजनीयता वस्तुतः उसमें विद्यमान नाडीसूत्रों के लोभ का परिणाम है न कि स्वयं पेशीसूत्रों के लोभ का, किन्तु अब प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध है कि मांसपेशी के सूत्र स्वतः उत्तेजनीय हैं।

निम्नांकित प्रयोगों द्वारा यह यान देरी जा सकती है:—

(१) चेटानाशन प्रयोग (Curare experiment of Claude Bernard).

मेदक में कुरार नामक औषध के १ प्रतिशत विलयन का अन्तःक्षेप करने के बाद नाडियों के अन्य भाग की क्रिया नष्ट हो जाने के कारण गृध्रसी नाडी को उत्तेजित करने से जंघा की पेशियों में संकोच नहीं होता। उस अवस्था में भी यदि मांसपेशियों को सीधे उत्तेजना दी जाय, तो उनमें संकोच उत्पन्न होता है।

(२) कुने का दीर्घायामा प्रयोग (Kuhne's Sartorius Experiment).

दीर्घायामा के समान लम्बे तथा समानान्तर सूत्रों वाली पेशियों के प्रान्त-भाग में नाडी सूत्र नहीं होते। पेशी के इस नाडीसूत्ररहित प्रान्त को सीधे उत्तेजित करने से उसमें संकोच उत्पन्न होता है।

(३) गर्भहृदय (Foetal heart).

गर्भास्थि में हृदय में नाडियों के विकास के पूर्व ही से संकोच और प्रसार होता रहता है ।

(४) अपरूपयुक्त नाडियों के साथ पेशियाँ—

नाडी का विच्छेद कर देने पर उसमें अपरूप की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है और लगभग ४-५ दिनों में उसकी उत्तेजनीयता एवं वाहता का गुण नष्ट हो जाता है । ऐसी नाडियों को यदि उत्तेजित किया जाय तो पेशियों पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु यदि पेशियों को साक्षात् रूप से उत्तेजना पहुँचाई जाय, तो उनमें संकोच होने लगता है । यह पेशी की सहज उत्तेजनीयता का ही परिणाम है ।

(५) त्रियमाण पेशी संकोच (Idiomuscular Contration).

नाडीगत अपरूप के फलस्वरूप त्रियमाण मांसपेशी में यह अवस्था देखी जा सकती है । ऐसी पेशी में यदि आघात पहुँचाया जाय, तो उस स्थान पर स्थानीय शोथ हो जाता है जो साक्षात् पेशी सूत्रों की क्रिया का परिणाम है ।

(६) विशिष्ट उत्तेजक (Specific Stimulus).

ग्लिसरीन नाडीसूत्रों को उत्तेजित करता है तथा तनु अमोनिया पेशियों को उत्तेजित करता है । यह विशिष्ट उत्तेजक होने के कारण ग्लिसरीन के द्वारा पेशियों में तथा तनु अमोनिया के द्वारा नाडीसूत्रों में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होगी ।

दीर्घायामा के नाडीविहीन प्रान्त भाग को तनु अमोनिया में डुबाने से उसमें संकोच होता है, किन्तु ग्लिसरीन में डुबाने से संकोच नहीं होता । पुनः नाडीसहित पेशी के ऊर्ध्व भाग को ग्लिसरीन में डुबाने से संकोच होने लगता है ।

संकोच शीलता

किसी तन्तु में उत्तेजक की क्रिया के परिणाम स्वरूप आकार में परिवर्तन करने की शक्ति को संकोच—शीलता कहते हैं । दूसरे शब्दों में, यह कुछ जीवित भोजनसार का ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण कोषाण किसी

से प्रभावित होने पर अपना आकार परिवर्तित करने में समर्थ होता है। पेशियों का आकारगत परिवर्तन वस्तुतः उसके आयतन सन्बन्धी परिवर्तन का सूचक नहीं है, बल्कि यह खोजःसार की स्थिति में परिवर्तन का ही परिणाम है।

संकोचशीलता और उत्तेजनीयता दोनों साथ साथ रहना आवश्यक नहीं है। यथा पेशियाँ और नाडियाँ दोनों उत्तेजनीय हैं, किन्तु संकोचशील केवल पेशी है, नाडी नहीं। शरीर के निम्नांकित तन्तुओं में संकोचशीलता का गुण पाया जाता है:—

१. सामान्य जीवकोषाणु-अमीबिक गति।
२. सामान्य वानस्पतिक कोषाणु।
३. रजक कोषाणु।
४. रोमिका।
५. मांसपेशी।

उत्तेजक के प्रकार

जब हम यह कहते हैं कि कोई तन्तु उत्तेजित हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि तन्तु के वातावरण में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से कोई परिवर्तन उत्पन्न किया गया है। उत्तेजक निम्नांकित प्रकार के हो सकते हैं:—

१. यान्त्रिक (Mechanical)-यथा किसी प्रकार का आघात या क्षत
२. रासायनिक (Chemical)

ये उत्तेजक तीन प्रकार से कार्य करते हैं:—

(८) शोभक के रूप में।

(९) या वीच अणुओं में परिवर्तन के द्वारा।

(१०) उदजन-अणु-केन्द्रीभवन में परिवर्तन के द्वारा।

३. आग्नेय (Thermal)

तापक्रम में अचानक परिवर्तन उत्तेजक का कार्य करता है।

४. वैद्युत- (Electrical)

यह दो प्रकार का होता है:—

(क) निरन्तर—(Galvanic or Constant Current)

(ख) प्रेरित—(Faradic or induced „)

निरन्तर विद्युद्धार के लिए 'डेनियल' सेल तथा प्रेरित विद्युद्धार के लिए 'दुबोयस रेमण्ड प्रेरणयन्त्र' (Du Bois Reymond induction Coil) का प्रयोग होता है ।

प्रेरित विद्युद्धार का बल प्राथमिक विद्युद्धार तथा यन्त्र के दोनों भागों की आपेक्षिक स्थिति पर निर्भर करता है । जब ये भाग दूरी पर होते हैं, तब धारा मन्द होती है । यदि यह एक रेखा पर स्थित हों तो धारा तीव्रतम, समकोण पर हों तो धारा का अभाव तथा यदि मध्यकोण पर हों तो धारा मध्यम होती है । इसके अतिरिक्त निर्माणरतम्भ की अपेक्षा निरोधरतम्भ अधिक तीव्र और बलवान् होते हैं ।

संकोचकाल में पेशीगत परिवर्तन

संकोच के समय पेशी में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं:—

१. आकारगत परिवर्तन (Changes in form)
२. स्थितिस्थापकता एवं प्रसार्यता संवन्धी परिवर्तन (Changes in extensibility & elasticity)
३. तापसंवन्धी परिवर्तन (Changes in temperature)
४. विद्युत्संवन्धी परिवर्तन (Changes in electrical Conditions)
५. रासायनिक परिवर्तन (Changes in Chemical Conditions)

आकारगत परिवर्तन

जब पेशी में उत्तेजन पहुँचाई जाती है, तब उसके आकार में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप वह छोटी और मोटी हो जाती है । किन्तु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता । मांसपेशी की लम्बाई लगभग ६५ से ८० प्रतिशत कम हो जाती है । इसका कारण यह है कि पेशी के भीतर स्थित द्रवभाग अनुलम्ब अक्ष से अनुप्रस्थ अक्ष की ओर चला आता

है और इस प्रकार उसकी लम्बाई तो कम हो जाती है किन्तु मोटाई बढ़ जाती है। इस काल में पेशी की संचित शक्ति भी कार्यरूप में परिणत होती है।

आकारगत परिवर्तनों की परीक्षा के लिए प्रायः मेढक की एक पेशी संभवतः जंघापिण्डिका गृध्रसी नाडी के साथ शरीर से पृथक् कर ली जाती है। इसे 'नाडीपेशीयन्त्र' (Nerve muscle preparation) कहते हैं। इसकी नाडी को "पेशीसंकोचमापक यन्त्र" (Myograph) के द्वारा उत्तेजित किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप पेशी में उत्पन्न हुए संकोच की परीक्षा की जाती है।

पेशीसंकोचमापक यन्त्र में एक ओर विद्युद्यन्त्र होता है जिसके द्वारा पेशी में उत्तेजना पहुँचाई जाती है। दूसरी ओर पेशी से संबद्ध यन्त्र के अग्रभाग पर लेखनयन्त्र होता है जो घेलनाकार भाग पर लगे हुए मसीपत्र के सम्पर्क में रहता है। जब पेशी में विद्युद्वाहक के द्वारा उत्तेजना पहुँचाने पर संकोच प्रारम्भ होता है, तब वह मूर्च्छाकार लेखन यन्त्र ऊपर की ओर उठ जाता है और संकोच समाप्त होने पर पुनः नीचे की ओर छूट आता है। घेलनाकार भाग भी सदैव एक निश्चित वेग से घूमता रहता है। इस प्रकार पेशी संकोच का पूर्ण रेखा चित्र मसीयन्त्र पर अंकित हो जाता है। इसे 'सामान्य पेशीरेखा' (Simple Muscle Curve) कहते हैं।

पेशी संकोच तीन अवस्थाओं में विभक्त होता है, अतः सामान्य पेशी रेखा के भी तीन भाग होते हैं। पेशी में उत्तेजना पहुँचाने पर शीघ्र संकोच उत्पन्न नहीं होता। किन्तु उसमें कुछ समय लग जाता है। इस काल को 'अव्यक्तकाल' (Latent period) कहते हैं। यह लगभग $\frac{1}{1000}$ सेकण्ड होता है, किन्तु यन्त्रभार में कमी होने पर ०.००५ में ०.०००४ सेकण्ड तक भी हो सकता है। इस काल में पेशी में कोई प्रकट परिवर्तन नहीं होता, किन्तु संकोच की तैयारी के रूप में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसमें नाडीस्पन्द उत्तेजनारोधान से पेशी तक पहुँचता है। यन्त्र अधिक भारी होने पर यह काल अधिक होता है। भविष्यो आदि में यह काल बहुत अधिक होता है।

इसके बाद दूसरी अवस्था का प्रारम्भ होता है, जिसे 'संकोचकाल' (Con-

traction period) कहते हैं । इसमें पेशी का दबाव बढ़ता जाता है और धीरे २ सीमा पर पहुँच जाता है । यह लगभग $\frac{1}{8}$ या $\frac{1}{5}$ सेकण्ड होता है । जब पेशी को सीधे उत्तेजित किया जाता है, तब अव्यक्तकाल कम होता है और जब चेष्टावह नाडी के द्वारा उसमें उत्तेजना पहुँचाई जाती है, तब यह अधिक होता है, किन्तु संकोचकाल सभी दशाओं में समान रहता है । इससे स्पष्ट है कि दोनों अवस्थाओं में पेशी के सभी मूत्रों में एक ही साथ संकोच प्रारम्भ और समाप्त होता है । इसे 'युगपत् सूत्रयोग' (Simultaneous fibre Summation) कहते हैं ।

तृतीय अवस्था में पेशी अपनी पूर्ववस्था में लौट आती है । इसे 'प्रसार-काल' (Relaxation period) कहते हैं । पहले तो लेखनयन्त्र बड़ी तेजी से नीचे उतरता है, फिर उसका उतार क्रमिक हो जाता है । यह काल लगभग $\frac{1}{4}$ सेकण्ड होता है ।

सामान्य पेशीरेखा पर प्रभाव डालनेवाले कारण

- | | |
|---------------------|---------------------|
| १. पेशी का स्वरूप । | ४. पेशी की स्थिति । |
| २. उत्तेजक का बल । | ५. तापक्रम । |
| ३. भार । | ६. औषध । |

(१) पेशी का स्वरूप—विभिन्न प्रकार की पेशियों में संकोचशीलता भी भिन्न २ प्रकार की होती है । एक प्रकार की पेशियों में भी उनकी क्रिया के अनुसार उसमें भिन्नता आ जाती है । स्वरतन्त्री पेशियों में बहुत तीव्र संकोच और प्रसार होते हैं । विभिन्न पेशियों की जाति में विभिन्नता उनमें स्थित स्वच्छसार तथा सूत्रसार के आपेक्षिक परिमाण पर निर्भर करती है । सूत्रसार के कारण पेशियों की गति मन्द एवं विलम्बित होती है तथा स्वच्छसार तीव्र और क्षणिक गति उत्पन्न करता है ।

(२) उत्तेजक का बल—पेशी में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए उत्तेजक का बल एक निश्चित सीमा से कम नहीं होना चाहिये । इस प्रकार पेशी में उत्तेजना उत्पन्न करने में समर्थ कम से कम उत्तेजक के बल को 'न्यूनतम उत्तेजक' (Minimal Stimulus) कहते हैं । इसी प्रकार उत्तेजक की शक्ति में वृद्धि के

अनुसार संकोच बढ़ता जाता है, किन्तु यह भी एक सीमा पर पहुँच कर रुक जाता है। उसके बाद उत्तेजक की शक्ति बढ़ाने से संकोच नहीं बढ़ता। पेशी में संकोच उत्पन्न करनेकी इस उच्चतम शक्ति को 'उच्चतम उत्तेजक' (Maximal Stimulus) कहते हैं। इसके सबन्ध में निम्नांकित युक्तियाँ दी जाती हैं:—


(क) प्रत्येक पेशी सूत्र के संकोच का परिमाण उत्तेजना की शक्ति के अनुसार होता है।

(ख) जैसे २ उत्तेजना की शक्ति बढ़ाई जाती है, वैसे २ पेशी के अधिक सूत्र प्रभावित होते जाते हैं और अन्त में पर सभी सूत्र संकुचित हो जाते हैं तब कोई भी सूत्र अश्लिष्ट न रहने के कारण फिर आगे संकोच नहीं हो सकता। यह इस सिद्धान्त पर अवलम्बित है कि एक पेशीसूत्र अपनी पूर्ण शक्ति भर संकुचित होता है या उसमें एकदम संकोच नहीं होता अर्थात् पेशी-सूत्र का संकोच सर्वत्र अपनी उच्चतम सीमा पर होता है। इसे 'सर्वाभावा नियम' (All or none phenomena) कहते हैं। इस प्रकार उत्तेजक की शक्ति बढ़ाने से अधिक पेशीसूत्र आक्रान्त होते जाते हैं और कुल मिला कर पेशी का संकोच अधिक हो जाता है।

(३) भार—कुछ गीमा तक भार से संकोच में वृद्धि होती है, किन्तु धीरे २ वह कम होने लगता है और अन्त में रुक हो जाता है। भारी बोझ से अव्यक्तकाल अधिक हो जाता है।


(४) पेशी की स्थिति—यदि पेशी बलवान् और विश्रामावस्था में हो, तो उत्तेजक की उभी शक्ति से उत्तेजना पहुँचाने पर उसमें तीन या चार बार तक उत्तरोत्तर संकोच में वृद्धि होती जाती है। इसे 'सोपानक्रम' (Stair Case phenomenon) या संकोच का लाभकर परिणाम (Beneficial effect of Contraction) कहते हैं। संकोच के परिणामस्वरूप उत्पन्न पेशीदुर्बलता कुछ सीमा तक उसमें सहायक होता है, किन्तु संकोच के आधिक्य से जब अम्ल का संचय अधिक हो जाता है, तब संकोच पर उसका हानिकार प्रभाव पड़ता है और श्रम की उत्पत्ति होती है।

(५) तापक्रम—स्तनधारी जीवों की पेशियों में 4° डिग्री से 40° डिग्री



चित्र २१—पेशीसंकोचमापकयन्त्र

१ देलन २ रेखनयन्त्री ३ भार ४ नाडीपेशीयन्त्र ५ विद्युत्ताट ६ विद्युत्कोष्ठ
७. अधोदेलन (विषय ४६ पृ० में देखें)



चित्र २२—सामान्यपेशीरेखा

१ उत्तेजना का स्थान (विषय ४६ पृ० में देखें)

सेण्टीग्रेड तक संकोच होता है । शीत से पेशी संकोच की सभी अवस्थाओं की अवधि बढ़ जाती है और संकोच मन्द होने लगते हैं । उष्णता से सभी अवस्थाओं की अवधि घट जाती है और संकोच तीव्र होते हैं । ४२° डिग्री सेण्टीग्रेड से अधिक ताप देने पर पेशीगत मांसतन्त्र के जम जाने से सापसंकोच (Heat rigor) उत्पन्न होता है ।

(६) औषध—कुछ औषधों का प्रभाव भी पेशी संकोच पर होता है, यथा:—
अदिनिलीन—पेशी के घल और संकोच को बढ़ाता है।

डिजिटैलिस—हार्दिक तथा अन्य स्वतन्त्र पेशियों की शक्ति बढ़ाता है।

विरेटीन—पेशी संकोच के प्रसारकाल को अत्यधिक बढ़ाता है।

पेरियम लवण—इसका प्रभाव विरेटीन के समान ही, किन्तु कुछ कम होता है।

प्रसर्पिता और स्थितिस्थापकता-संबन्धी परिवर्तन

पेशी के संकोचकाल में उसकी प्रसर्पिता बढ़ जाती है, किन्तु स्थितिस्थापकता कम हो जाती है। इस पर निम्नांकित कारणों से परिवर्तन होता है।—

(१) भार:—भार में वृद्धि करने से पेशी की प्रसर्पिता में वृद्धि होती है, किन्तु यह वृद्धि आनुपातिक नहीं होती और भार बढ़ाने पर भी धीरे २ प्रसार में उठनी वृद्धि नहीं होती। यथा—

भार (ग्राम)	५०	१००	१५०	२००	२५०	३००
कुल प्रसार	३.२	६	८	९.५	१०	१०.३
प्रसार में वृद्धि		२.८	२	१.५	०.५	०.४

समान भार देने पर भी सकुचित पेशी में असंकुचित पेशी की अपेक्षा प्रसार अधिक होता है। इस क्रिया को वेबर का विरोधाभास (Weber's Paradox) कहते हैं।

(२) तापक्रम—शीत से स्थितिस्थापकता में कमी तथा लवणता से उसमें वृद्धि होती है।

आग्नेय या तापसंबन्धी परिवर्तन

संकोचकालीन यान्त्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के कारण पेशी का तापक्रम संकोचकाल में कुछ अधिक हो जाता है। एक संकोच में लगभग 0.01° से 0.04° डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम बढ़ जाता है। इसके माप के लिए सूक्ष्म-तापमापकयन्त्र (Thermopile) नामक यन्त्र का प्रयोग होता है। इस यन्त्र में दो असमान धातुओं, तथा लौह और जर्मन सिल्वर या ऐण्टीमनी और

विस्मय को मिला कर उनको तार के द्वारा विद्युद्यन्त्र (Galvanometer) से संयोग कराया रहता है । यह यन्त्र इतना सूक्ष्मग्राही होता है कि तापक्रम में थोड़ा भी परिवर्तन होने पर विद्युद्वाहक की उत्पत्ति होती है और विद्युद्यन्त्र द्वारा उसका पता चल जाता है ।

पेशीसंकोच की दो अवस्थाओं में ताप उत्पन्न होता है:—

(१) प्रारम्भिक ताप (Initial heat)—

यह पेशी के संकोचकाल की अवस्था में उत्पन्न होता है ।

(२) विलम्बित या विश्रान्तिकाप (Delayed heat or Recovery heat):—

यह पेशी के विश्रान्तिकाल में होता है और इसका कारण पेशी में ओपजन की उपस्थिति में होने वाले परिवर्तन हैं । ओपजन की अनुपस्थिति में भी यह थोड़े परिमाण में होता है, इसे विलम्बित निरोपजन ताप (Delayed anaerobic heat) कहते हैं । ओपजन की उपस्थिति में यह अधिक बढ़ जाता है ।

रासायनिक परिवर्तन

पेशी का संकोच उसमें होनेवाले कुछ रासायनिक परिवर्तनों पर निर्भर करता है । दूसरे शब्दों में, रासायनिक शक्ति कार्य में परिणत हो जाती है ।

संकोच के समय पेशी में निम्नांकित रासायनिक परिवर्तन होते हैं:—

(१) ओपजन का अधिक आहरण ।

(२) मूलभाग विशेषतः कार्बन द्विऑक्साइड की अधिक उत्पत्ति ।

(३) शर्कराजन से दुग्धाम्ल की उत्पत्ति ।

(४) अम्ल प्रतिक्रिया ।

(५) ऊर्जन—अणु—केन्द्रोन्मूलन में वृद्धि ।

(६) फॉस्फेजिन का क्रिपेटिन और फॉस्फेट में जलीय विरलेपण ।

(७) ऐडिनिलपाइरोफॉस्फेट का फॉस्फोरिक अम्ल, अमोनिया तथा इनोसिनिक अम्ल में जलीय विरलेपण ।

पेशी के संकोचकाल में ओपजन का अधिक आहरण नहीं होता, किन्तु

विधान्तिकाल में उसका आहरण होता है जब कि पेशी संकोच के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है। इस प्रकार ओपजन की उपस्थिति के अनुसार इसकी दो अवस्थाएँ होती हैं:—

(क) निरोपजन अवस्था (Anaerobic phase) —

यह पेशी के संकोच एवं प्रसारकाल में होती है। इस अवस्था में दुग्धाम्ल-जन शर्कराजन तथा दुग्धाम्ल में परिणत होता है।

(ख) सौपजन अवस्था (Aerobic phase) —

यह पेशी के विधान्तिकाल में होती है जब ओपजन का उपयोग पूरा होता है। इसमें शर्कराजन और दुग्धाम्ल पुनः दुग्धाम्लजन में परिवर्तित होता है।

पेशी से संकोच के समय दुग्धाम्ल की उत्पत्ति सब से महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन है। पेशी संकोच के रासायनिक सिद्धान्त के अनुसार दुग्धाम्ल की उत्पत्ति ही पेशीसंकोच को उत्पन्न करती है। किन्तु आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार यह देखा गया है कि दुग्धाम्ल संकोच के लिये आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह संकोच और प्रसार की अवस्थाओं के बाद उत्पन्न होता है। दुग्धाम्ल की उत्पत्ति के लिये ग्लुटेथियोन (Glutathione) नामक द्रव्य की आवश्यकता होती है जो आयटो-एसिटिक अम्ल के द्वारा नष्ट हो जाता है। जब पेशी आयटोएसिटिक अम्ल से विद्युत् हो जाती है और दुग्धाम्ल का निर्माण नहीं होता, तब भी पेशी में संकोच उत्पन्न होता है और थक भी होता है।

दुग्धाम्ल का निर्माण

पेशी में उत्पन्न दुग्धाम्ल के परिमाण के अनुसार उसमें शर्कराजन की कमी हो जाती है। दुग्धाम्ल के निर्माण की कई अवस्थाएँ होती हैं और इसके लिए फॉस्फेट की उपस्थिति आवश्यक है।

(क) सर्व प्रथम शर्कराजन ($C_6H_{10}O_5$) हेक्सोज ($C_6H_{12}O_6$) में परिणत हो जाता है, जो फॉस्फोजन के जलीय विरलेपण से उत्पन्न फॉस्फेटों के साथ मिलता है और इस प्रकार हेक्सोजफॉस्फेट या दुग्धाम्लजन (Hexose-phosphates & Lactacidogen) बनता है।


(ख) हेक्सोजफॉस्फेट पर 'हेक्सोकाइनेज' (Hexokinase) नामक

क्रियतत्त्व की क्रिया होती है और वह मेथिल ग्लायोक्सल (Methyl Glyoxal) और स्फुरकाम्ल में परिवर्तित हो जाता है ।

(ग) मेथिलग्लायोक्सल पर 'मेथिल ग्लायोक्सलेज' (Methyl glyoxalase) नामक क्रियतत्त्व की क्रिया होती है और इसमें ग्लुटेथियोन नामक सहक्रियतत्त्व भी सहायक होता है । इस प्रकार वह दुग्धाम्ल ($C_3H_4O_5$) में परिणत हो जाता है और इसके अन्तिम द्रव्य फास्फेट और दुग्धाम्ल होते हैं ।

यह ग्लुटेथियोन आयडोएसिटिक अम्ल से नष्ट हो जाता है, अतः इस अम्ल से विपाक्त पेशी जब संकुचित होती है, तब दुग्धाम्ल उत्पन्न नहीं होता । आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि दुग्धाम्ल का सन्निहित पूर्ववर्ती द्रव्य ग्लायोक्सल नहीं, बल्कि पिरुविक अल्डीहाइड (Pyruvic aldehyde, $C_3H_4O_3$) है ।

सामान्य अवस्थाओं में इस प्रकार उत्पन्न दुग्धाम्ल का केवल २० प्रतिशत ओपजनीकरण के द्वारा कार्बन ड्वाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाता है:—



इस रासायनिक परिवर्तन के क्रम में अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है और शक्ति भी उत्पन्न होती है जो अवशिष्ट ८० प्रतिशत दुग्धाम्ल को पुनः शर्कराजन में संश्लेषित कर देती है ।

पेशी में उत्पन्न दुग्धाम्ल रक्त में शोषित होकर यकृत में पहुँच जाता है जहाँ वह शर्कराजन में परिणत हो जाता है । यकृत का यह शर्कराजन बाहर आकर रक्तगत सचशर्करा का रूप धारण करता है और पेशी में पहुँचने पर पुनः 'पेशीशर्कराजन' (Muscle Glycogen) में परिणत हो जाता है । इसे 'कोरीचक्र' (Cori cycle) कहते हैं । ओपजन की अनुपस्थिति में पेशी में दुग्धाम्ल का संचय होने लगता है ।

जब शर्करा का दुग्धाम्ल में विश्लेषण होता है तब शक्ति नहीं उत्पन्न होती है, किन्तु ओपजनीकरण से जब वह कार्बनड्वाइऑक्साइड और जल में परिणत होती

है, तब शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार इसकी दो मुख्य अवस्थाएँ होती हैं:—

(क) हेक्सोज का दुग्धाम्ल में विश्लेषण।

(ख) ओपजनीकरण के द्वारा उसका कार्बनडिऑक्साइड और जल में परिणाम।

द्वितीय अवस्था ओपजन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। जब ओपजन की प्राप्ति कम होती है यथा यदि पेशी को नम्रजन युक्त वायुमण्डल में संकुचित कराया जाय तो प्रथम अवस्था के उत्पन्न द्रव्य ज्यों के र्यों रह जाते हैं और उनसे श्रम की अवस्था उत्पन्न होती है। बाद में जब मांसतन्त्र जम जाता है तब मृत्युत्तरसंकोच की अवस्था उत्पन्न होती है। पेशी की अत्यधिक क्रिया ओपजन की कमी का मुख्य कारण है जिससे प्रथम मानसिक तथा बाद में मांसपेशियों में थम होता है। इस प्रकार अधिक परिमाण में उत्पन्न दुग्धाम्ल रक्त में प्रविष्ट होने पर रक्ताम्लता (Acidosis) उत्पन्न करता है। अगला-धिय से प्रथम अवस्था में कार्य करने वाले किण्वताओं की क्रिया में बाधा होती है अर्थात् शर्कराजन का हेक्सोज और दुग्धाम्ल में विश्लेषण ठीक ठीक नहीं हो पाता। फलस्वरूप शर्कराजन का कोष पूर्णतया रिक्त होने के पहले ही थम उत्पन्न हो जाता है।

फास्फेजन या फास्फोक्रिएटिन

दूसरी महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया जो पेशी के संकोचकाल में होती है, वह है फास्फेजन या फास्फोक्रियेटिन के जलीय विश्लेषण से क्रियेटिन और फास्फेट का निर्माण। यह प्रतिक्रिया शर्कराजन की अपेक्षा अधिक तीव्रता एवं शीघ्रता से होती है और फास्फेट का उपयोग हेक्सोजफास्फेट के निर्माण में होता है। इस हेक्सोजफास्फेट का जब हेक्सोकाइनेज नामक किण्वता के द्वारा मेथिल ग्लायोक्सल और फास्फेट में परिवर्तन होता है तब आवश्यक शक्ति प्राप्त होती है। ओपजन की उपस्थिति में फास्फेट और क्रियेटिन पुनः मिलकर फास्फेजन में परिणत हो जाते हैं।


जब पेशी थान्त हो जाती है तब फास्फेजन का विश्लेषण तो होता है, किन्तु उसका पुनः संश्लेषण नहीं होता और जब सब फास्फेजन का जलीय

विश्लेषण हो चुकता है तब पेशी में कठिन संकोच (Rigor) उत्पन्न होता है । इससे स्पष्ट है कि फास्फेजन पेशी के संकोच के लिए अत्यावश्यक है और पेशी का संकोच फास्फेजन की मात्रा के अनुपात से ही होता है । इस प्रकार पेशी में अत्यधिक संकोच होने पर भी उसमें दुग्धाम्ल का संचय नहीं होता । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसी स्थिति में संकोच के लिये आवश्यक शक्ति शर्कराजन से दुग्धाम्ल में विश्लेषण से नहीं प्राप्त होती, बल्कि वह फास्फेजन के विश्लेषण से प्राप्त होती है । इस अवस्था में अम्ल के अभाव से पेशी की प्रतिक्रिया चारीय होती है ।

ऐडिनिलपाइरोफास्फेट (Adenyl pyrophosphate)

ऐडिनिलपाइरोफास्फरिक अम्ल, जिसे ऐडिनोसिट्राइफास्फरिक अम्ल भी कहते हैं, पेशीसंकोच की क्रिया में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग देता है । पेशीसंकोच के समय यह विश्लेषित होकर फास्फरिक अम्ल तथा ऐडिनिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है । ऐडिनिलिक अम्ल का पुनः निरामीकरण के द्वारा अमोनिया तथा इनौसिनिक अम्ल में परिवर्तन होता है । यथा—


ऐडिनोसिनट्राइफास्फरिक अम्ल



इसके विश्लेषण क्रम में उत्पन्न शक्ति का उपयोग क्रियेटिन और फास्फेट से फास्फेजन के संश्लेषण में होता है । ऐडिनिल पाइरोफास्फेट की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में शर्कराजन का दुग्धाम्ल में परिवर्तन नहीं होता । इसके अतिरिक्त हेक्सेोजफास्फेट के निर्माण में इस यौगिक का

फास्फेट निरिन्द्रिय फास्फेटों की अपेक्षा अधिक परिमाण में तथा सुविधा से उपयुक्त होता है। इसके समुचित कार्य के लिए मैग्नेशियम के अणुओं की उपस्थिति आवश्यक है।

पेशीसङ्कोच के समय रासायनिक परिवर्तन



वैद्युतपरिवर्तन

संकोच के समय पेशी में रासायनिक परिवर्तनों के साथ साथ विद्युत् संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। इस काल में शक्ति का प्रादुर्भाव केवल ताप के रूप में ही नहीं होता, बल्कि अत्यन्त सूक्ष्म परिमाण में विद्युत् भी प्रकट होता है। वैद्युत परिवर्तन पेशीसंकोच के अव्यक्त काल में प्रारम्भ होते हैं और संकोचकाल के समाप्त होने के पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं। पेशी की विधामावस्था और संकोचावस्था के वैद्युत स्वरूपों में अन्तर होता है। अतः उनका पृथक् अध्ययन सुविधाजनक होगा।

(१) विधामावस्था में पेशी की वैद्युत दशा ।

यदि मांसपेशी के एक छम्बे टुकड़े को शरीर से पृथक् कर लिया जाय और इसके अनुलग्न तथा कटे हुए पृष्ठ पर विद्युद्धारामापक यंत्र लगाया जाय, तो उस यंत्र की सूई कुछ धूम जाती है जिससे विद्युद्धार का संकेत मिलता है। विद्युत् की इस धारा को 'विश्राम की विद्युद्धार' (Current of rest) कहते हैं। इस विद्युद्धार की उत्पत्ति के कारण के सम्बन्ध में अनेक मत प्रचलित हैं, जिनमें दो मुख्य हैं:—

(क) डु ब्वायस रेमण्ड का मत (Du Bois Reymond's theory) :—

इसका मत यह है कि मांसपेशी ऐसे अणुओं की बनी है जिसका मध्य भाग ऋण तथा प्रान्तभाग धन होते हैं। प्राकृत जीवित पेशी के मध्यभाग तथा प्रान्तभागों के वैद्युत दबाव में अन्तर सहज है, अतः जब पेशी धींच से फाट दी जाती है, तो अनेक धन प्रान्त भाग बाहर निकल आते हैं। इस मत के अनुसार यह विद्युद्धार स्वभावतः पेशियों में रहता है, किन्तु छत होने पर प्रकट हो जाती है।

(ख) हर्मन का मत:—(Hermann's theory)

इसके अनुसार पेशी के मध्य तथा प्रान्तभागों के वैद्युत दबाव में कोई अन्तर नहीं होता, अतः प्राकृत पेशी में कोई विद्युद्धार नहीं होती। यदि दोनों ध्रुवों पर पेशी समान स्थिति में हो तो वैद्युत स्वरूप में कोई अन्तर नहीं दीखता जैसा कि जीवनकाल में स्वभावतः होता है। विद्युद्धार की प्रतीति तभी होती है जब पेशी में छत होता है। इस प्रकार यह विद्युद्धार वस्तुतः छतजन्य या विभाजक विद्युद्धार (Current of injury or demarcation current) है जो छत भाग में रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप वैद्युत दबाव में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है।

यदि दो असमान तन्तुओं का संयोग कराया जाय तो विद्युद्धार उत्पन्न होती है। यथा पेशी धन तथा उसकी कण्डरा ऋण होती है और तभी उसमें विद्युत् का प्रवाह संभव है

इस मत की पुष्टि में निम्नांकित प्रमाण दिये जाते हैं:—

(क) छम्बे सूत्रों वाली पेशी में विद्युद्धार की अवधि छम्बी होती है। छोटे सूत्रों वाली पेशियों में यह क्षीघ्र समाप्त हो जाती है।

(ख) काटने के समान ही ताप, विष आदि पदार्थों के कारण छत का भी प्रभाव होता है।

विद्युद्धार का काल


जब तक छत रहता है, तब तक यह विद्युद्धार रहती है।

विद्युद्धार की प्रतीति

विद्युद्धार की प्रतीति या उसका निश्चय निम्नांकित यन्त्रों से होता है:—

१. परावर्तक विद्युद्धार मापक (Reflective galvanometer)
२. तार " " (String galvanometer)
३. केपिका विद्युन्मापक यन्त्र (Capillary electrometer)
४. कैथोड किरण नलिका (Cathode ray tube).

इनके द्वारा पेशीगत विद्युत् का जो रेखांकित विवरण मिलता है उसे 'विद्युत्पेशी सकोचमाप' (Electromyogram) कहते हैं।



चित्र २३—तारविद्युद्धारमापक

क-स-रजततार, ख-विद्युत् चुम्बक, ज-प्रकाश, च-वर्दा, घ-मांसपेशी।

संकोचावस्था में पेशी की वैद्युत दशा

जब पेशी संकुचित होती है तब उसकी वैद्युत दशा में परिवर्तन होने से एक विद्युद्धार उत्पन्न होती है, जिसे 'क्रियाजन्य विद्युद्धार' (Current of action) कहते हैं। यह धारा संकुचित होने वाली प्रत्येक पेशी में, चाहे वह

क्षत हो या स्वस्थ हो, पाई जाती है । चूँकि यह क्षतजन्य विद्युद्धार की विपरीत दिशा में होता है, अतः इसे 'ऋणपरिवर्तनीय धारा' (Negative variation current) भी कहते हैं ।

क्रियाजन्य विद्युद्धार का कारण

जब पेशी संकुचित होती है तब उसमें कुछ ऐमे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनसे उसके वैद्युत दबाव में अन्तर आजाता है और वह विभ्रामावस्था के पेशीसूत्रों की अपेक्षा धन हो जाता है । दूसरे शब्दों में, उत्तेजना का प्रभाव भी चत के समान ही होता है । यह प्रभाव अत्यन्त क्षणिक होता है और केवल एक सेकण्ड के हजारवें भाग तक रहता है ।

विद्युद्धार की अवधि

यह धारा तब तक रहती है जब तक कि पेशी में संकोचतरंग रहती है ।

विद्युद्धार का स्वरूप

व्यावस्थिक (Diphasic) :—संकोच पहले पेशी के एक प्रान्त भाग में प्रारंभ होता है और फलस्वरूप वह प्रान्तभाग दूसरे प्रान्तभाग की अपेक्षा धन हो जाता है । क्रमशः जब संकोच तरंग दूसरे प्रान्त में पहुँचती है तब यह प्रान्त पूर्वप्रान्त की अपेक्षा धन हो जाता है । इस प्रकार इस विद्युद्धार की दो अवस्थाएँ होती हैं । अतः इसे 'द्व्यावस्थिक परिवर्तनीय विद्युद्धार' (Diphasic variation current) कहते हैं । यह अक्षत पेशी में मिलती है ।

एकावस्थिक (Monophasic) :—यह चत और अक्षत दोनों प्रकार की पेशियों में मिलती है :—(१) यदि विद्युत्तार के एक प्रान्त को पेशी के चतभाग से तथा दूसरे प्रान्त को पेशी के अक्षतभाग से जोड़ दिया जाय और तब पेशी में संकोच कराया जाय तो उसमें विद्युद्धार एकावस्थिक ही होगी क्योंकि दूसरे प्रान्त में पेशीतन्तु के निर्जीव होने से वह उत्तेजना को ग्रहण नहीं करता, फलतः उसमें धारा उत्पन्न नहीं होती । इसलिए दूसरी अवस्था इसमें नहीं होती ।

(२) अक्षत पेशी के दीर्घसंकोच (Tetanus) की अवस्था में भी यह विद्युद्धार मिलती है । इसका कारण यह है कि जिस भाग से संकोचतरंग का प्रारंभ होता है वहाँ बराबर नई नई संकोचतरंगें उत्पन्न होती रहती हैं और इसलिए वहाँ धन विद्युत् भी बना रहता है ।

क्रियाजन्य विद्युद्धार की प्रतीति

इसकी प्रतीति निम्नांकित यन्त्रों से की जाती है:—


- (१) विद्युद्धारामापक यन्त्र । (२) वैशिका विद्युन्मापक यन्त्र
(३) क्रियारमक विद्युन्मापक (Physiological Rheoscope).

द्वितीयक संकोच (Secondary contraction)—

क और ख दो नाडी-पेशी-यन्त्रों को लिया जाय जिनमें दोनों पेशियाँ अक्षत हों, और ख की नाडी को क पेशी पर ऐसा रखा जाय कि वह उसके दोनों प्रान्तों के संपर्क में रहे । अब यदि क की नाडी को उत्तेजित किया जाय तो केवल क पेशी ही संकुचित नहीं होती, बल्कि ख की नाडी द्वारा उत्तेजना पहुँचने पर ख की पेशी भी संकुचित होती है । इसे द्वितीयक संकोच कहते हैं ।

दो उत्तेजकों का प्रभाव

प्रथम उत्तेजना के बाद कुछ क्षण तक पेशी और नाडी इस स्थिति में रहती है कि यदि उसे पुनः उत्तेजित किया जाय तो उसमें संकोच नहीं होता । इस काल को विधामावस्था (Refractory period) कहते हैं । इसकाल में पेशी अपनी चति की पूर्ति करती है जिससे वह आगामी संकोच कार्य में समर्थ हो सके । यह लगभग ०.०१ सेकण्ड होता है । अतः यदि इस काल में द्वितीय उत्तेजक का प्रयोग किया जाय तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, किन्तु यदि यह उत्तेजना पर्याप्त समय के बाद पेशी में पहुँचाई जाय तो दो सामान्य पेशी रेखाएँ अलग अलग बनती हैं । इनमें दूसरी रेखा कुछ बड़ी होती है, इसे संकोच का लाभकर परिणाम (Beneficial effect of contraction) कहते हैं । यदि पेशी में संकोच के अत्यक्त काल में ही दूसरी उत्तेजना दी जाय तो दोनों उत्तेजनार्थे मिल कर एक सामान्य पेशी रेखा बनाती हैं जो दोनों उत्तेजनाओं की पृथक् पृथक् पेशी रेखाओं से बड़ी होती है । इसे उत्तेजकयोग (Summation of Stimuli) कहते हैं । यदि पहली उत्तेजना से उत्पन्न हुये संकोच की अवस्था में ही दूसरी उत्तेजना दी जाय तो दूसरी पेशी रेखा पृथक् न बनकर पहली रेखा में ही जुट जाती है । इसे संयुक्त स्थिति या प्रभाव संयोग (Superposition or summation of effects) कहते हैं । प्रथम और द्वितीय उत्तेजनाओं के बीच में कालव्यवधान के अनुसार प्रभाव में भी विभिन्नता होती है ।




चित्र २४—दो उत्तेजनों का प्रभाव

१-प्रथम उत्तेजन, २-द्वितीय उत्तेजन

क-संकीचता समरूप पल्लव, ख-प्रभावपूर्ण, ग-उत्तेजनयोग ।

(क) यदि दोनों उत्तेजकों के बीच का व्यवधान पर्याप्त हो तो आक्षेपों के क्रम उत्पन्न होते हैं । (Succession of twitches)

(ख) यदि उत्तेजक एक दूसरे के बाद अधिक शीघ्रता से प्रयुक्त किये



चित्र २५—दीर्घसंकोच के विभिन्न रूप

१-२-प्रथम आक्षेप सोपानक्रम में । ३-४-अपूर्ण दीर्घसंकोच । ५-६-पूर्ण दीर्घसंकोच ।

जाँय तो निरन्तर प्रभाव संयोग देखने में आता है जब तक कि पेशी थान्त नहीं होती ।

(ग) यदि और शीघ्रता से उत्तेजकों का प्रयोग किया जाय तो एक सुदीर्घ संकोच की अवस्था देखने में आती है जिसमें पेशी पूर्णतया अपनी पूर्ववस्था में कभी नहीं लौटती, किन्तु उसके संकोच की अवस्थाएँ पृथक् २ स्पष्टरूप से प्रतीत होती हैं । इसे अपूर्ण दीर्घ संकोच (Incomplete tetanus) कहते हैं ।

(घ) यदि संकोच और तीव्र और शीघ्र हों तो सभी संकोच की अवस्थाएँ परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं और संकोच पृथक् २ नहीं दिखलाई पड़ता । इसे पूर्ण दीर्घसंकोच (Complete tetanus) कहते हैं ।

पेशीतरंग (Muscle-wave)

नाड़ी सूत्रों के द्वारा तरंग का शीघ्र संवहन होने के कारण स्वभावतः पेशी के सभी सूत्र एक ही समय संकुचित होते हैं किन्तु कुरार नामक औषध के द्वारा नाड़ी को शून्य करने पर यह देखा गया है कि सेढक की पेशी में इसकी गति प्रतिसेकण्ड ३ मीटर तथा मनुष्य की पेशियों में १०-१३ मीटर प्रतिसेकण्ड है । इसकी गति उष्णता से बढ़ती तथा शीत से घटती है ।

ऐच्छिक दीर्घसंकोच (Voluntary tetanus)

प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध है कि परतन्त्र पेशियों में जो ऐच्छिक संकोच होता है वह वास्तव में अपूर्ण दीर्घसंकोच की ही अवस्था होती है क्योंकि नाडीकेन्द्रों से पेशी तक एक उत्तेजना नहीं, बल्कि अनेक उत्तेजनाओं का समूह आता रहता है । ऐड्रियन तथा ब्रौन्क (Adrian & Bronk) के अनुसार प्रतिसेकण्ड ५० उत्तेजन आती हैं । भिन्न भिन्न पेशियों में इसकी संख्या में अन्तर होता है । यथा महाप्राचीरा में इसकी संख्या ७० प्रतिसेकण्ड है । कुचला विष में इनकी संख्या में अन्तर नहीं होता, केवल संकोचतरंग की ऊँचाई में वृद्धि हो जाती है ।

पेशी का स्वाभाविक संकोच (Muscle tonus)

संकोच और प्रसार के अतिरिक्त सजीव पेशी दबाव या निरन्तर संकोच की स्थिति में स्वभावतः रहती है जो सामान्यतः अत्यल्प होता है और समय समय

पर परिवर्तित होता रहता है। इसे पेशी का स्वाभाविक संकोच (Muscle tonus) या स्थितिजन्य संकोच (Postural contraction) कहते हैं।

कारण:—

(१) यह पेशियों के नाडीकेन्द्रों के साथ संबन्ध पर निर्भर करता है। पेशियों की गति के कारण उनमें स्थित नाडियों के अग्रभाग सदैव उत्तेजित होते रहते हैं। अतः संज्ञावह या चेष्टावह नाडी के विच्छिन्न होने पर स्वाभाविक संकोच नष्ट हो जाता है। यह उच्च केन्द्रों पर पूर्णतः निर्भर नहीं होता, किन्तु उनके द्वारा नियन्त्रित होता है।

(२) कुछ सीमा तक यह स्वस्थ रक्त द्वारा पेशियों के पोषण पर निर्भर करता है। अतः एव पोषण की कमी से पेशी का स्वाभाविक संकोच कम हो जाता है और वह शिथिल हो जाती है।

महत्त्व:—

(१) इसके द्वारा पेशियों संकोच के लिए अनुकूल अवस्था में घनी रहती हैं।

(२) शाखाओं की स्थिति को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है। अतः जब पेशी का स्वाभाविक संकोच नष्ट हो जाता है, तब शाखाओं की सन्धियाँ शिथिल हो जाती हैं।

(३) पेशियों के निरन्तर स्वाभाविक संकोच के कारण शरीर में अत्यधिक परिमाण में ताप उत्पन्न होता है। अतः यह तापोत्पत्ति का बहुत महत्वपूर्ण साधन है।

समभारिक और समाकारिक संकोच

(Isotonic and isometric Contractions)

यदि पेशी को एक उठाने योग्य बोझ दिया जाय तो वह उस बोझ को उठा लेती है और उसका आकार संकुचित और छोटा हो जाता है। संकुचितता कार्यरूप में परिणत होती है। पेशी पर निरन्तर समान भार रहने के कारण इस संकोच को समभारिक कहते हैं।

इसके विपरीत, यदि पेशी एक मजबूत सिंग के विरुद्ध कार्य करे, तो वह संकुचित नहीं हो पाती और उसकी लम्बाई ज्यों की त्यों रहती है। सारा दबाव पेशी के स्फुरमान्त्र भागों पर पड़ता है। आकार में परिवर्तन नहीं होने के

कारण इसे समाकारिक संकोच कहते हैं । इसमें लगभग सारी शक्ति ताप में परिणत हो जाती है ।

इनका अंकित विवरण पेशीसंकोचमापक्यंत्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है । समाकारिक और समभारिक संकोच प्रायः समान ही होते हैं, किन्तु समभारिक की अपेक्षा समाकारिक में निम्नांकित विशेषताएं होती हैं:—

- (१) यह उच्चतम सीमा पर शीघ्र पहुँच जाता है ।
- (२) दबाव में वृद्धि अकस्मात् प्रारंभ होती है ।
- (३) संकोचकाल की अवधि लम्बी होती है ।
- (४) इसका अंकित विवरण भी स्पष्ट मिलता है ।

पेशी-संकोच के समय प्रादुर्भूत शक्ति

जब पेशी सकुचित होती है तब शक्ति का प्रादुर्भाव निम्नांकित रूपों में होता है:—

- (१) घाप की उत्पत्ति (२) वैद्युत शक्ति का विकास
- (३) बाह्यक्रिया की परिसमाप्ति

इन तीनों प्रकार की शक्ति का मूल कारण संकोच के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन हैं । उन परिवर्तनों के क्रम में जटिल अणुओं का विश्लेषण होता है और उनसे साधारण अणु बनते हैं । इस प्रकार जटिल अणुओं के परमाणुओं को परस्पर धारण करने वाली रासायनिक या आभ्यन्तरिक शक्ति मुक्त होकर उपर्युक्त तीनों रूपों में प्रादुर्भूत होती है ।

आभ्यन्तर और बाह्य शक्तियों का अनुपात

कुल शक्ति का २५ से ३३ प्रतिशत तक कार्यरूप में परिणत होता है । व्यायाम करने वाले व्यक्तियों में यह अधिक तथा अकर्मण्य व्यक्तियों में कम होता है । उन्मुक्त शक्ति का जितना भाग कार्यरूप में उपयुक्त होता है, उसे 'कार्यसामर्थ्य' (Mechanical efficiency) कहते हैं । अन्य भौतिक-यन्त्रों से तुलना करने पर शरीरगत पेशियों का कार्य सामर्थ्य अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है । घाघ्र से चलने वाले इंजिन ८ से १० प्रतिशत तथा पेट्रोल से चलनेवाले इंजिन २० प्रतिशत ही शक्ति का उपयोग कार्य में कर पाते हैं, जब

कि मानवशरीर में पेशीसंकोच के समय प्रादुर्भूत शक्ति का लगभग ४० प्रतिशत कार्यरूप में परिणत होता है। इसके अतिरिक्त भी ताप के रूप में जो शक्ति अवशिष्ट रहती है वह व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि शरीर का स्वाभाविक तापक्रम बनाये रखने में सहायक होती है।

दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर पेशी तथा भौतिकयन्त्रों में यह है कि भौतिकयन्त्रों में इन्धन का ओपजनीकरण तथा शक्ति का प्रादुर्भाव साथ होता है, किन्तु पेशी में शक्ति के प्रादुर्भाव (संकोच) के बाद ओपजनीकरण होता है।

पेशीश्रम (Fatigue)

परिभाषा:—

पेशी के अत्यधिक परिश्रम के कारण उसके गुणकर्म में हास हो जाता है। इसे श्रम की अवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में, श्रम एक ऐसी अवस्था है जिसमें कार्याधिक्य के कारण पेशी की क्रियाओं का अवरोध हो जाता है तथा उसके उत्तेजनीयता, संकोचशीलता और वाहकता इन गुणों में कमी हो जाती है।

श्रमयुक्त पेशी का स्वरूप

१. उत्तेजनीयता में कमी। २. संकोचशीलता में कमी।
३. स्थितिस्थापकता में कमी। ४. संकोच की संख्या में कमी।
५. संकोच की शक्ति में कमी। ६. शक्ति के प्रादुर्भाव में कमी।
७. प्रसार के क्रम में अत्यधिक कमी।

८. जाक्य (Contracture)—यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें पेशी संकुचित अवस्था में ही रहती है तथा उसी के अनुसार उसका आकार भी छोटा हो जाता है।

श्रम के कारण

(१) मूलरूप पदार्थों का—

(क) केन्द्रीय नाडीसंस्थान (ख) पेशियों (ग) रक्त

(घ) उदजन-अणु-केन्द्रीयभवन में घृदि के कारण पेशियों पर बिप्राक्त प्रभाव।

(२) शक्युत्पादक यौगिकों की कमी (इन्धन की कमी) तथा फास्फेजन के पुनः संश्लेषण का अभाव ।

श्रम के कारणों का प्रमाण

(१) केन्द्रीय नाडीसंस्थान पर विषाक्त प्रभाव—

जब पेशी अत्यधिक कार्य करती है तब केवल शर्कराजन आदि शक्युत्पादक यौगिकों की ही कमी नहीं होती, बल्कि उन क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हानिकारक रासायनिक मलपदार्थों का भी संचय होता है जिनका समुचित रूप से उत्सर्ग नहीं हो पाता। ये मलपदार्थ दुग्धाम्ल, कार्बनडिऑक्साइड तथा अम्ल पोटेशियम फास्फेट (KH_2PO_4) हैं। इनका प्रभाव यों तो संपूर्ण शरीर पर होता है किन्तु मुख्यतः इनका विषाक्त प्रभाव केन्द्रीय नाडीसंस्थान पर पड़ता है। इन मलपदार्थों के संचय का सबसे पहला प्रभाव होता है मानसिक श्रम (बलम) की उत्पत्ति, जिससे कार्य के प्रति अनिच्छा उत्पन्न होती है, यद्यपि कार्य के प्रति असामर्थ्य उतना नहीं होता है। निम्नांकित प्रमाण इसके पक्ष में हैं:—

(१) श्रम की अवस्था में चाय, कॉफी आदि लेने से केन्द्रीय नाडीसंस्थान की उत्तेजना के कारण कार्य में त्वणिक वृद्धि हो जाती है ।

(२) अत्यधिक मानसिक परिश्रम से भी पेशीश्रम उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण यह है कि नाडाकोपाणुओं में अधिक उत्तेजना पहुँचने से उसकी क्रिया में भी अवरोध हो जाता है। उच्च केन्द्रों के इस प्रकार क्रियानिरोध से पेशियों का अत्यधिक रुच नहीं होने पाता और दूसरे शब्दों में, वह रुचक प्रत्यावर्तित चेष्टा के समान कार्य करता है ।

(२) पेशियों पर विषाक्त प्रभाव—

(क) ध्रान्त पेशियों के सख का स्वाभाविक पेशियों में अन्तःश्लेष करने से श्रम उत्पन्न होता है, किन्तु स्वाभाविक पेशीके सख का अन्तःश्लेष करने से ऐसा कोई परिणाम नहीं होता ।

(ख) स्वस्थ पेशी में पेशीदुग्धाम्ल का प्रवेश करने से श्रम उत्पन्न होता है और शारीर विलयन से घा देने पर यह दूर हो जाता है ।

पेशी के सकोचकाल में यदि उत्पन्न दुग्धाम्ल को बाहर निकालते रहने का प्रबन्ध किया जाय तो जब तक पेशीगत शर्कराजन का पूरा कोष समाप्त नहीं हो जाता तब तक श्रम की अवस्था उत्पन्न नहीं होती। स्वभावतः शरीर में विषपदार्थों के निराकरण का कार्य रक्त प्रवाह के द्वारा संपादित होता है। अन्यथा आदि का प्रभाव भी इसी के द्वारा होता है। ओपजनीकरण के द्वारा भी यह पदार्थ नष्ट होते हैं। पेशी में जब दुग्धाम्ल का परिमाण ०.२५ से ०.४ प्रतिशत तक होता है, तब वह श्रमयुक्त हो जाती है और उत्तेजकों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसे 'दुग्धाम्ल की उच्चतम सीमा' (Lactic acid Maximum) कहते हैं। इस अम्ल की अल्प मात्रा से पेशी में सोपानक्रम के समान उत्तेजना होती है, किन्तु शनैः-शनैः मात्रा बढ़ाते जाने से श्रम उत्पन्न हो जाता है। श्रम के रासायनिक सिद्धान्त के अनुसार ये विषपदार्थ ही श्रम के लिये उत्तरदायी हैं, किन्तु साथ साथ पेशी को पूर्ण अशक्त होने से बचाते भी हैं। यदि प्राणी आयडो एसिटिक अम्ल नामक विष से पीड़ित हो तो दुग्धाम्ल उत्पन्न नहीं होता और तब पेशी का सकोच फास्फोजन के विक्षेपण से होता रहता है। ऐसी स्थिति में, जब पेशी में फास्फोजन का परिमाण कम हो जाता है तब श्रम की अवस्था उत्पन्न होती है।

(३) रक्त पर विपाक्त प्रभाव—

(क) सकोच के समय पेशी में उत्पन्न दुग्धाम्ल रक्तप्रवाह में प्रविष्ट हो जाता है और यह भी देखा गया है कि पेशी से बाहर जाने वाले सिरागत रक्त में दुग्धाम्ल अधिक रहता है।

(ख) श्रान्त प्राणी का रक्त, जिसमें दुग्धाम्ल अधिक परिमाण में होता है, स्वस्थ प्राणी में प्रविष्ट करने से श्रम उत्पन्न करता है।

(ग) पेशियों के एक समूह का सकोच केवल उसी समूह की पेशियों में श्रम उत्पन्न नहीं करता, बल्कि शरीर की अन्य सभी पेशियों में श्रम उत्पन्न करता है।

(४) उदजन-अणु केन्द्रीभवन में वृद्धि का विपाक्त प्रभाव—

जब उदजन-अणु-केन्द्रीभवन में वृद्धि होती है तब पेशी में श्रम उत्पन्न होता है। इसका प्रमाण यह है कि यदि पेशी को किञ्चित् अम्ल विलयन में

स्वल्पा जाय तो दुग्धाम्ल की उच्चतम सीमा के कम होने से पेशी श्रान्त हो जाती है, यद्यपि उसमें दुग्धाम्ल का परिमाण केवल ०.१ प्रतिशत होता है ।

शक्त्युत्पादक द्रव्यों की कमी

(क) श्रान्तपेशी के श्रम के निराकरण में मलपदार्थों के निर्हरण के लिए आवश्यक समय से बहुत अधिक समय लगता है । इससे सिद्ध होता है कि मलपदार्थों के अतिरिक्त भी श्रम के कारण हैं, यथा:—

(१) ओपजन की कमी ।

(२) शर्कराजन, क्रियेटिन आदि में कमी ।

(३) फास्फेजन के पुनः संग्लेपन का अभाव ।

(ख) यदि पेशी में दीर्घ संकोच की अवस्था उत्पन्न हो जाय तब भी शर्करा और ओपजन देते रहने से देर में श्रम उत्पन्न होता है ।

(ग) श्रान्त पेशी के श्रम का निराकरण शीघ्र होता है यदि उसे ओपजन और शर्करा दी जाय ।

शक्त्युत्पादक द्रव्यों की अत्यधिक कमी से पेशी अशक्त हो जाती है ।

श्रम का स्थान

नाडीपेशीसमुदाय के जिस भाग में प्रभाव होने से श्रम की अवस्था उत्पन्न होती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । निम्नांकित प्रयोग से यह देखा गया है कि श्रम का सर्वप्रथम स्थान केन्द्रीय नाडीसंस्थान है :—

(१) यदि कोई व्यक्ति कोई बोझ निरन्तर उठाता रहे तो घोड़ीदेरके बाद प्रचल ऐच्छिक प्रयत्नों के होते हुए भी यह उसे उठाने में असमर्थ हो जाता है । किन्तु यदि नाड़ी को उत्तेजित किया जाय तो ऐसी स्थिति में भी पेशी में संकोच होता है और बोझ उठा लिया जाता है । इससे सिद्ध है कि केन्द्रीय नाडीसंस्थान द्वारा नाड़ी को उत्तेजना न मिलने से ही श्रम उत्पन्न होता है, यद्यपि नाड़ी, नाड़ी के अप्रभाग तथा पेशी प्राकृत स्थिति में रहती है । इसीलिये नाड़ी को सीधे उत्तेजित करने से श्रान्त पेशी में भी संकोच होता है ।

यदि नाड़ी को अधिक देर तक उत्तेजित किया जाय तो एक समय के

बाद पेशी में पुनः संकोच बन्द हो जाता है। इसका कारण नाड़ियों के अन्तःस्थलों (Endplates) का भ्रम है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि केन्द्रीय नाड़ीसंस्थान के बाद नाड़ियों के अन्तःस्थलों का भ्रम होता है।

(२) नाड़ियोंके अन्तःस्थलः—

यदि श्रान्त पेशी, जिसका संकोच नाड़ियों की निरन्तर उत्तेजना के बाद पुनः बन्द हो गया है, सीधे उत्तेजित की जाय, तो उसमें फिर संकोच होता है। इससे स्पष्ट है कि पेशी की उत्तेजनीयता घनी रहती है और भ्रम का स्थान नाड़ियों या उनके अन्तःस्थलों में हो सकता है। निम्नांकित प्रयोग से यह सिद्ध है कि भ्रम का स्थान नाड़ियों के अन्तःस्थल हैंः—

मेडक में कुरार नामक औषध के दो प्रतिशत विलयन की कुछ घंटों को प्रविष्ट करके एक नाड़ी पेशीयग्र बना लें। इसमें नाड़ी को उत्तेजित करने से पेशी में संकोच नहीं होता क्योंकि कुरार की क्रिया से नाड़ियों के अन्तःस्थल शून्य और क्रियाहीन हो जाते हैं। इस पर भी यदि नाड़ी को लगातार लगभग २ घण्टों तक उत्तेजित किया जाय तो सब तरह कुरार का प्रभाव समाप्त हो जाने के कारण पेशी में पुनः संकोच होने लगता है। इससे सिद्ध है कि नाड़ी को लगातार दो घण्टों तक उत्तेजित करते रहने पर भी उसमें भ्रम उत्पन्न नहीं होता और जैसे ही कुरार का प्रभाव अन्तःस्थलों से हटता है वैसे ही इसके द्वारा पेशी में उत्तेजना पहुंचने लगती है। अतः भ्रम का स्थान नाड़ियों के अन्तःस्थल हैं।

(३) पेशीः—

केन्द्रीय नाड़ी संस्थान तथा अन्तःस्थलों के बाद भ्रम का तीसरा स्थान पेशी है। इधर बतलाया गया है कि कुरार के अन्तःक्षेप के बाद नाड़ी की उत्तेजना के बाद भी पेशी में संकोच नहीं होता। ऐसी स्थिति में, यदि पेशी को सीधे उत्तेजित किया जाय तो उसमें संकोच होता है किन्तु कुछ समय तक निरन्तर उत्तेजित करते रहने से संकोच बन्द हो जाता है। इसका कारण पेशी का भ्रम है।

(४) नाड़ी—नाड़ी सबसे अन्तिम भाग है जिसमें भ्रम की अवस्था उत्पन्न होती है। वैलर नामक विद्वान् के मत में नाड़ियों में भ्रम उत्पन्न नहीं

होता क्योंकि उसमें विनाश की क्रिया बहुत कम तथा संधानात्मक क्रिया अधिक होती है, कारण कि मेदस कोष से उन्हे पोषक पदार्थ अधिक परिमाण में मिलता रहता है । हैलिबर्टन और ब्रौडी ने यह सिद्ध किया है कि अमेदस नाड़ी में मेदस नाड़ी के समान थम नहीं उत्पन्न होता । उनमें जो भी उत्तेजना-जन्य थम (Stimulation fatigue) होता है, वह स्थानिक होता है तथा उसका कारण निरन्तर उत्तेजना के कारण नाड़ी तन्तु का क्षत होना है ।

मृत्युत्तर संकोच (Rigor mortis)

परिभाषा:—मृत्यु के बाद पेशी में उत्तरोत्तर तीन अवस्थाएँ होती हैं:—

- (१) संकोचशीलता के साथ प्रसार ।
- (२) संकोचहीनता और कठिन्य ।
- (३) विघटन के साथ प्रसार ।

दूसरी अवस्था का नाम मृत्युत्तर संकोच है । दूसरे शब्दों में, मृत्युत्तर संकोच पेशीद्रव्य में रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है जिससे उसके गुणधर्म सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं ।

मृत्युत्तर संकोच में पेशी का स्वरूप

मृत्युत्तर संकोच में पेशी में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं:—

१. पारभासकता एवं चमक का अभाव । २. क्रमिक संकोच ।
३. ताप की उत्पत्ति । ४. आग्लिकता का विकास ।
५. कार्यन द्विओषिद्र तथा अन्य मूलपदार्थों की उत्पत्ति ।
६. पेशियों का स्पर्श कठिन और दृढ़ । ७. प्रसार्यता में कमी ।
८. स्थिति-स्थापकता में कमी । ९. उच्चेजनीयता का नाश ।
१०. स्वस्थ पेशी के प्रति धनविद्युत् युक्त । ११. पेशीगत मांससार का जमना ।

कारण

इसका कारण पेशी के सघटन में रासायनिक परिवर्तन है जिसके द्वारा पेशी के विलेय मांससार 'मायोसिन' किण्व तंत्र के द्वारा अविलेय रूप में होकर जम जाते हैं ।

उत्पत्ति और विनाश का क्रम

मृत्युत्तर संकोच सभी पेशियों में एक साथ नहीं होता। इसकी उत्पत्ति निम्नांकित क्रम से होती है :—

१. ग्रीवा और हनु।

२. ऊर्ध्वशिरसायें।

३. मध्यकाय।

४. अधःशिरसायें।

विशिष्ट अंगों में यह सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और उसी क्रम से नष्ट भी होता है।

उत्पत्ति का काल और अवधि

यह मृत्यु के बाद १० मिनट से ७ घंटे तक होता है। यह जितना हो शीघ्र होता है उतना ही शीघ्र समाप्त भी होता है।

मृत्युत्तर संकोच के प्रारंभ को प्रभावित करने वाले कारण

(१) पेशी का स्वरूप :—शीतरक्त प्राणियों की अपेक्षा उष्णरक्त प्राणियों में शीघ्र होता है। छाल पेशियों की अपेक्षा पीत पेशियों में तथा प्रसारक पेशियों की अपेक्षा संकोचक पेशियों में पहले होता है।

(२) पेशी की दशा :—यह बलवान् और शक्तिशाली पेशियों में बिलम्ब से तथा क्षययुक्त या थान्त पेशियों में शीघ्रतर प्रारंभ होता है। यह देखा गया है कि युद्ध के आरंभिक भाग में मरनेवाले सैनिकों में मृत्युत्तर संकोच देर से शुरू होता है तथा थक कर युद्ध के अन्तिम भाग में मरने वाले सैनिकों में यह जल्दी शुरू होता है।

(३) तापक्रम :—यह शुष्क और शीत वायु में देर से तथा उष्ण और आर्द्रवायु में शीघ्र प्रारंभ होता है।

(४) पेशी की विषयुक्त अवस्था :—विरोद्ध, कैफीन, हाईड्रोसायनिक अम्ल तथा क्लोरोफार्म जैसे विषों से शुष्क होने पर पेशी में मृत्युत्तर संकोच शीघ्र प्रारंभ होता है। शंखिया के कारण यह देर से होता है और देर तक रहता है।

(५) नाड़ीसंस्थान के साथ संबन्ध :—चेष्टाबहु नाड़ी के विरिद्धन या रण होने पर मृत्युत्तर संकोच बिलम्ब से तथा मन्दगति से होता है।

प्राकृत संकोचयुक्त तथा मृत्युत्तर संकोचयुक्त पेशी में समानता

प्राकृत संकोचयुक्त तथा मृत्युत्तर संकोचयुक्त पेशी में निम्नांकित समानता

ध्यान देने योग्य है :—

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| १. आकृतिगत परिवर्तन । | २. स्थिति स्थापकता में कमी । |
| ३. ताप की उत्पत्ति । | ४. ओपजन का अधिक उपयोग । |
| ५. मूलपदार्थों की अधिक उत्पत्ति । | ६. दुग्धाम्ल का निर्माण । |
| ७. अम्ल प्रतिक्रिया । | ८. शर्कराजन का शर्करा में परिणाम । |

प्राकृत संकोचयुक्त तथा मृत्युत्तर संकोचयुक्त पेशी में अन्तर

प्राकृतिकसंकोचयुक्त पेशी

मृत्युत्तर संकोचयुक्त पेशी

- | | |
|---|----------------------------------|
| १. मांससार विलेय | १. मांससार जमा हुआ |
| २. पारभासक | २. अपारदर्शक |
| ३. कोमल और संकोचशील | ३. कठिन और दृढ़ |
| ४. संकोच अरुस्मात् और तीव्र | ४. संकोच मन्द और क्रमिक— |
| ५. संकोच का क्षेत्र कम | ५. संकोच का क्षेत्र अधिक— |
| ६. अधिक प्रसार्य | ६. कम प्रसार्य |
| ७. श्रम शीघ्र होता है तथा अन्त में प्रसार होता है । | ७. अधिक काल तक संकुचित रहता है । |

शविक काठिन्य (Cadaveric rigidity)

मृत्यु के समय मृत्यु के ठीक पहले पेशियों में जो काठिन्य होता है उसे शविक काठिन्य कहते हैं । यह मृत्यु के कुछ देर बाद तक रहता है और फिर मृत्युत्तर संकोच में परिणत हो जाता है । इसमें अचानक शरीर की पेशियों में स्तम्भ हो जाता है और मृत्यु के समय मनुष्य की जो स्थिति होती है वही याद तक बनी रहती है । यह साधारणतः निम्नांकित कारणों से होता है :—

(१) मृत्यु के पूर्व अत्यधिक व्यायाम ।

(२) केन्द्रीय नाड़ीसंस्थान की प्रबल विकृति के कारण मृत्यु यथा मस्तिष्कगत रक्तस्राव ।

(३) अचानक मृत्यु । (४) खासावरोधजन्य मृत्यु यथा जलनिमग्न आदि

पेशी का रासायनिक संघटन

जल ७६%, दोसभाग २२%,
मांसतत्त्व १७-२०% ।

अलब्यूमिन—(क) मायोजन या मायोसिनोजन । (ख) मायो-अलब्यूमिन ।

ग्लोब्यूलिन—(क) मायोसिन या पैरामायोसिनोजन ।

(ख) ग्लोब्यूलीन प्रबस (X)

स्ट्रोमा मांसतत्त्व

केन्द्रक मांसतत्त्व (Nucleoprotein)

रक्तमांसतत्त्व-मांसरक्तक (Myochrome)

(Chromoprotein) कोपरक्तक (Cytochrome)

कोलेजन (Collagen)

तेह—स्फुरकतेह (Phospholipides) के रूप में २-५%
Olein, Stearin, Palmitin.

शाक्ततत्त्व—द्राक्षाशर्करा, शर्कराजन (३%)

सत्त्वपदार्थ (Extractives) :—(नत्रजनरहित) ०.५% ।

Inositol (०.००३%)

दुग्धाम्ल

(नत्रजनयुक्त)—क्रिएटिन क्रिएटिनिन

क्रिएटिनफास्फरिक अम्ल (फास्फेजन)

हेबसोजफास्फेट

एडिनिन पाईरो फास्फरिक अम्ल (Adenyl pyrophosphoric acid)

कार्बोसिन (०.२५%)

पेन्सरीन

प्यूरिन—जैन्थीन, हाइपो जैन्थीन, ऐडिनीन, ग्वेनीन ।

ग्लुटेयायोन, हिस्टैमीन

निरिन्द्रिय लवण— १.२%

पोटाशियम, सोडियम, सल्फिक, मैगनेशियम, लौह के क्लोराइड, सल्फेट तथा फास्फेट ।

क्रियतत्त्व—मांसतत्त्वविश्लेषक (Proteolytic)

शाक्ततत्त्वविश्लेषक (Amylolytic)

शर्कराजनविश्लेषक (Glycolytic)

स्कन्दक (Coagulative) ओपजनीकरण (Oxidative) ।

पेशी-व्यायाम का शरीर पर प्रभाव

पेशी-व्यायाम का लगभग शरीर के सभी अंगों एवं उनकी क्रियाओं पर पड़ता है ।

(१) पेशियों में परिवर्तन :—

(क) भीतरी अवकाशों में द्रव के आधिक्य के कारण पेशीभार में २० प्रतिशत तक वृद्धि ।

(ख) पेशियाँ छोटी और कठिन हो जाती हैं ।

(ग) शर्कराजन तथा क्रिएटिन फास्फेट की मात्रा में कमी ।

(घ) क्रिएटिन, गिरिन्द्रिय फास्फेट तथा लैक्टेट में वृद्धि ।

(ङ) दुग्धाम्ल तथा कार्बनड्विओपिड् की वृद्धि, फलतः उत्तरजक द्रव्य से ओपजन के पृथक्करण में सुविधा ।

(च) दुग्धाम्ल के कारण श्रम की अवस्था तथा उसके कारण ओपजन-कृण की उत्पत्ति ।

(छ) तापसंबन्धी तथा विद्युत्संबन्धी परिवर्तन ।

(२) श्वसनसंबन्धी परिवर्तन :—

(क) श्वास की सख्या और गभीरता में वृद्धि, फलतः

(ख) फुफुसीय व्यजन में अत्यधिक वृद्धि लगभग १०० लिटर तक यह निम्नांकित कारणों से श्वसनकेन्द्र के प्रभावित होने से होते हैं :—

(१) रक्त में दुग्धाम्ल तथा कार्बनड्विओपिड् की अधिक वृद्धि के कारण उद्जन-अणु केन्द्रीभवन में वृद्धि ।

(२) फुफुसों में अतिशीघ्रता से प्रवाहित होने वाले रक्त के अपूर्ण ओपजनीकरण के कारण ओपजन की कमी ।

(ग) अत्यन्त गम्भीर अवस्थाओं में दुग्धाम्लनिर्माण के कारण कोषगत वायु में कार्बन ड्विओपिड् का परिमाण बहुत कम हो जाना ।

(३) रक्तवहसंस्थानसंबन्धी परिवर्तन :—

(क) हृत्प्रतीघात की सख्या में वृद्धि ।

इसके निम्नांकित कारण हैं :—

(१) सांवेदनिक नाड़ीसूत्रों की उत्तेजना ।

(२) हृदय के मन्दक केन्द्र का अग्रसाद ।

(३) प्रत्यास की गहराई तथा केशिकाओं और सिराओं में रक्त का दबाव बढ़ जाने से अधिक रक्त हृदय की ओर लौटना, फलतः अलिन्दों में रक्त अधिक भरना ।

(ख) रक्तभार की वृद्धि ।

इसके निम्नांकित कारण हैं :—

(१) अधिक मात्रा में अद्रिनिलीन की उत्पत्ति ।

(२) हृत्प्रतीघात की सख्या और शक्ति में वृद्धि ।

(३) कार्बनडिऑक्साइड का दबाव घटने तथा ओपजन का दबाव घटने से रक्तसंचालक केन्द्र पर प्रभाव, फलतः रक्तवहस्रोतों का संकोच विशेषतः उदर के स्रोतों का ।

(ग) हृदय के निर्यात में वृद्धि ।

इसके निम्नांकित कारण हैं :—

(१) निलयसंकोच की शक्ति में वृद्धि ।

(२) अलिन्द में रक्त का अधिक भरना (अलिन्दीय उत्तेजना)

(घ) हृत्पोषक रक्तवहन में वृद्धि ।

महाधमनी के भीतर रक्त का दबाव बढ़ जाने से हृत्पोषक धमनियों में रक्त अधिक आना ।

(४) रक्त में परिवर्तन :—

(क) सामान्य परिश्रम से रक्तगत शर्करा में कोई परिवर्तन नहीं होता किन्तु अत्यधिक परिश्रम से यह अत्यधिक बढ़ जाती है और लगभग १० से २६ प्रतिशत तक हो जाती है । इसका कारण यह है कि अद्रिनिलीन का साव

बढ़ जाने के कारण यकृत से रक्तशर्करा का निर्गम अधिक मात्रा में होता है । यदि इस प्रकार का परिश्रम अधिक देर तक किया जाय तो यकृत स्थित शक्त-रक्त का कोष समाप्त हो जाने से रक्तगतशर्करा बहुत कम हो जाती है ।

(ख) उदजन-अणुकेन्द्रीभवन में वृद्धि हो जाती है ।

(ग) दुग्धान्द्र की मात्रा बढ़ जाती है किन्तु कार्बनडिऑक्साइड की कुल मात्रा कम हो जाती है ।

(घ) परिश्रम के अनुसार रक्तकणों का अपेक्षाकृत आधिरस्य । इसका कारण रक्तकणों का संवहन में अधिक प्रवेश तथा रक्त के द्रव भाग का धातुओं की ओर जाना ।

(५) पाचनसंस्थान में परिवर्तनः—

(क) पाचन-नलिका के स्त्रावों तथा परिसरणगति में अवरोध ।

(६) मूत्रसंबन्धी परिवर्तनः—

(क) मूत्र की राशि तथा वलोराइड में कमी ।

मूत्र की राशि में कमी का कारण यह है कि परिश्रम के समय घृक्क के रक्तवहस्रोतों का संकोच होने से घृक्क की क्रियाओं का अवरोध हो जाता है । दूसरे विद्वानों के मत में इसका कारण पोषक ग्रन्थि के पश्चिम पिण्ड का एक अन्तःस्त्राव है । वलोराइड में कमी का कारण यह है कि कुछ वलोराइड पसीने के साथ बाहर निकल जाता है तथा कुछ जल के साथ रक्त से पेशियों में चला जाता है ।

(ख) अम्लों, उदजन अणुओं, अमोनिया तथा फास्फेट की वृद्धि ।

(७) तापसंबन्धी परिवर्तनः—

पेशियों में सत्वशर्करा, स्नेह, इन श्वस्युत्पादक द्रव्यों के अधिक ओपजनीकरण के कारण शरीर का तापक्रम कुछ बढ़ जाता है । व्यायाम के समय उपयुक्त शक्ति का ८० प्रतिशत ताप के रूप में रहता है । इस अतिरिक्त ताप के निराकरण के लिए निम्नांकित परिवर्तन होते हैंः—

(क) खचा के रक्तवहस्रोतों का प्रान्तीय प्रसार ।

(ख) कुकुलीय व्यजन में वृद्धि ।

(ग) स्वेदागम में वृद्धि-इसमें तार चाप्पीभवत द्वारा गष्ट होता है ।

(८) सांवेदनिक नाडीसंस्थान पर प्रभावः—

(क) सांवेदनिक नाडियों की उत्तेजना से अधिक स्वेदागम ।

(९) अद्रिनिलीन पर प्रभावः—

(क) अद्रिनिलीन के साथ में वृद्धि, फलतः सांवेदनिक नाडीसंस्थान तथा पेशियों की शक्ति में वृद्धि ।

स्वतन्त्र पेशियाँ

स्वतन्त्र पेशियों की क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें मनुष्यशरीर के परावर तापक्रमवाले लवणविलयन (Ringer's Solution) में डुबोने के बाद उनकी परीक्षा की जाती है । कभी कभी पूर्वोक्त नाडीपेशीयन्त्र के द्वारा भी उनकी परीक्षा होती है । ऐसी स्थिति में, यदुधा आमाशय और अन्त्र के टुकड़ों को प्राणदा तथा अन्त्रीय नाडियों के साथ टूटफूट कर लेते हैं ।

स्वतन्त्र पेशियों के गुण धर्म का अध्ययन ह्यान्स, फ्राइडहर्स्ट तथा विन्डन नामक विद्वानों ने विशेषरूप से किया है । उन्होंने स्वतन्त्र तथा परतन्त्र पेशियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद स्वतन्त्र पेशियों के गुणधर्म निश्चित किये हैं । अतः पहले स्वतन्त्र तथा परतन्त्र पेशियों के विभेदक लक्षण चतुष्टय ज्ञायेंगे ।

स्वतन्त्र तथा परतन्त्रपेशियों में भेद

स्वतन्त्र तथा परतन्त्र पेशियों में अन्तर उनके नामों से ही स्पष्ट है । परतन्त्र पेशियाँ केन्द्रीय नाडीसंस्थान के उस भाग के नियन्त्रण में रहती हैं जिसकी क्रिया व्यक्ति की इच्छा के अधीन रहती है । इसके विपरीत, स्वतन्त्र पेशियाँ स्वतन्त्रतया कार्य करती हैं और केन्द्रीय नाडीसंस्थान के उस भाग के नियन्त्रण में रहती हैं जिसकी क्रिया इच्छा के अधीन नहीं है । इन दोनों में दूसरा भेद यह है कि स्वतन्त्र पेशियों में क्रिया और विश्राम की अवधि नियमित होती है । यद्यपि यह गुण सभी स्वतन्त्र पेशियों में वर्तमान है तथापि हृदय में स्पष्टरूप में देखा जा सकता है ।

स्वतन्त्र पेशियों के विशिष्ट लक्षण

उपर्युक्तभेदों के अतिरिक्त—

स्वतन्त्र पेशियों के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षण और होते हैं:—

(१) विद्युत के द्वारा इनमें उत्तेजना कम होती है तथा रासायनिक उत्तेजकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ।

(२) दीर्घसंकोच की अवस्था इनमें बहुत स्पष्टरूप से होती है । ऐसे स्थायी संकोच को 'चिरकालीन दीर्घसंकोच' (Tonus) कहते हैं । गृहदन्त्र में शोभ होने पर यह अवस्था उत्पन्न होती है और इसके कारण अत्यधिक वेदना होती है । कुछ व्यक्तियों में, जिनके उदर की पेशियाँ बहुत पतली होती हैं, संकुचित तथा कठिन गृहदन्त्र का बाहर से भी अनुभव किया जा सकता है । प्रसव के बाद गर्भाशय का इस प्रकार का संकोच रक्तस्राव बन्द करने में सहायक होता है । धमनियों में भी ऐसा संकोच देखने में आता है ।

३. निरन्तर अव्यवहित रूप से अनेक उत्तेजनार्थ पहुँचाने पर उनका संयोग बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ता है ।

४. परतन्त्र पेशियों के समान इनके सूत्र पृथक् पृथक् नहीं होते, बल्कि वे सब मिलकर एक समूह में स्थित रहते हैं । अतः उत्तेजना क्षीप्र ही संपूर्ण पेशी में फैल जाती है और इसी लिए विभिन्न शक्तिवाले उत्तेजकों का प्रयोग करने से उसमें परतन्त्र पेशियों के समान क्रमिक संकोच भी नहीं दिखलाई पड़ता ।

५. दबाव या कर्षण का प्रभाव इस पर यान्त्रिक उत्तेजक के रूप में विशेष पड़ता है । लवणयुक्त विरेचनों के द्वारा अन्त्रों के प्रबल संकोच का कारण उनका कर्षण ही है क्योंकि लवण के द्वारा आकृषित होकर द्रवांश अन्त्र स्रोत में चला आता है और इस प्रकार उस पर कर्षण प्रभाव पड़ता है । शाकों और फलों, जिनके कोषावरण का पाचन नहीं हो पाता, का प्रभाव अन्त्रगति पर इसी प्रकार होता है । गर्भाशय में भी मर्दन के द्वारा संकोच इसी आधार पर उत्पन्न होता है ।

६. सामान्यतः ताप के द्वारा इनमें प्रसार तथा शीत के द्वारा संकोच उत्पन्न होता है । इस लिए अन्त्र आदि अंगों के कठिन संकोचजन्य पीड़ा की शान्ति स्वेदन द्वारा की जाती है ।

७. नाड़ीमंडल से पृथक् करने पर इसके संकोच अनियमित हो जाते हैं । शरीर में अंगों की स्वतन्त्र पेशियों का नियन्त्रण स्वतन्त्र नाड़ी मंडल की नाडियों

के अधीन रहता है और इसलिए उनकी क्रियायें शरीर की साधारण आवश्यकताओं के अनुसार होती हैं। सामान्यतः उनमें दो प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं—एक मन्दक (Inhibitory) और दूसरी तीव्रक (Augmentory)।

८. इन पेशियों में भी परतन्त्र पेशियों के समान ही रासायनिक तथा तारकम संयन्धी परिवर्तन होते हैं किन्तु यह आश्चर्य का विषय है कि चिरकालीन सुदीर्घ सरोच की अवस्था में भी शक्ति का न तो अधिक व्यय ही होता है और न श्रम की अवस्था ही प्रकट रूप से होती है।


९. मृत्युत्तर सरोच की क्रिया का अध्ययन इन पेशियों के संयन्ध में उतनी पूर्ण रीति से नहीं किया गया है तथापि दोनों का रासायनिक संघटन समान होने के कारण मृत्यु के बाद पेशियाँ अग्न हो जाती हैं। आमाशय, गर्भाशय तथा मलाशय में मृत्युत्तर काटिन्य देखा गया है और सम्भवतः यह सभी प्रकार की स्वतन्त्र पेशियों में होता है, किन्तु यह संभवतः तापक्रम की कमी से होता है।

शारीरिक चेष्टायें

पेशियों का कार्य शरीर में गति उत्पन्न करता है। अतः सभी शारीरिक चेष्टायें पेशियों के कारण ही होती हैं। शरीर में उत्पन्न चेष्टाओं के स्वरूप का विस्तृत अध्ययन मनोवैज्ञानिक आधार पर ही संभव है, अतः उसका विस्तृत वर्णन मनोविज्ञान-संबन्धी पुस्तकों में द्रष्टव्य है। तथापि विषय को अधिक हृदयंगम एवं बोधजन्य बनाने के लिए उससे यहाँ कुछ सहायता ली गई है।

शारीरिक चेष्टाओं का वर्गीकरण निम्नांकित रूप से किया गया है:—

चेष्टा



सर्वप्रथम चेष्टाओं के दो विभाग किये गये हैं—ऐच्छिक और अनैच्छिक । ऐच्छिक चेष्टायें व्यक्ति की इच्छा के अधीन होती हैं और परतन्त्र पेशियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं यथा घूमना, टहलना, सोलना इत्यादि । अनैच्छिक चेष्टायें व्यक्ति की इच्छा के बिना ही होती हैं, अतः स्वतन्त्र पेशियों द्वारा उनकी उत्पत्ति होती है यथा आन्तरिक अंगों की क्रियायें निरन्तर हमारी इच्छाओं के बिना ही हुआ करती हैं ।

अनैच्छिक चेष्टायें दो प्रकार की होती हैं । कुछ तो जन्मकाल से ही स्वभावतः देखी जाती हैं उन्हें प्राथमिक चेष्टा कहते हैं और कुछ जन्म के बाद विकसित होती हैं उन्हें आन्तरिक चेष्टा कहते हैं । प्राथमिक चेष्टा ४ प्रकार की होती है—

१. अनैमित्तिक (Random or spontaneous)
२. आकस्मिक (Automatic)
३. सहज (Instinctive)
४. प्रत्यावर्तित (Reflex)

(१) अनैमित्तिक—अंगों में संचित शक्ति के आकस्मिक प्रादुर्भाव के कारण यह चेष्टायें उत्पन्न होती हैं । इनके लिए किसी बाह्य उत्तेजक की स्थिति अपेक्षित नहीं रहती और न इन चेष्टाओं का कोई विशेष उद्देश्य ही होता है । इस वर्ग में नवजात शिशु की प्रारम्भिक चेष्टायें यथा हाथ पांव फेंकना, आँखें घुमाना आदि आती हैं ।

(२) आकस्मिक—नवजात शिशु में कुछ चेष्टायें जन्मकाल से ही होने लगती हैं और अन्त तक निरन्तर होती रहती हैं, उन्हें आकस्मिक चेष्टायें कहते हैं । यथा श्वसन, रक्तसंचरण और पाचन यह तीन चेष्टायें प्रारम्भ से ही होती हैं । कुछ लोग इसका क्रियात्मक प्रत्यावर्तित चेष्टा में अन्तर्भाव करते हैं ।

(३) सहज—अन्तिम लक्ष्य का ध्यान रखते बिना जीवन या जाति की रक्षा के लिए सहज अन्त प्रवृत्तियों के द्वारा जो चेष्टायें होती हैं उन्हें सहज चेष्टायें कहते हैं । यह अन्त प्रवृत्तियाँ पोषण, उत्सादन, रक्षा, आक्रमण और समाज के संबन्ध में होती हैं । यह चेष्टायें प्राणियों की सिखरानी नहीं पड़ती क्योंकि यह सहज और परम्परागत होती हैं ।

(४) प्रत्यावर्तित चेष्टा—जिस प्रकार रचना विज्ञान की दृष्टि से नाड़ी कोषाण नाड़ीसंस्थान की इकाई माना गया है, उसी प्रकार क्रियाविज्ञान की दृष्टि से उसकी इकाई प्रत्यावर्तित चेष्टा है। मनुष्य में परिस्थिति के अनुसार अपने को बनाये रखने की जो क्षमता है उसका यह सर्वसाधारणरूप है। संज्ञात्मक उत्तेजक के परिणामस्वरूप उत्पन्न अतिशीघ्र पेशीजन्य या ग्रन्थिजन्य प्रतिक्रिया को प्रत्यावर्तित चेष्टा कहते हैं। तीव्र प्रकाश में आँखें धन्द कर लेना तीक्ष्ण गन्ध से छींकें आना, शीत से कास की उत्पत्ति, यह पेशीजन्य प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। आँखों में धूल पड़ने से आँसू आना, इमली आदि अम्लपदार्थ खाने से अधिक लालसाव होना आदि ग्रन्थिजन्य प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। इसी प्रकार कम्प, हिका, यमन, जृम्भा, छप्पा, हास्य, कास, निगरण, रोदन, स्वेदागम, लालसाव आदि शरीर में ५० से अधिक प्रत्यावर्तित चेष्टायें हैं, जो जन्म से ही निश्चित हो जाती हैं। इसके सम्पादन के लिए निम्नांकित पाँच भाग आवश्यक होते हैं—

(१) ज्ञानेन्द्रिय या ग्राहक अंग (Sense organ)

(२) संज्ञावह नाड़ीकोषाण (Sensory neurone)

(३) नाड़ीकेन्द्र (Nerve centre)

(४) चेष्टावह नाड़ीकोषाण (Motor neurone)

(५) पेशी या कर्मेन्द्रिय (Muscle)

इन सभी भागों को मिलाकर प्रत्यावर्तित वक्र (Reflex arc) कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक पिन स्वचा में चुभोया जाय, तो वह स्वचा में स्थित नाड़ी के अग्रभागों को उत्तेजित करेगा और वह उत्तेजना नाड़ीशक्ति में परिणत होकर संज्ञावह नाड़ी के द्वारा सुप्तुग्ना तक पहुँचती है। यहाँ यह चेष्टावह नाड़ी-सूत्र के साथ संबन्धित होकर उस नाड़ी के द्वारा पेशी तक जाती है और पेशी के संकुचित होने से स्वचा पिन से दृक् स्थिती जाती है। प्रत्यावर्तित चेष्टा का यह एक साधारण चित्र है, किन्तु जीवनकाल में नाड़ीमूत्रों के अनेक लट्ठि संबन्ध होते हैं और उन्हीं के अनुसार चेष्टाओं की अभिव्यक्ति होती है। यथा उपर्युक्त उदाहरण में ही यदि नाड़ियों का संबन्ध स्वरयंत्र से होगा, तो साथ ही साथ चीखने की आवाज भी निकल सकती है।

प्रत्यावर्तित क्रिया के सामान्य लक्षण ।

१. वे शरीर को समावित आघातों से बचाती हैं ।

जब कोई वस्तु आँख के पास पहुँचती है, और पलकें बन्द न हों, तब वह आँख में प्रविष्ट होकर आघात पहुँचा सकती है । इसी प्रकार यदि बहुत तीव्र प्रकाश आँख पर पड़ता हो, तो उसमें विकृति हो सकती है, इसलिए दृष्टिरन्ध्र छोटा हो जाता है और आवश्यकता से अधिक प्रकाश आँख के भीतर नहीं जाने देता । हानिकारक वस्तुयें भी छींक के द्वारा नाक से इसी प्रकार बाहर निकाली जाती हैं ।

२. व्यक्ति की इच्छाओं का इन पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता ।

प्रत्यावर्तित चेष्टाओं पर व्यक्ति का कोई नियन्त्रण नहीं रहता । उनको रोकने की चेष्टा व्यर्थ हो जाती है ।

३. यह चेष्टायें बहुत शीघ्र संपन्न होती हैं ।

ये चेष्टायें इतनी शीघ्र होती हैं कि उनकी समाप्ति के बाद ही व्यक्ति का ध्यान उस ओर जाता है । विलम्ब होने से शरीर को हानि हो सकती है, अतः उत्तेजनायें सुषुम्नाकाण्ड तक जाकर वहीं से छूट जाती हैं ।

४. इन चेष्टाओं को सीखने की आवश्यकता नहीं होती ।

इन चेष्टाओं को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती और उससे उनमें कुछ मौलिक परिवर्तन ही सम्भव है । वस्तुतः नादीयस्थान के विकासकाल में ही कुछ ऐसे आवश्यक संबन्धों की स्थापना हो जाती है कि तेजक के द्वारा शीघ्र ही उत्तेजना का प्रारम्भ होता है ।

५. यह एक स्थानिक प्रतिक्रिया है ।

शरीर के अत्यन्त सीमित क्षेत्र में यह चेष्टायें होती हैं । सामान्यतम चेष्टाओं लिए केवल दो नाड़ी कोषाणुओं की आवश्यकता होती है ।

प्रत्यावर्तित चेष्टा के विभाग

इसके दो विभाग किये हैं:—

क्रियामक (Physiological) २. सज्ञामक (Sensation)

जो चेष्टाएँ बिल्कुल अनजाने होती हैं उन्हें क्रियात्मक कहते हैं यथा दृष्टि-रन्ध्र की चेष्टा । इनमें उत्तेजनायें नियमित रूप से आती रहती हैं । इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने पाचन, श्वसन, रक्तसंचरण आदि क्रियाओं को भी इसी के भीतर रखा है ।

जिन चेष्टाओं का ज्ञान हमें होता है उन्हें संज्ञात्मक परावर्तित चेष्टा कहते हैं यथा पलक गिरना, छींकना, खोसना इत्यादि ।

विकास की दृष्टि से इसके दो विभाग किये गये हैं:—

१. सामान्य (Simple)
२. आवस्थिक (Conditioned)

जो चेष्टा जन्म से मृत्यु पर्यन्त शरीर में उसी रूप में वर्तमान रहती है उसे सामान्य परावर्तित चेष्टा कहते हैं—यथा हिक्का, घमन आदि पूर्वाक्त लगभग ५० चेष्टाएँ । इसके अतिरिक्त अधिकांश चेष्टाएँ जटिल स्वरूप की होती हैं और उनमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । अवस्थाओं के अनुसार निरन्तर परिवर्तन होते रहने के कारण ही थोड़े समय में मनुष्य के स्वच्छिन्न में सहाय अन्तर हो जाता है । बचपन में मनुष्य का जो रूप रहता है वह युवावस्था और वृद्धावस्था में नहीं रह पाता । बाह्य परिस्थितियों से उसे अनुभव होता है और उसके कारण उसकी चेष्टाओं में अनुकूल परिवर्तन होते रहते हैं । मनुष्य की शिवादीर्घा, उसका विकास बहुत कुछ इन्हीं चेष्टाओं पर निर्भर रहता है । इन्हें आवस्थिक परावर्तित चेष्टा कहते हैं ।

उदाहरण के लिए, यदि एक कुत्ते को मांस का एक टुकड़ा दिखलाया जाय तो उसके मुँह में पानी आ जायगा, किन्तु घण्टी बजाने से उसके मुँह में पानी नहीं आयगा । अर्थात् मांस लालास्राव के लिए पर्याप्त उत्तेजक है और घण्टी नहीं है । किन्तु यदि लगातार कई दिनों तक कुत्ते को मांस दिया जाय और उसी समय घण्टी भी बजाई जाय तो उसके बाद मांस नहीं देने पर भी केवल घण्टी बजाने से ही लालास्राव उत्पन्न होगा । ऐसी स्थिति में घण्टी की आवाज पर लाला का स्राव आवश्यक प्रत्यावर्तित चेष्टा बड़ी जाती है, क्योंकि घण्टी में उस चेष्टा को उत्पन्न करने की शक्ति आवश्यक नहीं है, स्वाभाविक नहीं ।

किसी ज्ञानेन्द्रिय की उत्तेजना के फलस्वरूप अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं:—

(१) केवल सीधी और सामान्य प्रत्यावर्तित चेष्टा हो सकती है जिसमें केवल एक संश्लेष और एक चेष्टाग्रह नाडीकोषाणु का भाग रहता है ।

(२) उत्तेजना और ऊपर की ओर जाकर सुषुम्नाकाण्ड के केन्द्रीय नाडी-कोषाणु में पहुँचती है और ऊपर की पेशी को उत्तेजित करती है ।

(३) दोनों पेशियों के द्वारा संयुक्त प्रतिक्रिया हो सकती है ।

(४) इसके आगे बढ़ने पर मस्तिष्क के कोषाणु प्रभावित हो सकते हैं ।

प्रत्यावर्तित चेष्टा का विषय महत्वपूर्ण और गंभीर है । अतः इसका विस्तृत वर्णन नाडीसंस्थान के अन्तर्गत किया जायगा ।

आन्तरिक चेष्टायें:—

(५) भावनात्मक चेष्टायें—चेष्टा की भावना से ही जिन चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है, उन्हें भावनात्मक चेष्टायें कहते हैं । इन पक्षों को पढ़ते समय यदि हमारे शरीर पर मक्खी घँट जाती है तो हमारा हाथ उसे हटाने के लिए स्वयं घूम जाता है । अनुकरणात्मक चेष्टायें भी इसी के अन्तर्गत आती हैं । आप बच्चे को देखकर हँसिये, वह भी हँस देगा । किसी सभा में वक्ता के भाषण पर इसी प्रवृत्ति से लोग तालियाँ पीटते या हँसते हैं ।

(६) अभ्यासात्मक चेष्टायें—ये चेष्टायें अपने प्रारम्भिक रूप में ऐच्छिक होती हैं किन्तु सतत परिशीलन के द्वारा वह अपने आप होने लगती हैं और अनैच्छिक हो जाती हैं । यथा घूमना, लिखना, गाना, सैरना आदि ।

तृतीय अध्याय

रक्त

रक्त एक द्रव संयोजक तन्तु है जिसमें कोषाणु (रक्तकण) द्रवरूप तथा अत्यधिक परिणाम में विद्यमान अन्तःकोषाणवीय पदार्थ के द्वारा एक दूसरे से पृथक् रहते हैं । अन्य संयोजक तन्तुओं की भाँति रक्त का विकास मध्यस्तर से होता है । इसी द्रव माध्यम के द्वारा शरीर के सभी तन्तु साक्षात् या परोक्षरूप से पोषण प्राप्त करते हैं तथा इसी के द्वारा शरीर क्रियाओं में उत्पन्न मलपदार्थों का तन्तुओं से बाहर निर्हरण किया जाता है ।

रक्त के कार्य

(१) पोषण—यह पाचनमलिका से शोषित आहार तथा अन्य पदार्थों को तन्तुओं तक पहुँचाता है और इस प्रकार तन्तुओं को उनकी वृद्धि और सधान के लिए आवश्यक तत्त्व प्राप्त होते हैं ।

(२) ओपजनवहन :—यह फुफ्फुसों में वायु से शोषित ओपजन को तन्तुओं तक पहुँचाता है ।

इस प्रकार आहार द्रव्य और ओपजन का तन्तुओं में पहुँच कर जीवनीय ज्वलन होता है और उससे शक्ति उत्पन्न होती है ।

(३) मलपदार्थ का निर्हरण :—समीकरण के क्रम में उत्पन्न मलपदार्थ यथा कार्बन द्विओषिड, दुरधाम्ल तथा अन्य हानिकारक द्रव्य रक्त द्वारा मलोत्सर्ग के अंगों तक पहुँचाये जाते हैं और वहाँ से उनका त्याग शरीर के बाहर होता है ।

(४) अन्तःस्रावों का वहन :—यह विभिन्न अन्तःस्रावों को शरीर के तन्तुओं तक पहुँचाने का माध्यम है जिससे शरीर के भिन्न भिन्न अंगोंकी क्रियाओं में सहकारिता स्थापित होती है ।

(५) तापसंवितरण :—यह शरीर में उत्पन्न ताप का समान रूप से वितरण करता है और इस प्रकार शरीरके तापक्रम को एक निश्चित सीमा पर बनाये रखता है ।

(६) क्षारीयतास्थापन :—समीकरण के क्रम में उत्पन्न हानिकारक अम्ल पदार्थों को उदासीन करता है और इस प्रकार तन्तुओं की स्वामाविक क्षारीयता बनाये रखता है ।

(७) रक्षाकार्य :—घेतकणों के द्वारा या जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करता है ।

(८) रक्तस्रावनिरोध :—स्क्लेन के द्वारा यह अधिक रक्तस्राव को रोकता है ।

सूक्ष्मरचना—रक्त में मुख्यतः दो भाग होते हैं :—एक द्रव भाग होता है जिसे रक्तस (Plasma) कहते हैं और इस द्रव में अनेक सूक्ष्म कण तैरते रहते हैं जो तीन प्रकार के होते हैं :—

- (क) रक्तकण (Erythrocytes or red blood Corpuscles)
- (ख) श्वेतकण (Leucocytes or white blood Corpuscles)
- (ग) रक्तचक्रिका (Thrombocytes or blood platelets)

रक्त में रक्तस और कणों का आपेक्षिक परिणाम एक यन्त्र के द्वारा निश्चित किया जाता है जिसे रक्तविमापक (Haematocrit) कहते हैं । रक्त का लगभग ४५ प्रतिशत कणों से तथा ५५ प्रतिशत रक्तस से बनता है ।

वर्णः—रक्त का स्वाभाविक वर्ण लाल होता है । किन्तु इसकी लाली में अवस्थानुसार परिवर्तन होता रहता है । धमनियों का रक्त चमकीला लाल तथा सिराओं का रक्त नीलिमायुक्त लाल होता है । यह रक्तवर्ण रक्तस में स्थित रक्तकणों के कारण होता है ।

विशिष्ट गुरुत्व—रक्त का विशिष्ट गुरुत्व स्वभावतः १.०५५ से १.०६० तक होता है । आयु और लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है । भोजन के बाद यह घट जाता तथा व्यायाम के बाद बढ़ जाता है । दिन में यह धीरे-धीरे कम होता तथा रात में धीरे-धीरे अधिक होता है । प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार इसमें इतनी विभिन्नता होती है कि एक व्यक्ति के लिए जो प्राकृत विशिष्ट गुरुत्व है वह दूसरे व्यक्ति के लिए विकृति का सूचक हो सकता है ।

रक्तस की अपेक्षा कणों का विशिष्ट गुरुत्व अधिक होता है । उसमें भी श्वेतकणों की अपेक्षा रक्तकणों का विशिष्ट गुरुत्व अधिक (१.०९) होता है । इसलिए रक्तस्राव के बाद रक्त नहीं जमने से रक्तकण तल में जमने लगते हैं और श्वेतकण उसके ऊपर आवरण बनाते हैं । रक्त का विशिष्ट गुरुत्व निम्नांकित विधियों से नापा जाता है :—

(१) राय की विधि—ऐसे द्रवपदार्थों में, जिनका विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात है, रक्त की घूँद गिराई जाती हैं । जब रक्त की घूँद उसमें न नीचे बैठे और न ऊपर उठे तब उसी के समान उसका विशिष्ट गुरुत्व समझना चाहिये ।

(२) हैमर श्लैग की विधि (Hammerslag's method)—क्लोरोफार्म और वेन्जीन का मिश्रण लीजिये और एक घूँद रक्त उसमें मिलाकर खूब हिला दीजिये । यदि घूँद नीचे बैठ जाय तो थोड़ा और क्लोरोफार्म मिला देने से वह ऊपर आ जायगी । यदि वह ऊपर तैरती हो तो थोड़ा और वेन्जीन

मिला दीजिये, वह नीचे चली जायगी। इसके बाद मिश्रण का विशिष्ट गुरुत्व एक उपयुक्त विशिष्टगुलबमापक यन्त्र द्वारा निश्चित कर लिया जाता है। इस विधि में सुविधा यह है कि इसमें केवल एक बूँद रक्त से ही काम चल जाता है।

रक्त का स्वाद—रक्त का स्वाद बमकीन होता है।

तापक्रम—रक्त का औसत तापक्रम 37.0° सेण्टीग्रेड या 98.6° फारेनहीट है। रक्तप्रवाह पेशियों, नाडीकेन्द्रों तथा ग्रन्थियों द्वारा जाने पर गरम तथा त्वचा की केशिकाओं में जाने पर ठण्डा हो जाता है।

गन्ध—ताजे रक्त में एक विशिष्ट गन्ध होती है जो सामान्यतः प्राणी की प्रकृति के अनुसार होती है।

प्रतिक्रिया—रक्त की प्रतिक्रिया किंचित् सारीय होती है और स्वभावतः उष्ण 7.35 से उष्ण 7.43 तक तथा औसत उष्ण 7.39 होती है। उष्ण 7.4 से अधिक प्रतिक्रियाक्षारभाव तथा उष्ण 7.3 से नीचे अम्लभाव को सूचित करती है। सामान्यतः रक्त की प्रतिक्रिया में बहुत कम परिवर्तन होता है क्योंकि रक्त में स्थित बाइकार्बोनेट, फास्फेट तथा मांसतरत्र प्रतिक्रिया स्थायक के रूप में कार्य करते हैं और इसीलिए अधिक परिमाण में अम्लपदार्थ खाने पर भी रक्त की अम्लता नहीं बढ़ने पाती।

स्वाभाविक रक्त में रक्तकणों के रक्तवर्ण के कारण लिटमस पत्र का साधारण प्रयोग नहीं हो सकता। अतः रक्त की प्रतिक्रिया का निर्णय निम्नांकित विधियों से होता है:—

(१) एक लिटमस पत्र को सान्द्र लवणविलयन में भिगोकर उस पर एक बूँद रक्त रखिये और कुछ सेकण्ड के बाद पानी से उसको धो दीजिये।

(२) एक बूँद रक्त एक चमकीले लिटमस पत्र पर रखिये और कुछ सेकण्ड के बाद इसे जल से धो डालिये।

सान्द्रता—यह देखा गया है कि मानवशरीर का रक्त जल से पाँचगुना गाढ़ा होता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा सान्द्रता कुछ कम होती है। अब यह भी निश्चित हो चुका है कि रक्त की सान्द्रता रक्तकणों और रक्तास के अनुपात के अनुसार होती है। रक्त की सान्द्रता का निश्चय इस प्रकार किया जाता है कि यू (U) के आकार की एक नलिका (सान्द्रता मापक Ostwald's visco-

simeter) में परिचुत जल का प्रवाह देखा जाता है और दूसरी नलिका में रक्त का प्रवाह किया जाता है । इस प्रकार तुलना करने से रक्त की सान्द्रता का निश्चय किया जाता है । रक्त की सान्द्रता निम्नांकित अवस्थाओं में बढ़ जाती है :—

१. ईथर द्वारा सज्जनाश करने पर ।
२. अहिफेन सत्व ।
३. कार्बन द्विओपिक् ।
४. अद्रिनिलीन ।
५. कुछ विकार यथा फुफुसशोथ, मस्तिष्कावरण शोथ ।

निम्नांकित अवस्थाओं में यह घट जाती है :—

- (१. लवणविलयन के निक्षेप से । २. उष्णरक्तान के बाद । ३. घृक्कशोथ ।

आयतन—स्वभावतः प्राणी में रक्त का परिमाण शरीरभार के निश्चित अनुपात में होता है । निलय के भरने तथा फलस्वरूप प्राकृत रक्तप्रवाह को बनाये रखने में रक्तपरिमाण का बहुत बड़ा महत्व है । यह शरीरभार का लगभग ७.५ से १० प्रतिशत तक (औसत ८.८%) अर्थात् १ से १.६ तक होता है । शरीर के तन्तुओं में रक्त के परिमाण का वितरण निम्नांकित रूप से निश्चित किया गया है :—

प्लीहा	०.२३%,	मस्तिष्क और सुषुम्ना	१.२४%,
घृक्क	१.६३%,	त्वचा	२.१०%,
अन्त्र	६.३०%,	अस्थि	८.२४%,

हृदय, फुफुस और वृहद् रक्तवह स्रोत	२२.७६%,		
विश्रामावस्था में पेशी	२९.२०%,	यकृत	२६.३०%,

उपर्युक्त विवरण के अनुसार रक्त का वितरण निम्नांकित प्रकार से होता है :—

- प्रायः १/३ हृदय, फुफुस और रक्तवहस्रोत । प्रायः १/३ यकृत ।
 ” ” विश्रामावस्था की पेशी । ” ” अन्य अंग ।

रक्त के कुल आयतन में निम्नलिखित अवस्थाओं के अनुसार विभिन्नता होती है :—

- (क) आयु—बच्चों में अधिक ।
- (ख) लिंग—स्त्रियों में कम ।

- (ग) गर्भावस्था—गर्भावस्था में अधिक, प्रसव के बाद कम ।
 (घ) अधिक जल लेने से—वृद्धि ।
 (ङ) जल नहीं लेने से—कमी ।
 (च) अम्लों तथा चारों के प्रयोग से रक्तस गाढ़ा होने से आयतन कम तथा सोडा बाईकार्ब या सत्वशर्करा से रक्तस पतला होने से आयतन अधिक हो जाता है ।

रक्त की मात्रा का निर्णय

शरीर में रक्त की कुल मात्रा का निर्णय दो विधियों से किया जाता है:—

- (१) प्रत्यक्ष (Direct) (२) अप्रत्यक्ष (Indirect)

(१) प्रत्यक्षविधि—

(क) हैलडेनस्मिथ की विधि (Haldane smith method)
 पहले रक्त के रजकद्रव्य का प्रतिशत रक्तरजकमापक यन्त्र से निकाल लीजिये ।
 स्वभावतः १०० सी० सी० रक्त में १८.५ सी० सी० ओपजन रहता है और तब उसका घर्ण १०० प्रतिशत कहा जाता है । रक्त रजकद्रव्य का प्रतिशत नापने के बाद व्यक्ति को लगभग ७५ सी० सी० कार्बनएकोपिद् सुघाड़िये । अब रक्त की कुछ घूर्ण लेकर रक्तरजकमापक यन्त्र से उसकी परीक्षा कीजिये । तब पता चलेगा कि रक्त १५ प्रतिशत कार्बनएकोपिद् से सन्तृप्त है अर्थात् १०० सी. सी. रक्त में $\frac{18.5 \times 100}{100} = 2.7$ सी. सी. कार्बन एकोपिद् रहता है ।

अब ७५ सी. सी. कार्बन एकोपिद् सूंघने से १०० सी. सी. रक्त में कार्बन एकोपिद् का परिमाण २.७ सी. सी. अर्थात् १५ प्रतिशत होता है । इसलिए कार्बनएकोपिद् के १०० प्रतिशत (प्रति १०० सी. सी. रक्त में १८.५ सी. सी.) के लिए ५०० सी. सी. कार्बनएकोपिद् सूंघने की आवश्यकता होगी । अर्थात् रक्त में कार्बनएकोपिद् (या ओपजन) का कुल धारणसामर्थ्य ५०० सी. सी. है । इस परिमाण का धारण २७.२७ सी. सी. रक्त द्वारा होगा क्योंकि १०० सी. सी. रक्त १८.५ सी. सी. कार्बनएकोपिद् या ओपजन का धारण करता है । अब निम्नांकित सूत्र से रक्त की कुल मात्रा निश्चित की जाती है:—

आयतन \times विशिष्ट गुरुत्व = रक्त का कुल भार ।

$\therefore 2727 \times 1.044 = 2846$ ग्राम ।

(ख) कीथ की विधि (Keith's method)—इसमें कुछ रगों का रक्त में निक्षेप करने के ४ या ५ मिनट के बाद कुछ रक्त निकाला जाता है और तब रक्तरस के वर्ण की परीक्षा की जाती है ।

रक्तरस (Plasma)—रक्तरस रक्त का तरल भाग है जो रक्त से निम्नलिखित विधियों से प्राप्त किया जाता है:—

(१) केन्द्रापकर्षण विधि—इस विधि से रक्तकण भारी होने से नीचे बैठ जाते हैं और रक्तरस तरल के रूप में ऊपर अलग हो जाता है जिसे पिपेट के द्वारा निकाल लिया जा सकता है ।

(२) जीवित परीक्षणनस्थिका (Living Test tube)—बड़े जीवों में उनकी अनुमन्या सिरा को रक्त के साथ काट कर अलग कर लिया जाता है और उसे ठंडे स्थान में लटका दिया जाता है । इससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और रक्तरस ऊपर हो जाता है ।

(३) स्कन्दन रोक्ने की अन्य किसी विधि से ।

रक्तरस का संघटन

जल	९०%		
मांसतत्त्व	७.०%,	सीरम अल्यूमिन	४.९%,
		” ग्लोब्यूलिन	१.८%,
		सूत्रजन	०.४%,
		केन्द्रक मांसतत्त्व	
संघपदार्थ	०.४६%	(नष्टजनयुक्त)	

यूरिया, मूत्राम्ल, आमिषाम्ल, क्रियेटिन, क्रियेटिनिन, जैन्थीन, हाइपोजैन्थीन ।

पेट्टिनिन, ग्वैनिन ।

(नष्टजनरहित)

फास्फोलिपिन, कैलेस्टरोल, लेसिथिन, दुग्धाम्ल, स्नेह, स्नेहान्त्र, द्रावशर्करा ।

क्रियतत्त्व—शर्कराजनविश्लेषक, मांसतत्त्वविश्लेषक, ओपजनीकरण, परिवर्तक, स्नेहविश्लेषक, केन्द्रकविश्लेषक, हिमोडायस्टेज ।

अन्यपदार्थ—अन्तःधाव, रोगप्रतिरोधनपदार्थ, पूरक (एलेक्सन), ऐम्बोसेप्टर्स (Amboceptors) ।

गैस—ओपजन, कार्बनडिऑक्साइड, नम्रजन ।

रक्त रस के मांसतत्त्व क्रियाविज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व पूर्ण हैं। प्रयोगों से यह देखा गया है कि मांसतत्त्व की कमी से शीघ्र ही स्तब्धता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त ये चाररक्त के रूप में भी कार्य करते हैं और इस प्रकार उद्जन अणुकेन्द्रभजन को स्थिर रखते हैं। सीरम अल्ब्यूमिन अमोनियम सल्फेट से पूर्ण सन्तृप्त होने पर ही अवक्षिप्त होते हैं। सूत्रजन रक्त के स्कन्दन में विशेष महत्त्व का है। इसका स्वरूप ग्लोब्यूलिन के समान होता है और बहुत शीघ्र अवक्षिप्त हो जाता है। लवणों की उपस्थिति में ५६° सेण्टीग्रेड तक गरम करने से यह जम जाता है। रक्त रस के अन्य मांसतत्त्वों की अपेक्षा लवणों के अधिक से यह शीघ्र जमता है। सामान्य कारण से अर्धसन्तृप्त होने तथा अमोनियम सल्फेट के २५-३० प्रतिशत विलयन से यह अवक्षिप्त हो जाता है।

उत्पत्ति:—सूत्रजन की उत्पत्ति यकृत कोषाणुओं में होती है अधिक रक्त साव के बाद जब प्राणी में रक्त की पूर्ति सूत्रहीन रक्तसे की जाती है या थुले हुये रक्तकण 'रिंगरलॉक विलयन' (Ringerlock suspension) में मिला कर शरीर में प्रविष्ट किये जाते हैं (इसे रक्त रस निवेप (Plasmaphoresis) कहते हैं) तब प्राकृत प्राणियों में कुछ ही घंटों में सूत्रजन पुनः उत्पन्न हो जाता है। किन्तु यदि यही ऐसे प्राणियों में जिनका यकृत निकाल दिया जाय तो सूत्रजन की पुनरुत्पत्ति नहीं होती। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि यकृत के विकारों में रक्त रस में सूत्रजन की मात्रा कम हो जाती है।

सीरम ग्लोब्यूलिन लगभग ७५° सेण्टीग्रेड तक गरम करने से जम जाता है और अमोनियम सल्फेट से अर्धसन्तृप्त तथा मैग्नेशियम सल्फेट से पूर्ण सन्तृप्त होने पर अवक्षिप्त हो जाता है।

अवस्थाओं के अनुसार रक्तस में स्नेह की मात्रा में विभिन्नता होती है । अधिक गुरु तथा स्निग्ध भोजन करने पर रक्त में स्नेह की मात्रा अधिक हो जाती है और सीरम में कुछ मलिनता आ जाती है । शीत स्थान में रखने पर स्नेह की बूंदें उससे अलग हो जाती है ।

रक्तस्कन्दन (Coagulation of blood)

शरीर से रक्त निकलने पर उसमें तीन अवस्थाएँ आती हैं:—

(क) प्रतिक्रियावस्था (Reaction phase)

(ख) स्कन्दनावस्था (Coagulation phase)

(ग) संकोचावस्था (Contraction phase)

(क) प्रतिक्रियावस्था:—

यह ३ से ५ मिनट तक रहती है । इस काल में रक्त में कोई भौतिक परिवर्तन दिखलाई नहीं देता और वह अपने स्वाभाविक तरलरूप में रहता है । तथापि रक्त में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रक्तचक्रिकाएँ परस्पर मिल कर छोटे-छोटे पिण्डों में एकत्रित हो जाती हैं । पहले वह पिण्ड बूट जाते हैं और फिर उनमें विरलेपण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप अनेक पदार्थ घनते हैं । इन पदार्थों में स्कन्दिन या पुरःस्कन्दिन (Thrombogen or prothrombin) मुख्य है और इसकी उत्पत्ति के लिए जीवनीय द्रव्य के आवश्यक होता है ।

यह समझा जाता है कि पुरःस्कन्दिन श्वेतकणों या रक्तचक्रिकाओं से नहीं घनता है, किन्तु वह रक्तस के एक मांसतन्त्र के रूप में स्थित रहता है । रक्तचक्रिकाओं तथा श्वेतकणों के विरलेपण से एक क्रियाशील पदार्थ घनता है जिसे 'थ्रोम्बोकाइनेज' (Thrombokinas) कहते हैं । यह एक स्नेह पदार्थ है और मस्तिष्क से प्राप्त 'सेफैलिन' (Cephalin) नामक द्रव्य के समान है ।

(ख) स्कन्दनावस्था:—

इसमें रक्त गाढ़ा और घन हो जाता है जिससे पात्र को उलटने पर भी रक्त गिरता नहीं है । यह १० मिनट के भीतर होता है और इसे 'स्कन्दनकाल' कहते हैं । इस अवस्था में स्कन्दजन रक्त के विलेय खटिक लवणों के साथ मिलता है और इससे स्कन्दिन (Thrombin, thrombase or fibrin ferment)

नामक पदार्थ बनता है। पुरःस्कन्दिन और खटिक का यह संयोग 'थ्रोम्बोकाइनेज' नामक प्रियाशील माध्यम के द्वारा सम्पन्न होता है जो तन्तुओं के विरलेपण से प्राप्त होता है।

(ग) संकोचावस्था :—

इस अवस्था में रक्त के जमे हुये घन भाग के चारों ओर से घुँद-घुँद का तरल पदार्थ का साव होता है। ये घुँदें चारों ओर पृष्ठ भाग पर जमने लगती हैं और धीरे-धीरे रक्त तरल और ठोस दो भागों में विभक्त हो जाता है। तरल भाग सीरम (Serum) तथा ठोस भाग स्कन्द (Clot) कहलाता है।

इस काल में स्कन्दिन की क्रिया सूत्रजन पर होती है और उसे 'सूत्रीन' (Fibrin) नामक अविलेय जमे हुये मांसतत्त्व में परिणत कर देता है। यह सूत्रीन रक्त के सम्पूर्ण जमे हुये भाग के भीतर सूक्ष्म तन्तुओं का एक जाल सा बनाता है जिसके बीच-बीच में रक्तकण स्थित होते हैं। इसके बाद सूत्रीन सिकुड़ने लगते हैं और रक्त का तरल भाग (Serum) बाहर निकलने लगता है।

अत्यधिक शक्ति के सूक्ष्मदर्शकयन्त्र में देखने पर सूत्रीन का जाल स्फटिक के समान दीखता है और स्वयं सूत्रीन सूच्याकार स्फटिक के समान दिखलाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अम्लों या लवणों के द्वारा जमाने पर रक्त का थक्का घड़े-घड़े पिण्डों के रूप में होता है।

रक्तस्कन्दन को रोकने वाले कारण

(क) ऐसे कारण जो कर्णों के विरलेपण को रोकते हैं अर्थात् जो स्कन्दन की प्रयत्नावस्था में बाधा पहुँचाते हैं :—

(१) निम्न तापक्रम (२) संजीव रक्तवह नलों की दीवारों से सम्पर्क

(३) स्नेह से सम्पर्क

(ख) ऐसे कारण जो विलेय खटिक लवणों को अविलेय लवणों में परिवर्तित करने से 'सूत्रीन क्रिण्व' की उत्पत्ति को रोकते हैं अर्थात् जो स्कन्दन की द्वितीय अवस्था में बाधा पहुँचाता है :—

(४) पोटेशियम औक्जलेट का प्रक्षेप

(५) सोडियम फ्लोराइड " "

(६) " साइट्रेट " "

(ग) ऐसे कारण जो प्रतिस्कन्दिन की अधिक उत्पत्ति से सूत्रीनकिण्व को नष्ट कर देते हैं:—

(७) मांसतत्त्वसार का अन्तःक्षेप

(८) क्षुत रक्त में जलौकासत्र (*Hirodin*) का मिश्रण

(९) सर्प विष का अन्तःक्षेप

(घ) ऐसे कारण जो रक्तरस के सूत्रजन को अवच्छिन्न कर देते हैं:—

(१०) सोडियम सल्फेट का प्रक्षेप

(११) मैगनेशियम सल्फेट का प्रक्षेप

(१२) सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रक्षेप

(१३) रक्त को 60° सेण्टीग्रेड तक गरम करना

रक्तस्कन्दन को बढ़ाने वाले कारण

(फ) ऐसे कारण जो रक्त के विरलेपण में सहायता करते हैं:—

(१) तापक्रम में वृद्धि (२) बाह्यपदार्थों से सम्पर्क

(३) रोंतों की दीवाल में आघात (४) संक्षोभ ।

(ख) ऐसे कारण जो द्वितीय अवस्था में सहायता करते हैं:—

(५) विलेय खटिक लवणों का प्रक्षेप

(६) केन्द्रक मांसतत्त्व का अन्तःक्षेप

हॉपेल के रक्तस्कन्दन—सम्यन्धी सिद्धान्त के अनुसार यकृतीन के द्वारा ही रक्त की स्वाभाविक तरलता बनी रहती है । जब रक्त बाहर निकलता है तब ग्रौम्योकाइनेज इस यकृतीन को उदासीन बना देता है और तब स्कन्दन की क्रिया होती है ।

प्रतिपुरःस्कन्दिन-यकृतीन (*Antiprothrombrin, heparin*)

रक्तरस में स्कन्दन का प्रतिरोधी एक द्रव्य होता है जो ग्रौम्योकाइनेज की क्रिया के द्वारा पुरःस्कन्दिन से स्कन्दिन के निर्माण में बाधा डालता है । इसे प्रतिपुरःस्कन्दिन या यकृतीन कहते हैं । इसकी क्रिया किफेलिन या अन्य तन्तु-सार के द्वारा नष्ट हो जाती है ।

प्रतिस्कन्दिन (Antithrombin)

रक्त बाहर निकलने पर जम जाता है किन्तु रक्तवह खोतों में यह नहीं जमता। इसका कारण यह है कि चकृत के द्वारा एक स्कन्दिन विरोधी पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे प्रतिस्कन्दिन कहते हैं। उसी के कारण स्कन्दिन की क्रिया सूत्रजन पर नहीं हो पाती और रक्त जमने नहीं पाता।

रक्तस्कन्दिनसूचक तालिका

रक्तविरलेपण + विटामिन के

↓

पुरःस्कन्दिन + खटिक + प्रोथ्रोम्बाइनेज

↓

स्कन्दिन + सूत्रजन

↓


सूत्रीन

रक्तकण (Red blood corpuscles or Erythrocytes)

ये गोल, किन्तु दोनों पाशों में नतोदर होते हैं और सुदा के समान दिखाई देते हैं। इनमें केन्द्र नहीं होते। इनका व्यास लगभग $\frac{1}{25}$ इंच तथा मोटाई $\frac{1}{100}$ इंच होती है। ये कण पृथक् होने पर गहरे पीले या हल्के लाल रंग के दिखाई देते हैं, किन्तु जब यह मिले रहते हैं तो उनका रंग गहरा लाल होता है। इन कणों में परस्पर चिपकने की प्रवृत्ति होती है जिससे बहुत से कण अपने पारस्परिक-माय से एक दूसरे से मिले रहते हैं और तब यह देखने में कणों की ढेर के समान मालूम होते हैं। जीवित अवस्था में इनमें लचीलेपन का गुण होता है जिससे दबाव पड़ने पर ये कुछ लम्बे और सङ्कुचित हो जाते हैं किन्तु शीघ्र ही पूर्ववस्था में लौट आते हैं।

चित्र २६

रक्तकण जिस वस्तु के सम्पर्क में आते हैं उससे विशेषतः प्रभावित होते हैं। यदि उन्हें जल में या सामान्य लवण विलयन में रखा जाय तो वे द्रव का पोषण करके गैर की भांति फूल जाते हैं। इनके भीतर का रक्तद्रव्य जल में विलीन हो जाता है और अन्त में अधिक फूल जाने से ये कण फट जाते हैं। इसे रक्त विलयन (Haemolysis) कहते हैं। इसके बाद कोशों में भी विलेपण की क्रिया होने लगती है, इसे कोश विलयन (Stomatolysis) कहते हैं।



चित्र २६

यदि उन्हें समान शक्ति के विलयन (यथा ०.९ प्रतिशत लवण विलयन) में रखा जाय तो इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता । इसके विपरीत, उच्च लवण विलयन में रखने पर उनके भीतर का द्रव व्यापन क्रिया (Osmosis) के द्वारा बाहर खिंच आता है और कण सिकुड़ जाते हैं । रक्त विलयन की क्रिया निम्नांकित कारणों से होती है:—

(१) रक्त में जल मिलाना ।

(२) रक्त में ईयर, पित्त लवण, क्लोरोफार्म, तनु अम्ल, चार तथा सैपो-निनका तनु जलीय विलयन—(१-१०००)

(३) नीललोहितोत्तरकिरण, रुकिरण आदि किरणों का प्रभाव (किरण-जन्य रक्तविलयन)

(४) अतिशील या १०° सेंटीग्रेड तक तापक्रम (तापजन्य रक्तविलयन)

(५) अतितीव्र सन्नोम ।

(६) सर्पविष

(७) एक जाति के रक्त को दूसरी जाति के प्राणियों में प्रविष्ट करने से (विशिष्ट रक्त विलयन)

रक्तकण की रचना

रक्तकण की रचना एक रंगरहित लिफाफे की तरह होती है जिसमें एक अर्धद्रव पदार्थ भरा रहता है । इसमें रक्तरंजक द्रव्य की प्रधानता होती है, जिसका रंग गहरा लाल होता है और इसी के कारण रक्तकण का भी रंग लाल प्रतीत होता है । प्रत्येक कण में लगभग ३ भाग जल होता है । शेष ठोस भाग में ९० प्रतिशत रक्तरंजक द्रव्य होता है । यदि कण को दाब कर तोड़ दिया जाय तो रक्तरंजक द्रव्य का विलयन करण से बाहर निकल जायगा और केवल रंगरहित आवरण रह जायगा ।

रक्तकण का रासायनिक संघटन

जल	६५%
रक्तरंजक	३२%
अन्य ठोस पदार्थ	३%

(सेन्द्रिय)

मांसतत्व	०.९%
लेसिमिन	
कोलेस्टीन	

(निरिन्द्रिय)

पोटाशियम, लवक तथा मैग्नेशियम के छोराइड	
पोटाशियम, " "	सलपेट
" " "	फास्फेट

कणों में पोटाशियम तथा रक्तरस में सोडियम और लवक लवणों का अधिस्थ रहता है।

रक्तकणों की संख्या

रक्तकणों की औसत संख्या पुरुषों में ४५ से ५५ लाख तक तथा स्त्रियों में ४५ लाख होती है। रक्त की संपूर्ण राशि में ४० से ५० प्रतिशत तक रक्त कणों का भाग रहता है। रक्तकणों की संख्या में निम्नांकित अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है:—

- (१) आयु—गर्भ या नवजात शिशु में सर्वाधिक।
- (२) शरीर का समूहन। (३) पोषण। (४) निवास की स्थिति।
- (५) काल—भोजन के बाद घट जाती है।
- (६) गर्भावस्था—घट जाती है। (७) मासिक—बढ़ जाती है।

(८) पार्वर्य प्रदेश—अधिक ऊँचाई पर रक्तकिरणों की संख्या बढ़ जाती है। यह भोजन की कमी फलतः प्लीहा के संकोच के कारण होता है।

रक्तकणाधिक्य (Polycythaemia)

यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त में रक्तकणों का बाहुल्य हो जात है। यह आघातजन्य स्तब्धता तथा चर्ब, दग्ध आदि तथा अतितीव्र अतिसार या घमन की अवस्थाओं में देखा जाता है। इसका कारण यह है कि रक्तरस का द्रवभाग केशिकाओं से अधिक परिमाण में छन कर बाहर निकल जाता है।

और रक्त गाढ़ा हो जाता है जिससे अपेक्षाकृत रक्तकणों का बाहुल्य हो जाता है। इसे आपेक्षिक रक्तकणाधिक्य (Relative polycythaemia) कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब रक्तकणों की संख्या में वस्तुतः वृद्धि होती है तब उसे तत्परिक रक्तकणाधिक्य (Absolute polycythaemia) कहते हैं। प्राकृत रक्तकणाधिक्य निम्नांकित अवस्थाओं में होता है:—

(१) भावावेश—इसमें प्रत्यावर्तित रूप से प्लीहा का संकोच होता है और फलस्वरूप अधिक रक्तकण संचयन में आ जाते हैं।

(२) ओपजन की कमी—इसमें रक्तमज्जा की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है जिससे रक्तकणों का उत्पादन बढ़ जाता है।

रक्ताल्पता (Anaemia)

इस अवस्था में रक्तकणों की संख्या और रक्तरजस का परिमाण कम हो जाता है। अतितीव्र रक्तव्याघ्र होने पर शरीर में निम्नांकित पूरक प्रतिक्रियाएँ होती हैं जिनसे रक्त का स्वाभाविक स्वरूप बना रहता है:—

(१) सूक्ष्म धमनियों का संकोच । (२) प्लीहा का संकोच ।

(३) मज्जा की क्रियाशीलता में वृद्धि ।

(४) तन्तुओं से द्रव का शोषण करने के कारण रक्तरस के परिमाण में वृद्धि ।

इसी प्रकार जब भोजन में पोषक-तत्वों यथा निरिन्द्रिय छवग, लौह, जीवनीयद्रव्य की कमी हो जाती है तब भी रक्ताल्पता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसे 'पोषणसम्बन्धी रक्ताल्पता' (Nutritional anaemia) कहते हैं।

यकृत में एक पदार्थ पाया जाता है जो रक्तकणों को उत्पन्न करने के लिए रक्तमज्जा को उत्तेजित करता है। इस पदार्थ के अभाव में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे घातक रक्ताल्पता (Pernicious anaemia or addison's anaemia) कहते हैं। यह पदार्थ वस्तुतः यकृत में नहीं, किन्तु आमाशय में उत्पन्न होता है। आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि आमाशयिक स्राव में एक अनिर्दिष्ट तत्व होता है जिसका नाम 'एडिसिन' (Addisin) है और जो स्वरूपतः अन्तःस्राव के समान होता है। यह भोजन के किसी तत्व

विशेषतः मांस, घृतक तथा मरिचक के मांसतन्त्रों से संयुक्त होता है। शोष्ण का यह साव जीवनीयद्रव्य धीरे के समान होता है। ऐडिसिन और भोजनतन्त्रों के संयोग से बना हुआ पदार्थ यकृत में संचित रहता है और रक्तमज्जा में उत्पन्न रक्तकणों के परिपाक तथा विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग देता है और इस प्रकार घातक रक्ताल्पता से शरीर की रक्षा करता है।

रक्तकणों की गणना

सर्वप्रथम रोगी से रक्त लेने के लिए आवश्यक उपकरणों को प्रस्तुत रखना चाहिये। रोगी की उँगली यदि ठंडी हो तो गरम पानी से धोकर गरम करना चाहिये और यदि भौंगी हो, तो सुखा देना चाहिये। उस उँगली को अपने बायें हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में पकड़ो। उसके अग्रभाग को अल्कोहल से विसंक्रमित करो और सुखने दो। दाहिने हाथ में सूई लेकर उँगली के अग्रभाग के निकट करतल की ओर तीव्रवेधन करो और उँगली को धीरे से दबाओ। जिससे एक बूंद रक्त वहाँ पृष्ठ पर पड़कर हो जाय। उसे साफ कर दो। इसी प्रकार निकाली हुई दूसरी बूंद को रक्तकण के लिए निर्धारित पिपेट में ५ बिंदु तक मुख के द्वारा खींचो। ध्यान रहे कि इसके साथ हवा या एक बुलबुला भी अन्दर न जाने पावे और तीव्र ही अग्रभाग साफ करके १०१ जक तक रक्तकणीय द्रव खींचो। यदि हवा का कोई बुलबुला चला गया हो तो फिर से यह क्रिया करनी चाहिये।

रक्तकणों की पिपेट के अग्रभाग को उँगलियों से धन्द करके एक मिनट तक हिलाओ। पिपेट से १ या २ बूंद बाहर निकालने के बाद एक छोटी बूंद गणना के लिए प्रयुक्त चित्रकाच के क्षेत्र पर लो। उसको शीशे के आवरणक क्षण्ड (Cover slip) से धीरे धीरे ढँक दो, जिससे उसके भीतर वायु के बुलबुले न जाने पावें। रक्तविन्दु का आकार उतना ही होना चाहिये जो वेबल गणनाक्षेत्र ही ढँक सके, उसके बाहर न जाने पावे, अन्यथा दूसरी विन्दु ऐनी पड़ेगी। अब रक्तकणों की गणना सूक्ष्म दर्शक यन्त्र से की जाती है। गणना क्षेत्र में १६ छोटेछोटे क्षेत्र होते हैं जिनका वर्गफल $\frac{1}{16}$ वर्ग मिलीमीटर होता है। ऐसे १६ छोटे क्षेत्रों के मिलने से एक बड़ा क्षेत्र बनता है। बड़े क्षेत्रों की संख्या भी १६ होती है।

गणना की विधि भी यह है कि क्षेत्रों की प्रथम पंक्ति में ऊपर से नीचे की

ओर गिनना चाहिये । फिर क्षेत्र को थोड़ा खिसका कर दूसरी पंक्ति में नीचे से ऊपर गिनना चाहिये । इसी प्रकार W की तरह तीसरी पंक्ति में ऊपर से नीचे और चौथी पंक्ति में नीचे से ऊपर गिनना चाहिये । कुछ रक्तकण क्षेत्र के भीतर न होकर रेखा पर पड़े मिलेंगे । इनमें जो कण ऊपर और बाईं ओर की रेखा पर हों, उन्हें गिनना चाहिये, दूसरों को नहीं, अन्यथा परिणाम गलत निकलेगा । इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होती है:—

$$\frac{\text{कणसंख्या} \times 4000 \times 200}{68}$$

इसी प्रकार श्वेतकणों की गणना की जाती है । इसके लिए रक्तचिन्दु श्वेतकरण के लिए निर्धारित पिपेट में ५ चिह्न तक मुँह के द्वारा खींचो और उसमें ११ चिह्न तक श्वेतकणीय द्रव खींचो । शेष विधि रक्तकणों की गणना के समान ही है । श्वेतकणों की गणना का सूत्र निम्नलिखित है:—

$$\frac{\text{कणसंख्या} \times 4000 \times 20}{256}$$

कभी कभी विलयन की अशुद्धि, पिपेट में धीरे धीरे चूसना, कणों का विषम वितरण तथा धूलि आदि कारणों से गणना का परिणाम ठीक नहीं निकलता ।

वान हर्बर्टन विलयन के द्वारा रक्तकणों को विलयन करने के पश्चात् रक्त-चमिकाओं की गणना की जा सकती है । वानहर्बर्टन विलयन १० प्रतिशत यूरिया विलयन के २१ भाग तथा सामान्य लवण विलयन के ९ भाग को परस्पर मिश्रित करने से बनता है । इसी प्रकार, रक्तरजकद्रव्य का माप रक्तरजकमापक यन्त्र (Haemoglobinometer) के द्वारा किया जाता है ।

रंगाङ्क (Colour index):—यह रक्तकणों तथा रक्तरजक के प्रतिशत परिमाण का अनुपात है । ५ लाख रक्तकणों को प्रतिशत माना जाता है । उदाहरणतः, यदि रक्तरजक १० प्रतिशत है तथा रक्तकण ९६ प्रतिशत है तो रंगाङ्क हुआ—

$$\frac{\text{रक्तरजक}\%}{\text{रक्तकण}\%} = \frac{10}{96} = 0.1041$$

रक्तकणों की उत्पत्ति और विकास

प्रारम्भिक गर्भावस्था में रक्तबद्ध प्रदेश के कुछ सकेन्द्रक गर्भकोषाणुओं के केन्द्रक विभक्त होते हैं और वही विभक्त, प्रविभक्त होते होते रक्तकणों में परिणत हो जाते हैं। तृतीयमास के बाद से लसिकाग्रंथियाँ, प्लीहा, यालप्रैवेयक तथा यकृत रक्तकणों के निर्माण का कार्य करते हैं। जन्म के बाद इनका निर्माण रक्तमज्जा के द्वारा होता है।

प्रतिदिन रक्तकणों का नाश होता रहता है और इसी क्षति की पूर्ति करने के लिए रक्तमज्जा में निरन्तर नये नये रक्तकण बनते रहते हैं। रक्तमज्जा में ऐसे विकसित होने वाले रक्तकणों की संख्या ४० से ५० लाख तक रहती है और इनसे लगभग १५ लाख रक्तकण प्रतिदिन बनते हैं।

विकासक्रम में सर्वप्रथम जो कण उत्पन्न होते हैं, वह स्वाभाविक कणों से बड़े तथा केन्द्रकयुक्त होते हैं उन्हें सकेन्द्रक रक्तकण (Megaloblasts) कहते हैं। यह रंगरहित होते हैं। इसके बाद ओजःसार में रक्तरंजक द्रव्य उत्पन्न होने से यह रक्तकणों में परिणत हो जाता है। पहले उत्पन्न होने वाले कण को पूर्वज रक्तकण (Erythroblasts) कहते हैं जिसके केन्द्रक में सूक्ष्म जालक के समान रचना होती है। उसके बाद अनुजरक्तकण (Normoblasts) उत्पन्न होते हैं जिनके केन्द्रक में जालक रचना नहीं होती। इसके बाद केन्द्रक नष्ट हो शोषित हो जाते हैं और इस प्रकार केन्द्रकविहीन रक्तकण रह जाता है, इसे केन्द्रकरहित रक्तकण (Reticulocytes) कहते हैं। इन्हीं कणों से स्वाभाविक परिपक्व रक्तकणों का निर्माण होता है। किन्तु रक्तव्य की अवस्था में रक्तनिर्माणक प्रदेशों पर अत्यधिक भार पड़ने पर ये कण तथा गंभीर अवस्थाओं में केन्द्रकयुक्त कण भी रक्त में मिलने लगते हैं।

रक्तमज्जा के रक्तबद्ध सिराधौतों में स्थित केशिकाओं में रक्तनिर्माण का कार्य होता है। यकृत सत्र रक्तमज्जा को उत्तेजित करता है और इस प्रकार रक्तकणों का उत्पादन बढ़ जाता है। जीवनीय द्रव्य ली, थाइरीक्सोन तथा ताम्र रक्तोत्पादन में सहायता करते हैं।

रक्तकणों का भविष्य

मनुष्य में लगभग चार या पाँच सप्ताह के जीवन चक्र के बाद रक्तकण बिगलेपित हो जाते हैं और रक्तरंजक द्रव्य भी बिगलेपित हो जाता है जिससे

पित्तरञ्जक द्रव्य बनते हैं । इसका प्रमाण यह है कि मूत्र और पुरीष द्वारा पित्तरञ्जक द्रव्यों का उत्सर्ग निरन्तर होता रहता है । यह पित्तरञ्जक द्रव्य रक्त रञ्जकद्रव्यों से यकृत-कोषाणुओं द्वारा बनते हैं, यह पहले घटलाया जा चुका है । रक्तक्षय वाले रोगों में हिमोसिडरिन (Haemosiderin) नामक लौहयुक्त रक्तद्रव्य का यकृत तथा प्लीहा में संचय होते भी देखा गया है ।

विरलेपित रक्तकों के ग्रहण तथा उनसे पित्तरञ्जक द्रव्यों का निर्माण एक विशेष संस्थान द्वारा होता है उसे जालकान्तर्घातीय संस्थान (Reticulo-endothelial system) कहते हैं । इसमें निम्नलिखित अंगों का समावेश होता है :—

१. यकृत के तारककोषाणु ।
२. प्लीहा ।
३. रक्त के एककेन्द्रीय कोषाणु ।
४. लसीकावह स्त्रोतों, प्लैटिक स्त्रोतों, रक्तमज्जा, अधिवृक्कग्रन्थि के अन्तःस्तर ।
५. रक्तमज्जा, लसीकातन्तु, प्लीहा, घालग्रैयेक के जालक कोषाणु ।

इसके अतिरिक्त विद्वानों का यह मत है कि रक्तनाश तथा पित्तनिर्माण की क्रिया शरीर के कुछ ही अंगों में सीमित न रहकर वह संभवतः सभी अंगों में होती है । यहाँ तक कि सामान्य क्षत में भी वस्तुतः पित्तरञ्जकद्रव्य का निर्माण स्थानीय होता है ।

इस संस्थान के निम्नांकित कार्य हैं :—

- (१) बाह्य द्रव्यों का आहरण यथा जीवाणु, कोषाणुशेष आदि ।
- (२) रक्तरञ्जक से पित्तरञ्जक का निर्माण ।

स्वस्थ व्यक्तियों में रक्तक्षय के कारण लौह की जो मात्रा शरीर में मुक्त होती है वह लगभग सब नये रक्तकों के निर्माण में उपयुक्त हो जाती है । इसी लिए इस अनुपात से लौह की अधिक आवश्यकता भोजन में नहीं होती ।

रक्तरञ्जकद्रव्य (Haemoglobin)

यह रक्त का रञ्जकद्रव्य है जिसके कारण उसका रंग लाल रहता है । यह रंजक मांसतरव की श्रेणी का एक संयुक्त मांसतरव है जो—१६ प्रतिशत वर्तुलिन (Globin), जिसमें राधक का भी भाग रहता है तथा ४ प्रतिशत

रक्तरञ्जन (Haemochromogen , $\text{C}_{34}\text{H}_{40}\text{O}_4\text{N}_4\text{Fe}$), जिसमें ०.०३३५ प्रतिशत लौह रहता है—के मिष्ठने से बना है। यह ताप, तनु अम्लों तथा तीव्र क्षारों के द्वारा क्षीघ्र इन दोनों अवयवों में विभक्त हो जाता है। इसका स्फटिकीकरण भी हो सकता है। स्फटिकों का आकार त्रिगोण के समान होता है। रक्तकणों के भीतर छत्रों के कारण यह विलयन रूप में रहता है और उसका स्फटिकीकरण नहीं होता।

१०० ग्राम रक्त में १४-१५ ग्राम रक्तरञ्जकद्रव्य रहता है और इस अनुपात से उसकी मात्रा शतप्रतिशत मानी जाती है। रक्त की ओपजनवहन-शक्ति पूर्णतः रक्तकणों में वर्तमान रक्तरञ्जक के परिमाण पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त यह क्षाररक्षक है तथा कार्बनडिऑक्साइड का भी वहन करता है।

ओपजन-सन्तुति (Oxygen saturation)

सामान्य धमनीगत रक्त में रक्तरञ्जक का ९४ से ९६ प्रतिशत ओपजरञ्जक के रूप में रहता है। इस लिए रक्त की 'ओपजन सन्तुति' (Oxygen saturation) ९४ से ९६ प्रतिशत होती है और अवशिष्ट असन्तुति ४ प्रतिशत। शिरागत रक्त की ओपजन सन्तुति ६० से ८० प्रतिशत तक होती है।

थोड़ी देर के प्रचल व्यायाम से रक्तरञ्जक का परिमाण बढ़ जाता है, किन्तु देर तक व्यायाम जारी रखने से रक्तकणों का नाश होने लगता है, यद्यपि यह अवस्था क्षणिक होती है क्योंकि शीघ्र ही नये नये रक्तकणों के द्वारा इसके स्थान की पूर्ति हो जाती है।

रक्तरञ्जक से उत्पन्न द्रव्य

(१) हिमेटिन—(Haematin) ($\text{C}_{34}\text{H}_{30}\text{N}_4\text{O}_4\text{Fe OH}$)

रक्तरञ्जक को तनु अम्लों से ओपजन की उपस्थिति में विश्लेषित करने पर यह प्राप्त होता है। यह नीलाभ कृष्ण स्फटिकों के रूप में होता है तथा जल या मद्यसार में अविलेय है। किन्तु अम्ल या क्षार में आसानी से घुल जाता है।

(२) हिमोक्रोमोजन Haemochromogen ($\text{C}_{34}\text{H}_{40}\text{N}_4\text{O}_4\text{Fe}$)

जब रक्तरञ्जक ओपजन की अनुपस्थिति में विश्लेषित होता है, तब यह प्राप्त होता है।

(३) हिमीन Haemin ($\text{C}_{34}\text{H}_{32}\text{N}_4\text{O}_4\text{FeCl}$)—

यह हीमेटिन हाइड्रोक्लोराइड है जो गहरे भूरे रंग के दुर्बलों में मिश्रता है ।

(४) हिमेटापोर्फिरिन—Haematoporphyrin ($C_{34}H_{33}N_4O_6$)

यह लौह से रहित द्रव्य है तथा रक्तपर या हीमेटिन पर गवकामल की क्रिया होने से प्राप्त होता है ।

(५) हाइड्रोबिलिरुबीन—Hydrobilirubin ($C_{32}H_{44}N_4O_7$)

यह हीमेटिन पर टिन तथा गवकामल की क्रिया होने से प्राप्त होता है ।

(६) बिलिरुबीन Bilirubin ($C_{33}H_{36}N_4O_9$)—

यह भी रक्तरञ्जक का लौहविहीन घटक है और जालकान्त-स्वरीय तन्तु विशेषतः यकृत के कोषाणुओं में हीमेटोपौरफिरिन से उत्पन्न होता है ।

(७) हिमेटोवायडिन Haematoidin—

यह पुराने रक्त के जमे हुए रबकों में तथा रक्तकों के विश्लेषित होने पर तन्तुओं में पाया जाता है ।

(८) बिलिवर्डिन—Biliverdin ($C_{33}H_{30}N_4O_8$)—

यह बिलिरुबिन के ओपजन के साथ संयोग होने से उत्पन्न होता है ।

(९) यूरोबिलिन—(Urobilin)—मूत्ररञ्जक ।

यह एक प्रकार का रञ्जकद्रव्य है जो मूत्र में मिलता है ।

(१०) स्टर्कोबिलिन—(Stercobilin)—पुरीपरञ्जक ।

यह पुरीष का रञ्जकद्रव्य है जो विघटनकारक जीवाणुओं की क्रिया से बिलि-रुबिन के परिवर्तन होने से प्राप्त होता है ।

रक्तरञ्जक के यौगिक

(१) ओपरक्करञ्जक (Oxyhaemoglobin):—रक्तरञ्जक और ओपजन के मिलने से यह यौगिक बनता है । १ ग्राम रक्तरञ्जक ७६० मिली-मीटर वायुभार तथा ० सेण्टीग्रेड पर १.३४५ सी. सी. ओपजन से संयुक्त होता है । यह यौगिक वस्तुतः रक्तरञ्जक का ऑक्साइड नहीं है क्योंकि इसमें ओपजन का बहुत शिथिल संयोग होता है ।

रक्तरञ्जक का यह एक विशिष्ट गुण है कि वह ओपजन के साथ आसानी से संयुक्त हो जाता है तथा उसी ही आसानी से उसको छोड़ भी देता है । उसका यही गुण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है । यह छाल रंग का होता है और

मद्यसार या ईयर में अविलेय तथा जल में विलेय है। इसका रफटिकीकरण भी शीघ्र होता है।

(२) अर्धोपरक्तरञ्जक—(Methaemoglobin) यह रक्तरञ्जक और ओपजन का दृढ यौगिक है और रक्तरञ्जक का थायसाइट समझा जाता है। यह ओपरक्तरञ्जक के सान्द्र विलयन में पोटेशियम फेरीसाइनाइट, पोटेशियम पर-मैंगनेट यां ओजोन मिलाने से प्राप्त होता है। यह भूरे रंग का होता है। इसमें ओपरक्तरञ्जक की अपेक्षा ओपजन का परिमाण आधा होता है।

(३) कार्बोपरक्तरञ्जक—(Carboxy-haemoglobin) Hb (FeCO)₄ यह रक्तरञ्जक के कार्बनएक्सीपिट्र गैस के साथ संयुक्त होने से बनता है। रक्तरञ्जक में ओपजन की अपेक्षा १३० गुना अधिक कार्बनएक्सीपिट्र से मिलने की प्रवृत्ति होती है। १०० सी. सी. रक्त १८.५ सी. सी. कार्बनएक्सीपिट्र से संयुक्त होता है। यह ओपरक्तरञ्जक से अधिक स्थायी यौगिक है। ओपजन की कमी के कारण तथा व्यासाम्रोपजन्य मृत्यु में यह गैस अत्यधिक पाया जाता है।

(४) नत्राऑक्सीरक्तरञ्जक Nitricoxide haemoglobin Hb (Fe No)₄ यह रक्त में अमोनिया मिलकर नट्रीपिट्र गैस के साथ संयुक्त कराने पर प्राप्त होता है।

(५) गन्धरक्तरञ्जक (Sulph Haemoglobin)—यह रक्त रञ्जक और हाइड्रोजन सल्फाइट के योग से बनता है। इसका रंग मलिन हरिताम होता है।

श्वेतकण (White blood corpuscles)

श्वेतकण छोटे केन्द्रकयुक्त कोषाणु होते हैं जिनके आकार-प्रकार में बहुत भिन्नता देखी जाती है। कुछ लाल कणों से छोटे होते हैं किन्तु अधिकतर बड़े होते हैं। साधारणतः इनका व्यास १० म्यू होता है। इनके केन्द्रक के आकार में भी बहुत विभिन्नता पाई जाती है और उसीके अनुसार इसे कई श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इन कोषाणुओं में गति करने की शक्ति होती है और वे अमीबा के समान गति करते हैं जिससे इनका आकार सदैव परिवर्तित होता रहता है। इनका विशिष्ट गुरुत्व रक्तकणों की अपेक्षा कम होता है। औसतन

उनकी संख्या प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में ७००० से ९००० होती है, किन्तु अवस्थाओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है । इनमें जीवाणु भक्षण (Phagocytosis) का भी गुण होता है ।

भोजन, विशेषतः मांसतत्त्व बहुत, के बाद, शारीरिक परिश्रम, अभ्यस्य, गर्भावस्था, बाल्यावस्था तथा अनेक औपसर्गिक रोगों में श्वेतकणों की वृद्धि (Leucocytosis) हो जाती है । वृद्धावस्था तथा उपवास के बाद उनकी संख्या घट जाती है (Leucopenia)

श्वेतकणों के प्रकार

(१) बहुकेन्द्री श्वेतकण (Polymorphonuclear) :—यह प्रायः बृहत् एककेन्द्री कणों के आकार के होते हैं और लघु एककेन्द्री कणों से बड़े तथा शहरशेखर से कुछ छोटे या बराबर होते हैं । इसका केन्द्रक कई भागों में विभक्त और विषम होता है । कोपसार अधिक तथा कमजोर होता है । उनकी संख्या स्वभावतः ६० से ८० प्रतिशत तक होती है ।

इनमें अग्न्याशयिक रस के पाचक किण्व तत्व (Trypsin) के समान क्षारीय माध्यम में कार्य करने वाला एक मांसतत्त्व विश्लेषक किण्वतत्व होता है जिसे श्वेताणुमांसतत्त्व विश्लेषक (Leukoprotease) कहते हैं । इनमें जीवाणु भक्षण की शक्ति अत्यधिक होती है और इसी लिए अनेक औपसर्गिक रोगों में इनकी संख्या बढ़ जाती है । पूर्योपत्ति की अवस्था में इनकी संख्या ८० से ९० प्रतिशत तक हो जाती है ।

(२) लघु एककेन्द्री श्वेतकण (Small mononuclear or lymphocytes) :—यह आकार में सबसे छोटे होते हैं, किन्तु अपेक्षाकृत इनके केन्द्र बड़े होते हैं, जिससे कोपसार की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें कण भी नहीं होते । केन्द्र प्रायः गोल होते हैं । इनकी संख्या स्वभावतः २० से ३० प्रतिशत तक होती है । बच्चों में इनकी संख्या कुछ अधिक होती है । एक वर्ष के बच्चे में यह औसतन ६० प्रतिशत तथा १० वर्ष के बच्चे में ३६ प्रतिशत मिलते हैं ।

इनमें अमीविक गति होती है किन्तु जीवाणुभक्षण की शक्ति नहीं होती ।

(३) बृहत् एककेन्द्री श्वेतकण (Large mononuclear) :—आकार में यह बहुकेन्द्री कणों से कुछ छोटे या उनके समान होते हैं तथा इनकी आकृति अग्निरंगेच्छु के समान होती है। केन्द्रक कुछ विभक्त और गोल या मण्डाकार होता है। कोपसार स्पष्ट, विस्तृत और कणों से रहित होता है। इनकी संख्या ३ से १० प्रतिशत तक औसतन ५ प्रतिशत होती है।

इनमें अमीबिक तथा जीवाणुभक्षण दोनों गुणधर्म होते हैं। इनमें एक मांसतापविरोधक किण्वसाह होता है जो अम्ल माध्यम में कार्य करता है।

(४) अम्लरंगेच्छु श्वेतकण (Eosinophile) :—ये बहुकेन्द्री कणों के समान होते हैं। किन्तु इनके कोपसार में स्थूल कण होते हैं। आकार में ये बहुकेन्द्री कणों से बड़े होते हैं। इनकी संख्या ५ प्रतिशत होती है। ये श्रमावतः जीवाणुभक्षक नहीं होते।

(५) परिवर्तनी श्वेतकण (Transitional) :—इनकी संख्या ३ से १ प्रतिशत होती है। इनमें एक केन्द्रक होता है जिसका आकार शण्डे के समान या सोम के धौज के समान होता है।

(६) भस्मरंगेच्छु (Mast cells or basophils) :—यह स्वाभाविक रक्त में बहुत कम लगभग ३ प्रतिशत मिलते हैं। इसका केन्द्रक अनियमित आकार का तथा कोपसार कणयुक्त होता है। किन्तु ये कण उदासीन रंगों से रञ्जित होते हैं। कुछ रोगों में ये अधिक संख्या में पाये जाते हैं।

श्वेतकणों की उत्पत्ति

(१) लघु एककेन्द्री, बृहत् एककेन्द्री तथा परिवर्तनी श्वेतकण लसीका ग्रन्थियों से उत्पन्न होते हैं।

(२) बहुकेन्द्री, अग्निरंगेच्छु तथा उदासीनरंगेच्छु अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं।


श्वेतकणों का वर्गीकरण

इनका वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है :—

(क) रंगग्रहण के अनुसार :—

(१) भस्मरंगेच्छु- (Basophils)—जो भास्मिक रंगों को अच्छी तरह ग्रहण करते हैं यथा लघु एककेन्द्री, बृहत् एककेन्द्री तथा भस्मरंगेच्छु कण

भेदकण



चित्र २६(क)

१-अम्लरंगेच्छु २-बहुकेन्द्री ३-परिवर्तनी ४-बृहत् एककेन्द्री ५-लघु एककेन्द्री
६-भस्मरंगेच्छु

(२) उदासीन रंगेच्छु या उभयरंगेच्छु (Neutrophils or amphophils)—जो उदासीनरंगों को ग्रहण करते हैं यथा परिवर्तनी श्वेतकण—

(३) अम्लरंगेच्छु (Acidophils)—जो अम्ल रंगों को ग्रहण करते हैं यथा बहुकेन्द्री और अम्लरंगेच्छु कण ।

(ख) भोजःसार की प्रकृति के अनुसार—

(१) स्वच्छ, (२) सूक्ष्मकण युक्त, (३) स्थूलकणयुक्त ।

(ग) उत्पत्ति के अनुसार—

(१) लसीका ग्रन्थियों में उत्पन्न । (२) मज्जा में उत्पन्न ।

श्वेतकणों का रासायनिक संघटन

इनके केन्द्रक में भ्यूक्लीन तथा ओजःसार में ग्लोब्यूलिन तथा केन्द्रकमांस तारव की ध्रेणी के मासदार होते हैं । इनके ओज सार में प्रायः स्वल्प मात्रा में श्वेत और शर्कराजन भी होता है ।

श्वेतकणों का कार्य

शरीर एक बड़े साम्राज्य के समान है । राज्य की रक्षा के लिए जिस प्रकार सेना का प्रबन्ध होता है, उसी प्रकार शरीररूपी राज्य की रक्षा के लिए श्वेत कणों की सेना का प्रबन्ध है । श्वेतकण युद्ध में अत्यन्त कुशल होते हैं और जब शरीर पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तब ये उस स्थान पर एकत्रित हो कर उसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं । यदि ये उन आक्रमणकारी जीवाणुओं से बलवान् हुये, तो उन्हें अपने भीतर ले लेते हैं और पचा जाते हैं । इसे जीवाणुभक्षण (Phagocytosis) की क्रिया कहते हैं । रोगोत्पादक जीवाणुओं से शरीर की रक्षा के लिए इनका अस्तित्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी सख्या कम होने से शरीर पर अनेक प्रकार के जीवाणुओं का आक्रमण होने लगता है और शरीर क्षण ही कर अन्त में मृत्यु तक हो जाती है । शरीर को बाह्य दाहियों से बचाने के लिए श्वेतकणों की प्रबल सेना आवश्यक है ।

रोगक्षमता (Immunity)

शरीर को बाह्य आघातों एवं रोगों से बचाने के लिए अनेक प्रबन्ध प्रकृति द्वारा किये गये हैं । शरीर में बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है जिससे हानिकारक जीवाणुओं का नाश हो जाता है । रक्त में यदि

(२) उदासीन रंगेच्छु या उभयरंगेच्छु (Neutrophils or amphophils)—जो उदासीनरंगों को ग्रहण करते हैं यथा परिवर्तनी श्वेतकण—

(३) अम्लरंगेच्छु (Acidophils)—जो अम्ल रंगों को ग्रहण करते हैं यथा बहुकेन्द्री और अम्लरंगेच्छु कण ।

(स) भोजःसार की प्रकृति के अनुसार—

(१) स्वच्छ, (२) सूक्ष्मकण युक्त, (३) स्थूलकणयुक्त ।

(ग) उत्पत्ति के अनुसार—

(१) लसीका ग्रन्थियों में उत्पन्न । (२) मज्जा में उत्पन्न ।

श्वेतकणों का रासायनिक संघटन

इनके केन्द्रक में न्यूक्लीन तथा भोजःसार में ग्लोब्यूलिन तथा केन्द्रकमांस ताव की श्रेणी के मांसतत्त्व होते हैं । इनके भोजःसार में प्रायः स्त्रल्प मात्रा में स्नेह और शर्कराजन भी होता है ।

श्वेतकणों का कार्य

शरीर एक बड़े साम्राज्य के समान है । राज्य की रक्षा के लिए जिस प्रकार सेना का प्रबन्ध होता है, उसी प्रकार शरीररूपी राज्य की रक्षा के लिए श्वेतकणों की सेना का प्रबन्ध है । श्वेतकण युद्ध में अत्यन्त कुशल होते हैं और जब शरीर पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तब ये उस स्थान पर एकत्रित हो कर उसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं । यदि वे उन आक्रमणकारी जीवाणुओं से घलवान्न हुये, तो उन्हें अपने भीतर ले लेते हैं और पचा जाते हैं । इसे जीवाणुभक्षण (Phagocytosis) की क्रिया कहते हैं । रोगोत्पादक जीवाणुओं से शरीर की रक्षा के लिए इनका अस्तित्व अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी संख्या कम होने से शरीर पर अनेक प्रकार के जीवाणुओं का आक्रमण होने लगता है और शरीर क्षण ही कर अन्त में मृत्यु तक हो जाती है । शरीर को बाह्य शत्रुओं से बचाने के लिए श्वेतकणों की प्रबल सेना आवश्यक है ।

रोगक्षमता (Immunity)

शरीर को बाह्य आघातों एवं रोगों से बचाने के लिए अनेक प्रबन्ध प्रकृति द्वारा किये गये हैं । शरीर में बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है जिससे हानिकारक जीवाणुओं का नाश हो जाता है । रक्त में यदि

स्कन्दन का गुण न हो, तो एक साधारण क्षत से इतना रक्तस्राव होगा कि मनुष्य की मृत्यु हो जायगी; किन्तु स्कन्दन के प्राकृतिक गुणधर्म के द्वारा अधिक रक्तस्राव से शरीर की रक्षा होती है। आहार के साथ प्रविष्ट जीवाणु आमाशयिक रस के अम्ल से नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मूत्र की अम्लता के कारण उसमें जीवाणुओं की क्रिया नहीं हो पाती।

इन सब से अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली प्रबन्ध रक्त तथा लसीका की जीवाणुनाशक क्रिया है। यह देया गया है कि औपसर्गिक रोग एक क्षा होने के बाद दुबारा नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि रोग की अवधि में शरीर में कुछ ऐसे रक्त पदार्थ बन जाते हैं। कलतः कुछ ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे उस रोग के भावी आक्रमणों से शरीर की रक्षा हो जाती है। शरीर में रोग को रोकने की जो शक्ति होती है, उसे रोगक्षमता कहते हैं और इस शक्ति से सम्पन्न शरीर को रोगरुम कहते हैं। उदाहरण के लिए, चेचक की टीका लगाने से व्यक्ति में चेचक के ही साधारण लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वह व्यक्ति कुछ वर्षों के लिए रोगरुम हो जाता है। इसी प्रकार च्चेग, आन्त्रिक ज्वर आदि रोगों को रोकने के लिए टीका दी जाती है। इसे प्रतिपेधक टीका (Protective inoculation) कहते हैं। इसी प्रकार रोग उत्पन्न होने के बाद उसकी चिकित्सा के लिए जब टीका दी जाती है, तब उसे रोगनाशक टीका (Curative inoculation) कहते हैं।

रक्त के खेतकण जीवाणुओं का भक्षण कर जाते हैं, किन्तु रक्त रस भी जीवाणुओं के जीवन के प्रतिकूल माध्यम सिद्ध हुआ है। यद्यपि इन जीवाणुनाशक द्रव्यों का रासायनिक स्वरूप पूर्णतया निर्धारित नहीं हुआ है तथापि इतना ज्ञात हुआ है कि वह मांसतत्त्व के समान है। रक्त को ५५° सेण्टीग्रेड पर १ घंटे तक गरम करने से उसकी जीवाणुनाशक शक्ति नष्ट हो जाती है। इन पदार्थों को जीवाणु नाशक (Bacteriolysins) कहते हैं।

इसीके समान रक्त में एक दूसरी शक्ति होती है जिसे रक्त विलयन शक्ति (Globulicidal power) कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि एक प्राणी का सीरम दूसरी जाति के प्राणी में प्रविष्ट किया जाय तो वह उसके रक्त-कणों को विहीन कर देता है। रक्त में विद्यमान इन पदार्थों को जिनमें रक्त विलयन की शक्ति होती है, रक्तविधायक (Haemolysins) कहते हैं।

स्वामाविक रक्त में इन जीवाणु नाशक द्रव्यों को एक निश्चित अनुपात रहता है । जब इनमें कमी होती है तब व्यक्ति किसी प्रकार के भी जीवाणु से आक्रान्त हो सकता है । अथवा यदि जीवाणुओं की संख्या अत्यधिक होती है तब भी व्यक्ति रोग ग्रस्त हो जाता है, किन्तु इस अवस्था में भी जीवाणु नाशक द्रव्य और जीवाणुओं का संघर्ष चलता रहता है । उसके शरीर में अधिक से अधिक जीवाणु नाशक द्रव्य उत्पन्न होते हैं अन्त में जब जीवाणुओं को पराजित कर देते हैं तब वह रोगमुक्त हो जाता है । यही नहीं, उसके रक्त में उस विशिष्ट जीवाणु नाशक द्रव्य का बाहुल्य हो जाता है और यह कुछ दिनों के लिए उस विशिष्ट जीवाणु के भावी आक्रमणों के प्रति रोगरक्षक हो जाता है । इस प्रकार प्रत्येक जीवाणु से संघर्ष के परिणाम स्वरूप शरीर में विशिष्ट प्रतिरोधक द्रव्य उत्पन्न होता है ।

रोगरक्षकता प्राणियों में आसानी से क्रमशः उत्पन्न की जा सकती है । यह बात केवल जीवाणुओं के संबन्ध में ही नहीं, अपितु उनके विष के संबन्ध में भी लागू होती है । उदाहरण के लिए, यदि रोहिणी के जीवाणु को उपयुक्त माध्यम में रखा जाय तो उनकी वृद्धि होती है और उनसे विष भी उत्पन्न होता है । परीक्षा के द्वारा यह ज्ञात कर लिया जाता है कि इस विष की कितनी मात्रा किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु का कारण हो सकती है । जो मात्रा मनुष्य को मार सकती है वह एक बड़े घोड़े को नहीं मार सकेगी । इसी प्रकार जिस मात्रा से एक मनुष्य मरता है उससे कई कुत्ते या खरगोश मर जायेंगे । जो मात्रा एक व्यक्ति को मार सकती है वह उस विशेष व्यक्ति के लिए मारक मात्रा (Lethal dose) कहलाती है । यदि इससे कम मात्रा का प्रवेश किसी पशु में कराया जाय तो उसे अधिक हानि न होगी और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जायगा । कुछ दिनों के बाद इससे अधिक मात्रा का प्रवेश कराया जाता है । इस प्रकार धीरे धीरे यह मात्रा बढ़ाई जाती है । कुछ समय के बाद यह ज्ञात होगा कि वह पशु मारक मात्रा से भी अधिक मात्रा का सहन कर लेता है और कोई विवृति उसके शरीर में उत्पन्न नहीं होती । इसका कारण यह है कि विष के क्रमिक प्रयोग से शरीर में प्रति-विष की उत्पत्ति होती है । घोड़े में यह क्रिया अधिक स्पष्टरूप से होती है । अब यदि इस प्रकार रोगरक्षक घोड़े के रक्त से सीरम को पृथक् कर रोहिणीरोग

से पीड़ित मनुष्य में प्रविष्ट किया जाय तो वह शीघ्र ही रोगमुक्त हो जाता है।

इस प्रतिविष की कार्यपद्धति के संबन्ध में यह विदित हुआ है कि जिस प्रकार अम्ल चार को उदासीन कर देता है, उसी प्रकार प्रतिविष विष को निष्क्रिय बना देता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि यदि विष और प्रतिविष एक परीक्षण नलिका में मिश्रित कर दिये जाय और कुछ समय दिया जाय तो वह मिश्रण हानिकारक नहीं होता। वह विष वस्तुतः प्रतिविष के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट नहीं होता, क्योंकि यदि इस मिश्रण को ६८° सेन्टीग्रेड तक गरम किया जाय तो प्रतिविष जम जाता है और नष्ट हो जाता है फलतः विष ज्यों का त्यों रह जाता है।

प्रतिविष के उत्पत्तिस्थान के अनुसार रोगक्षमता दो प्रकार की होती है—सक्रिय और निष्क्रिय (Active & passive)। सक्रिय रोगक्षमता में रक्त पदार्थ शरीर में ही उत्पन्न होते हैं अर्थात् शरीर रक्तपदार्थों की उत्पत्ति में सक्रिय भाग लेता है। इसके विपरीत, निष्क्रिय रोगक्षमता में दूसरे प्राणी के शरीर में उत्पन्न प्रतिविष का रक्त सीरम के रूप में प्रवेश कराया जाता है। इन दोनों में सक्रियरोगक्षमता अधिक स्थायी होती है।

प्रतिविष की उत्पत्ति के संबन्ध में अर्लिक (Ehrlich) नामक विद्वान् की जो रचना है, उसे पार्श्वशृङ्खला सिद्धान्त (Side chain theory of immunity) कहते हैं। उसका मत है कि जिस प्रकार पोषक मांसतन्त्र स्वाभाविक सात्मीकरण के क्रम में कोषाणुओं से मिलते हैं उसी प्रकार विष भी जीवित कोषाणुओं के ओजःसार से परमाणुसमूहों के द्वारा सयुक्त होता है। इन परमाणु समूहों को ग्रामफसमूह (Haptophor Groups) कहते हैं तथा कोषाणुओं के परमाणुसमूहों को, जिनसे ये संबद्ध होते हैं, ग्राहक समूह (Receptor groups) कहते हैं। विष के प्रयोग से इन ग्राहकसमूहों की उत्पत्ति अधिक होने लगती है जो अन्त में रक्तसंवहन में प्रविष्ट हो जाते हैं। रक्त में स्वतन्त्ररूप से घूमते हुये यही ग्राहकसमूह प्रतिविष बनाते हैं। सात्मीकरण की प्रक्रिया से इसकी तुलना का रहस्य यह है कि दुग्ध, अंडे आदि निर्विष द्रव्यों का भी क्रमशः मात्रा बढ़ाते हुये शरीर में प्रवेश किया जाय तो उसके परिणाम-स्वरूप भी कुछ प्रतिकूलद्रव्य उत्पन्न होते हैं जिनसे उपर्युक्त द्रव्य जम जाते हैं। रक्त के अतिरिक्त शरीर के अन्य कोषाणु भी इसी प्रकार प्रतिकूल, रक्तपदार्थ

संशोधित-परिवर्धित। प्रामाणिक संस्करण ॥

भैषज्यरत्नावली

‘विद्योत्तिनी’ भाषाटीका विमर्श टिप्पणी
परिशिष्ट सहित

टीकाकार—

कविराज अम्बिकादत्त शास्त्री

सम्पादक—

श्री राजेश्वरदत्त शास्त्री D. Sc.,
बड़े सार्जन् के १०० पृष्ठ, ग्लेज कागज,
इसका छपाई, दक्षी जिल्द (मूल्य १५)

सम्मति—

मैथिल कविराज प्रतापसिंह D. Sc.,
डायरेक्टर आफ आयुर्वेद, राजस्थान

प्रस्तुत प्रकाशन देस अत्यन्त प्रसन्नता
है। यह परिवर्धित और परिमार्जित प्रका-
शन वैद्य व्यवसायियों के लिये आशोर्वा-
त्स्वरूप सिद्ध होगा। कविराज अम्बिकादत्त
शास्त्री सिद्धहस्त लेखक हैं। उनके साथ श्री
ब्रह्मर्षिकर्जो तथा श्रीराजेश्वरदत्तजी की
सम्पादनकला का सहयोग सोने में हुमन्ध
का काम कर गया है।

इसके पूर्व के छव प्रकाशन अपूर्ण,
अशुद्ध प्राय और प्रकाशन कलाहीन हैं।

आशा है आयुर्वेद साहित्य प्रेमी इस
प्रकाशन से पूरा पूरा लाभ उठावेंगे।

चौखम्बा विद्या भवन, बनारस

सर्ग होने पर रक्त उन जीवाणुओं को परस्पर सरलेपित कर देता है जिससे वे गतिहीन हो जाते हैं। आन्त्रिक ज्वर की विडाल प्रतिक्रिया इसी तथ्य पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों के कारण यह क्रिया होती है उन्हें सरलेपक पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ भी मांसतत्त्व के समान ही होते हैं, किन्तु रक्तविटायकों की अपेक्षा ताप का अधिक सहन करते हैं। ६०° सेण्टीग्रेड के ऊपर अधिक देर तक गरम करने से उनकी क्रिया नष्ट की जा सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवाणुरूपी स्रावों को परास्त करने के लिए शरीर में अनेक साधन प्रस्तुत किये गये हैं। कहीं वे सरलेपक पदार्थों के द्वारा गतिहीन हो जाते हैं, कहीं जीवाणुनाशक पदार्थों से नष्ट हो जाते हैं। कहीं उनका विष प्रतिविष के द्वारा नष्ट हो जाता है और कहीं वह जीवाणुभक्षकों का आहार बन जाते हैं। अधिकांश जीवाणुशास्त्रियों का मत है कि जीवाणुभक्षण की क्रिया ही सर्वप्रधान है और दूसरी क्रियायें सहायकरूप तथा कम देखने में आती हैं। जब जीवाणु श्वेतकणों की क्रिया से नष्ट हो जाता है, तब मनुष्य या दूसरे प्राणी में उसका प्रवेश करने से रोग नहीं उत्पन्न होता, किन्तु यदि वह नष्ट नहीं होता तो वह बढ़ने लगता है और रोग उत्पन्न करता है। इसीलिए उसे रोगोत्पादक (Pathogenic) कहते हैं। श्वेतकणों के द्वारा भक्षित होने पर उनकी रोगोत्पादन शक्ति क्षीय नष्ट हो जाती है। भक्षण के लिए जीवाणुओं का रुचिकारक तथा स्वादु होना आवश्यक है। जो जीवाणु अरुचिकारक होते हैं उन्हें रुचिकारक बनाया जाता है। शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अरुचिकारक जीवाणुओं को रुचिसंपन्न तथा स्वादु बनाने का काम करते हैं। इन्हें स्वादुकारक (Opsonins) कहते हैं। सबधनद्रव्य से निकाल कर यदि जीवाणुओं को धोकर दिया जाय तो श्वेतकण उनका ग्रहण नहीं करते, किन्तु यदि उन्हें सीरम में डुबोकर दिया जाय तो श्वेतकण उन पर शीघ्र आक्रमण करते हैं। उदाहरण के लिए, हमलोग प्रतिदिन श्वास के द्वारा यक्ष्मा के जीवाणुओं को शरीर के भीतर लेते रहते हैं, किन्तु रक्त की इसी स्वादुकारक शक्ति के कारण श्वेतकणों के द्वारा वह नष्ट कर दिये जाते हैं और अधिकांश व्यक्ति इस रोग से बच जाते हैं। इस रोग की चिकित्सा में भी पौष्टिक आहार तथा शुद्ध वायु के द्वारा इसी शक्ति को बढ़ाया जाता है।

रक्त में एक और पदार्थ होता है जिसे 'अवक्षेपक' (Precipitin)

कहते हैं । भिन्न जाति के प्राणियों का रक्त यदि किसी प्राणी में प्रविष्ट किया जाया, तो प्रतिविष के साथ साथ अवक्षेपक पदार्थ भी उत्पन्न होता है ।

इस प्रकार श्वेतकणों के जीवाणुभक्षण के अतिरिक्त रक्त में निम्नांकित पदार्थ होते हैं जो बाह्य हानिकारक पदार्थों से शरीर की रक्षा करते हैं:—

१. जीवाणुनाशक (Bacteriolysins) -
२. रक्तविलायक (Haemolysins)
३. प्रतिविष (Antitoxin)
४. संश्लेषक (Agglutinin)
५. स्वादुकारक (Opsonin)
६. अवक्षेपक (Precipitin)

रक्तकणिका (Blood platelets or thrombocytes)

यह छोटी दण्डाकार या गोलाकार होती हैं तथा इनका व्यास रक्तकण के $\frac{1}{2}$ या $\frac{1}{3}$ होता है । कुछ विद्वान् इन्हें मज्जा के बृहदाकार कोषाणुओं के अवशेष के रूप में मानते हैं, किन्तु अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि ये रक्तकणों के समान ही रक्त के स्वतन्त्र भाग हैं । रक्त के एक घन मिलीमीटर में इनकी संख्या ३ लाख (२½ लाख से ५ लाख तक) होती है । इनमें चलने की शक्ति नहीं होती । रक्त के जमने में इनका प्रधान भाग रहता है । रक्त के जमने में ये किस प्रकार सहायता करती हैं, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, तथापि पुरः-स्कन्दिन के निर्माण के द्वारा ये उसमें सहायक होती हैं । उनका आकार परिवर्तनशील होता है तथा ये अत्यन्त अंगुर तथा चिपकने वाले होते हैं । जब रक्त जमते हैं तब ये परस्पर एकत्रित हो जाते हैं । बाह्य पदार्थों से संपर्क होने पर उनका विरलेपण शीघ्र होने लगता है ।

रक्तस्राव उत्पन्न करने वाले रोगों (यथा रोहिणी, ममूरिका, घातक पाण्डु) में इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है (रक्तकणिकाहरता—Thrombopenia) । सहज रक्तस्राव में उनका विरलेपण बहुत धीरे धीरे होता है जिससे रक्त जल्दी जमने नहीं पाता । इनमें कुछ प्राकृतिक विभिन्नताएँ भी देखी जाती हैं यथा पर्वतों पर तथा शीत ऋतु में इनकी संख्या बढ़ जाती है ।

रक्तवर्ग (Blood groups)

बहुत दिनों तक यह बात देखी जाती थी कि यदि एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में प्रविष्ट किया जाय तो कभी बड़े भयंकर लक्षण उत्पन्न होते थे और कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती थी। १९०१ में वियना के कार्ललैण्डस्टीन ने यह खोज की कि सभी रक्त एक वर्ग के नहीं होते और ये लक्षण ग्राहक के रक्त के द्वारा दायक के रक्तकणों के संश्लेषण से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अन्य विद्वानों के मनन और चिन्तन के बाद रक्तवर्ग की अवस्था स्थापित हुई। इन लोगों ने यह बतलाया कि रक्तस या सीरम में संश्लेषक क और ख वर्तमान रहते हैं जिनकी क्रिया विविधरूप से रक्तकणों में विद्यमान संश्लेषजन क और ख नामक द्रव्यों पर होती है।

रक्तकणों में संश्लेषजन क और ख की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार मनुष्य का रक्त चार वर्गों में विभाजित किया गया है:—

क ख वर्ग के रक्त कोषाणुओं में संश्लेषजन क और ख दोनों होते हैं।

क " " केवल " " होता है।

ख " " केवल " ख " "।

शून्य " " कोई " नहीं होता।

नामकरण	रक्तवर्ग मौस अंक	जैन्सकी अंक
क ख	१	४
क	२	२
ख	३	३
शून्य	४	१

विभिन्न रक्तवर्गों में संश्लेषक और संश्लेषजन

वर्ग	संश्लेषक	संश्लेषजन
क ख	अनुपस्थित	क ख
क	ख	क
ख	क	ख
शून्य	क ख	अनुपस्थित

सश्लेपक क की क्रिया उन्हीं रक्तकणों पर हो सकती है जिनमें संश्लेपजन क होता है। इसी प्रकार सश्लेपक ख की क्रिया उन्हीं रक्तकणों पर होती है जिनमें सश्लेपजन ख होता है। इसी आधार पर दायक और ग्राहक के रक्त के वर्ग का निश्चय होता है। जिस व्यक्ति के रक्त की परीक्षा करनी होती है उसका थोड़ा सा रक्त परीक्षण नलिका में लिया जाता है जिसमें १ सी० सी० सामान्य लवण विलयन तथा १ प्रतिशत पोटाशियम साइट्रेट विलयन का मिश्रण रक्ता रहता है। इस विलयन से मिश्रित रक्त का थोड़ा सा भाग सीरम क और सीरम ख के साथ काचशुष्ठ पर रक्ता जाता है और सश्लेषण प्रतिक्रिया के अनुसार वर्ग का निश्चय किया जाता है:—

सीरम क	सीरम ख	रक्तवर्ग
सश्लेषण	सश्लेषण	क ख
अनुपस्थित	"	क
सश्लेषण	अनुपस्थित	ख
अनुपस्थित	"	शून्य

दूसरे शब्दों में,

१. क ख वर्ग के रक्तकण सीरम क और ख से सश्लेषित होते हैं।
२. क " " " " " " क से नहीं।
३. ख " " " " " " ख से नहीं।
४. शून्य " " किसी सीरम से " नहीं होते।

शून्यवर्ग के रक्तकणों में सश्लेषजन नहीं होते, अतः इस वर्ग का रक्त किसी भी व्यक्ति में आसानी से प्रविष्ट किया जा सकता है। इस वर्ग के व्यक्तियों को इसी लिए, सामान्यदायक (Universal donors) कहते हैं। इसी प्रकार क ख वर्ग के सीरम में सश्लेषक नहीं होते, अतः इस वर्ग के व्यक्ति किसी वर्ग का रक्त ग्रहण कर सकते हैं। इसलिये इन्हें 'सामान्य ग्राहक' (Universal recipients) कहते हैं।

भारतीयों में रक्तवर्गों का व्यापेक्षिक अनुपात निम्नलिखित है:—

क ख ७ प्रतिशत । क २४ प्रतिशत । ख ३१ प्रतिशत । शून्य ३८ प्रतिशत ।

इधर क वर्ग को क_१ और क_२ तथा क ख वर्ग को क_३ ख तथा क_४ ख में विभाजित करने से वर्गों की संख्या छः हो जाती है ।

रक्तवर्गों के संबन्ध में सबसे आश्चर्यजनक बात उनका स्थायित्व है । सरलेप-जन जन्मकाल में उपस्थित रहते हैं और द्वितीय वर्ष तक पूर्ण विकसित हो जाते हैं । इसी प्रकार सरलेपक जन्मकाल में बहुत कम देखे जाते हैं, किन्तु प्रथम वर्ष के अन्त तक पूर्ण विकसित हो जाते हैं । एक बार जब ये विकसित हो जाते हैं तब उसी रूप-में ये जीवनपर्यन्त रह जाते हैं, यद्यपि कभी कभी उनके वर्ग में परिवर्तन भी देखा गया है । कुछ विद्वान् यह भी कहते हैं कि और सर्गिक रोगों, क्षकिरण चिकित्सा तथा कुनैन के प्रयोग के बाद रक्तवर्ग में परिवर्तन देखा गया है, किन्तु वस्तुतः यह प्रमादवश ही होता है और रक्तवर्ग के स्थायित्व में कोई सन्देह नहीं है ।

चतुर्थ अध्याय .

लसीका

जब रक्त केशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रवभाग (रक्तस) कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाओं से केशिकाओं की पतली दीवारों से छन कर बाहर आ जाता है और धातुओं के निकट संपर्क में आता है । बाहर निकला हुआ यही रक्तस लसीका कहलाता है । इस प्रकार लसीका एक प्रकार का रक्त है जिससे रक्तकण छूटकर लिये गये हैं ।

तन्तुओं में उत्पत्तिस्थान से लेकर रसकुचया तक लसीका के सपूर्ण मार्ग में उसकी गतिविधि पर लसीकाग्रथियों का प्रभाव पड़ता है । यही नहीं, एक तन्तु से आई हुई लसीका दूसरे तन्तु से आई हुई लसीका से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती और यह भिन्नता तन्तु की क्रियाशीलता से अधिक स्पष्ट हो जाती है । सब से अधिक स्पष्ट भिन्नता पाचनकाल में पाचनमलिका से आई हुई लसीका (जिसे अन्नरस (Chyle) कहते हैं) तथा शरीर के अन्य भागों से आई हुई लसीका में दृष्टिगोचर होती है । जब पाचन नहीं होता रहता है तब पयस्विनी मलिकाओं में बहने वाले द्रवभाग तथा अन्य अंगों की लसीका

में अधिक अन्तर नहीं होता । पाचनकाल में रसकुल्या में बहनेवाला द्रवभाग लसीका के सामान्य स्वरूप का निर्देशक होता है ।

भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक संघटन

लसीका क्षारीय, स्वच्छ, पारदर्शक या कुछ गाढ़ा द्रवपदार्थ होता है जिसमें लगभग ९४ से ९६ प्रतिशत जल तथा ४ से ६ प्रतिशत ठोस भाग होता है । ठोस पदार्थों में मुख्य भाग मांसतरवों का होता है ।

रासायनिक संघटन में यह रक्तारस के समान ही होता है, केवल मांसतरवों का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ पतला होता है । इसमें मांसतरवों का परिमाण अवस्थाओं तथा शरीर के अयस्क के अनुसार बदलता रहता है यथा यकृत से आई हुई लसीका में दाखाओं की अपेक्षा मांसतरव अधिक होता है । यह भी शरीर के विभिन्न भागों में फेशिकाओं की प्रवेश्यता पर निर्भर करता है, जैसा कि आगे बतलाया जायगा । इसमें लसीकाणुवर्ग के श्वेतकण भी होते हैं । यदि लसीका को चुपचाप छोड़ दिया जाय तो वह जम जाता है । इसका थक्का रक्त की अपेक्षा कम कठिन और कम स्थूल होता है । उसमें तन्तुसार मिश्रण पर उसका थक्का कुछ अधिक कठिन हो जाता है ।

लसीका में स्नेह की मात्रा पाचन के अनुसार भिन्न भिन्न होती है । स्नेह-प्रधान भोजन के बाद शीघ्र ही लसीका का रूप दुग्ध के समान सफेद और गाढ़ा हो जाता है । यह अम्लारस में स्नेह की उपस्थिति का परिणाम होता है और इसीलिए उदर की अन्तर्मुखवादिनी रसायनियों पयस्विनी कहलाती हैं ।

सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखने पर पारदर्शक लसीका में अनेक रंगरहित कण पाये जाते हैं जिन्हें लसीकाणु (Lymph-Corpuscles or lymphocytes) कहते हैं और जो श्वेतकण के सदृश ही होते हैं । इनमें बड़े केन्द्रक तथा थोड़ा कोपस्तर होता है तथा जमीविक गति भी इनमें देखी जाती है । विभिन्न प्राणियों में इनकी संख्या में अन्तर होता है तथा एक ही प्राणी में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भी अन्तर देखा जाता है । लसीका में उनकी संख्या उतनी ही होती है जितनी श्वेतकणों की रक्त में ।

ये लसीका के साथ रक्त में चले जाते हैं और तब उनकी संज्ञा श्वेतकण (Leucocytes) हो जाती है । ये लसीकाप्राणियों तथा अन्य लसीकातन्तुओं

यथा उपजिह्विका, घालग्रैवेयक, प्लीहा आदि में उत्पन्न होते हैं। इन स्थानों से बाहर निकलने वाली लसीका में आनेवाली लसिका की अपेक्षा लसीकाणुओं की संख्या अधिक होती है।

लसीकासंस्थान (Lymphatic system)

लसीका का अधिष्ठान लसीकासंस्थान है जिसमें लसीकावकाश (Lymph spaces) तथा रसायनियाँ आती हैं। उसका विवरण निम्नलिखित है:—


सर्वप्रथम लसीका तन्तुओं के असंख्य सूक्ष्म तथा अनियमित लसिकावकाशों में प्रकट होती है। ये अवकाश परस्पर अनेक प्रकार से सूक्ष्म रसायनियों के द्वारा संबद्ध हैं। ये रसायनियाँ छोटी सिराओं के समान अत्यन्त कोमल दीवाल तथा अत्यधिक कपाटों से युक्त होती हैं। छोटी छोटी रसायनियाँ कोशिकाओं के समान कोषाणुओं के केवल एक स्तर से ही घनी होती हैं और उन्हीं के समान उनमें कमेदस आदीसूत्रों का वितरण होता है।

—मवीनतम सिद्धान्त के अनुसार तन्वकाश सीधे रसायनियों में नहीं खुलते। अतः लसीकावकाशों में स्थित तन्तुद्रव तथा रसायनियों में बढ़ती हुई लसीका में भेद है। छोटी छोटी रसायनियाँ परस्पर मिलकर बड़ी बड़ी रसायनियों का रूप धारण करती हैं और उनसे भी अन्त में दो मुख्य शाखाएँ बनती हैं।—एक वाम रसकुल्या तथा दूसरी दक्षिण रसकुल्या। दक्षिण रसकुल्या बहुत छोटी होती है और उसमें शरीर के बहुत थोड़े भाग से रसायनियाँ आकर मिलती हैं यथा शिर और ग्रीवा का दक्षिण भाग, दक्षिण शाखा, वक्ष का दक्षिण पार्श्व (आशयों के सहित)। वाम रसकुल्या में शरीर के शेष भाग, जिसमें पाचन-नलिका भी सम्मिलित है, से रसायनियाँ आकर मिलती हैं। इन दोनों प्रधान नलिकाओं में कपाटों का बाहुल्य होता है, जिससे लसीका पीछे की ओर नहीं लौट सकती। यह दोनों नलिकाएँ आन्तर्यन्तर अनुमन्या तथा अक्षधरा सिराओं के संगमस्थल पर समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक नलिका के खुलने के स्थान पर एक कपाट होता है जो लसीका को शिराओं में प्रविष्ट होने देता है, किन्तु रक्त को नलिकाओं में नहीं जाने देता।

कुछ रसायनियाँ फुफुसावरण, उदरावरण आदि स्नेहिक गुहाओं से होकर आती हैं। रसायनियों के बीच बीच में लसीकापन्यियाँ होती हैं।

लसीकाग्रन्थियां (Lymphatic glands)

सभी रसायनियां अपने मार्ग के किसी न किसी भाग में लसीकाग्रन्थियों से होकर गुजरती हैं । इन ग्रन्थियों में लसीकाणुओं का निर्माण होता है । यह आकार में गोल या अंडाकार होती है और इनकी आकृति वृक्क के समान होती है । सब से बाहर की ओर संयोजक तन्तु का एक कोप होता है जिसमें कुछ अरेखाकित पेशीसूत्र भी रहते हैं । कोप से बहुत से प्रवर्धन ग्रंथि के भीतर वृन्त की ओर जाते हैं जिन्हें कोपांकुर (Trabeculae) कहते हैं ।



चित्र २७—लसीकाग्रन्थि

१ अन्तर्मुखी रसायनियां २ बहिर्मुखी रसायनियां ३ सैरिक कोपावरण ४ अन्त रंस्तु ५ लसीकातन्तु ६ लसीकापय ७ बहिर्वंस्तु ८ कोपांकुर ।

ग्रन्थि के बाह्य या उन्नतोदर भाग में ये प्रवर्धन बड़े होते हैं और इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनसे ग्रन्थि का बाह्य भाग अनेक कोष्ठों में विभक्त हो जाता है जिन्हें लसीकाकोप (Alveoli) कहते हैं । इन कोष्ठों में जाल के समान लसीकातन्तु भरा रहता है जिसके बीच बीच में लसीकाणु भरे रहते हैं ।

ग्रन्थि का आग्नेयन्तर भाग दो भागों से घना है :- बाहरी (Cortical) भाग कुछ हलके रंग का तथा भीतरी भाग कुछ लाली लिए हुए होता है । भीतरी भाग में प्रवर्धन की अनेक शाखायें होती हैं और यह आपस में इस प्रकार मिली रहती हैं कि एक जाल सा घन छाता है । बाहरी भाग के लसीकाकोष तथा भीतरी भाग के जालक में कोष के केवल मध्यभाग में लसीकातन्तु होता है । इस मध्यभाग के चारों ओर तथा इसके और प्रवर्धन के बीच में जालकतन्तु से निर्मित खुले हुए मार्ग होते हैं जिन्हें लसीकापथ (Lymph path) कहते हैं ।

अनेक अन्तर्गामी नलिकाओं से लसीका ग्रन्थि में प्रविष्ट होती है । ये नलिकायें ग्रन्थि के उन्नतोदर भाग में कोष को पारकर लसीकापथों में खुलती हैं । नलिकाओं के सभी आवरण बाहर ही रह जाते हैं और यह केवल अन्तःस्तर को लेकर ही भीतर जाती है जो लसीकापथों के अन्तःस्तर से मिलकर एकत्र हो जाता है । इसी प्रकार छोटे छोटे बहिर्गामी खोतों के मिलने से एक खोत बनता है जो छुन्तभाग में ग्रन्थि से बाहर निकलता है ।

कुछ प्राणियों तथा शरीर के कुछ भागों में इन ग्रन्थियों का रंग लाल होता है । इन्हें लोहित लसीकाग्रन्थि (Haemal lymphglands) कहते हैं और उनकी रसायनियों में रक्त भर रहता है ।

लसीका का प्रवाह

२४ घण्टों में लसीकापथों में निकल कर रक्त में प्रविष्ट होने वाली लसीका का परिमाण बहुत अधिक होता है । यह देखा गया है कि आहार पूरा मिलने पर रक्त के बराबर परिमाण में ही लसीका २४ घण्टों में उरस्या नलिका (रस-कुल्या) से गुजरती है । इसलिए यह स्पष्ट है कि लसीकासंस्थान में लसीका का प्रवाह अतिशीघ्रता से होना चाहिये । रक्तसंवहन को बनाये रखने के लिए जिस प्रकार हृदय की व्यवस्था है, उस प्रकार लसीका के संवहन के लिए कोई हृदय नहीं होता । अतः लसीका की आगे की ओर गति निम्नांकित कारणों पर निर्भर रहती है :—

(१) दबाव का अन्तर :—भौतिक नियमों के अनुसार द्रवपदार्थ अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहता है । लसीका के उत्पत्तिस्थान (लसीका-

काशों) तथा लक्ष्यस्थान (प्रीवा की सिराओं) के दबाव में बहुत अन्तर होता है । लसीकावकाशों में यह दबाव लगभग २० मिमीमीटर और सिराओं में लगभग शून्य के बराबर होता है । अतः इसी दबाव के अन्तर से लसीका का प्रवाह आगे की ओर होता रहता है ।

(२) वक्षीय चूषण (Thoracic aspiration) —

(क) नियमित प्रश्वास के द्वारा रसकुल्या से खिंच कर लसीका सिराओं में प्रविष्ट होती है ।

(ख) प्रश्वास के समय वक्ष का विस्तार होने से रसकुल्या प्रसारित होती है और छोटी छोटी रसायनियों से उसमें लसीका अधिक परिमाण में आने लगती हैं ।

(३) रसायनियों का नियमित सकोच ।

(४) शरीर की चेष्टायें तथा कपाट ।

शरीर पेशियों के सकोच से रसायनियों पर जो दबाव पड़ता है उससे भी लसीका के प्रवाह में बहुत सहायता मिलती है । रसायनियों में जो कपाट होते हैं उनसे लसीका पीछे की ओर नहीं छीट पाती ।

लसीका का निर्माण

रक्तवह स्रोतों से छन कर रक्तस के लसीकावकाशों में आने के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं । इनमें अभी दो विचार मुख्य हैं.—

(१) केशिकाओं में जय रक्त बहता है तब स्यन्दन और प्रसरण की भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा रक्तस से लसीका का निर्माण होता है ।

(२) केशिकाओं की दीवाल बनाने वाले अन्त स्तर के कोषाणुओं की सक्रिय उद्देचक प्रक्रियाओं से लसीका का निर्माण होता है ।

लुडविग का मत (Ludwig's theory)

इसका मत है कि लसीका निर्माण सीधे रक्तस से केशिकाओं की दीवाल से स्यन्दन और प्रसरण की विधियों से होता है ।

इसके पक्ष में निम्नांकित प्रमाण हैं:—

(१) केशिकाओं में स्थित रक्त का दबाव बाहरी तन्तुओं की अपेक्षा अधिक

होता है। इसलिष्ट पतली केशिकाओं की दीवारों से रक्तस्रस छन जाता है। इस दृष्टि से लसीका निःस्यन्दित पदार्थ है।

(२) केशिकाओं के दबाव को यदलने वाले कारणों का प्रभाव उन्व लसीका के परिमाण पर भी पड़ता है यथा:—

(क) यदि केशिकागत दबाव बढ़ जाय, यथा तिराओं के रक्तस्रवहन में बाधा होने से, तो उत्पन्न लसीका का परिमाण बढ़ जाता है।

(ख) यदि लसीकायकाओं का दबाव घटा दिया जाय तो लसीका का स्राव बढ़ जाता है।

(३) लसीका का संघटन भी इस मन्त्र का समर्थन करता है। लसीका में निरिन्द्रिय लवणों की सान्द्रता रक्तस्रस के समान ही होती है तथा मांसतत्व उससे कम होता है। इसका आधार भी यही भौतिक नियम है कि सजीव कलाओं से पिच्छिल पदार्थों के छनने पर निःस्यन्दित द्रव मातृद्रव से अधिक छनू होता है।

इसके विपक्ष में प्रमाण

(१) केवल प्रसरण से ही लसीका का निर्माण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि रक्तस्रस के मांसतत्व लगभग अप्रसरणशील हैं, फिर भी लसीका में मांसतत्व पर्याप्त परिमाण में पाया जाता है।

(२) कुछ अवस्थाओं में केशिकागत दबाव बढ़ने पर भी लसीका का प्रवाह नहीं बढ़ता। हन्वधरीय ग्रंथि पर पेट्रोपिन का प्रयोग करने से Chorda tympani नाडी की उत्तेजना के कारण यद्यपि रक्तस्रवहनों का प्रसार हो जाता है तथापि स्राव की वृद्धि नहीं होती।

(३) कुछ अवस्थाओं में लसीकाप्रवाह बढ़ जाता है, यद्यपि केशिकागत दबाव नहीं बढ़ता। यथा पेक्टोन, जलौकास्रव आदि द्रव्यों का अतःशेष करने पर लसीकाप्रवाह बढ़ जाता है, किन्तु रक्तभार पर कोई प्रभाव देखने में नहीं आता।

(४) केशिकागत दबाव से स्वतन्त्रतया लसीका के संघटन में अन्तर हो सकता है।

शरीर के विभिन्न भागों की लसीका के संघटन में अन्तर होता है यथा वृक्क से आई हुई लसीका में घनभाग अधिक होते हैं, यद्यपि वहाँ की केशिकाओं में

प्रवाह अधिक नहीं होता । इसके अतिरिक्त एक ही केशिका से आई हुई लसीका के संघटन में अवस्थाओं के अनुसार भेद हो सकता है ।

(५) दबाव के विपरीत भी लसीकावाहकों से अनेक पदार्थ रक्तनलिकाओं में चले आते हैं ।

निस्यन्दन की भौतिक विधि में केवल एक ओर की ही द्रव पदार्थ की गति होती है, किन्तु सजीव शरीर में केशिका की दीवारों से दो विरुद्ध दिशाओं में पदार्थों का आवागमन होता है । तन्तुओं के लिए पोषक पदार्थ केशिकाओं से बाहर निकल कर तन्तुओं में जाता है, किन्तु तन्तुओं से मूलभाग विपरीत दिशा में केशिकाओं में प्रविष्ट होते हैं ।

हीडेनहेन का मत (Høidenbain's theory)

इनका मत है कि लसीका का निर्माण केशिकाओं के अन्तःस्तरीय कोषाणुओं की विशिष्ट उद्देचन क्रिया के कारण होता है ।

इसके पक्ष में निम्नांकित प्रमाण हैं:—

(१) सखशर्करा, लवण आदि के अतिसान्द्रक विलयन का अन्तःक्षेप करने से रक्तभार में बिना परिवर्तन हुये ही लसीका का प्रवाह बढ़ जाता है । इन पदार्थों को द्वितीय श्रेणी का लसीकासाधक (Lymphagogues of the 2nd class) कहते हैं ।

हीडेनहेन के मत के अनुसार जब इन पदार्थों का रक्त में अन्तःक्षेप किया जाता है तब केशिकाओं के अन्तःस्तरीय कोषाणुओं की उद्देचन क्रिया के द्वारा ये निकल कर तन्तुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार तन्तुओं में द्रव का व्यापनभार अधिक होने से रक्त से जल खिंचने लगता है और लसीका का साव बढ़ जाता है ।

(२) कुछ द्रव्यों, यथा पेप्टोन का जलीय सघ, अण्डे का श्वेतभाग, जली-कासख, केकड़े की पेशियों का सार, का अन्तःक्षेप करने से लसीका का प्रवाह बढ़ जाता है । ये द्रव्य प्रथम श्रेणी का लसीकासाधक (Lymphagogues of the 1st class) कहलाते हैं । इनसे घमनीगत रक्तभार में वृद्धि नहीं होती, किन्तु यदि अधिक मात्रा में प्रयुक्त किये जाय तो रक्तभार कम हो जाता है ।

हीटनेहेत के अनुसार ये द्रव्य केशिकाओं के अन्तःस्तरीय कोषाणुओं के प्रति विशिष्ट उत्तेजक का कार्य करते हैं और उनकी उद्देचन क्रिया बढ़ा देते हैं।

(३) अधरा महासिरा का सन्धन करने से केवल लसीका के प्रवाह में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि लसीका में मांसतन्त्र की सान्द्रता भी बढ़ जाती है।

स्टार्लिंग का मत (Starling's theory)

इनके मत में लसीका का निर्माण निम्नांकित तीन कारणों पर निर्भर है:—

१. अन्तःकेशिकाभार (Intracapillary pressure)

२. केशिका की दीवारों की प्रवेश्यता (Permeability)

३. तन्तुओं की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न मलपदार्थों के परिमाण पर निर्भर रासायनिक कारण।

इस मत के पक्ष में निम्नांकित प्रमाण हैं:—

(क) अन्तःकेशिका भार के बढ़ने से लसीकाप्रवाह में वृद्धि।

(१) रक्तसंवहन में अधिक परिमाण में द्रव का अन्तःक्षेप या

(२) सत्वशर्करा, लवण आदि का अन्तःक्षेप

उपर्युक्त द्रव्यों से लसीकाप्रवाह की वृद्धि के सम्बन्ध में स्टार्लिंग निम्नांकित रूप में विवेचना उपस्थित करते हैं:—

इन द्रव्यों का अन्तःक्षेप करने से रक्त का व्यापनभार अत्यधिक बढ़ जाता है जिसके कारण लसीका तथा तन्तुओं से जलेश खिंचकर रक्त में चला जाता है और फलस्वरूप केशिकाओं का दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने से निस्त्यन्त्र की क्रिया बढ़ जाती है और इसलिए लसीका का प्रवाह बढ़ जाता है।

(३) किसी अंग की सिराओं का सन्धन—

जब कभी सिरागत रक्तप्रवाह में रुकावट होती है तब अन्तःकेशिकाभार बढ़ जाता है। इससे लसीका की उत्पत्ति बढ़ जाती है और तन्तुओं में उसका संचय होने के कारण शोथ हो जाता है।

अधरा महासिरा को बाँध देने से केवल लसीका का प्रवाह ही नहीं बढ़ता, बल्कि मांसतन्त्र का प्रतिशत परिमाण भी बढ़ जाता है। यकृत में उत्पन्न लसीका की जो अधिक सान्द्रता होती है, वह भी यहाँ की केशिकाओं की अधिक सवे-

यता के कारण ही होती है । कौंग के मत के अनुसार अधस्वक् तथा पेशीतन्तु ही केशिकायें मांसतरव के लिए अप्रवेश्य हैं ।

(ख) केशिकाओं की दीवारों की प्रवेद्यता बढ़ने से लसीका प्रवाह में घृद्धि:—

(१) रक्तग्रहसङ्कोचक नाडियों का व्यवच्छेद:—

इससे केशिकाओं का प्रसार होने से उनकी प्रवेद्यता बढ़ जाती है और लसीका का प्रवाह बढ़ जाता है ।

(२) रक्तग्रहप्रसारक नाडियों की उत्तेजना:—

इसका प्रभाव भी उपर्युक्त रीति से ही होता है ।

(३) केशिकाओं में स्थानीय घत या

(४) पेप्टोन, जलौक्यासव आदि का अन्तःक्षेप—

इन द्रव्यों के अन्तःक्षेप से केशिकाओं का अन्तःस्तर विकृत हो जाता है जिससे उनकी प्रवेद्यता बढ़ जाती है । अतः लसीका का प्रवाह भी बढ़ जाता है ।

(५) हिस्टेमीन, एसिडिल कोलीन का अन्तःक्षेप:—

इससे भी केशिकाओं का प्रसार होता है और उनकी प्रवेद्यता बढ़ जाती है । इसलिये लसीका का प्रवाह बढ़ जाता है । दुग्धमग्न आदि में भी जब तन्तुओं के विवटन से हिस्टेमीन उत्पन्न होता है तब भी यही बात देखने में आती है ।

(६) रक्त में खटिक की कमी—

(७) ओपजन की कमी—

ओपजनकी कमी तथा रक्तस के मांसतरव में परिवर्तन होने से प्रवेद्यता बढ़ जाती है । केशिकाओं की प्रवेद्यता तथा रक्त और तन्तुओं के बीच पदार्थों का विनिमय अन्तःस्त्रावों के द्वारा नियन्त्रित होता है । इसमें अधिष्ठक ग्रंथि के बाह्यभाग का अन्तःस्त्राव (Cortin) मुख्य है ।

(ग) तीसरा कारण विशेषतः शाखाओं में महस्व का है और तन्तुओं की क्रिया के कारण उत्पन्न मलपदार्थों पर निर्भर रहता है । जब पेशियों में संकोच होता तो मलपदार्थ (दुग्धाम्ल) अधिक मात्रा में बनते हैं जो तन्तुओं में जाकर व्यापनकार बढ़ा देते हैं और फलस्वरूप रक्त से अधिक परिमाण में जलौक्य खिंच कर लसीकावकाशों में चला आता है ।

तन्तुओं की क्रियाशीलता के कारण भी लसीका का उत्पादन बढ़ जाता है। पित्तलवणों का अन्तःश्लेष करने से यकृत के कोषाणु उत्तेजित हो जाते हैं और यकृत की क्रिया बढ़ जाने के कारण उस अंग से लसीका का प्रवाह बढ़ जाता है।

(घ) रसायनीसंस्थान में अवरोध होने से लसीका का प्रवाह बढ़ जाता है।

लसीका के प्रवाह में जब रुकावट होती है तब लसीकाणुओं का संचय होने से लसीका बाहर निकल नहीं पाती और तन्ववकाशों में उसका संचय होने से शोथ उत्पन्न हो जाता है।



पञ्चम अध्याय

रक्तवहसंस्थान

सम्पूर्ण शरीर में रक्त का संवहन निरन्तर होता रहता है जिससे शरीर के धातुओं को शुद्ध वायु एवं पोषक तत्व प्राप्त होता रहता है तथा मलों का निर्हरण भी होता रहता है। यह रक्तसंवहन का कार्य जिन अंगों के द्वारा संपन्न होता है उन सबको सम्मिलित रूप से रक्तवहसंस्थान की संज्ञा दी गई है। इस संस्थान में हृदय, (रक्तशेपक अंग) धमनियों, (हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाले स्रोत) सिराओं (रक्त को लौटा कर हृदय में ले आने वाले स्रोत) तथा केशिनाओं (धमनियों तथा सिराओं के मध्य में विस्तृत जालरूप) का समावेश होता है।

हृदय


यह रक्तवहसंस्थान के एक बृहत् पेसीमय ध्मापक के रूप में वक्ष में दोनों फुफ्फुसों के बीच में स्थित है। इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे 'हृदयावरण' कहते हैं। उसके दो स्तर होते हैं—सौष्रिक और स्नेहिक। आवरण का स्नेहिक स्तर हृदय के बाह्य स्तर से मिला रहता है। इस प्रकार हृदयावरण के स्नेहिक स्तर तथा हृदय के बाह्य स्तर के मिलने से उनके मध्य में एक कोष बन जाता है जिसमें स्नेह का कुछ अंश भराकर रहता है। इससे, दोनों गृह घिकने रहते हैं और हृदय की गति के समय उनमें परस्पर घर्षण नहीं होने

पाता । हृदय के बाह्य स्तर में स्थितिस्थापक सूत्रों की उपस्थिति से हृदय के स्वाभाविक संकोचप्रसार में कोई बाधा नहीं होती और हृदयावरण के बाह्य सौत्रिक स्तर के कारण हृदय का आकार सीमित एवं सुरक्षित रहता है तथा उसका प्रसाराधिक्य नहीं होने पाता ।

हृदय के कोष्ठ

हृदय का आन्तरिक प्रदेश एक लम्बे विभाजन के द्वारा वाम और दक्षिण दो पेशीमय कोष्ठों में विभक्त हो जाता है । ये दोनों कोष्ठ पुनः एक अनुप्रस्थ

विभाजन के द्वारा ऊर्ध्व और अधः दो भागों में विभक्त हो जाते हैं जिन्हें क्रमशः अलिन्द (Auricle) और निलय (Ventricle) कहते हैं । अलिन्द रक्त को ग्रहण करता है । अतः उसे प्राहक कोष्ठ भी कहते हैं । इसी प्रकार निलय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रेषित करता है, इस कारण उसे वीरक कोष्ठ भी कहते हैं । अलिन्द और निलय के बीच में एक द्वार होता है जिससे ये दोनों कोष्ठ परस्पर संबद्ध रहते हैं । इन द्वारों पर ऐसे कपाट लगे रहते हैं जो रक्त को अलिन्द से निलय में जाने देते हैं, पर विपरीत दिशा में लौटने नहीं देते । इस प्रकार वाम अलिन्द, वाम निलय, दक्षिण अलिन्द तथा दक्षिण निलय ये चार हृदय के कोष्ठ होते हैं । वाम भाग में



चित्र २८—हृदय

शुद्ध तथा दक्षिण भाग में अशुद्ध रक्त रहता है और ये दोनों प्रकार के रक्त अनुलम्ब विभाजन के द्वारा एक दूसरे से पृथक् रहते हैं । ये कोष्ठ भीतर की ओर एक सूक्ष्म कला से आवृत हैं जिसे आन्तरिक कला कहते हैं । यही कला रक्तमय छोटों के अन्तःपृष्ठ को भी आवृत करती है और रक्तधरा कला की संज्ञा ग्रहण करती है ।

दक्षिण अलिन्द

इसके एक कोण में जिह्वा के आकार का एक निकला हुआ भाग रहता है जिसे 'दक्षिण अलिन्दपुच्छ' कहते हैं। इस कोष्ठ में संपूर्ण शरीर के अंगों से रक्त लाकर उत्तरा एवं अधरा महासिराये खुलती हैं। अधरा महासिरा का द्वार एक कपाट से सुरक्षित एवं अंशतः आवृत है जिसे 'महासिरा कपाट' कहते हैं। कोष्ठ की पश्चिम भित्ति में एक हल्का सा खात है जिसे 'अण्डाकार खात' कहते हैं। इसके द्वारा रक्त गर्भ के शरीर में दक्षिण अलिन्द से सीधे वामभाग में पहुंच जाता है। उस समय फुफुसों के निष्क्रिय होने के कारण रक्त को वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

दक्षिण निलय

हृदय के अधिकांश पूर्वपृष्ठ में यह रहता है, किन्तु हृदय के अग्रभाग के निर्माण में इसका कोई भाग नहीं रहता। दक्षिण अलिन्द और निलय के बीच में जो द्वार होता है उस पर त्रिपत्र कपाट (Tricuspid valve) लगा रहता है। इसी कपाट से होकर रक्त दक्षिण अलिन्द से इस कोष्ठ में आता है। यहां से रक्त फुफुसी धमनी में चला जाता है जिसका द्वार पुफुसी कपाट (Pulmonary valve) से सुरक्षित है।

वाम अलिन्द

यह कोष्ठ फुफुसों से चार सिराओं द्वारा लौटे हुये रक्त को ग्रहण करता है। इसके और वामनिलय के बीच के द्वार पर द्विपत्र कपाट (Bicuspid valve) लगा रहता है जिससे रक्त इस कोष्ठ से होकर वाम निलय में चला जाता है।

वाम निलय

इसकी भित्ति मनुष्य में दक्षिण निलय की अपेक्षा तीन गुना अधिक मोटी होती है क्योंकि इसे रक्त को सम्पूर्ण शरीर में पहुंचाना पड़ता है और इस प्रकार इस पर कार्यभार अधिक हो जाता है। यहां से रक्त महाधमनी में जाता है जिसका द्वार 'महाधमनी कपाट' (Aortic valve) द्वारा सुरक्षित रहता है।

कपाट

हृदय में कपाटों की व्यवस्था ऐसी है कि उनके द्वारा रक्त की गति एक ही दिशा में सम्भव है। त्रिपत्र कपाट में तीन तथा द्विपत्र कपाट में दो पत्रक होते

हैं। प्रत्येक पत्रक त्रिकोणाकार होता है, जिसका आधार पार्श्ववर्ती भागों से मिल कर एक वृत्ताकार कला बनाता है जो अलिन्द निलय द्वार के चारों ओर एक कण्डरामुद्रिका के द्वारा स्थिर रहती है तथा धारयें कण्डरारज्जुओं के द्वारा निलय के अन्तःपृष्ठ से उद्भूत कपाटस्तम्भिका पेशियों से सम्बद्ध रहती हैं जिससे निलय के संकोच के समय कपाट स्थिर रहते हैं।

द्विपत्र तथा त्रिपत्र कपाट रचना में समान होते हैं, किन्तु अधिक भार सहन करने के कारण द्विपत्र कपाट अधिक स्थूल तथा दृढ होते हैं। त्रिपत्र कपाट पूर्णतया चन्द नहीं होता, अतः रक्त का कुछ अंश लौट कर पुनः अलिन्द में चला जाता है। द्विपत्र कपाट पूर्णतः चन्द हो जाता है। फुकुसी और महाधमनी कपाट अर्धचन्द्राकार होते हैं, इसलिए उन्हें अर्धचन्द्रकपाट भी कहते हैं। महाधमनी कपाट अधिक भार वहन करने के कारण अधिक दृढ होते हैं। प्रत्येक अर्धचन्द्रकपाट में तीन अर्धचन्द्राकार भाग होते हैं जिनकी उन्नतोदर धारा निलय तथा धमनी के संयोगस्थल पर एक सौत्रिक चक्र के द्वारा जुड़ी रहती है और नतोदर धारा स्वतन्त्र रहती है। इस प्रकार उसका आकार जेब के समान हो जाता है। इस कोपाकार भाग के केन्द्र में एक सौत्रिक ग्रन्थि होती है। निलय से रक्त जाते समय ये कोप पृथक् पृथक् हो जाते हैं, किन्तु शीघ्र ही वह परस्पर मिल जाते हैं, जिससे रक्त लौटने नहीं पाता। महाधमनी तथा फुकुसी धमनी की भित्ति के बाहर इन अर्धचन्द्राकार कपाटखण्डों के सूचक उभार होते हैं जिन्हें स्रोतःकोप कहते हैं। रक्तसंवहन के समय कुछ रक्त इन कोपों में चला जाता है जिससे ये कपाट स्थिर रहते हैं तथा प्रसार के समय कपाटों के चन्द होने में भी इनसे सहायता मिलती है। इन्हीं के समीप हार्दिक धमनी का द्वार होता है जिस पर हार्दिक कपाट लगा रहता है।

कपाटों की सूक्ष्मरचना

कपाट हृदय की आन्तरिक कला के दो स्तरों से बने होते हैं।

हृदय की सूक्ष्मरचना

सूक्ष्म रचना की दृष्टि से हृदय में तीन स्तर होते हैं:—

१. बाह्यस्तर २. मध्यस्तर ३. अन्तःस्तर

१. बाह्यस्तर

इसका वर्णन पूर्व में हो चुका है और इसका सम्बन्ध हृदय की रक्षा से होता है।

२. मध्यस्तर

यह हृदय के बीच का स्तर होता है जिसमें पेशी का भाग सबसे प्रधान होता है। इसलिए इसे 'हृत्पेशीस्तर' भी कहते हैं। इसमें तीन प्रकार के पेशी-सूत्र होते हैं:—

(क) अलिन्द सूत्र (Auricular fibres)

(ख) निलय सूत्र (Ventricular fibres)

(ग) अलिन्द निलय गुच्छ (Auriculo-ventricular bundle or bundle of his.)

(क) अलिन्दसूत्र

ये सूत्र दो स्तरों में व्यवस्थित हैं उच्च और गम्भीर। उच्च सूत्र अनुप्रस्थ दिशा में दोनों अलिन्दों में समान रूप से फैले होते हैं। गम्भीर सूत्र दोनों अलिन्दों में पृथक् अवस्थित होते हैं। इनमें कुछ मुद्रिकाकार तथा कुछ ग्रन्थि-युक्त सूत्र होते हैं।

(ख) निलयसूत्र

इनकी व्यवस्था अत्यधिक जटिल होती है। इनके भी दो स्तर होते हैं, उच्च और गम्भीर। ये सूत्र हृदय के विभिन्न भागों से निकल कर अन्त में कपाटस्थानिका पेशियों से सम्बद्ध हो जाते हैं।

(ग) अलिन्दनिलय गुच्छ

इसके द्वारा अलिन्द और निलय साक्षात् रूप से संबद्ध रहते हैं। इसका प्रारम्भ दो ग्रन्थियों के रूप में होता है जिन्हें क्रमशः 'सिरालिन्दग्रन्थि' (Sino-Auricular node) तथा 'अलिन्दनिलयग्रन्थि' (Auriculo-Ventricular node) कहते हैं। सिरालिन्द ग्रन्थि उत्तरा महासिरा के द्वार पर अवस्थित है तथा अलिन्द निलय ग्रन्थि हार्दिक घमनी के तनिक ऊपर रहती है। अलिन्दनिलयग्रन्थि से चलकर अलिन्दनिलयगुच्छ निलयविभाजन के पास पहुँच

कर वाम और दक्षिण दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है जो विभाजक प्राचीर के दोनों पार्श्वों में आन्तरिक कला से आवृत होकर नीचे की ओर दोनों निलयों में चली जाती हैं । दक्षिण शाखा शामक रज्जु में परिणत हो जाती है और शाखा प्रशाखाओं में विभक्त होकर अन्त में कपाटस्तम्भिका पेशियों तथा दक्षिण निलय की भित्तियों में विलीन हो जाती है । वाम शाखा पूर्व और पश्चिम दो भागों में विभक्त हो कर पूर्ववत् निलय में फैल जाती है । इस गुच्छ में हृत्पेशी से भिन्न पेशीसूत्र होते हैं, जिन्हें 'पर्किन्जस सूत्र' (Purkinje's Fibres) कहते हैं । इन पेशीसूत्रों में हृत्पेशी की अपेक्षा शर्कराजन का परिमाण अधिक होता है । इस गुच्छ का कार्य है अलिन्दगत उत्तेजना को निलय तक पहुँचाना ।

अन्तःस्तर

यह एक चिकनी और पतली कला के रूप में है जो हृदय के कोष्ठों को भीतर से आवृत करती है और बड़ी बड़ी धमनियों की आन्तरिक कला से मिल जाती है । इसी के दोहरे स्तर से हृदय के कपाटों का निर्माण होता है । यह संयोजक तन्तु से घनी है जिसमें कुछ स्थितिस्थापक सूत्र भी मिले रहते हैं । इसी से संबद्ध कुछ सौम्रिक चक्र अलिन्द, निलय तथा धमनियों के द्वार पर लगे रहते हैं जिनके आधार पर कोष्ठ की पेशियां तथा द्वार के कपाट स्थिर रहते हैं ।

हृदय का पोषण

दक्षिण और वाम हार्दिक धमनियाँ, जो महाधमनी की शाखाएँ हैं, हृदय को रक्तपदान करती हैं । अधिकांश सिराएँ हार्दिक सिरापरिवाहिका के द्वारा दक्षिण अलिन्द में खुलती हैं ।

रसायनी

हृदय में रसायनियाँ दो जालकों के रूप में रहती हैं । प्रथम गभीर जालक है जो ठीक आन्तरिक कला के नीचे रहता है और द्वितीय उत्तान जालक है जो हृदयावरण के स्नेहिक स्तर के नीचे रहता है ।

नाड़ियाँ

प्राणदा नाड़ी तथा सांविदनिक नाड़ी के सूत्रों से हार्दिक चक्र का निर्माण होता है और इसी चक्र से नाड़ियाँ निकल कर हृदय में फैल जाती हैं ।

रक्तवह स्त्रोतों की सूक्ष्मरचना

धमनियाँ—धमनियों का मूल भाग वामनिलय से महाधमनी के रूप में प्रारंभ होता है। महाधमनी के उद्गम के बाद ही उससे दो हार्दिक धमनियाँ निकल कर हृदय में प्रविष्ट हो जाती हैं और इसके बाद महाधमनी की शाखाएँ संपूर्ण शरीर में पहुंच कर अंगों को रक्त प्रदान करती हैं। जैसे जैसे यह शाखाएँ आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इनका आकार सूक्ष्म होता जाता है और इन्हें सूक्ष्म धमनियों की विशिष्ट संज्ञा प्राप्त होती है। यह सूक्ष्म धमनियाँ और आगे बढ़ने पर जालक के रूप में फैल जाती हैं जिन्हे कैपिल्ला कहते हैं। मृत्यु के बाद, दीवाल मोटी होने के कारण धमनियाँ सिराओं की भांति अच्छी तरह सिकुड़ नहीं पाती और खाली रहती हैं। अवकाशयुक्त होने के कारण ही प्राचीन विज्ञान जसे वायुपूर्ण समझते थे और इसीलिये उसकी संज्ञा भी 'धमनी' (भ्रानान्नमन्यः) दी गई है।

रचना

धमनी की दीवाल निम्नलिखित स्तरों से बनी होती है:—

(१) बाह्यप्राचीरिका—यह तब से बाहर का स्तर है जो रनायुसूत्रों से बना होता है।

(२) मध्यप्राचीरिका—धमनी की दीवाल का अधिक भाग इसी स्तर से निर्मित होता है। इसमें पेशीसूत्र तथा स्थितिरथापक सूत्र दोनों होते हैं। पेशीसूत्र अनैच्छिक होते हैं तथा अनुग्रह्य रीति से अवस्थित होते हैं। इन्हीं के बीच बीच में स्थितिरथापक सूत्र होते हैं। आकृति के अनुसार पेशीसूत्रों तथा स्थितिरथापक सूत्रों के अनुपात में अन्तर होता है। बड़ी धमनियों में स्थितिरथापक सूत्र अधिक तथा मध्यम एवं छोटे आकार की धमनियों में पेशीसूत्र अधिक होते हैं।

(३) अन्तःप्राचीरिका—यह स्थितिरथापक तन्तु के स्तर से बनी होती है। इसके अन्तःपृष्ठ पर आन्तरिक कला लगी रहती है जिससे वह चिकना हो जाता है और रक्त के प्रवाह में कोई अवरोध नहीं होता। आन्तरिक कला के बाहर की ओर संयोजक तन्तु का एक स्तर होता है जिसे उपान्तरिक कला कहते हैं। इस प्रकार अन्तःप्राचीरिका तीन भागों से बनी होती है:—

(क) आन्तरिकला, (ख) 'उपान्तरिक कला, (ग) स्थितिस्थापक स्तर ।

धमनियों का पोषण

धमनियों का पोषण छोटी छोटी धमनियों के द्वारा होता है जिन्हें 'छोतःपोषक धमनियाँ' कहते हैं । ये धमनियाँ बाह्य प्राचीरिका में शाखा प्रशाखाएँ देती हैं और कुछ दूर तक मध्य स्तर में भी पहुँचती हैं, किन्तु अन्तःस्तर में नहीं पहुँच पाती ।

नाड़ियाँ

धमनियों में सांवेदनिक नाड़ीसूत्र आते हैं जो पेशीसूत्रों के बीच बीच में जालकों के रूप में स्थित रहते हैं ।

सिरायें

केशिकाओं के जालक के बाद सिराओं का प्रारम्भ होता है । प्रारंभ में यह बहुत छोटी होती हैं, किन्तु धीरे धीरे आपस में मिलकर इनका आकार बड़ा होता जाता है और अन्त में उत्तरा तथा अधरा महासिराओं, हार्दिकी सिराओं (जो दक्षिण अलिन्द में प्रविष्ट होती हैं) तथा चार कुफुसी सिराओं (जो वाम अलिन्द में प्रविष्ट होती हैं) के रूप में परिणत होती हैं । धमनियों की अपेक्षा सिराओं में दो-तीन गुना अधिक रक्त रहता है ।

रचना

धमनियों के समान सिराओं में भी तीन स्तर होते हैं, किन्तु धमनी की अपेक्षा सिरा में बाह्य और मध्य प्राचीरिका पतली होती हैं । दूसरी विशेषता यह है कि सिराओं में बीच बीच में कपाट होते हैं जो रक्त को पीछे की ओर नहीं लौटने देते हैं । जिन सिराओं पर पेशी का दबाव पड़ता है उनमें कपाटों की संख्या बहुत कम या कभी कभी नहीं भी होती है । इन कपाटों की रचना महा-धमनी के अर्धचन्द्र कपाटों के समान होती है ।

केशिका जालक

सूक्ष्म धमनियों तथा सिराओं के बीच में केशिकाओं का जाल फैला रहता है । यह आन्तरिक कला से बना होता है और इसका स्वरूप एक पारदर्शक झिल्ली के सदृश होता है । कहीं कहीं सूक्ष्म धमनियों तथा सूक्ष्म सिराओं में साक्षात् संबन्ध हो जाता है और उसके बीच में जालक नहीं होता ।

सहायक रक्तसंवहन (Collateral circulation)

जब किसी अंग की मुख्य धमनी या सिरा अवरुद्ध हो जाती है तब सहायक रक्तसंवहन शीघ्र स्थापित हो जाता है और छोटी छोटी रक्तवाहिनियां मदद करती हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि बाह्य धमनी में अवरोध हो जाय तो उसकी कोई शाखा बंदी हो जाती है और बाहु को रक्त प्रदान करती है।

रक्तसंवहन (Circulation of blood)

१६२८ ई० के पूर्व रक्त के कार्य तथा गति के संबंध में अत्यन्त अस्पष्ट भावनायें विद्वत्समाज में प्रचलित थीं। कुछ लोगों के मत में वायु के द्वारा रक्त का सञ्चालन होता था तथा कुछ लोग सूक्ष्म प्राणशक्ति के द्वारा रक्तसंवहन मानते थे। सन् १६२८ ई० में विलियम हार्वे नामक विद्वान् ने यह अनुसन्धान किया कि रक्त शरीर में चक्रवत् परिभ्रमण करता है और जिस स्थान से खलता है पुनः वही पहुँच जाता है। ऐसे अनुसन्धान के लिए एक तो शरीररचना का शुद्ध ज्ञान होना चाहिये तथा उसके आधार पर ही प्रयोग किये जाने चाहिये। रक्त के चक्रवत् परिभ्रमण की पुष्टि के लिए निम्नांकित शरीररचनाओं पर उपर्युक्त विद्वान् ने विचार किया और उन्हें ही अपने प्रयोगों का आधार बनाया:—

१. हृदय से सयत्न दो प्रकार की भिन्न भिन्न नलिकायें हैं जिनमें एक को सिरा तथा दूसरी को धमनी कहते हैं।

२. हृदय तथा सिराओं में कपाट हैं जो रक्त को एक ही दिशा में जाने देते हैं।


चित्र २९

इन रचनाओं के आधार पर हार्वे ने निम्नांकित प्रयोग किये:—

१. जीवित व्यक्ति में धमनियों के छत से रक्त स्पन्दन के साथ वेग से निकलता है। प्रत्येक स्पन्दन हृदय के स्पन्दन के अनुरूप होता है।

२. हृदय के निकट बंदी सिराओं को बाँध देने से हृदय पीला, शिथिल एवं रक्तहीन हो जाता है। बन्धन हटा देने पर रक्त पुनः हृदय में आने लगता है।

३. महाधमनी को बाँध देने पर हृदय रक्त से फूल जाता है और जब तक बन्धन नहीं हटाया जाता तब तक खाली नहीं होता।



४. उपर्युक्त प्रयोग जन्तुओं पर किये गये थे किन्तु मनुष्यों में भी यह देखा गया कि यदि बाहु को हलके बांध दिया जाय तो सिराओं के दब जाने से रक्त लौट नहीं पाता और अंग में शोथ हो जाता है । इसके विपरीत, यदि बन्धन फसकर छराया जाय तो धमनी के दब जाने से अंग में रक्त नहीं पहुँचता और वह पाण्डु और शीत हो जाता है । बन्धन हटा देने से अङ्ग प्राकृतिक स्थिति में आ जाता है ।

५. हावें ने हृदय में रहने वाली रक्त की राशि तथा संपूर्ण शरीर में रहने वाली रक्तराशि को नापा और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हृदय के प्रत्येक स्पन्दन के समय इतनी रक्तराशि बाहर भेजता तभी संभव है जब कि वही रक्त बार बार लौट कर हृदय में आवे ।

६. धमनी में क्षत होने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए क्षत तथा हृदय के बीच में दबाव देना होता है, किन्तु यदि सिरा में क्षत है तो क्षत के स्थान से बाहर की ओर दाबना होता है ।

इस प्रकार हावें ने यह प्रमाणित किया कि हृदय के संकोच के द्वारा रक्त धमनियों में प्रविष्ट होता है और उनके द्वारा धातुओं में पहुँचता है और सिराओं द्वारा पुनः हृदय में लौट आता है । रक्त के चक्रवत् परिभ्रमण के संबन्ध में ज्ञान होने पर भी हावें को धमनियों और सिराओं के पारस्परिक संबन्ध का ज्ञान नहीं था । वह समझते थे कि स्वज्ञ की तरह अंगों के छिद्रों के द्वारा सिरायें और धमनियाँ परस्पर संबद्ध हैं । १६६१ ई० में सर्वप्रथम मैलपिजी नामक विद्वान् ने सिराओं तथा धमनियों के मध्यवर्ती केशिकाजालक का अनुसन्धान किया और १६६८ ई० में लीवेनहूक नामक विद्वान् ने सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से मेढक के पैर में केशिकाओं द्वारा रक्तसंवहन प्रत्यक्ष भी दिखाया । हावें की असफलता का एक कारण यह भी था कि उस समय केशिकाजालक में रक्तसंवहन को देखने के लिए उपयुक्त शक्तिशाली काँचों का भी अभाव था ।

रक्तसंवहन क्रम

हृदय के वाम निलय से रक्त महाधमनी के द्वारा धमनियों में और उनके द्वारा शरीर के धातुओं में पहुँचता है । शरीर के धातुओं से रक्त पुनः सिराओं द्वारा हृदय के दक्षिण अलिन्द में लौट आता है । सूक्ष्म धमनियों और सिराओं

के बीच में केशिकाओं का जालक होता है जहाँ रक्त और धातुओं के बीच तात्त्विक विनिमय होता है। दक्षिण अलिन्द से रक्त दक्षिण निलय में चला जाता है। जब दक्षिण निलय सकुचित होता है, तब रक्त अलिन्द निलयद्वार पर छोड़े हुये कपाटों के बन्द हो जाने से अलिन्द में लौटने नहीं पाता, अतः फुफुसी धमनी में प्रविष्ट हो जाता है। फुफुसी धमनी आगे जाकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है जो दोनों फुफुसों में जाती हैं और इस प्रकार रक्त दोनों फुफुसों में बँट जाता है। फुफुस में स्थित केशिकाजालकों में वितरित होने से रक्त श्वास के द्वारा गृहीत प्राणवायु के संपर्क में आता है। इस प्रकार हृदय के दक्षिण भाग में स्थित अशुद्ध रक्त की शुद्धि फुफुसों में होती है। शोधन के पश्चात् रक्त चमकीले लाल रङ्ग का हो जाता है और वह चार फुफुसी सिराओं द्वारा हृदय के वाम अलिन्द में पहुँचता है। वाम अलिन्द के भर जाने पर वह सकुचित होता है और रक्त वाम निलय में प्रविष्ट होता है। इसी प्रकार वाम निलय भी भर जाने पर जब सकुचित होता है तब रक्त अलिन्द में लौटने की चेष्टा करता है, किन्तु द्विपत्र कपाटों के बन्द हो जाने से वह चेष्टा व्यर्थ हो जाती है और रक्त महाधमनी में प्रविष्ट होता है। महाधमनी में स्थित कपाट भी इसी प्रकार रक्त को पीछे लौटने नहीं देते। महाधमनी में पहुँचने पर रक्त संपूर्ण शरीर में घूम जाता है और घूमने के बाद सिराओं द्वारा पुनः हृदय के दक्षिण अलिन्द में वापस आ जाता है। इसी क्रम से रक्त शरीर में चक्रवत् परिभ्रमण करता है। इस प्रकार संपूर्ण रक्तसंवहन के दो भाग होते हैं जिनमें एक गृह्य तथा दूसरा लघु चक्र कहलाता है। रक्त हृदय के दक्षिण भाग से फुफुसों में जाता है और वहाँ से शुद्ध होकर पुनः वाम भाग में लौट आता है। इसी को लघु चक्र या फुफुसीय रक्तसंवहन करते हैं। दूसरा चक्र हृदय के वाम भाग से प्रारम्भ होता है और रक्त संपूर्ण शरीर में फैल कर पुनः हृदय के दक्षिण भाग में वापस चला आता है। इसे गृह्य चक्र या सामान्य रक्तसंवहन कहते हैं। इससे अतिरिक्त, अन्तः नलिका तथा उदरस्थ अन्य आशयों की केशिकाओं में प्रवाहित होने वाला रक्त एकत्र होकर यकृत में जाता है और वहाँ उसका पुनः विभाग होता है और तब अन्त में हृदय में पहुँचता है। रक्तसंवहन की इस शाखा को प्रतीहारी संवहन कहते हैं। बहुत कुछ इसी प्रकार का सहायक संवहन घृकों में भी होता है, उसे घृकीय संवहन कहते हैं।

फुफुसों में रक्त जाने पर रक्तरक्षकद्रव्य के साथ ओपजन का संयोग होता और ओपरक्तरक्षक नामक यौगिक बनता है। इसी से शुद्ध रक्त का वर्ण मकीला लाल रहता है और धमनियों का भी वर्ण इसी प्रकार का होता है। ओपजन विरहित होने पर रक्त का वर्ण नीला हो जाता है और इसी लिए सिराओं में नीलवर्ण होती हैं।

गर्भस्थ बालक का रक्तसंवहन

पूर्वोक्त सामान्य रक्तसंवहन से गर्भस्थ बालक के रक्तसंवहन में कुछ वेलक्षणता देखी जाती है। इसके निम्नांकित कारण हैं:—

(१) गर्भस्थ बालक अपने पोषण के लिए पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर रहता है और स्वयं कुछ ग्रहण नहीं करता।

(२) परिस्थिति के अनुसार रक्तसंवहन के हृदय आदि अवयवों के निर्माण में भी विशेषता होती है।

(३) वह स्वयं वायु का आदान-प्रदान भी नहीं करता।

हृदय के निर्माण में निम्न रचनाओं की विशेषता पाई जाती है:—

(१) संवाहिनी महासिरा (Umbilical veins)

(२) सेतुसिरा (Ductus venosus)

(३) सेतुधमनी (Ductus arteriosus)

(४) संवाहिनी धमनियों (Umbilical arteries)

(५) शुकच्छिद्र (Foramen ovale)

प्रसव के बाद सिरा धमनियों के द्विद्र ५ दिनों में बन्द हो जाते हैं और शुकच्छिद्र १० दिनों में बन्द होता है।

रक्तसंवहनक्रम

प्रथम अवस्था—माता के शरीर से रक्त अग्रा द्वारा गर्भ के नाभिनाल में स्थित संवाहिनी महासिरा होकर गर्भ के शरीर में प्रविष्ट होता है। उसके द्वारा सर्वप्रथम रक्त यकृत में जाता है और यकृत का पोषण करता है। रक्त का अधिक भाग सेतुसिरा द्वारा अग्रा महासिरा से चला जाता है। यकृत में प्रविष्ट रक्त भी अन्त में याकृती सिराओं द्वारा अग्रा महासिरा में पहुँच जाता

है। अधरा महासिरा द्वारा यह रक्त हृदय के दक्षिण अलिन्द में पहुँचता है और दक्षिण निलय में न जाकर शुक्तिच्छिद्र से वाम अलिन्द में जाता है और तदनन्तर वामनिलय में पहुँचता है। यहाँ से रक्त महाधमनी में सामान्य रीति से जाता है।

द्वितीय अवस्था—ऊर्ध्वकाय का रक्त उत्तरा महासिरा द्वारा दक्षिण अलिन्द में जाता है और वहाँ से दक्षिण निलय में प्रविष्ट होता है। वहाँ से रक्त फुफुसी धमनी के द्वारा फुफुस में पहुँचता है। कुछ भाग तो फुफुस के पोषण के लिए रह जाता है और बाकी रक्त से तु धमनी द्वारा महाधमनी में चला जाता है। फुफुसागत रक्त भी पुनः लौट कर सिराओं द्वारा वाम अलिन्द में और वहाँ से वाम निलय में जाता है और फिर महाधमनी में प्रविष्ट होता है।

तृतीय अवस्था—महाधमनी की शाखा प्रशाखाओं से रक्त सपूर्ण शरीर में अमण करता है और अन्त में उत्तरा तथा अधरा महासिराओं द्वारा हृदय में लौट आता है। अधिक भाग सवाहिनी धमनियों द्वारा नाभिनाल में आ जाता है और अधरा में प्रविष्ट होता है। वहाँ से माता के शरीर में चला जाता है।

इस प्रकार फुफुसों के क्रियाशील न होने से रक्तशोधन या विनिमय का कार्य अधरा द्वारा ही होता है। इसलिए माता के शरीर से रक्त अधरा द्वारा ही गर्भ से शरीर में प्रविष्ट होता है और उसी के द्वारा पुनः लौटकर माता के शरीर में आ जाता है।

रक्तसंवहन के भौतिक कारण

रक्तसंवहन कुछ निश्चित भौतिक नियमों के अनुसार होता है। शरीर में रक्तसंवहन को बनाये रखने वाले निम्नांकित भौतिक कारण हैं:—

- (१) हृदय की स्रपक शक्ति (२) दबाव में अन्तर
- (३) रक्तवाहिनियों की स्थितिस्यापम्ता
- (४) रक्तवाहिनियों के आयतन में अन्तर (५) प्रतिरोध

गत्यात्मक दृष्टिकोण से विचार करने पर किसी द्रव पदार्थ की गति निर्मांकित कारणों पर निर्भर रहती है:—

(१) बाह्य कारण (२) प्रदत्त गति (३) द्रव का भार

१. हृदय की स्रोपक शक्ति—हृदय के प्रत्येक संकोच के समय जो शक्ति आविर्भूत होती है वह रक्त को एक निश्चित दबाव पर तथा निश्चित वेग से हाने में सहायक होती है । दबाव तथा वेग हृदय से उद्भूत शक्ति के अनुसार ही होते हैं ।

२. दबाव में अन्तर—द्रव पदार्थों की गति स्वभावतः अधिक दबाने वाले स्थान से कम दबाव वाले स्थान की ओर होती है । रक्तवहसंस्थान के विभिन्न अंगों का दबाव नीचे दिया जा रहा है:—

	अधिकतम	न्यूनतम
वामनिलय	१४० मिलीमीटर	—३० मिलीमीटर
धमनियाँ	११० "	
केशिकायें	१५-२० "	
सिरायें	३ "	—८
अलिन्द	२० "	—७

इस नलिका को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि हृदय (वामनिलय), धमनियाँ, केशिकाओं, सिराओं तथा अलिन्द का दबाव क्रमशः कम होता गया है । अतः दबाव के अन्तर से रक्त हृदय से क्रमशः धमनियाँ, केशिकाओं और सिराओं में जाकर पुनः हृदय में ही लौट आता है ।

३. रक्तवाहिनियों की स्थितिस्थापकता—प्रत्येक निलयसंकोच के समय लगभग १३ छँटाक रक्त महाधमनी में प्रविष्ट होता है । इस विशेष मात्रा के कारण धमनियाँ की चौड़ाई तथा लम्बाई बढ़ जाती है और इस प्रसार के कारण रक्त की अधिक मात्रा को वह थोड़ी देर के लिए अपने में रख लेती हैं । निलय के प्रसारित होने पर धमनियाँ इस रक्त को केशिकाओं में भेज देती हैं और स्वयं पूर्वावस्था में लौट आती हैं और इस प्रकार केशिकाओं तथा सिराओं में रक्त का प्रवाह सन्तत एवं समान रूप से होता रहता है ।

४. रक्तवाहिनियों के आयतन में अन्तर—नलिका का आयतन द्रव पदार्थों के वेग को निर्धारित करने का प्रधान कारण है । नलिका के आयतन के

विपर्यस्त अनुपात में प्रवाह का वेग होता है अर्थात् नलिका का आयतन कम रहने से वेग अधिक और आयतन अधिक होने से वेग कम होता है।

५. प्रतिरोध—नलिका में बहते हुये द्रवपदार्थ को एक प्रकार के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। यह प्रतिरोध नलिका के व्यास के वर्ग मूल के विपर्यस्त अनुपात में होता है अर्थात् यदि नलिका का व्यास आधा कम कर दिया जाय तो प्रतिरोध १६ गुना अधिक हो जायगा। इसलिए बड़ी बड़ी धमनियों में तो प्रतिरोध इतना कम होता है कि ध्यान में नहीं आता, किन्तु सूक्ष्म धमनियों में यह सबसे अधिक होता है। इसे प्रान्तीय प्रतिरोध कहते हैं।

यद्यपि केशिकायें बहुत छोटी होती हैं और उनमें प्रतिरोध भी अधिक होता है तथापि उनका क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि कुल मिलाकर प्रतिरोध सूक्ष्म धमनियों की अपेक्षा कम ही होता है। दूसरी बात यह है कि तीव्रता से बहने वाले द्रवपदार्थ को अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और चूँकि सूक्ष्म धमनियों में प्रवाह तीव्र होता है, इसलिए केशिकाओं की अपेक्षा उनमें प्रतिरोध भी अधिक होता है।

अन्तर्हार्दिक दबाव

हृदय के विभिन्न कोष्ठों का दबाव नापने के लिए एक यन्त्र का प्रयोग होता है, जिसे 'हृदयनलिका यन्त्र' (Tambour or manometer) कहते हैं। इसे नापने की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। कुत्ते के हृदय के कोष्ठों की नाप करने पर निम्नांकित परिणाम निकला है:—

	अधिकतम	न्यूनतम
दक्षिण अलिन्द	२० मिलीमीटर	—७ मिलीमीटर
दक्षिण निलय	६० "	—१५ "
वाम निलय	१४० "	—३० "

रक्तसंवहन का समय

रक्त के सम्पूर्ण शरीर में घूम कर पुनः हृदय में पहुँचने तक कितना समय लगता है, इसके सम्बन्ध में अनेक प्रयोग किये गये हैं। इनके अनुसार मनुष्य में पूर्ण रक्तसंवहन में लगभग १५ सेकण्ड लगते हैं, किन्तु यह निकटतम मार्ग

से रक्तपरिभ्रमण का समय है । लम्बे रास्ते से धूमने में अधिक समय लगता है । पूर्ण रक्तमण्डन का समय ठीक ठीक निकालना अभी तक कठिन है ।

हृदय का कार्य

भौतिक तथा क्रियात्मक इन दोनों दृष्टियों से हृदय के कार्य का अध्ययन किया जाता है । भौतिक दृष्टिकोण से हृदय के भ्रमापनकार्य, कपाटों का सहयोग, हृत्कार्यचक्र और तत्जन्य हृच्छब्दों की परीक्षा की जाती है और क्रियात्मक दृष्टिकोण से हृत्प्रतीघात तथा नादियों द्वारा उसके नियन्त्रण का अध्ययन किया जाता है ।

हृत्कार्यचक्र (Cardiac cycle)

हृदय की क्रिया के समय उसमें जो चक्रवत् परिवर्तन होता है, उसे हृत्कार्यचक्र कहते हैं । यह परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं :—

१. संकोच (Systole) २. प्रसार (Diastole)
३. विश्राम (Rest phase)

(१) सर्वप्रथम अलिन्दों का संकोच होता है उसे अलिन्द संकोच कहते हैं । इससे दक्षिण अलिन्द का रक्त दक्षिण निलय में तथा वाम अलिन्द का रक्त वाम निलय में चला जाता है । इस प्रकार दोनों निलय रक्त से भर जाते हैं ।

(२) उसके बाद निलयों का संकोच होता है । इससे दक्षिण निलय का रक्त फुफुसी धमनी तथा वाम निलय का रक्त महाधमनी में चला जाता है । अलिन्द द्वार के कपाटों के बन्द हो जाने से रक्त अलिन्दों में नहीं लौट पाता ।

(३) निलयों का संकोच समाप्त होने के पूर्व ही अलिन्दों का प्रसार प्रारम्भ हो जाता है जिससे सिगओं द्वारा रक्त उनमें भरने लगता है ।

(४) उसके बाद निलयों का भी प्रसार होने लगता है । प्रसार के समय अर्धचन्द्र कपाटों के बन्द हो जाने से धमनियों से रक्त नहीं लौट पाता । यही हृत्प्रेषी के विश्राम का भी काल होता है ।

इसके बाद पुनः अलिन्दों का संकोच होता है और इस प्रकार ये परिवर्तन चक्रवत् होते रहते हैं ।

हृत्कार्यचक्र का समय

हृदय की गति प्रति मिनट ७२ होती है । इस हिसाब से ५ सेकण्ड में

६ चक्र होते हैं और एक चक्र में ००८ सेकण्ड समय लगता है । इसका विवरण निम्न लिखित है:—

अलिन्दसङ्कोच ००१ सेकण्ड

अलिन्द प्रसार और विश्राम काल ००७ ”

००८ सेकण्ड

निलयसङ्कोच ००३ सेकण्ड

निलयप्रसार ००५ ”

००८ सेकण्ड

हृदय की गति अधिक होने से हृत्कार्यचक्र की अवस्थाओं की मर्यादा कम हो जाती है । विशेषतः प्रसारारवस्था पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और वह कम हो जाती है ।

हृत्कार्यचक्र की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन

(क) अलिन्द सङ्कोच के समय:—

(१) अलिन्दों का परिसरण सङ्कोच

(२) अलिन्दों में दबाव की वृद्धि

(३) अलिन्दों में सिरागत रक्त का चणिक अवरोध

(४) अलिन्द निलय द्वार के कपाटों का खुलना

(५) रक्त का निलय में सहसा प्रवेश

(६) निलय के प्रसार में वृद्धि

(७) अर्धचन्द्र कपाटों का बन्द होना

(८) महाधमनी तथा फुफुसी धमनियों में रक्त का प्रवाह नहीं होना

अलिन्द सङ्कोच के समय अलिन्दों का सम्पूर्ण रक्त निलयों में चला जाता है और यद्यपि महाधमनी के मुख पर कपाट नहीं है तथापि निम्नलिखित कारणों से सिराओं में रक्त नहीं लौट पाता:—

- (ग) सिरामुख की अपेक्षा अलिन्दनिलय द्वार अधिक बड़ा है ।
 (घ) दक्षिण अलिन्द के ऊर्ध्वभाग में स्थित पेदी के सङ्कोच से सिरा का मुख बन्द हो जाता है ।

ख) अलिन्दप्रसार के समय :—

- (१) अलिन्दों में सिरागत रक्त का प्रवेश
- (२) अलिन्दों का प्रसार
- (३) अलिन्द निलय कपाटों का अवरोध
- (४) प्रथम ध्वनि की उत्पत्ति
- (५) निलयों का सङ्कोच
- (६) निलयगत दबाव में वृद्धि
- (७) अर्धचन्द्र कपाटों का अवरोध
- (८) चारों कपाटों के बन्द होने से निलय का रक्त पर अधिक दबाव
- (९) महाधमनी तथा फुफुसी धमनियों में रक्तप्रवाह नहीं होता

ग) निलयसङ्कोच के समय :—

- (१) निलयों का संकोच
- (२) निलयगत दबाव की अधिक वृद्धि
- (३) अर्धचन्द्र कपाटों का खुलना
- (४) महाधमनी तथा फुफुसी धमनियों में रक्त का प्रवेश
- (५) प्रथम ध्वनि की तीव्रता

घ) निलयप्रसार तथा विश्राम के समय :—

- (१) अलिन्दों में सिरागत रक्त का प्रवेश
- (२) अलिन्दों का प्रसार ।
- (३) अलिन्दनिलय कपाटों का अवरोध
- (४) अर्धचन्द्र कपाटों का अवरोध
- (५) द्वितीय ध्वनि की उत्पत्ति
- (६) थोड़ी देर के लिए निलयकोष का चारों ओर से बन्द हो जाना
- (७) अलिन्दगत दबाव निलयगत दबाव से बढ़ जाता है
- (८) अलिन्दनिलय कपाटों का खोलना

- (९) निलयों में अलिन्दगत रक्त का प्रवेश
- (१०) तृतीय च्वनि की उत्पत्ति
- (११) निलयों का सहसा प्रसार
- (१२) निलयों का दबाव शून्य के भी नीचे चला जाना
- (१३) सिरागत रक्त का अलिन्दों और निलयों में प्रवेश.
- (१४) महाधमनी तथा कुकुसी धमनियों में रक्त प्रवेश नहीं होना

हृदय का आयतन—हृत्कार्यचक्र की विभिन्न अवस्थाओं में हृदय के आयतन में जो परिवर्तन होते हैं उनका मापन अनेक जन्तुओं पर प्रयोग के द्वारा किया गया है। इसके लिए जो यन्त्र प्रयोग में आता है उसे हृदयमापक यन्त्र (Cardiometer) कहते हैं।

हृदयस्पन्द के कारण—यदि मेरूक आदि शीतरक्त प्राणियों के हृदय को शरीर को पृथक् कर दिया जाय तो अनुकूल अवस्थाओं में वह कुछ घण्टों तथा कभी कभी कुछ दिनों तक स्वाभाविक रीति से संकोच करता रहता है। स्तनधारी जीवों में भी इस प्रकार पृथक्कृत हृदय उपयुक्त शोषजनयुक्त द्रव में रखने पर अनुकूल अवस्थाओं में कई घण्टों तक संकोच करता रहता है।

इस प्राकृत प्रक्रिया को देखने से हृदयस्पन्द के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रश्न उठते हैं:—

१. हृदयस्पन्द का स्वरूप क्या है ? यह केन्द्रीय नाडीमण्डल के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है या हृदय की आन्तरिक अवस्थाओं पर ? दूसरे शब्दों में, हृदय-स्पन्द आत्मजात क्रिया है या प्रत्यावर्तित ?

२. यदि यह आत्मजात है तो इसका उद्गम स्थान हृदय में स्थित नाडी गण्ड है या स्वयं हृत्पेशीकोषाणु ? दूसरे शब्दों में, हृदयस्पन्द नाडीजन्य है या पेशीजन्य ?

३. इस आत्मजातत्व का कारण क्या है—पेशी या नाडी ?

४. हृदयस्पन्द का यथार्थ उद्गमदिन्दु क्या है ?

५. सकोचतरंग का प्रारंभ वहीं से क्यों होता है ?

६. सिरामुख पर प्रारंभ हुआ परिसरयसकोच नाडियों के द्वारा संपूर्ण हृदय

क्षेत्र पर फैलता है या पेशीकोषाणुओं के द्वारा ? अर्थात् इसका प्रसार पेशीजन्य है नाडीजन्य ?

उपर्युक्त प्रश्नों पर क्रमशः नीचे विचार किया जाता है ।

(१) हृदयस्पन्द का स्वरूप—हैलर नामक विद्वान् ने सन् १७५७ ई० में देखा और सिद्ध किया कि केन्द्रीय नाडीमण्डल से सम्बन्ध विच्छिन्न कर देने पर भी हृदय नियमित रूप से सकोच करता रहता है । मेन्क आदि जन्तुओं पर इसका प्रयोग कर देखा भी गया है । इससे यह प्रमाणित होता है कि हृदयस्पन्द आत्मजात है न कि प्रत्यारवित किया । हृदयस्पन्द की शक्ति हृदय के सब भागों में समानरूप से नहीं रहती । सिरामुख के पास वह सर्वाधिक तथा क्रमशः निलय की ओर कम होती जाती है । अतः श्यकृकृत हृदय में सर्वप्रथम निलय की क्रिया चन्द होती है उसके बाद क्रमशः अलिन्द, सिरामुख तथा सिराओं की क्रिया अवस्तु होती है । हृदयस्पन्द आत्मजात होने पर भी उसका नियन्त्रण नाड़ियों के द्वारा होता है तथा अन्य अंगों के साथ उसका सम्बन्ध स्थािर रहता है ।

(२) हृदय का नियमित स्पन्द नाडीजन्य है या पेशीजन्य ? जब सन् १८४८ ई० में रैमक नामक विद्वान् ने हृदय में नाडीकोषाणुओं की उपस्थिति का अनुसन्धान किया, तब यह प्रश्न उठा कि हृदय का नियमित स्पन्द नाडीजन्य है या पेशीजन्य ? यह प्रश्न इतना विवादास्पद है कि अभी तक विद्वत्समाज किसी भी निर्णय पर नहीं पहुच सका है यद्यपि दोनों सिद्धान्तों के पक्ष में अनेक युक्तियाँ दी जाती हैं ।

नाडीजन्य सिद्धान्त के पक्ष में प्रमाण

(१) नाडीतन्तु की मात्रा के अनुसार हृदय के विभिन्न भागों में नियमित सकोच होता है । यह देखा गया है कि सिराद्वार पर नाडीप्रथियों और गाडी सूत्रों की अधिकता रहती है और क्रमशः नीचे की ओर कम होती जाती है । इसके अनुसार हृदयस्थ नाडीप्रथियों से ही सकोच का प्रारम्भ होता है ।

(२) अलिन्दपुच्छ को हृदय से विच्छिन्न कर देने पर उसमें सकोच नहीं होता, क्योंकि उसमें नाडीमण्डल नहीं होते ।

(३) मेढक में निलय के अग्रभाग के निचले ३ भाग में नाडीकोषाण नहीं होते, अतः हृदय से पृथक् कर देने पर उसमें स्वतः संकोच नहीं होता ।

(४) लिम्फ्युलस नामक केकड़े की जाति का प्राणी है । उसका हृदय नलिकाकार होता तथा नाडीरज्जु से संबद्ध रहता है । यदि यह संबन्ध विच्छिन्न कर दिया जाय तो इसकी क्रिया बन्द हो जाती है । इससे स्पष्ट है कि हृदयस्पन्द नाड़ियों पर ही आश्रित है ।

पेशीजन्य सिद्धान्त के पक्ष में प्रमाण

(१) गर्भस्थ बालक का हृदय नाडीकोषाणों के विकास के पूर्व से ही स्वतः गति करता रहता है । गर्भाधान के तीन सप्ताह बाद हृदयगति करने लगता है जब कि नाडीतन्तु ५ वें सप्ताह के प्रारंभ में प्रकट होता है ।

(२) मेढक में हृदय के निलय के अग्रभाग में यद्यपि नाडीगण्ड नहीं है तथापि यदि उसे हृदय से विच्छिन्न कर दिया जाय और किसी पोषक द्रव में रक्ता जाय तो उसमें स्वतः नियमित स्पन्द होता रहता है ।

(३) विच्छिन्न हृदय में कुछ काल के बाद नाडीगण्डों की उत्तेजनाशक्ति पेशी से पूर्व नष्ट हो जाती है, किन्तु इसके बाद भी हृदय में गति उत्पन्न की जा सकती है । इसके कारण स्पष्टतः नाडीगण्ड नहीं हो सकते क्योंकि वह पहले ही नष्ट हो जाते हैं । अतः एव यह स्पन्द पेशीजन्य ही है ।

(४) निकोटिन द्वारा हार्दिक नाडीगण्डों को शून्य करने के बाद भी हृदय अपनी स्वाभाविक रीति से गति करता रहता है ।

यद्यपि यह विषय अत्यन्त विवादास्पद है तथापि अधिकांश विद्वानों का मत पेशीजन्य सिद्धान्त के पक्ष में ही है ।

(३) स्वतः संकोच का कारण क्या है ? रक्त तथा लसीका के खनिज लवण हृदय की नियमित गति के लिए आवश्यक है, विशेषतः सोडियम, पोटेशियम तथा शक्ति के विश्लेषित अणु ।

(४) हृदयस्पन्द का उद्गमबिन्दु—उत्तरा महासिरा तथा हार्दिकी सिरापरिवाहिका के बीच में स्थित सिरालिन्द ग्रन्थि, जिसे 'गस्त्युत्पादक' (Pacemaker) भी कहते हैं, हृदयस्पन्द का प्रारंभिक उद्गम स्थान है । यहीं से

हृदयस्पन्द का प्रारंभ होता है। यद्यपि प्राणदा नाडी हृदयगति को कम करती है तथा सांवेदनिक नाडीसूत्र हृदय की गति बढ़ा देते हैं, तथापि इनमें से किसी में संकोच तरंग को उत्पन्न या बहान करने की शक्ति नहीं है। इसके संबन्ध में निम्नांकित प्रमाण उल्लेखनीय हैं:—

(१) सिरालिन्द ग्रंथि में ताप पहुँचाने पर हृदयगति में वृद्धि तथा शीत से उसमें हास हो जाता है।

(२) मृत्यु के समय सिरालिन्द ग्रंथि की गति सबसे अन्त में घटती है।

(३) सिरापरिवाहिका तथा हृदय के अन्य भागों के बीच में यदि व्यवधान कर दिया जाय तो परिवाहिका तो गति करती रहती है, किन्तु उसके नीचे के भाग में गति मन्द हो जाती है।

(४) हृदय का यही भाग स्पन्दकाल में सर्वप्रथम धनविद्युत् से युक्त होता है, अतः इसी भाग में क्रिया का प्रारंभ होता है।

सिरालिन्द ग्रंथि त्रिशिष्ट पेशीसूत्रों से घनी होती है जिसमें नाडीसूत्र तथा नाडीकोषाणुओं की अधिकता होती है। यह ग्रंथि हृदय के क्रम तथा नियम को नियन्त्रित करती है।

रिजलैण्ट नामक विद्वान् के मतमें हृदयस्पन्द का उत्क्रमबिन्दु सिरालिन्दग्रंथि न होकर उसका पार्श्ववर्ती स्थान है जिसे 'पुरापरिवाहिका' (Presinus) कहते हैं। इसमें संकोच की उच्चतम शक्ति होती है। यहाँ से उत्तेजना प्रारंभ होकर सिरालिन्द ग्रंथि में जाती है। वहाँ से यह दक्षिण अलिन्द की अन्तःकला के नीचे स्थित त्रिशिष्ट पेशीसूत्रों तक जाती है जिन्हे 'हिसतवारा' संस्थान (His-Tawara System) कहते हैं और जो दक्षिण अलिन्द की पेशियों को क्रिया के लिए उत्तेजित करता है।

(५) सिरालिन्दग्रन्थि में स्पन्दोत्पत्ति का कारण—सिरालिन्द ग्रंथि में ही हृदयस्पन्द का प्रारंभ क्यों होता है इसके संबन्ध में दो मुख्य सिद्धान्त प्रचलित हैं:—

(१) गर्भसंबन्धी सिद्धान्तः—हृदय गर्भ के प्रारंभ में एक मलिका के आकार का होता है और उसके गर्भकोष्ठ क्रमशः हार्दिक कोष्ठ में परिवर्तित हो जाते हैं । सिरालिन्द ग्रन्थि में ये गर्भकोष्ठ कुछ हद तक रह जाते हैं, इसलिये उनमें उत्तेजना की शक्ति अधिक होती है ।

(२) रासायनिक सिद्धान्तः—इसके अनुसार हृदय की गति पोटेशियम, सोडियम और खटिक की एक निश्चित अनुपात में उपस्थिति पर निर्भर करती है । आजकल यह समझा जाता है कि पोटेशियम ही प्रधानतः सिरालिन्दग्रन्थि को उत्तेजित करता है । यह भी माना जाता है कि स्वभावतः पोटेशियम हम अनुपात में रहता है कि अलिन्द तथा निम्न शान्त रहते हैं, केवल सिरालिन्द ग्रन्थि उत्तेजनाशील होती है । पोटेशियम की क्रिया कैसे होती है इसके संबन्ध में यह कहा जाता है कि हृदय में 'आत्मतनजन' (Automatism) नामक एक सेन्द्रिय पदार्थ रहता है जो पोटेशियम के द्वारा आत्मतन (Automatin) में परिवर्तित होता है जिससे हृदय में उत्तेजना होती है । कुछ लोगों का यह भी मत है कि हृदयान्तःस्त्राव नामक एक रासायनिक पदार्थ इस उत्तेजना का कारण होता है । सिरालिन्द ग्रन्थि में इसकी उत्पत्ति अधिक होने से वह अधिक क्रियाशील होती है ।

(६) संकोचतरंग का वहन अग्रभाग तक कैसे होता है ? हृदय में संकोचतरंग का वहन नाड़ीद्वारा होता है या पेशी द्वारा यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । संकोच की गति अत्यन्त मन्द होने से यह सिद्ध है कि नाड़ी द्वारा इसकी गति नहीं होती । इसके विपरीत, पेशी द्वारा संकोचतरंग का वहन होता है, इस पक्ष में निम्नोक्त युक्तियाँ हैंः—

(१) संकोच की मन्द गति,

(२) सूक्ष्मरचना ।

हृदय पेशियों की रचना ऐसी है कि वे शाखाओं द्वारा परस्पर संबद्ध हैं, अतः हृदय के एक भाग में उत्पन्न उत्तेजना दूसरे भाग में इन्हीं के द्वारा पहुंच जाती है ।

(३) यह देखा गया है कि यदि निष्ठुर की नाड़ियाँ काट दी जाँय तब भी पेशियों में संकोच की लहर प्रतीत होती है ।

अलिन्दनिलयगुच्छ

अलिन्द से निलय तक उत्तेजना का वहन एक विशिष्ट पेशीतन्तु के द्वारा होता है जिसे अलिन्दनिलयगुच्छ (Bundle of his) कहते हैं। इसकी वाहकता अन्य हार्दिक कोषाणुओं की अपेक्षा १० गुनी अधिक होती है तथा सामान्य हार्दिक कोषाणु की अपेक्षा इनमें शर्कराजन की मात्रा भी अधिक होती है।

इस गुच्छ को प्रारंभ सिरापरिवाहिका प्रदेश में एक ग्रन्थि के रूप में होता है जिसे अलिन्दनिलयग्रन्थि कहते हैं। यहाँ से गुच्छ आगे की ओर अलिन्द-विभाजक कला में और फिर वहाँ से नीचे की ओर चलकर निलयविभाजक के शिखर के पास उसकी दो शाखायें हो जाती हैं दक्षिण और वाम। दक्षिण-शाखा पीछे की ओर जाकर सिरालिन्द ग्रन्थि में स्थित हृदय की पेशियों से मिल जाती है। वाम शाखा पुनः दो भागों में विभक्त हो जाती है जिनमें एक वाम तथा एक दक्षिण निलय को जाती है। प्रत्येक भाग हृदन्तःकला के नीचे स्थित रहता है और क्रमशः शाखा प्रशाखाओं में विभक्त होता जाता है। इसकी अन्तिम शाखायें हार्दिक पेशियों से सयद्ध रहती हैं। उत्तेजना के स्वाभाविक वहन में बाधा होने से एक अवस्था उत्पन्न होती है, जिसे 'हृस्तम्भ' कहते हैं। इसमें हृदय थोड़ी देर के लिए बन्द हो जाता है।

हृदयविद्युत्मापन

अन्य पेशियों के समान हृदय की पेशियों में भी संकोच के समय क्रियाजन्य विद्युद्वाहकता की उत्पत्ति होती है। इसका मापन करने वाले यन्त्र को 'हृदयविद्युत्मापक यंत्र' (Electrocardiogram) कहते हैं तथा इस यन्त्र के द्वारा प्राप्त चित्रण को 'हृदयविद्युत्माप' (Electrocardiograph) कहते हैं।

हृदय पर निरिन्द्रिय लवणों का प्रभाव

(क) सोडियम:—रक्त तथा लसीका में स्थित सोडियम के लवण उसके मापन भार को बनाये रखने में प्रमुख भाग लेते हैं। यह हृदयतन्तु की अवस्था पर विशेष प्रभाव डालते हैं और हृदय की संकोचशीलता तथा उत्तेजनीयता को बनाये रखने में सहायता करते हैं। इसकी अधिकता से हृदय की पेशियाँ शिथिल और प्रसारित हो जाती हैं और हृदयगति प्रसारकाल में रुक जाती है।

इसके अभाव में हृदय की संकोच शीलता और उत्तेजनीयता नष्ट हो जाती है। पोटेशियम तथा खटिक की अपेक्षा इसकी मात्रा रक्त में अधिक होती है।

(ख) पोटेशियम—यह हृदयगति के क्रम को नियमित रखता है। उत्तेजनीयता तथा संकोच शीलता के लिये यह आवश्यक नहीं है। इसके आधिक्य से हृदय की गति मन्द हो जाती है, अत्यन्त प्रसार हो जाता है और अन्त में गति बन्द हो जाती है। इसके अभाव में हृदय की गति बढ़ जाती है और विशेषतः निलय का क्रम बढ़ जाता है।

(ग) खटिक—यह हृदय की संकोचशीलता तथा उत्तेजनीयता को बनाये रखने के लिए अत्यावश्यक है। इसके आधिक्य से कठिन संकोच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अभाव में संकोचशीलता तथा उत्तेजनीयता नष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से खटिक तथा सोडियम और पोटेशियम के प्रमाण में अत्यन्त विरोध है और इन्हीं परस्पर विरोधी तत्वों की क्रिया से हृदय के क्रमिक संकोच तथा प्रसार की अवस्थाएँ सदा रहती हैं।

कार्बन द्विऑक्साइड के आधिक्य से वाहकताओं कमी हो जाती है और फलस्वरूप हृदयस्थ की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।

हृदयध्वनि

हृत्कार्यचक्र के सिलसिले में हृदयध्वनि उत्पन्न होती है और इसका हृत्कपाटों की क्रिया से घनिष्ठ संबंध रहता है। यह ध्वनि हृत्प्रदेश में ध्वनि लगाकर या श्रवणयन्त्र से सुनी जा सकती है। विद्युत् के द्वारा भी इनका चित्रमय विवरण प्राप्त किया जाता है। ध्यान से देखने पर इसमें दो ध्वनि स्पष्टतः प्रतीत होती है जो क्रमशः एक दूसरे के बाद उत्पन्न होती है। उन्हें प्रथम और द्वितीय ध्वनि के नाम से संबोधित करते हैं।

प्रथम ध्वनि—यह निलय संकोचके प्रारम्भ में उत्पन्न होती है, इसलिये इसे संकोचकालिक ध्वनि भी कहते हैं। यह अलिन्दनिलयद्वारा पर स्थित कपाटों के कम्पन के फल स्वरूप उत्पन्न होती है और दीर्घ एवं मन्दस्वरूप की होती है। इसकी अवधि लगभग ०.१८ सेकण्ड है। यह ध्वनि निम्नांकित तीन कारणों के समुदाय से उत्पन्न होती है:—

(१) निलयसंकोच की अवस्था में द्विपत्र और त्रिपत्र कपाट बन्द हो जाते हैं जिससे रक्त अलिन्द में नहीं लौटने पाता । इस अवरोध के परिणाम-स्वरूप कपाटों में दबाव तथा कम्पन उत्पन्न होता है और उसी में ध्वनि का प्रादुर्भाव होता है ।

(२) निलयों के पेशीसमूह में भी संकोचावस्था में कम्पन होते हैं और फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है ।

(३) यत्र की भित्ति से हृदय का सपर्क भी कुछ हद तक ध्वनि की उत्पत्ति में कारण होता है ।

द्वितीय ध्वनि—यह निलयपम्पार के प्रारंभ में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे प्रसारकालिक या अनुसंकोचकालिक भी कहते हैं । यह लघु और तीव्र स्वरूप की होती है । इसकी अवधि ०.१० सेकण्ड है । यह अर्धचक्र कपाटों के सहसा बन्द होने तथा दबाव अधिक होने के कारण उनमें उत्पन्न कम्पन के फलस्वरूप आविर्भूत होती है ।

तृतीय ध्वनि—आइन्थोयन नामक विद्वान् ने ३५ प्रतिशत व्यक्तियों में एक मूधम तृतीय ध्वनि का पता लगाया जो द्वितीय ध्वनि के बाद तुरन्त सुनाई देती है । यह द्वितीय ध्वनि से कोमल है और व्यायाम आदि के समय तीव्र हो जाती है । इसकी उत्पत्ति में निम्नांकित कारण बतलाये जाते हैं :—

(१) अधिक दबाव वाले अर्धचन्द्र कपाटों का अनुकम्पन ।

(२) ध्वनिक रक्तप्रवेश से अलिन्द कपाटों का कम्पन ।

(३) निलयों में रक्तप्रवेश के कारण संघर्षध्वनि ।

हृदयध्वनि के वैकृत रूपान्तर

हृदयध्वनि में निम्नांकित रूपान्तर विकृति के सूचक होते हैं :—

१. क्षीण—हृदयपेशी के क्षय से ।

२. प्रबल—हृदयपेशी की वृद्धि से ।

३. तीव्र—द्वितीय ध्वनि की तीव्रता महाधमनीगत रक्तभाराधिक्य का सूचक है ।

४. प्राक्संकोचमर्मर या युग्म प्रथमध्वनि—अलिन्दों की वृद्धि तथा अलिन्द-द्वारसंकोच में ।

५. संकोचकालिक मर्मर—अर्धचन्द्र कपाटों के संकोच से ।

६. अनुसंकोचकालिक मर्मर—अर्धचन्द्र कपाटों के रक्तप्रभावर्तन से ।

७. द्वितीयध्वनि का द्वैतभाव—महाधमनी तथा कुकुसी कपाटों के एक साथ बन्द न होने ।

कपाटों की स्थिति

हृदयध्वनि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हृत्कपाटों की स्थिति का परिज्ञान अत्यावश्यक है ।

प्रथम ध्वनि—

(क) द्विप्रक्रपाट—हृदयाग्रभाग पर पंचम पशुंकान्तराल में ।

(ख) त्रिप्रक्रपाट—उरःफलक के अधःप्रान्त में ।

द्वितीय ध्वनि—

(क) महाधमनीकपाट—द्वितीय दक्षिण पशुंकान्तराल में ।

(ख) कुकुसीकपाट—द्वितीय धाम " " ।

हृत्प्रतीघात (Heart Beat)

यह हृत्कार्य के बाह्यचिह्नों में मुख्य है । यह संस्रोचकाल के प्रथम भाग में होता है । इसमें मयोरेखा के ३-३½ इञ्च बाईं ओर पञ्चम पशुंकान्तराल का क्रमिक स्थान होता है । इसका कारण संस्रोच के फलस्वरूप हृदय की कठिनता तथा उसकी आकृति का परिवर्तन है । इसीलिए हृदय की वृद्धि और प्रसार में यह क्रमशः तीव्र और मन्द हो जाता है ।

हृत्पेशी के गुणधर्म

हृत्पेशी में निम्नांकित विशिष्ट गुणधर्म होते हैं:—

१. क्रमिकता (Rhythmicity)—उत्तेजना को विकसित करने की शक्ति ।

२. वाहकता (Conductivity)—उत्तेजना को हृदय के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाना ।

३. उत्तेजनीयता (Excitability)

४. सङ्कोचशीलता

५. सब या नहीं की क्रिया (All or none phenomena)—स्वतन्त्र और परतन्त्र पेशियों में उत्तेजना की प्रबलता के अनुसार ही सङ्कोच सर्वदा अधिकतम होता है, यद्यपि इस अधिकतम सङ्कोच की मर्यादा में अन्तर हो सकता है ।

६. सोपानक्रम (Staircase phenomenon)—विश्रामकाल के बाद यदि हृदय को कुछ देर के लिए बन्द करके कृत्रिम रीति से निश्चित समय का अन्तर दे कर उत्तेजना पहुँचाई जाय तो सोपानक्रम से प्रारम्भिक तीन या चार संकोच उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं ।

७. विश्रामकाल (Refractory period)—जब हृदय अपने आप स्पन्दन करता रहता है तब थोड़ी देर के लिए वह ऐसी स्थिति में रहता है तब बाह्य उत्तेजकों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसे विश्रामकाल कहते हैं और यह पूरे संकोचकाल तक रहता है । इसका अर्थ यह है कि यदि उस समय कोई उत्तेजना हृदय में पहुँचाई जाय तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । ऐसा समझा जाता है कि हृदय के संकोचकाल में क्रिएटिन फास्फेट का विरलेपण होता है और जब तक यह पुनः संश्लेषित नहीं होता तब तक हृदयेशी विश्रामकाल में रहती है ।

८. अधिसंकोच (Extra systole)—यदि प्रसारकाल में दूसरी उत्तेजना पहुँचाई जाय तो प्रसारकाल कम हो जाता है और उसके स्थान पर एक और संकोच उत्पन्न होता है । इसे अधिसंकोच कहते हैं ।

९. क्षतिपूर्तिकाल (Period of compensation)—रक्त अधिसंकोच के बाद एक विश्रामकाल आता है जो सामान्य विश्राम काल से अधिक होता है । इसे क्षतिपूर्तिकाल कहते हैं । यदि इस समय अलिन्दों से स्वाभाविक उत्तेजना पहुँचे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता और एक ध्वनि का लोप हो जाता है । इसी कारण हृदयेशी में पूर्ण पेशीस्तम्भ की अवस्था नहीं उत्पन्न होने पाती ।

१०. स्टार्लिङ्ग का नियम—यह सामान्य नियम है कि पेशियों के सूत्रों पर जब अधिक दबाव पड़ता है या वे अधिक प्रसारित होते हैं तो उनका संकोच भी अधिक होता है । हृदये में भी यही बात होती है । हृदय के कोष्ठों में जब रक्त अधिक भर जाता है तब उसके दबाव से हृदयेशी सूत्र अधिक संकोच करने लगते हैं । इस प्रकार हृदय में अधिक रक्त आने से बाहर भी अधिक रक्त भेजा जाता है और कम रक्त आने से बाहर भी कम रक्त जाता है । परिस्थिति के

अनुकूल अपने को बनाये रखने की हृदय की इस शक्ति को ही स्टॉलिङ्ग का नियम कहते हैं।

अलिन्दीय सूत्रसङ्कोच और अलिन्दरफुरण

कभी कभी अनियमित उत्तेजनाओं से हृदय का सम्पूर्ण सङ्कोचन हो कर पृथक् पृथक् पेशीसूत्रों का सङ्कोच होने लगता है उसे अलिन्दीय सूत्रसङ्कोच (Auricular fibrillation) कहते हैं। सामान्यतः ऐसी अवस्था हृदयेशीस्तर के रोगों में देखने में आती है। हार्दिक धमनी के बन्धन से भी यह अवस्था उत्पन्न होती है और व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। यह संकोच लगभग प्रतिमिनट ४५० होता है।

इसी प्रकार स्थानीय अवरोध, विश्रामकाल की कमी तथा सङ्कोचतरङ्ग की मन्द गति के कारण अलिन्दों का संकोच निलयों की अपेक्षा तिगुना या चौगुना होने लगता है। इसे अलिन्दरफुरण (Auricular flutter) कहते हैं।

हृदय का रक्तनिर्यात

यह रक्त का वह परिमाण है जो प्रत्येक सङ्कोचकाल में हृदय से बाहर धमनियों में जाता है। इसे सङ्कोच परिमाण कहते हैं। प्रतिमिनट निलय से जितना रक्त बाहर निकलता है उसे कालपरिमाण कहते हैं। सङ्कोचकाल में भी निलय पूर्णतः खाली नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ रक्त रह जाता है।

हृदय के रक्त निर्यात को नापने के लिए अनेक विधियाँ प्रयुक्त होती हैं जिनमें मुख्य स्टॉलिङ्ग के हृदयफुफुसयन्त्रकी विधि (Heart-lung preparation) है। इसके द्वारा पहले निलय से प्रतिमिनट बाहर निकले हुये कुल रक्त की राशि देखते हैं उसके बाद उसे प्रतिमिनट हृत्पत्तीघातों की सख्या के द्वारा विभाजित करने से निलय से प्रत्येक सङ्कोचकाल में बाहर भेजे गये रक्त का परिमाण निश्चित किया जाता है।

स्वाभाविक अवस्था में जब हृदय प्रतिमिनट ७२ धार संकोच करता है तब प्रत्येक निलय का रक्त निर्यात ५५ से ८० घनसंटीमीटर तक होता है। शरीर के श्रृंगमान के प्रतिवर्गमीटर के कालपरिमाण को हृदयाङ्क (Cardiac index) कहते हैं। यह स्वस्थ व्यक्तियों में २.२ लिटर होता है।

हृदय के रक्त निर्यात पर निम्नाङ्कित कारणों का प्रभाव पड़ता है:—

(१) सिराओं द्वारा रक्त का आयात—विश्राम के समय हृदय के दक्षिण

कोष्ठ में सामान्यतः ३ लिटर रक्त प्रति मिनट आता है और अत्यधिक परिश्रम के समय यह मात्रा ३० से ४० लिटर तक हो सकती है ।

(२) हृत्प्रतीघातों का क्रम और शक्ति (३) रक्तभार (४) व्यायाम रक्तभार (Blood pressure)

रक्तवाहिनियों की दीवाल पर रक्त का जो दबाव पड़ता है उसे रक्तभार करते हैं ।

कारणः—रक्तभार निम्नाङ्कित कारणों से होता हैः—

(१) हृदय की शक्ति

(क) रक्तनिर्यात (ख) हृदयगति का क्रम

(ग) रक्तप्रवाह का वेग

(२) प्रान्तीय प्रतिरोध (३) रक्तका परिमाण

(४) रक्त की सान्द्रता (५) रक्तवाहिनियों की स्थितिस्थापकता

(६) नलिका का आयतन (७) श्वसनसम्बन्धी परिणाम

श्वास लेने के समय धमनीगत रक्तभार अधिक तथा उच्छ्वास के समय कम हो जाता है । रक्तसंवहन के विभिन्न भागों में भी यह भिन्न भिन्न होता है । महाधमनी में यह सबसे अधिक (१४० मिमीमीटर) और सिराओं में सबसे कम (- ८) होता है ।

रक्तभार का मापन

रक्तभार के मापन की दो मुख्य विधियाँ हैंः—

१. साक्षात् (Direct) २. नैदानिक (Clinical)


प्रथम विधि जन्तुओं तथा द्वितीय विधि मनुष्यों में प्रयुक्त होती है ।

साक्षात् विधि में धमनी को खोल कर उपयुक्त यन्त्र द्वारा तद्गत भार को देखा जाता है तथा उसका विवरण रक्खा जाता है ।

नैदानिक विधि में धमनी को खोला नहीं जाता, किन्तु बाहर से ही एक यन्त्र के सहारे रक्तभार नापा जाता है । इसको देखने की भी दो विधियाँ हैं एक स्पर्शनविधि (Palpatory method) और दूसरी श्रवणविधि (Auscultatory method)

रक्तभारमापक यन्त्र (Sphygmomanometer) में एक पम्प होता है जिससे नलिका लगी रहती है । एक नलिका का सम्बन्ध याहुयन्धन से तथा

दूसरी नलिका का सन्ध्यन्त्र पारदयन्त्र से रहता है। वायुयन्त्रन समरूप से बाहु पर कस कर बाँध दिया जाता है और पम्प से हवा भरी जाती है। उसी समय वहिः प्रकोष्ठिका धमनी (नाडी) भी देखी जाती है। जब वायुयन्त्रन में वायु का दबाव धमनी गत रक्तभार से अधिक हो जाता है तब धमनी दृष्य जाती है और उसका स्पन्द यन्द हो जाता है। फन्स्वरूप पारदयन्त्र में भी कम्पन नहीं दीखता। अब पम्प के स्फु को ढीला कर वायुयन्त्रन से वायु बाहर निकाली जाती है। वायु के निकलने से थोड़ी देर में नाडी पुनः चलने लगती है। इसी समय पारदयन्त्र को देखने से जो अङ्क प्राप्त होगा वह सन्तोचकालिक रक्तभार का



चित्र ३०-रक्तभारमापन

सूचक होगा। और अधिक वायु के निकालते जाने से नाडी अधिक स्पष्ट होती जाएगी और जब नाडी बिलकुल स्पष्ट हो जाय तथा पारद यन्त्र में कम्पन भी

अधिकतम हो तो वह प्रसारकालिक रक्त भार का सूचक होगा । यह स्पर्शन विधि पहलाती है । इस विधि का प्रयोग अब प्रायः नहीं होता है, क्योंकि इसमें रक्तभार ५-१० मिलीमीटर कम मिलता है और प्रसारकालिक रक्तभार भी ठीक से पता नहीं चलता ।

सामान्यतः श्रवणविधि का ही अधिक उपयोग होता है । उसमें नाडी को स्पर्श करने के बदले कफोखिणात में बाहुबीधमनी के ऊपर श्रवणयन्त्र रख कर प्रत्येक स्पन्द के समय ध्वनि सुनी जाती है । बाहुपन्धन में वायुभार अधिक हो जाने से धमनी दब जाती है और ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती । जब धीरे धीरे वायु निकाली जाती है और जैसे ही ध्वनि सुनाई दे, पारदयन्त्र में अङ्क को देख ले । यही सङ्कोचकालिक रक्तभार होगा । और अधिक वायु निकालने से ध्वनि सीमतर होती जाती है, फिर अस्पष्ट हो जाती तथा अन्त में बंद हो जाती है । प्रकटम ध्वनि होने के पहले अस्पष्ट ध्वनि के समय पारदयन्त्र के अङ्कों को नोट कर ले । यही प्रसारकालिक रक्तभार होगा ।

इसका ध्यान रखना चाहिये कि रक्तभार लेने समय हृदय और बाहु सम-स्त में रहें ।

प्राकृत रक्तभार (Normal blood pressure)

प्राकृत सङ्कोचकालिक रक्तभार में आयु के अनुसार विभिन्नता होती है:—

बाल्यावस्था	७५ से ९० मिलीमीटर
किशोरावस्था	९० " ११० "
युवावस्था	१०० " १२० "
प्रीढावस्था	१२० " १३० "
वृद्धावस्था	१४० " ५० "

आयु के अनुसार रक्तभार निकालने के लिए सामान्यतः आयु में ९० जोड़ देने से सङ्कोचकालिक रक्तभार मालूम हो जाता है:—

सङ्कोचकालिक रक्तभार = आयु + ९०

१६० से अधिक रक्तभार विकृति का सूचक है ।

१. युवा व्यक्तियों में औसत प्रसारकालिक रक्तभार ८० मिलीमीटर होता है और ४० वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में लगभग ९० मिलीमीटर होता

है। भावावेश के कारण हृदय की गति तीव्र होने तथा अधिनिलीन के द्वारा प्रभावित होने से रक्तभार बढ़ जाता है। इसी प्रकार शारीरिक व्यायाम के समय भी रक्तभार बढ़ जाता है।

संकोचकालिक रक्तभार (Systolic blood pressure)

यह हृदय के संकोचकाल में विद्यमान अधिकतम रक्तभार है और वामनिलय की शक्ति एवं कार्यक्षमता का सूचक है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह प्रायः ५ से १० मिलीमीटर तक कम होता है। काल का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। प्रातः काल यह सब से कम तथा अपराह्न में सबसे अधिक रहता है।

प्रसारकालिक रक्तभार (Diastolic blood pressure)

यह हृदय के प्रसारकाल में धमनियों में विद्यमान रक्तभार है। यह धमनी-यल तथा प्रान्तीय प्रतिरोध की शक्ति का सूचक है। यह सामान्यतः ५० वर्ष की आयु तक संकोचकालिक रक्तभार के $\frac{2}{3}$ होता है। वृद्धावस्था में यह उसके $\frac{1}{2}$ हो जाता है।

नाड़ीभार (Pulse pressure)

संकोचकालिक तथा प्रसारकालिक रक्तभार में जो अन्तर होता है उसे नाड़ीभार कहते हैं। यह प्रत्येक संकोचकाल में उत्भूत शक्ति का निर्देशक है तथा रक्तसंचालन की क्षमता का सूचक है। युवा व्यक्तियों में यह लगभग ४५ मिलीमीटर होता है। स्वभावतः संकोचकालिक, प्रसारकालिक तथा नाड़ीभार स्वाभाविक रक्तभार के १:२:१ के अनुपात में होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, संकोचकालिक रक्तभार बढ़ता जाता है और संकोचकालिक तथा प्रसारकालिक रक्तभार का अन्तर भी अधिक होता है।

आवश्यक रक्तभार (Essential pressure)

यह वह भार है जो प्रान्तीय प्रतिरोध पर विजय पाकर संपूर्ण शरीर को रक्तप्रदान करने के लिए आवश्यक है। यह लगभग ५० मिलीमीटर होता है।

रक्तप्रवाह की गति

रक्तवह संस्थान के विभिन्न भागों में रक्तप्रवाह की गति में अन्तर होता है। यह गति धमनियों में ७२० इंच प्रतिमिनट, केशिकाओं में १ इंच प्रति-

मिनट तथा सिराओं में २४० से ३६० इञ्च प्रतिमिनट होती है । इस विभिन्नता का कारण यह है कि द्रवपदार्थ की गति नलिकाओं में उनके व्यास के विपर्यस्त अनुपात से होती है । धमनी ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है, उसकी शाखायें बढ़ती जाती हैं और नलिकाओं का क्षेत्र बढ़ जाने से क्रमशः रक्त की गति भी उसी के अनुसार कम होती जाती है । उदाहरण स्वरूप, केशिकाओं का कुल क्षेत्र महाधमनी से ७२० गुना अधिक है, अतः उसमें रक्त की गति महाधमनी की अपेक्षा ७२० गुनी कम है । इसी प्रकार उत्तरा तथा अधरा महासिराओं का क्षेत्र दुगुना या त्रिगुना होने से महाधमनी की अपेक्षा उनमें रक्त की गति भी ३ या ३- होती है ।

गतिवैभिन्न्य का महत्व

अंगों के पोषण की दृष्टि से, रक्तभार की अपेक्षा रक्त की गति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर अंगों में पहुँचने वाली रक्तराशि निर्भर करती है । केशिकाओं में रक्त की बहुत मन्द होती है क्योंकि इसी स्थान पर रक्त छन कर धातुओं में पहुँचता है और उनका पोषण करता है । शरीर की संपूर्ण केशिकाओं की लम्बाई ६२००० मील तथा उनका क्षेत्र ६७००० वर्गफीट, लगभग १३ एकड़ है ।

जब सिराओं में अवरोध होने तथा केशिका की दीवाल की प्रवेश्यता बढ़ जाने से केशिकागत भार अधिक हो जाता है तब केशिकाओं से अधिक परिमाण में जलस्राव का साव होता है और जब यह जलस्राव इतना अधिक हो जाता है कि लसीकागहिनियों से अच्छी तरह नहीं हटाया जा सकता तब वह निवृत्तवर्ती धातुओं में एकत्रित और संचित होने लगता है । इसी से शोथ उत्पन्न हो जाता है । इस स्थिति में, जलस्राव की कमी से रक्तणुओं के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है और केशिकागत प्रवाह बन्द हो जाता है ।

रक्त की गति के कारण

(१) हृदय से उद्भूत शक्ति (२) दबाव का अन्तर (३) नलिका की चौड़ाई (४) नलिकाभित्ति का संघर्ष ।

नलिका की चौड़ाई अधिक होने से रक्त की गति कम हो जाती है । इसका निर्धारण निम्नांकित सूत्र के अनुसार करना चाहिये :—

$$\text{रक्त की गति} = \frac{\text{रक्तपरिमाण प्रतिसेकण्ड}}{\text{नलिका का क्षेत्र}}$$

नाड़ी (Pulse)

परिभाषा:—नाड़ी रक्तभार में अचानक वृद्धि की तरंग तथा घमनी की आकृति में परिवर्तन का समुक्त रूप है। इसी तरंग का अनुभव स्पर्शनकाल में अंगुलियों के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक हृत्प्रतीघात के द्वारा प्रान्तीय रक्तभार में परिवर्तनों के अनुरूप घमनीभित्तियों की प्रतिक्रिया (प्रसार तथा दीर्घता) ही नाड़ी है। घमनियाँ प्रसारकाल में टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं जो संकोचकाल में सीधी हो जाती हैं।

कारण:—१. निलय का सान्तर संकोच

२. हृदय के रक्तनिर्यात का परिमाण

३. हृदय के रक्तनिर्यात की विधि

४. रक्तनलिकाओं की स्थितिस्थापकता

५. प्रान्तीय प्रतिरोध

हृदय के प्रत्येक संकोचकाल में ३ औंस रक्त महाधमनी में जाता है। यदि रक्तनलिकाएँ कड़ी होती, तो उतना ही रक्त संपूर्ण शरीर में होता हुआ हृदय में लौट आता, किन्तु ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि हृदय के संकोचकाल में रक्त का अधिक भाग धमनियों में रह जाता है और धमनियाँ भी फैलकर लंबी या सीधी होकर इस अधिक रक्त को अपने में स्थान देती हैं। इसी के फलस्वरूप नाड़ी का अविर्भाव होता है। प्रसारकाल में यह अधिक रक्त धमनियों के संकुचित होने से केशिकाओं में चला जाता है।

स्पन्द केवल धमनियों में ही प्रतीत होता है और स्वभावतः केशिकाओं और सिराओं में नहीं मिलता। केवल हृदय के निकटवर्ती बड़ी बड़ी सिराओं में स्पन्द मिलता है। निम्नांकित दो दृष्टियों से यह विभिन्न धमनियों में भी भिन्न भिन्न रूप में होता है:—

(१) हृदय के निकट बड़ी धमनियों में नाड़ीतरंग अधिक उच्च होती है तथा दूरवर्ती धमनियों में उसनी उच्च नहीं होती तथा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है।

(२) हृदय के निकट बड़ी धमनियों में यह शीघ्र उत्पन्न होती तथा छोटी धमनियों में क्रमशः बाद में पहुँचती है । इस प्रकार नाडी तरंगवत् गति करती है, इसलिए इसे नाडीतरंग कहते हैं ।

नाडीतरंग का वेग

नाडीतरंग का वेग रक्तप्रवाह के वेग की अपेक्षा बहुत अधिक होता है । स्वभावतः इसका वेग इतना तीव्र होता है कि यह अर्धचन्द्र कपाटों के बन्द होने के पहले ही दूरवर्ती धमनियों में पहुँच जाती है । आयु के अनुसार भी नाडीतरंग के वेग में विभिन्नता होती है:—

५.२ मीटर प्रतिसेकण्ड ५ वर्ष की आयु में ।

६.२ " " २० " " ।

७.२ " " ४० " " ।

८.३ " " वृद्धावस्था में ।

नाडीतरंग का वेग धमनियों की कठिनता पर निर्भर करता है । जितनी कठिन धमनियाँ होती हैं, उतना ही अधिक इसका वेग होता है । इसीलिए वृद्धावस्था में धमनी काठिन्य के कारण यह सबसे अधिक होता है ।

यह निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है:—

१. धमनियों की प्रसरणशीलता:—लचीली धमनियों में वेग कम तथा कठिन धमनियों में अधिक होता है । उदाहरणस्वरूप, कक्षा से करतल की अपेक्षा घंटाण से पादतल तक वेग अधिक रहता है, क्योंकि कक्षालुगा धमनी की अपेक्षा और्वी धमनी अधिक कठिन होती है । इसी प्रकार बच्चों की धमनियों में नाडीतरंग मन्द होती है और युवा व्यक्तियों की कठिन धमनियों में अधिक तीव्र होती है ।

२. धमनियों की चौड़ाई:—चौड़ी धमनियों में वेग कम होता है ।

३. रक्तभार का परिमाण:—रक्तभार अधिक में वेग तीव्र तथा रक्तभार की कमी में वेग मन्द होता है ।

नाडी की स्पर्शनपरीक्षा

इसमें निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिये:—

(१) सख्या (Frequency), (२) बल (Strength),

(३) नियमितता (Regularity or Rhythm),

(४) शक्ति (Tension), (५) आयतन (Volume)

(१) संख्या:—यह हृत्प्रतीघात की संख्या का सूचक है। आयु के अनुसार इसमें विभिन्नता होती है:—

नवजात शिशु	१४० प्रतिमिनट
१ वर्ष से कम	१३० "
१-२ वर्ष	१००-१२० "
३-४ वर्ष	९०-१०० "
७-१४ वर्ष	८० "
युवावस्था	७२ "

काल के अनुसार भी विभिन्नता देखी जाती है। निद्राकाल में यह सब से कम (५२-५७ प्रतिमिनट) तथा दिन में अधिकतम (११२-१२० प्रतिमिनट) होती है। इसकी औसत ६०-९० तक होती है।

(२) बल:—यह निलयसंकोच की शक्ति का सूचक है तथा हृदय के बल तथा प्रसिक्त रक्त की मात्रा पर निर्भर रहता है।

(३) नियमितता:—यह हृत्प्रतीघातों के क्रम का सूचक है। जब हृदय आक्रमिक रूप से संकोच करता है (कालिक आक्रमता) तब नाड़ी बीच बीच में टूट हो जाती है। इसे सान्तर नाड़ी कहते हैं। जब हृदय तो क्रमिक रूप से संकोच करता है, किन्तु निलयसंकोच का बल समान नहीं रहता (आयतन सन्धी आक्रमिकता) तो उसे अनियमित नाड़ी कहती हैं।

(४) शक्ति:—यह अधिकतम संकोचकालिक रक्तभार का मापक है। नाड़ी में रक्तप्रवाह को बन्द करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, उसी से इसका माप किया जाता है। इसमें निर्मोक्त कारणों से विभिन्नता होती है:—

(क) हृदय का बल:—अधिक होने से संकोचकालिक रक्तभार अधिक फलतः नाड़ीशक्ति अधिक होती है।

(ख) प्रान्तीय प्रतिरोध का परिमाण:—अधिक होने से शक्ति अधिक होती है यथा शीतज्वर में कण के समय प्रतीत किया जा सकता है।

(ग) धमनीभित्ति की स्थितिरथापकता:—धमनियों में काठिन्य होने से शक्ति अधिक हो जाती है ।

(५) आयतन या आकृति:—कभी कभी तरंग ऊँची होने से नाडी अधिक फैलती है (गुरु या पूर्ण नाडी) और कभी कभी तरंग कम ऊँची होने से नाडी कम फैलती है (लघु या अपूर्ण नाडी) ।

नाडी की पूर्णता दो बातों पर निर्भर है:—

१. धमनियों की स्थितिरथापकता ।
२. हृदय का बल तथा रक्तनिर्यात का परिमाण ।

नाडीस्पन्दमापक यन्त्र (Sphygmograph)

नाडीस्पन्द का लिखित विवरण प्राप्त करने के लिए नाडीस्पन्दमापक यन्त्र का प्रयोग होता है । इस यन्त्र के द्वारा रेखाओं में जो नाडीस्पन्द का विवरण प्राप्त होता है उसे नाडीस्पन्दमाप (Sphygmogram) कहते हैं । नाडीस्पन्दमाप का अध्ययन करने से उसमें निम्नांकित भाग होते हैं:—



चित्र ३१—नाडीस्पन्दमाप

१ से २—ऊर्ध्वरेखा, २ से ७—निम्नरेखा, ३—पूर्वनिम्नतरंग, ४—निम्नतरंगखाल, ५—निम्नतरंग, ६—अनुनिम्न तरंग ।

(क) ऊर्ध्वरेखा (Upstroke)—रक्तमार कम रहने से यह अधिक ऊँची मिलती है ।

(ख) निम्नरेखा (Downstroke)—प्राग्तीय प्रतिरोध अधिक रहने के कारण इसमें कई गौणतरंगे होती हैं ।

गौण तरंग (Secondary waves)

उपर्युक्त रेखाओं के साथ गौण तरंगें संयुक्त रहती हैं:—

१. उच्चतरंग (Anacrotic wave)—यह उच्चरेखा के साथ मिली रहती है और वैकृत अवस्थाओं यथा द्वारमंकोच, रक्तभाराधिक्य आदि में मिलती है।

२. निम्नतरंग—(Dicrotic wave) यह निम्नरेखा के साथ मिली रहती है और महाधमनी कपाटों के बन्द होने के कारण रक्त के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। महाधमनी कपाटों की विकृति में रक्त पुनः निलय में चला आता है और उस समय एक विशेष प्रकार की नाड़ी प्रतीत होती है जिसे जलमुद्गर नाड़ी (Water-hammer pulse) कहते हैं।

३. पूर्वनिम्न तथा अनुनिम्न तरंग—

कभी कभी निम्नतरंग के पहले या पीछे गौणतरंग संयुक्त हो जाती है। उन्हें क्रमशः पूर्वनिम्न (Pre-dicrotic) या अनुनिम्न तरंग (Post-dicrotic) कहते हैं। यह धमनियों के काठिन्य के कारण उत्पन्न होती है।

सिराओं में रक्तसंचयन

सिराओं के द्वारा रक्त का संबन्धन निम्नांकित कारणों से होता है:—

१. हृदय के संकोचकाल में उत्पन्न दबाव।
२. धमनियों की स्थितिस्थापकता।
३. पेशीसंकोच।
४. अन्तःचसन के समय वक्ष की कर्पणक्रिया।
५. अहिन्दों में शून्य दबाव के कारण हृदय द्वारा रक्त का चूषण।
६. सिराओं का क्रमिक संकोच और प्रसार।

प्राकृत अवस्थाओं में प्राण्तीय प्रतिरोध तथा धमनियों की स्थितिस्थापकता के कारण सिराओं और केशिकाओं में रक्तप्रवाह सतत और समान रूप से होता है, अतः उनमें स्पन्दन नहीं प्रतीत होता। निम्नांकित अवस्थाओं में सिरागत स्पन्दन प्रतीत होता है:—

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| १. सूक्ष्म धमनियों का प्रसार। | २. धमनियों का काठिन्य। |
| ३. हृदय की मन्द क्रिया। | ४. हृदय की शीघ्र क्रिया। |

प्राकृत अवस्था में भी हृदय के समीप बड़ी बड़ी सिराओं में स्पन्दन होता है।

केशिकाओं में रक्तसंवहन

केशिकाओं में भी स्पन्दन वैकृत अवस्था में उपर्युक्त कारणों से ही प्रतीत होता है । केशिकाओं में रक्त तीन धाराओं में बहता है :—

१. स्थिर स्तर :—यह केशिका की दीवाल से लगा होता है और इसमें कुछ धिले श्वेतकण होते हैं ।

२. प्रान्तीय धारा :—इसकी गति बहुत मन्द होती है और इसमें श्वेत कण रहते हैं ।

३. केन्द्रीय धारा :—इसकी गति शीघ्र होती है और इसमें रक्तकण होते हैं ।

रक्तसंवहन की स्थानिक विशेषतायें

मस्तिष्क :—मस्तिष्कमूलिका तथा मातृका धमनियों से बने हुये धमनी चक्र के द्वारा मस्तिष्क को रक्त निरन्तर मिलता रहता है । कुछ करोटिकीय धमनियाँ भी इसमें सहयोग करती हैं । करोटि तथा कठिन मस्तिष्कावरण से आच्छादित रहने के कारण सिरायें तथा सिरापरिवाहिकायें बाहरी दबाव से बची रहती हैं ।

फुफ्फुस :—सामान्य रक्त संवहन से फुफ्फुसी रक्त संवहन की निम्नांकित विशेषतायें हैं :—

१. फुफ्फुसी धमनियों में दबाव बहुत कम लगभग २० मिलीमीटर (काथिक धमनियों का १) रहता है । इसका कारण यह है कि फुफ्फुस में स्थित सूक्ष्म धमनियों का आयतन अधिक होता है और वहाँ में दाह वायुमण्डल की अपेक्षा दबाव कम रहने के कारण केशिकायें फैली रहती हैं । कभी कभी यह दबाव हृदय के दक्षिण भाग में रक्त के अधिक आघात तथा फुफ्फुसों से वाम अलिन्द की ओर रक्तप्रवाह में बाधा होने के कारण बढ़ जाता है ।

२. फुफ्फुसों में रक्त की कुल मात्रा प्रवास के समय सम्पूर्ण शरीर के रक्त का ८ प्रतिशत तथा निःप्रवास के समय ६ प्रतिशत रहता है ।

३. तीसरी विशेषता है फुफ्फुसों में रक्तवाहिनी सञ्चालक नाडियों का नितान्त अभाव । इधर कुछ प्रयोगों के द्वारा सङ्कोचक नाडियों की उपस्थिति देखी गई है किन्तु प्रसारक नाडियों के सम्यन्ध में कुछ निश्चय नहीं हो सका है ।

हृदय :—हृदय को हार्दिक धमनियों के द्वारा रक्त मिलता है । महाधमनी की प्रथम शाखा होने के कारण इन धमनियों में रक्त अधिक दबाव के साथ

जाता है और हृदय में रक्तसंचहन यथासम्भव सर्वोत्तम रीति से होता है। हृदय के कुल निर्यात का लगभग ५ प्रतिशत रक्त इन धमनियों में हो कर बहता है। हृदय की कार्यक्षमता इसी रक्तसंचहन पर निर्भर करता है। निम्नांकित कारणों का प्रभाव हार्दिक रक्तसंचहन पर पड़ता है:—

१. हृदय का रक्तनिर्यात—हृदय से अधिक रक्त निर्यात होने पर रक्तसंचहन अधिक होता है यहाँ तक कि अत्यधिक परिश्रम के समय सम्पूर्ण रक्तसंचहन का लगभग ६ रक्त कुपकुस में हो जाता है।

२. ओपजन की मात्रा:—शरीर की अन्य धातुओं की अपेक्षा हृदय को ओपजन की आवश्यकता अधिक होती है। अत्यधिक परिश्रम में शरीरगत कुल ओपजन का लगभग ६ हृदय के काम आ जाता है। जब रक्त में ओपजन की मात्रा कम हो जाती है तब हार्दिक धमनियों का प्रसार हो जाता है और आवश्यक परिमाण में ओपजन पहुँचाने के लिए उनमें रक्तप्रवाह बढ़ जाता है। ५० प्रतिशत ओपजन की कमी होने से रक्तप्रवाह ४-५ गुना बढ़ जाता है।

३. कार्बनड्विऑक्साइड की मात्रा:—कार्बनड्विऑक्साइड की अधिकता से हार्दिक धमनियों का प्रसार हो जाता है किन्तु यह प्रसार पूर्णतः कारण की अपेक्षा कम होता है।

४. रक्त का उदजनकेन्द्रीभवन:—अधिक (७.५ से ७.९ तक) होने से हार्दिक धमनियों का संकोच हो जाता है।

५. धमनीगत रक्तभार:—रक्तभार बढ़ने से हार्दिक रक्तप्रवाह बढ़ जाता है।

६. अन्तःस्त्राय:—अदिनिट्रीन से हार्दिक धमनियों की छोटी छोटी शाखाओं का प्रसार हो जाता है। हिस्टेमीन से उनका संकोच हो जाता है। पीयूषग्रन्थि के स्त्राव (पिट्यूटरीन) से भी उनका संकोच होता है।

७. खनिज लवण:—पोटाशियम की अधिकता से हार्दिक धमनियों का प्रसार तथा खटिक की अधिकता से उनका संकोच हो जाता है।

८. तापक्रम:—शीत से हार्दिक धमनियों का प्रसार एवं उष्णता से उनका संकोच होता है।

रक्तसंचहन पर प्रभाव डालने वाले कारण

१. गुरुत्वाकर्षण:—औसत दबाव कम होने के कारण सिराओं पर धमनियों की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक पड़ता है, फिर भी कपाटों की

उपस्थिति तथा सिराओं द्वारा रक्तप्रवाह में सहायक कारणों से स्वभावतः विकृति दृष्टिगोचर नहीं होती । सीधा खड़ा होने पर उदरप्रदेश में रक्त अधिक एकत्रित हो जाता है जिससे हृदय के दक्षिण भाग में रक्त कम जाता है, फल स्वरूप, सभी अङ्गों, विशेषतः मस्तिष्क में रक्त की पहुँच पूरी नहीं हो पाती । साधारण स्थिति में, निम्नाश्रित कारणों से धमनीगत रक्तभार कम नहीं होने पाता:—

(क) उदरपेशियों का सहज सङ्कोच

(ख) उदररक्तवाहिनियों की शक्ति

(ग) अन्तःश्वसन के समय चक्षीय कर्पण

चक्षीय कर्पण के कारण ही इन अवस्थाओं में श्वसन क्रिया बढ़ जाती है । सोया हुआ व्यक्ति जब अचानक खड़ा होता है या उठ बैठता है तब रक्तवाहिनी सञ्चालक नाडियों की समुचित प्रतिक्रिया के कारण मस्तिष्क में रक्त की कमी नहीं होने पाती । किन्तु जब मनुष्य दुर्बल होता है और रक्तवाहिनी सञ्चालक नाडियाँ भी दुर्बल हो जाती हैं तब ऐसी स्थिति में अचानक खड़ा होने से, मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से चकर मालूम होने लगता है ।

२. व्यायाम:—व्यायाम का अधिक प्रभाव रक्तग्रह संस्थान पर ही देखने में आता है । परिश्रम प्रारम्भ करते ही सारे शरीर, विशेषतः चर्म और आन्त्र के रक्तग्रह स्रोत सङ्कुचित हो जाते हैं और रक्तप्रवाह का क्षेत्र कम हो जाता है । परिणामस्वरूप, सिराओं द्वारा हृदय में रक्त अधिक आने लगता है जिससे हृदय उत्तेजित हो कर अधिक तेजी से कार्य करने लगता है और इस प्रकार शरीर के अङ्गों में रक्त का सञ्चार बढ़ जाता है । स्वभावतः चक्ष के भीतर का दबाव शून्य रहता है और सांस भीतर लेने के समय यह और भी कम हो जाता है । दूसरी ओर, महाप्राचीरा पेशी के नीचे खिसकने से उदर में दबाव बढ़ जाता है और इस प्रकार रक्त ज्यादा दबाव के स्थान से कम दबाव वाले स्थान (हृदय) की ओर खिंचने लगता है । शरीर के जिस अंग पर भार पड़ता है, वहाँ की पेशियाँ सिराओं के कपाटों को दबा कर रक्त को हृदय की ओर ले जाने में सहायता करती हैं ।

रक्त का तापक्रम तथा हृदय के दक्षिण भाग में उसका दबाव बढ़ जाने के कारण हृदय की गति भी बढ़ जाती है । यदि रक्तभार अधिक हुआ तो उसको

कम करने के लिए हृदय मन्द तथा धमनियां प्रसारित हो जाती हैं। रक्त में ओपजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण नाड़ी मण्डल उत्तेजित हो जाता है और इस प्रकार हृदय की गति तेज हो जाने से रक्त का दबाव थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है।

विशेषतः जिस अङ्ग का व्यायाम हो रहा हो, उसमें केशिकाओं का प्रसार हो जाता है। परिश्रम के समय वहाँ दुग्धमल तथा कार्बनडाइऑक्साइड उत्पन्न होने से तत्स्थानीय धमनियों का प्रसार हो जाता है। अधिपृक्क ग्रन्थि का साव (अड्रिनिलीन) परिश्रम के समय बढ़ जाता है और हृदय की गति बढ़ाने में सहायक होता है।

तापक्रम:—तापक्रम की वृद्धि से रक्त गरम हो कर ताप नियामक केन्द्र को उत्तेजित करता है और खचा की रक्तवाहिनियां प्रसारित हो जाती हैं जिससे अन्त में स्वेदग्रन्थियों की क्रियाशीलता से स्वेद की उत्पत्ति होती है।

उच्चकेन्द्र:—व्यायाम के पूर्व ही से हृदय की गति तीव्र हो जाती है तथा रक्तवाहिनियों का संकोच हो जाता है। मानसिक परिश्रम से भी रक्तवह स्त्रोतों का संकोच होता है और लगभग ५० मिलीमीटर रक्तभार बढ़ जाता है। स्त्रोतों के संकोच के कारण खचा की विद्युत् सहिष्णुता कम हो जाती है जिसे मानस-व्युत्त प्रत्यावर्तित क्रिया (Psycho-electric reflex) कहते हैं। मानस आवावेश की अवस्थाओं में ग्लोहा और बृहदान्त्र के रक्तवह स्त्रोत सङ्कुचित हो जाते हैं।

रक्तस्राव:—रक्तसंवहन पर रक्तस्राव का प्रभाव इसकी गम्भीरता तथा अवधि पर निर्भर करता है। सामान्यतः रक्तस्राव की अवस्था में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं:—

१. रक्तभार की कमी
२. रक्तकों का अधिक निर्माण
३. हृदयगति की वृद्धि

सामान्य रक्तस्राव में रक्त स्त्रोत का मुख सङ्कुचित एवं मन्द हो जाता है तथा रक्त के जम जाने से रक्तस्राव रुक जाता है।

हृत्कार्य का नियन्त्रण

हृदय में केन्द्रीय नाडीमण्डल से चेष्टावह सूत्रों के दो समूह आते हैं। एक समूह प्राणदा नाडी के द्वारा आता है तथा दूसरा समूह सांवेदनिक नाडीमण्डल

के द्वारा पहुँचता है । इन्हे क्रमशःरोधक (Inhibitory) तथा वर्धक (Augmentory) सूत्र कहते हैं । संज्ञावह सूत्रों का भी एक समूह प्राणदा नाड़ी में भी सम्मिलित रहता है जिनमें से कुछ सूत्रमिल कर अवसादक नाड़ी (Depressor nerve) बनाते हैं । इस प्रकार शरीर क्रिया की दृष्टि से प्राणदा की हृदयस्थित शाखायें संज्ञावह तथा चेष्टावह या रोधक इन दो श्रेणियों में विभक्त हैं । इन नाड़ियों का हृत्कार्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार हृदय का कार्य नियन्त्रित होता है । इसीलिए जब प्रान्तीय प्रतिरोध अत्यधिक होता है तथा धमनीगत रक्तभार भी अधिक हो जाता है तब हृदय की गति मन्द हो जाती है । इस प्रकार धमनीगत प्रतिरोध के अनुसार परिवर्तन होने से हृदय अवसाद या चति से बच जाता है ।

चेष्टावह नाड़ियों का मार्ग -

(क) प्राणदा की रोधक शाखायें निम्नांकित हैं:—

- (१) ग्रीवास्थित हार्दिक शाखायें (२) वक्षःस्थित हार्दिक शाखायें
(३) अधःस्थित स्वरयन्त्रीय (४) ऊर्ध्वस्थित स्वरयन्त्रीय का बाह्य विभाग
रोधक सूत्र प्राणदा नाड़ी के केन्द्र से प्रारंभ होकर उपर्युक्त शाखाओं के मार्ग से हृदय में पहुँचते हैं और वहाँ जाकर सिरालिन्द एवं अलिन्दनिलयप्रथि में स्थित नाड़ीकोषाणुओं में समाप्त हो जाते हैं । दक्षिण प्राणदा के सूत्र मुख्यतः अलिन्दनिलयप्रथि में जाते हैं । उन नाड़ीकोषाणुओं से पुनः नवीन सूत्र निकलते हैं जो अलिन्द, निलय एवं अलिन्दनिलयगुच्छ में जाते हैं ।

(ख) वर्धक सूत्र सुपुम्नाकाण्ड में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा कुछ पञ्चम नाड़ियों के पूर्वमूल में उत्पन्न होते हैं और ऊर्ध्व, मध्य तथा अधः नाड़ी-गण्ड होते हुए हृदय में पहुँचते हैं और वहाँ प्राणदा की हार्दिक शाखाओं से मिल कर हृदयनाड़ीचक्र बनाते हैं । यह नाड़ीचक्र हृदय के मूल में स्थित है और इसके दोनों उत्तान एवं गम्भीर भाग महाधमनी के तोरण तथा आरोही भाग पर अवस्थित हैं । इस चक्र से हृदय में रोधक तथा वर्धक दोनों प्रकार के सूत्र पहुँचते हैं जो हृदय का नियन्त्रण करते हैं ।

रोधक सूत्रों का कार्य

हृदय में प्राणदा से निरन्तर उत्तेजना पहुँचती रहती है जो

को बढ़ने नहीं देती। यदि प्राणदा नाडी को काट दिया जाय या उसकी विकृति से उसका रोधक प्रभाव कम हो जाय तो हृदय की गति सीम हो जाती है। इस स्थिति में भी यदि प्राणदा में कृत्रिम रूप से उत्तेजना पहुँचाई जाय तो उसकी गति मन्द हो जाती है या बिलकुल रुक जाती है।

रोधक सूत्रों के कार्य का स्वरूप क्या है इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। हॉवेल के मत से प्राणदा नाडी की उत्तेजना से जो हृदय का अवरोध होता है वह पोटाशियम अणुओं के आविर्भाव के कारण होता है। प्राकृतिक रूप से हृत्पेशी में पोटाशियम लवणों के रूप में रहता है और नाडीगत उत्तेजना के द्वारा उसका विद्रवण होने से जब उसके अणु स्वतन्त्र होते हैं तब उनका रोधक प्रभाव हृदय पर होता है। दूसरे विद्वानों का मत है कि यह रोधक प्रभाव एक विशिष्ट रासायनिक द्रव्य (एस्टरिलकोलिन) के द्वारा होता है जिसे 'प्राणदाद्रव्य' की भी संज्ञा दी गई है। ऐट्रोपीन की क्रिया इस प्राणदाद्रव्य के विपरीत होती है। इसी प्रकार लोगों का विश्वास है कि सांवेदनिक नाडी की उत्तेजना से भी एक वर्धक द्रव्य उत्पन्न होता है जो हृदयगति को बढ़ा देता है।

वर्धक सूत्रों का प्रभाव

सांवेदनिक नाडी के वर्धक सूत्रों का भी प्रभाव हृदय पर निरन्तर होता है, किन्तु प्राणदा की अपेक्षा इनका प्रभाव बहुत अल्प होता है इसलिए इनको काट देने से हृदय का विशेष अवरोध देखने में नहीं आता। इन सूत्रों को उत्तेजित करने के बाद ५-१० मिनट तक नाडी की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इनका अव्यक्त काल अधिक होता है, किन्तु प्रभाव उत्पन्न होने पर अधिक देर तक रहता है। इसका कारण यह है कि सांवेदनिक सूत्रों की उत्तेजना से अधिकृत ग्रन्थि का उत्सर्ग बढ़ जाता है जिसका वर्धक प्रभाव देर तक रहता है।

इन सूत्रों के प्रभाव से हृदयगति यद्यपि बढ़ जाती है तथापि रक्तनिर्यात नहीं बढ़ता क्योंकि सिराओं से रक्त के आयात में कोई वृद्धि नहीं होती और रक्तभार भी उतना ही रहता है। इस प्रकार उत्तेजना से हृदयगति की वृद्धि होने पर प्रसारकाल पर अधिक प्रभाव पड़ता है और वह कम हो जाता है। इससे हृत्पेशी की उत्तेजनीयता भी बढ़ जाती है जिससे अधिक संकोच भी उत्पन्न होने लगता है। अतः सांवेदनिक उत्तेजना की प्रतिक्रिया हृदय पर घातक

होती है और यदि उचित रूप से प्राणदा को उत्तेजित किया जाय तो वह लाभकर होता है ।

संज्ञावद् नाडियाँ

प्राणदा की अवसादक शाखा हृदयगति का नियमन करती है । जय रक्तभार अधिक होता है तब यह उत्तेजित होकर हृदय की गति धम कर देती है । इन सूत्रों पर शरीर के अन्य अंगों तथा धातुओं की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है । मानस दशाओं का भी इस पर प्रभाव पड़ता है और कभी कभी इससे मृत्यु भी हो जाती है ।

हृत्केन्द्र (Cardiac centre)

हृत्केन्द्र प्राणदाकेन्द्र के समीप चतुर्थकोष्ठ की भूमि पर अवस्थित है । इसके दो भाग होते हैं:—

१. हृद्रोधक (Cardio-inhibitory)

२. हृद्वर्धक (Cardio-acceleratory)

संज्ञावद् नाडियों के द्वारा निरन्तर उत्तेजना पहुँचने के कारण हृद्रोधक केन्द्र थोड़ा बहुत सदा क्रियाशील रहता है । यह केन्द्र दो प्रकार से प्रभावित होता है:—१. साक्षात् रूप से और २. प्रत्यावर्तितरूप से

(क) हृत्केन्द्र पर साक्षात् रूप से प्रभाव डालने वाले कारण:—

१. रक्त का तापक्रम—तापक्रम की वृद्धि से हृदय की गति बढ़ जाती है ।

२. ओपजन का परिमाण—रक्त में कम हो जाने से हृदयगति बढ़ जाती है । यह स्थिति पार्श्व रथानों तथा कार्यनएकोपिद् विष में देखी जाती है ।

३. ओपजन का नितान्त अभाव—इससे भी हृदय की गति बढ़ कर १४० प्रतिमिनट तक हो जाती है ।

४. कार्यन द्विओपिद् का आधिक्य—कुछ हद तक यह हृदय की गति को बढ़ाता है, किन्तु बहुत अधिक होने से अलिन्दनिलयगुच्छ पर इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है और वह हृदयावरोध की अवस्था उत्पन्न कर देता है ।

(ख) हृत्केन्द्र पर प्रत्यावर्तित रूप से प्रभाव डालने वाले कारण:—

१. श्वसन—प्रश्वास में हृदयगति अधिक तथा निःश्वास में कम हो जाती है ।

२. रक्तभार—अधिक होने से हृदय मन्द तथा कम होने से तीव्र हो जाता है ।

३. व्यायाम—इससे हृदय तीव्र हो जाता है और पेशियों को अधिक रक्त एवं ओपजन मिलता है। हृदयगति बढ़ने का कारण यह है कि सिराओं में रक्तभार बढ़ जाता है और हृदय में रक्त अधिक मात्रा में प्रविष्ट होता है। इसे 'अलिन्द्रीय प्रत्यावर्तित क्रिया' कहते हैं।

४. संज्ञाबह नाडियाँ—कुछ संज्ञाबह नाडियों की उत्तेजना से हृदय की गति मन्द हो जाती है। अचानक तीव्र शब्द (थुतिनाडी) तथा शीत स्नान (त्वाचनाडी) का भी हृत्केन्द्र पर प्रभाव पड़ता है।

५. वेनमिज प्रत्यावर्तन—हृदय में सिराओं द्वारा रक्त के आयात में वृद्धि होने से दक्षिण अलिन्द अतिप्रसारित हो जाता है। फलस्वरूप, सांवेदनिक नाडियों के उत्तेजित होने से रक्तबह संचालक केन्द्र की क्रिया बढ़ जाती है तथा प्राणदाकेन्द्र की क्रिया रुक जाती है। जिससे रक्तबहसंकोच होता था हृदयगति तीव्र हो जाती है।

६. अवसादक प्रत्यावर्तन—पूर्वोक्त स्थिति के विपरीत जब रक्तभार बढ़ जाता है तब महाधमनी के सांवेदनिकसूत्र प्राणदाकेन्द्र के रोधक भाग को उत्तेजित करते हैं और हृदयगति मन्द एवं रक्तभार भी कम हो जाता है।

७. मानस प्रभाव—भावानेश के कारण हृदय तीव्र तथा आकस्मिक शोक के कारण मन्द या बन्द हो जाता है।

८. नेत्रहार्दिक प्रत्यावर्तन—अभिगोलकों पर दबाव पड़ने पर हृदयगति मन्द हो जाती क्योंकि पाँचवी नाडी प्राणदा नाडी से संबद्ध रहती है। इस क्रिया को 'नेत्रहार्दिक प्रत्यावर्तन' कहते हैं।

रक्तवहसञ्चालक नाडीमण्डल (Vasomotor nervous system)

परिभाषा:—यह रक्तबह स्रोतों की धारणाशक्ति को नियन्त्रित करता है। इसका प्रभाव मुख्यतः धमनियों तथा विशेषतः सूक्ष्म धमनियों पर पड़ता है। अतः इसे धमनी संचालक संस्थान भी कहते हैं।

उपयोग:—(क) प्रत्येक अंग में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार

रक्तप्रवाह का नियमन

१. पाचनकाल में पाचनसंस्थान की धमनियाँ प्रसारित तथा त्वचा की धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं। फलतः उदर में रक्त अधिक पहुँचता है।

२. चर्वण के समय लालाग्रधियों की धमनियाँ प्रसारित हो जाती हैं ।

३. व्यायाम के समय पेशियों में रक्त अधिक तथा उदर में कम पहुँचता है । इसीलिए भोजन के बाद तुरत व्यायाम का निषेध किया जाता है ।

४. मस्तिष्क धमनियों में रक्तभार बढ़ने से सूक्ष्मधमनियों का प्रसार हो जाता है और साधारण रक्तभार कम हो जाता है ।

(ख) शरीर के तापक्रम का नियमन:—

शीतकाल में श्वचा की धमनियाँ सकुचित हो जाती हैं जिससे रक्त की उष्णता नष्ट नहीं होने पाती और रक्त भीतरी अंगों में चला जाता है । इसके विपरीत, उष्णकाल में श्वचा की धमनियाँ प्रसारित हो जाने से उष्णता बाहर निकलती रहती है जिससे शरीर का तापक्रम बढ़ने नहीं पाता ।

(ग) प्रान्तीय प्रतिरोध को स्थिर रखना:—

इसके द्वारा रक्तभार का नियमन होता है ।

(घ) गुरुत्वाकर्षण पर विजय:—

यदि इसका प्रभाव न हो तो गुरुत्वाकर्षण की क्रिया से रक्त अधःशाखाओं में संचित हो जाय, किन्तु इसके फलस्वरूप उन भागों की धमनियाँ सकुचित रहती हैं और उनमें रक्त आवश्यकता से अधिक नहीं जाने पाता ।

आविष्कार

सन् १८५२ ई० में बर्लॉड धर्मंड ने कुछ जन्तुओं पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि ग्रैवयक सावेदनिक में रक्तवहसकोचक सूत्र रहते हैं जिनकी उत्तेजना से धमनियों में सकोच तथा विच्छेद से प्रसार होता है । १८५८ ई० में उपर्युक्त विद्वान् ने ही रक्तवहप्रसारक सूत्रों की उपस्थिति को प्रमाणित किया जिसके विच्छेद का तो कोई प्रभाव नहीं होता किन्तु उत्तेजना से धमनियों का प्रसार हो जाता है ।

इस नाडीयन्त्र के निम्नांकित भाग होते हैं:—

१. सज्ञावह नाडियाँ
२. सुपुम्ना शीर्षक में स्थित नाडीकेन्द्र
३. सुपुम्नाकाण्ड में स्थित सहायक केन्द्र
४. चेशावह नाडियाँ

(१) संज्ञायह नाडी—यह दो प्रकार की होती है:—

१. उत्तेजक नाडी—इसकी उत्तेजना से रक्तभार की वृद्धि हो जाती है।
२. अवसादक नाडी—इसे उत्तेजित करने से रक्तभार कम हो जाता है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार के नाडीसूत्र एक ही नाडी में होते हैं, किन्तु उनकी उत्तेजना विभिन्न अवस्थाओं में होती है। यथा खूब पर शीत के प्रभाव से उत्तेजक नाडी तथा उष्णता के प्रभाव से अवसादक नाडी उत्तेजित होती है। सम्भवतः इनकी क्रिया प्रत्यावर्तित रूप से धमनियों पर प्रभाव डालती है।

धमनीसंचालन का प्रत्यावर्तित नियन्त्रण

निम्नादित चीन प्रत्यावर्तित प्रियायें साधारण रक्तसंचालन का नियमन करती हैं:—

१. प्राणदर नाडी की अवसादक क्रिया—इसका परीक्षणामक वर्णन खुङ्ग्विग नामक विद्वान् ने सन् १८६६ ई० में किया था।

२. मातृकापरिवाहिका की क्रिया:—महामातृका धमनी के विभाजन-स्थान पर एक फूला हुआ भाग होता है उसे मातृकापरिवाहिका कहते हैं। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे ग्रन्थि के समान अंग भी होते हैं उन्हें मातृकोर्पांग कहते हैं जिन्हें पहले अन्त घवा ग्रन्थि माना जाता था। इस स्थान में बहुत-सी नाडियाँ आवर चक्र घनाती हैं। इसकी उत्तेजना से रक्तभार कम हो जाता है। इसके दो कारण हैं एक हार्दिक गति की मन्दता तथा धमनियों का प्रसार।

३. उत्तेजक क्रिया —सिराओं के द्वारा रक्त के अधिक आयात से जब अलिन्दों का प्रसार होता है या रक्तभार के बाधिव्य से बड़ी बड़ी सिरायें प्रसारित रहती हैं तो इस प्रत्यावर्तित क्रिया के द्वारा हृदय तीव्र हो जाता है। इसे 'वेनमिज की प्रत्यावर्तित क्रिया' कहते हैं।

(२) नाडीकेन्द्र:—यह मस्तिष्क के चतुर्थ कोष्ठ में स्थित होता है।

(३) सुपुम्ता के सहायक केन्द्र:—मस्तिष्क के विनाश के बाद रक्तभार में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, किन्तु यदि प्राणी की जीवित रक्खा जाय तो इन सहायक केन्द्रों की उत्तेजना से वह पुनः चढ़ने लगता है। यदि इनका भी विनाश कर दिया जाय तो रक्तभार फिर अत्यन्त कम हो जाता है।

धमनीसंचालक केन्द्र को साक्षात् रूप से उत्तेजित करनेवाले कारणः—

१. स्थानिक उत्तेजना—विद्युद्दारा के द्वारा ।
२. औषधियाँ—हिजिटेलिस, स्ट्रिकनीन और कैफीन उत्तेजक तथा ईंधर और बलोरोफार्म अवसादक होते हैं ।
३. फायन डाइअर्बिसाइड—इसके आधिक्य से रक्तभार की वृद्धि तथा कमी से रक्तभार में कमी हो जाती है ।
४. ओपजन की कमीः—इससे रक्तभार बढ़ जाता है ।

धमनीसंचालक केन्द्र को प्रत्यावर्तित रूप से उत्तेजित करनेवाले कारणः—

(१) सज्ञाग्रह धमनीसंचालक नाडियाँ—कुछ देर लगातार उत्तेजना देने से रक्तभार कम हो जाता है ।

(२) प्राणदा नाडियों के अवसादक सूत्र—

(३) मानस उत्तेजक—मानस भावावेश की अवस्थाओं में शोक इत्यादि से चेहरा पीला तथा लज्जा, क्रोध आदि से छाल हो जाता है ।

(४) मातृशरीरवाहिका में दबाव ।

चेष्टावह नाडियाँ

यह दो प्रकार की होती हैंः—

(१) धमनीसंकोचक । (२) धमनीप्रसारक ।

हृदय पर औषधों का प्रभाव

१. अदिनिलीन—यह हृदयगति तथा उसके वेग को बढ़ाता है ।

२. अर्गोटैक्सीन, अर्गोटैमीन—इससे हृदयगति मन्द हो जाती है ।

३. पेट्रोपीन—यह हृदय की गति बढ़ाता है ।

४. मस्केरीन, पाइलोकार्पीन, कोलीन, एसिटिलकोलीन—ये हृदय को मन्द करते हैं ।

५. निफोटिन—यह स्वतन्त्र नाडीमण्डल की संधियों को निश्चेष्ट बना देता है तथा प्राणदा नाडी की क्रिया को नष्ट कर देता है । अत एव हृदय गति बढ़ जाती है ।

६. मादक औषधियाँ—बलोरोफार्म, मोर्फिन तथा क्लोरल हाइड्रेट आदि हृदय की गति मन्द कर देती हैं । ये कनीनिकासकोचक भी होती हैं ।

षष्ठ अध्याय

श्वसनसंस्थान

मनुष्य के जीवन के लिए वायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण ताव है। इस वायु के आहरण और निहरण की शारीर क्रिया का नाम श्वसन है। श्वसन उन सभी क्रियाओं का समुदाय है जिनसे शरीर के कोषाणुओं को ओपजन प्राप्त होता है तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन ड्विऑक्साइड का निहरण होता है। दूसरे शब्दों में, इसे शरीर और वायुमण्डल के बीच वायवीय विनिमय की क्रिया कहा जा सकता है। यह वायवीय विनिमय ही श्वसन का प्रधान उद्देश्य है, किन्तु यह शरीर के तापक्रम के नियमन में भी सहायक होता है। श्वसन की क्रिया सभी जीवों में होती है। निम्न श्रेणी के प्राणी वायुमण्डल से सीधे ओपजन ग्रहण करते हैं, किन्तु उच्च वर्ग के प्राणी जिनमें रक्तमंडल की व्यवस्था होती है, रक्त के द्वारा ओपजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उच्चकर्म के प्राणियों में श्वसन की दो अवस्थाएँ होती हैं:—

(१) बाह्यश्वसन—(External respiration)

इसमें फुफ्फुसी केशिकाओं में स्थित रक्त तथा फुफ्फुस के वायुकोष गत वायु के बीच आदान प्रदान होता है। रक्त वायु से ओपजन ग्रहण करता तथा कार्बन ड्विऑक्साइड का परित्याग करता है।


(२) अन्तःश्वसन—(Internal or tissue respiration)

इसमें सावकायिक केशिकाओं में रक्त तथा शरीरधातुओं के बीच वायवीय विनिमय होता है।

श्वसन कर्म से सम्बद्ध शरीर का जो भाग है उसे श्वसन संस्थान कहते हैं। इसमें दोनों फुफ्फुसों तथा श्वास नलिकाओं का ग्रहण होता है।

श्वसनयन्त्र

श्वासपथ और श्वासनलिकाएँ:—श्वासपथ सौत्रिक एवं स्थितिस्थापक वायु से निर्मित एक नलिका है जिसके स्तरों के बीच में तरुणस्थिमण मुद्रिकाएँ व्यवस्थित रहती हैं। ये मुद्रिकाएँ श्वासपथ के सामने और पार्श्व में होती हैं और इनके पश्चिम भाग में सौत्रिक कला से आच्छादित श्वसन तन्त्र पेशियों का एक स्तर



चित्र ३२

- | | | | |
|-------------|--------------------|-------|------------|
| १-अधिजिह्वा | २-कृक्याविकविक | ३-अवड | ४-कृकादिका |
| ५-अधिजिह्वा | ६-वामश्वसप्रणालिका | | |

होता है । इन मुद्रिकाओं के कारण ही श्वासपथ बराबर खुला रहता है । श्वास-पथ का आन्त्यन्तर पृष्ठ रोमिकामय आवरण तन्तु से युक्त रहता है और इसकी आधारकला तथा उसके नीचे स्थित तयोजक तन्तु से श्लेष्मलकला का निर्माण होता है । श्लेष्मलकला के पृष्ठ भाग पर उसके नीचे स्थित श्लेष्मल ग्रन्थियों की नलिकायें खुलती हैं ।

चित्र ३२

आगे जाकर श्वासपथ दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है जिन्हें श्वासनलिकायें कहते हैं । इनकी रचना प्रायः श्वासपथ के समान होती है, किन्तु अन्तर केवल यही है कि इनकी श्लेष्मलकला के नीचे स्वतन्त्र पेशियों का एक सुस्पष्ट स्तर वृत्तरूप में क्रमबद्ध रहता है ।

श्वास नलिकायें भी अन्य शाखाओं, प्रशाखाओं में विभक्त हो जाती हैं । इन्हें श्वास प्रणालिकायें कहते हैं । इनमें जो बड़ी होती हैं उनकी दीवारें सौम्रिक तन्तु की बनी होती हैं तथा उनमें तरुणास्थिमय मुद्रिकाओं के भाग, स्वतन्त्र पेशी-सूत्र तथा स्थितिरूपापक तन्तु के अनुलम्ब गुच्छ होते हैं । उनके अन्तःपृष्ठ में श्लेष्मलकला होती है जो रोमिकामय आवरण तन्तु से ढकी रहती है । इस कला में श्लेष्मलग्रन्थियों का भी निवास होता है जिनसे श्लेष्मा का स्राव होता रहता है । रोमिकामय तन्तु के सहारे यह श्लेष्मा ऊपर की ओर श्वासपथ में स्वरयन्त्र तक पहुँच जाता है जहाँ से यह या तो बाहर निकाल दिया जाता है या निगल लेने पर उदर में चला जाता है । श्वसनमार्ग के घणशोथ की अवस्था में यह श्लेष्मताव अत्यधिक बढ़ जाता है ।

श्वासप्रणालिका की सूक्ष्म शाखाओं में क्रमशः तरुणास्थि का भाग कम होता जाता है और अन्त में एकदम नहीं रहता । इस प्रकार इन तरुणास्थिविहीन शाखाओं में केवल सौम्रिक तथा स्थितिरूपापक तन्तु से निमित्त कला होती है जिसमें चक्राकार पेशीसूत्रों का आधिब्यव रहता है । यह पेशियाँ प्राणदा नाडी के द्वारा सङ्कुचित तथा सांवेदनिक नाडी और अद्रिनिलीन के द्वारा प्रसारित हो जाती हैं । इसीलिपु श्वास रोग में श्वासप्रणालिकाओं को प्रसारित करने के लिए अद्रिनिलीन तथा सांवेदनिक नाडी को उत्तेजित करनेवाले अन्य द्रव्यों का उपयोग किया जाता है ।

कुपफुस

घर में दोनों ओर कुपफुस की स्थिति है। यह एक स्नेहिक कलासे आच्छादित रहता है जिसे कुपफुसावरण कहते हैं। इसके दो स्तर होते हैं:—एक कुपफुस के पृष्ठ पर लगा रहता है और दूसरा वक्ष की आभ्यन्तर दीवाल पर लगा होता है। पहला स्तर आसक्तिक तथा दूसरा परिसरीय कहलाता है। स्वस्थावस्था में, ये दोनों स्तर एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं और इनके बीच में बहुत थोड़ा अवकाश रहता है। इस अवकाश में थोड़ा दलेष्मा का अंश रहता है जिससे कुपफुसों के फैलाने और सिकुड़ने में सुविधा होती है।

कुपफुस स्वभावतः स्थितिस्थापक होते हैं। श्वासप्रणालिकाओं में स्थित द्रव्य के कारण वह सिकुड़ने नहीं पाता और पयुंकाओं के सम्पर्क में रहता है, किन्तु जब किसी प्रकार कुपफुसावरण के दोनों स्तरों के बीच में वायु या द्रव का प्रवेश हो जाता है तब कुपफुस बहुत सिकुड़ जाते हैं और घर तथा उनके बीच में बहुत स्थान रिक्त रह जाता है।

प्रत्येक कुपफुस के कई खण्ड होते हैं। दक्षिण कुपफुस में तीन तथा वाम



चित्र ३३-कुपफुस के वायुकोष

१. श्वासप्रणालिका २. वायुकोष

कुष्कुस में दो खण्ड होते हैं । प्रत्येक खण्ड में भी और छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें अनुखण्ड कहते हैं । इन अनुखण्डों में श्वासप्रणालिका की छोटी छोटी शाखाएँ फैली रहती हैं । इन शाखाओं में क्रमशः पेशीभाग भी अनुपरिचित होने लगता है और अन्तिम शाखाएँ अनियमित कोपों के रूप में फैली रहती हैं । इन्हें वायुकोप कहते हैं । वायुकोपों से युक्त श्वासप्रणालिका की अन्तिम शाखा को वायुकोप संघात (Infundibulum) कहते हैं । उनकी दोवाले बहुत पतली कला की बनी होती हैं और एक दूसरे से प्रायः मिली रहती हैं । वायुकोपों के बाहर की ओर कुकुसी केशिकाओं का एक सघन जाल फैला रहता है जिससे कुकुसगत वायु और केशिकागत रक्त के बीच में कोई व्यवधान नहीं होता और वायु तथा रक्त के आदान-प्रदान का कार्य पूर्णता से सम्पादित होता है ।

रक्तसंवहन—कुष्कुसों में रक्त दो मार्गों से आता है—एक कुकुसी धमनी द्वारा और दूसरा श्वासनलिकीय धमनियों द्वारा । प्रथम मार्ग से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए आता है और दूसरे मार्ग से कुष्कुस आदि अंगों के पोषण के लिए रक्त आता है । रक्त शुद्ध होकर कुकुसी सिराओं द्वारा हृदय के वाम अलिन्द में छोट जाता है और द्वितीय मार्ग से आया हुआ रक्त मुख्यतः श्वासनलिकीय सिराओं तथा कुछ कुकुसी सिराओं द्वारा लौटता है ।

श्वासनक्रिया

प्राणियों की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है कि कुकुसगत वायु निरन्तर विशोधित होती रहे । यह कार्य कुछ हद तक श्वासमार्ग में स्थित वायु के द्वारा होता है, किन्तु प्राकृत अवस्थाओं में यह इतना अपर्याप्त होता है कि उसकी कोई गणना नहीं की जाती । वायु के इस विशोधन का कार्य उरोगुहा के क्रमिक संकोच और प्रसार, फलतः कुकुसों के संकोच और प्रसार से सम्पन्न होता है । कुकुसों के आकुञ्चन के समय वायु भीतर ली जाती है जिसे प्रश्वास (Inspiration) तथा उनके प्रसार के समय वायु बाहर निकाल दी जाती है जिसे निःश्वास (Expiration) कहते हैं । इस प्रकार प्रश्वास और निःश्वास श्वासनक्रिया के दो भाग होते हैं ।

श्वासनक्रिया में पेशियों का सहयोग

श्वासनक्रिया में मांसपेशियाँ भी महत्वपूर्ण योग देती हैं । पेशियों के संकोच से उरोगुहा के आकार में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, जिनसे कुकुसों को अधिक

फैलने का स्थान और अवसर मिलता है। प्रश्वास में निम्नांकित पेशियाँ भाग लेती हैं:—

सामान्य प्रश्वास:—

- | | |
|---------------------------|--|
| १. महाप्राचीरा | २. बाह्य पशुंकान्तराला |
| ३. आस्यन्तर पशुंकान्तराला | ४. पशुंकोष्ठमनी |
| ५. पश्चिमोत्तरा अरित्रा | ६. पशुंकारुपणी पुरोगा, मध्यमा और पश्चिमा |

गम्भीर प्रश्वास:—इसमें उपर्युक्त पेशियों के अतिरिक्त यह पेशियाँ भी भाग लेती हैं:—

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| १. उरःकर्णमूलिका | २. अरित्रा गुर्वी | ३. कटिपार्श्वच्छदा |
| ४. उरश्छदा वृद्धती | ५. उरश्छदा लघ्वी | ६. पृष्ठच्छदा |
| ७. अंसोन्नमनी | ८. अंसापकर्षणी गुर्वी | |

९. स्वरयन्त्रीय पेशियाँ:—उरःकण्टिका, उरोऽवदुका, कृकाटिकावदुका

१०. प्रसनिका पेशियाँ—तालुतोलनी, फाकलकिनी, प्रसनिका की संकीर्णक पेशियाँ

११. मुखमण्डल की पेशियाँ १२. नासा विस्फारिणी १३. नासापुटोन्नमनी

इन सब में प्रश्वास की मुख्य पेशी महाप्राचीरा है। प्रश्वास के समय यह नीचे की ओर दब जाती है और इस प्रकार उरोगुहा में अवकाश बढ़ जाता है। प्रश्वासकाल में उरोगुहा का आयतन अर्धार्धः, पूर्वपश्चिम तथा बाह्यान्तः इन तीनों दिशाओं में बढ़ता है। वय की आकृति में भी श्वसनकाल में परिवर्तन होते हैं। प्रश्वास के समय यह प्रायः घृत्ताकार और निश्वास के समय अण्डाकार हो जाता है।

निःश्वास की पेशियाँ

प्रत्येक प्रश्वास के बाद सस्रभित्ति के पुनः पूर्ववस्था में लौट आने के कारण उरोगुहा का आयतन कम हो जाता है। यह विवादास्पद विषय है कि निःश्वास सक्रिय है या निष्क्रिय। प्रश्वास के बाद प्रश्वास की पेशियों का प्रसार होता है और फुफ्फुस, वय तथा उदर पर से दबाव हट जाने के कारण वे पूर्ववस्था की लौट आते हैं। इस प्रकार निःश्वासक्रिया मुख्यतः फुफ्फुसों की स्थितिस्थापकता और उपपशुंकाओं तथा उदरभित्ति की स्थितिस्थापकता के कारण होती

है । कुछ विद्वानों के मत में प्राकृत निःश्वासकाल में आम्पन्तर पशुंकान्तराला पेशियों का संकोच होता है ।

सामान्य निःश्वास कर्म स्वतः संपन्न होने पर भी गम्भीर निःश्वास के समय निम्नाङ्कित पेशियाँ भी काम करने लगती हैं:—

१. उदर्य पेशियाँ २. उरस्त्रिकोणिका ३. अरिमा पश्चिमाधरा ४. कटिचतुरा

श्वास की संख्या

श्वास सामान्यतः युवा व्यक्ति में १८ प्रतिमिनट होता है । श्वास और नाडी का अनुपात १:४ होता है । अत्यधिक ज्वर के समय जब नाडी वेगवती हो जाती है तब श्वास की संख्या भी बढ़ जाती है और अनुपात पूर्ववत् सुरक्षित रहता है । न्यूमोनिया रोग में यह अनुपात बदल जाता है और १:३ तथा १:२ तक हो जाता है, क्योंकि उसमें श्वास की संख्या तो बढ़ जाती है पर नाडी सतनी नहीं बढ़ती है । श्वास की संख्या व्यायाम, ज्वर तथा मानसिक भावावेश की अवस्थाओं में बढ़ जाती है । आयु के अनुसार भी विभिन्नतायें होती हैं । नवजात शिशु में ४०-५० प्रतिमिनट और ५ वर्ष की आयु में लगभग २५ प्रतिमिनट होता है । स्त्रियों में प्रतिमिनट २-४ अधिक तथा निद्राकाल में कम होता है ।

श्वासन के प्रकार

१. उदर्य (Abdominal)—इसमें मुख्यतः महाप्राचीरा की गति होती है । यह थालकों में देखा जाता है और इसमें उदर आगे की ओर प्रश्वास के समय विशेष रूप से निकल जाता है ।

२. ऊर्ध्वपशुकीय (Superior thoracic)—इसमें प्रधानतः महाप्राचीरा तथा ऊर्ध्वपशुकाओं की गति होती है । यह स्त्रियों में देखा जाता है ।


३. अधःपशुकीय (Inferior thoracic)—इसमें मुख्यतः महाप्राचीरा और अधःपशुकाओं की गति होती है । यह पुरुषों में देखा जाता है ।

श्वासनकाल में वज्र की गति नापने के लिए विभिन्न यन्त्रों का प्रयोग होता है ।

श्वासित वायु का आयतन

श्वासित वायु का आयतन अवस्थाओं के अनुसार बदलता रहता है । इसकी निश्चित वायुमापक यन्त्र (Spirometer) के द्वारा होता है । इसकी घनावट निम्नाङ्कित होती है:—

नीचे एक पात्र में जल भरा रहता है जिसमें एक दूसरा हल्का घातुपात्र डूब कर रखा दिया जाता है। ऊपर की ओर एक धारणी पर होते हुये दूसरी



चित्र ३४-श्वसित वायुमापक यन्त्र

१. घातुपात्र २. नार ३. नलिका ४. मापनयन्त्र

ओर इसका सम्बन्ध एक भारयुक्त वस्तु से होता है। उसके भीतर एक नलिका लगी रहती है जिसके मुँह पर फीक कर वायु भीतर भेजी जाती है। उछड़े पात्र से सम्बन्धित एक सुरी होती है जो एक मापनयन्त्र से लगी रहती है।

श्वसित वायु का आयतन नासने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोष प्रयुक्त होते हैं।—

३. सञ्चित वायु—(Reserve or supplemental air) (१६०० सी० सी०) यह मात्रा जो सामान्य वायु के अतिरिक्त अधिस्तम निःश्वास क्रिया के द्वारा बाहर निकाली जाय ।

४. अवशिष्ट वायु (Residual air)—(१५०० सी० सी०) यह मात्रा जो अधिकतम निःश्वास के बाद भी अवशिष्ट रहती है ।

५. कोषगत वायु (Alveolar air)—(३२०० सी० सी०) सामान्यतः फुफ्फुस के वायुकोषों में एक सञ्चित कोष रहता है जो सञ्चित और अवशिष्ट वायु का योग होता है । इसे प्राकृत धारणाशक्ति या क्रियात्मक धारणाशक्ति कहते हैं ।

६. न्यूनतम वायु (Minimal air)—वायु की वह न्यूनतम मात्रा जो वायुकोषों में स्थिर रहती है । इसी के कारण फुफ्फुससङ्ग पानी में तैरते हैं ।

७. पूर्णव्यजन (Total ventilation)—यह वायु की वह मात्रा है जो प्रतिमिनट श्वसन संस्थान में आता और जाता है ।

यह विग्राम के समय स्वस्थ युवा व्यक्ति में ५ से १० लिटर प्रतिमिनट तथा अधिक परिश्रम के समय १०० लिटर प्रतिमिनट तक हो जाती है ।

८. श्वसनधारणाशक्ति (Vital capacity of lungs)—वायु की वह मात्रा जो गम्भीरतम प्रश्वास के द्वारा ली जाय और गम्भीरतम निःश्वास के बाद निकाली जाय । यह अतिरिक्त, सामान्य तथा सञ्चित वायु का योग होता है । ६० डिग्री फारनहीट तापक्रम पर यह नौसतन ३०००-४००० सी० सी० रहती है । यह शारीरिक स्वास्थ्य का सूचक है और व्यायामशील व्यक्तियों में अधिक तथा रुग्ण व्यक्तियों में कम हो जाती है । शरीर की स्थिति का भी इस पर प्रभाव पड़ता है । खड़े रहने पर अधिक तथा लेटने पर कम हो जाती है ।

९. पूर्ण धारणाशक्ति (Total capacity)—(५३०० सी० सी०) यह श्वसनधारणाशक्ति तथा अवशिष्ट वायु का योग है ।

श्वसनकर्म का नाडीजन्य नियन्त्रण

श्वसन की पेशियों की क्रिया सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से होने का कारण यह है कि उनमें चेष्टावह नाड़ियों द्वारा क्रमिक उत्तेजनायें पहुँचती रहती हैं । यह क्रिया एक नाड़ी केन्द्र के नियन्त्रक प्रभाव के अधीन है । अत एव यह

परावर्तित क्रिया है न कि स्वयं जात । इस परावर्तित क्रिया के निम्नांकित भाग हैं:—

१. केन्द्र २. संज्ञावह नाड़ी ३. चेष्टावह नाड़ी

(१) केन्द्र

स्वसनसम्बन्धी उत्तेजना मस्तिष्कगत पिण्डकेन्द्र में उत्पन्न होती है और वहाँ से क्रमशः निम्न सुषुम्नाकेन्द्रों में आती है । इस केन्द्र के दो भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में दो केन्द्र (प्रश्वासकेन्द्र और निःश्वासकेन्द्र) होते हैं । सामान्य अवस्थाओं में दोनों क्रमशः एक दूसरे के बाद कार्य करते हैं । क्लोरल हाइड्रेट विष में दोनों स्वतन्त्रतया निरपेक्षरूप से कार्य करने लगते हैं ।

आजकल यह प्रमाणित किया गया है कि संज्ञावह उत्तेजनाओं के बिना भी पिण्डकेन्द्र स्वतन्त्ररूप से कार्य कर सकता है । यह देखा गया है कि पिण्डकेन्द्र को नाड़ीसम्बन्धी से पृथक् कर देने पर भी प्रश्वास होते हैं । इससे सिद्ध होता है कि इसकी क्रिया हृदय की सिरालिन्दप्रस्थि के समान स्वयंजात है ।

केन्द्र को साक्षात् रूप से उत्तेजित करने वाले कारण

१. साक्षात् उत्तेजक—विद्युद्दारा

२. औषध—(क) स्ट्रिकनीन, कैफीन, ऐट्रोपीन, लोपीलिन, न्यूमिन ये औषधें केन्द्र को उत्तेजित करती हैं और फलतः श्वासक्रिया बढ जाती है ।

(ख) मौर्फिन, हिरोइन, कोडीन तथा क्लोरल हाइड्रेट केन्द्र पर अवसादक प्रभाव डालती हैं ।

३. रक्त की मात्रा—रक्त की मात्रा बढने से यथा रक्तप्रक्षेप तथा लवणविलयन प्रक्षेप की अवस्थाओं में श्वास की संख्या बढ जाती है । इसके विपरीत, अत्यधिक रक्तताव होने पर श्वास की संख्या कम हो जाती है ।

४. रक्त का तापक्रम—ज्वर इत्यादि में रक्त का तापक्रम बढने से हृदयगति के साथ साथ श्वास की संख्या बढ जाती है । इसके विपरीत, शीत के कारण यथा मातृकाधनियों पर रक्त रखने से स्वसन की संख्या कम हो जाती है ।

५. रक्त के उद्भजनकेन्द्रीयभवन में परिवर्तन—

रक्त की आम्लिकता बढने पर श्वास क्रिया बढ जाती है । अब तो यह भी

समझा जाता है कि कार्बन द्विओयिद्र नहीं यलिक रक्त का उदजन केन्द्रीभवन ही केन्द्र का विशिष्ट उत्तेजक है ।

६. रक्त में गैसों की वृद्धि या हास का भी श्वास की गम्भीरता और संख्या पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है जो आगे बतलाया जायगा ।

केन्द्र को प्रत्यावर्तित रूप से उत्तेजित करने वाले कारण

(क) मस्तिष्क के उच्च केन्द्रों की उत्तेजना—यथा आवेश या इच्छा शक्ति ।

(ख) रक्तभार—रक्तभार के आधिक्य से केन्द्र पर अवसादक प्रभाव पड़ता है और इसकी कमी से उत्तेजक प्रभाव पड़ता है ।

(ग) प्राणदा नाड़ी की फुफ्फुसी शाखायें ।

(घ) शरीर की प्रायः सभी संज्ञावह नाड़ियों की उत्तेजना का प्रभाव केन्द्र पर पड़ता है :—

(१) शीत आदि के द्वारा श्वासा की उत्तेजना से प्रश्वास गम्भीर और अधिक हो जाता है ।

(२) दृष्टि नाड़ी की उत्तेजना से यथा तीव्र प्रकाश में प्रश्वास अधिक हो जाता है ।

(३) घ्राणनाड़ी की उत्तेजना से छोंक आती है या प्रश्वास अवच्छेद हो जाता है ।

(४) नासानाडियों की उत्तेजना से छोंक आती है ।

(५) श्रुतिनाड़ी की उत्तेजना से हाँफ आने लगती है या श्वासावरोध हो जाता है ।

(६) कण्ठरासनी नाडी से श्वास रुक जाता है जिससे भोजन श्वासपथ में नहीं जाने पाता ।

(७) ऊर्ध्वस्वरयन्त्रीय नाडियाँ—निःश्वास को उत्तेजित करती हैं और कास उत्पन्न होता है । जब अग्न श्वरयन्त्र में जाता है तब हृत्ती क्रिया के द्वारा वह बाहर निकाल दिया जाता है । इस प्रकार श्वास मार्ग तथा श्वास नलिकाओं में प्रविष्ट हुये हानिकर पदार्थों को निकालने के लिए कास का शरीर की रक्षा के लिए अत्यधिक महत्व है ।

८. गुदसङ्कोचनी का प्रसार—इसमें प्रश्वासाधिक्य होता है ।

९. मातृकापरिवाहिका (Carotid sinus) की उत्तेजना से भी श्वास क्रिया में परिवर्तन होते हैं। कार्बनडिऑक्साइड के आधिक्य या ओपजन की कमी से श्वासाधिक्य तथा इसके विपरीत, कार्बनडिऑक्साइड की कमी और ओपजन के आधिक्य से श्वास की कमी या अवरोध हो जाता है।

१०. प्राणदा नाडी के संज्ञावह सूत्रों की उत्तेजना से भी केन्द्र पर प्रभाव पड़ता है।

(२) संज्ञावह नाडी

प्राणदा नाडी में दो प्रकार के सूत्र होते हैं:—

(१) प्रश्वास सूत्र (२) निःश्वाससूत्र

विशेषता:—

(१) निःश्वाससूत्र दुर्बल उत्तेजकों से अधिक प्रभावित होते हैं। मध्यम या तीव्र उत्तेजकों से दोनों प्रकार के सूत्र उत्तेजित होते हैं विशेषतः प्रश्वाससूत्र अधिक उत्तेजित होते हैं।

(२) प्रश्वाससूत्र बहुत तीव्र धात हो जाते हैं। इसलिए यदि तीव्र उत्तेजकों से प्राणदा को उत्तेजित किया जाय तो पड़ले प्रश्वास बढ़ जाते हैं किन्तु बाद में निःश्वास अधिक हो जाते हैं।

(३) रासायनिक उत्तेजक यथा क्लोरल हाइड्रेट निःश्वास सूत्रों को उत्तेजित करता है।

ये सूत्र दो प्रकार से उत्तेजित होते हैं:—

(१) वायु कोषों के क्रमिक संकोच और प्रसार के द्वारा—

हेरिंग ब्रेयर सिद्धान्त के अनुसार वायुकोषों का प्रसार दुर्बल उत्तेजक के रूप में कार्य करता है और इसलिए निःश्वाससूत्रों को उत्तेजित करता है। इसके विपरीत, वायुकोषों का संकोच तीव्र उत्तेजक के रूप में प्रश्वाससूत्रों को उत्तेजित करता है।

(२) वायुकोषों के दबाव के आधिक्य या न्यूनता के द्वारा—

वायुकोषों के क्रमिक संकोच और प्रसार के परिणामस्वरूप फुफ्फुसी वायुकोषों में दबाव की वृद्धि या कमी होती है। दबाव के बढ़ने से प्रश्वाससूत्र उत्तेजित होते हैं और घटने से निःश्वाससूत्र उत्तेजित होते हैं।

प्राणदा नाडी में चेष्टावह सूत्र भी कुछ होते हैं जो श्वास प्रणालिकाओं की

स्वतन्त्र पेशियों से संबद्ध रहते हैं । ये श्वासनलिका संकोचक सूत्र स्वभावतः क्रियाशील होते हैं और श्वासप्रणालिकाओं को संकोच की स्थिति में रखते हैं । प्राणदा के फुफुसी सूत्रों को काट देने पर, यह क्रिया नष्ट हो जाती है और फलस्वरूप श्वासप्रणालिकाओं का प्रसार हो जाता है और फुफुस आयतन में बढ़ जाते हैं ।

जब यह संकोचक सूत्र उत्तेजित होते हैं तब श्वासनलिकास्थित पेशियों के संकोच से उनका मार्ग सकीर्ण हो जाता है और फुफुसों में वायु का अवकाश कम हो जाने से श्वास में रुक होने लगता है । इस अवस्था को श्वास कहते हैं । हिस्टेमिन से इन पेशियों का संकोच तथा अट्रिनिलीन से प्रसार होता है ।

(३) चेष्टावह नाड़ी—श्वसनसंबन्धी चेष्टावह नाड़ियाँ जो श्वसन की विभिन्न पेशियों में जाती हैं, सुपुत्रा के धूसरभाग में स्थित अपने अपने चेष्टावह नाड़ी केन्द्रों से उद्भूत होती हैं । ये नाड़ीकेन्द्र श्वसन के सहायक केन्द्र हैं जो पिण्डस्य प्रधान श्वसनकेन्द्र के नियन्त्रण में रहते हैं । निम्नांकित कोष्ठक में श्वसन की चेष्टावह नाड़ियाँ तथा पेशियों से उनका संबन्ध दिखलाया गया है:—

नाड़ी

१. मौखिक
२. प्राणदा (ऊर्ध्वस्वरयंत्रीय नाड़ी की शाखायाँ)
३. प्राणदा (अधःस्वरयंत्रीय शाखा)
४. प्राणदा (अधःस्वरयंत्रीय शाखा)
५. सुपुत्रीय सहायिका नाड़ी की शाखायाँ
६. द्वितीय से सप्तम ग्रैवेयक मूलों की शाखायाँ—
७. प्राचीरिका नाड़ी (चतुर्थ से सप्तम ग्रैवेयक मूलों में)
८. द्वितीय ग्रैवेयक से वृत्तीय मूलों तक पशुकान्तरालीय नाड़ियाँ
९. प्रथम कटि नाड़ी की शाखायाँ—

पेशी

१. ओष्ठ तथा नासा की पेशियाँ
२. ककाटिकावटुका
३. अवशिष्ट स्वरयंत्रीय पेशियाँ
४. श्वासनलिका की पेशियाँ
५. ओवा तथा अंस की पेशियाँ
६. पशुकान्तरालीय पेशियाँ
७. महाप्राचीरा
८. पशुकान्तराला तथा उदर्य पेशियाँ
९. उदर्य तथा वंछणीय पेशियाँ ।

श्वसनकेन्द्रों पर गैसों का प्रभाव

श्वसन का रासायनिक नियन्त्रण

(क) कार्बनडिऑक्साइड का प्रभाव:—यह सबसे प्रबल उत्तेजक है । कोषगत वायु में इसका दबाव प्रायः स्थिर रहता है और प्राकृत वायुमंडल के दबाव का ५.५ प्रतिशत होता है । इसमें थोड़ा भी परिवर्तन होने से श्वसनकेन्द्र को सूचना मिल जाती है और वह इसको सम रखने का प्रयत्न करता है ।

प्रभाव:—१. प्राकृत परिमाण में श्वसनकेन्द्र प्राकृत गंभीरता और क्रम से कार्य करता है । इसे प्राकृत श्वसन (*Eupnoea*) कहते हैं ।

२. इसकी बहुत थोड़ी वृद्धि होने पर श्वसन की गहराई बढ़ जाती है । इसे गंभीर श्वसन (*Deeper breathing*) कहते हैं ।

३. और अधिक परिमाण बढ़ने पर गहराई और संख्या दोनों बढ़ जाती है । इसे अतिश्वसन (*Hyperpnoea*) कहते हैं ।

४. और अधिक बढ़ाने पर श्वसन की सहायक पेशियों पर भार पड़ने लगता है और श्वास में कष्ट (*Dyspnoea*) होने लगता है ।

५. और वृद्धि होने पर श्वासादरोध (*Asphyxia*) की स्थिति उत्पन्न होती है ।

६. कार्बनडिऑक्साइड का भार कम होने पर—श्वसन की गहराई में कमी (*Shallow breathing*) हो जाती है ।

७. और अधिक कमी होने पर—श्वसन की गहराई और संख्या दोनों में कमी हो जाती है । इसे नीचश्वास (*Hypopnoea*) की अवस्था कहते हैं ।

८. और कम होने पर श्वास रुक जाता है । इसे श्वासलोप (*Apnoea*) कहते हैं ।

(ख) ओपजन का प्रभाव:—१. ओपजन का आधिक्य—इससे एक प्रकार की विषमयता उत्पन्न हो जाती है । इसके कारण रक्तभार में कमी और मूर्च्छा इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं ।

२. और आधिक्य होने से—फुफुसों में शोथ, फुफुस शोथ, आघेप आदि लक्षण होते हैं ।

शरीर में ओपजन की कमी दो प्रकार की होती है । रक्त में ओपजन की कमी को रक्तोपजनाल्पता (Anoxaemia) तथा धातुओं में ओपजन की कमी को धातुओपजनाल्पता (Anoxia) कहते हैं । रक्तोपजनाल्पता कई कारणों से उत्पन्न होती है और उसी के अनुसार इसके कई प्रकार किये गये हैं:—

(क) भाराल्पताजन्य रक्तोपजनाल्पता:—धमनीरक्त में ओपजन भार की कमी होने से यह अवस्था उत्पन्न होती है यथा—पार्श्वप्रदेशों में । इसके अतिरिक्त ओपजनभार को कम करने वाले निम्नांकित कारणों से भी यह अवस्था उत्पन्न होती है:—

१. उत्तान श्वसन २. श्वासपथ में अवरोध ३. फुफुन्कला में क्षति
४. कोषगत वायु के अवकाशों में कमी यथा जलनिमज्जन और न्यूमोनिया ।

(ख) रक्ताल्पताजन्य रक्तोपजनाल्पता:—इसके निम्नांकित कारण हैं:—

१. रक्तरजक द्रव्य की कमी

१. रक्तरजक द्रव्य तथा ओपजन के संयोग में बाधा यथा कार्बन एकोपिट्ट विष

२. रक्तरजक द्रव्य का कपिलरक्तरजक में परिवर्तन

(ग) मन्दप्रवाहजन्य रक्तोपजनाल्पता:—रक्तप्रवाह मन्द होने पर यह अवस्था उत्पन्न होती है यथा रक्तघाव या अवसाद ।

(घ) धातुविपजन्य रक्तोपजनाल्पता:—यह अवस्था शरीर धातुओं के विपाक होने पर उत्पन्न होती है । जब कोषाणु पोटाशियम सायनाइड, मद्य इत्यादि द्रव्यों से विपाक हो जाते हैं तब ये ओपजन का उचित उपयोग नहीं कर पाते ।

पर्वतरोग (Mountain sickness)

समुद्र के समतल में ओपजन का दबाव १६२ मिलीमीटर होता है, किन्तु ज्यों ज्यों ऊँचाई बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसका दबाव भी कम होता जाता है, फलतः वायुकोषगत वायु का भार भी कम होता जाता है । यहाँ तक कि अष्टानक १०००० फीट की ऊँचाई पर, जहाँ ओपजनभार १०६ मिलीमीटर है, चले जाने पर पर्वतरोग उत्पन्न हो जाता है । उसके प्रधान लक्षण निम्नलिखित है:—

१. शिरःशूल २. क्लम ३. निद्रानाश ४. चिद्विचित्रान ५. वमन ६. अवसाद ।

हृदयध्वंसन केन्द्र के अवरोध द्वारा शून्य भी हो सकती है। ये लक्षण ओपजन भार में सहसा कमी करने से ही होते हैं। यदि ओपजनभार क्रमशः कम दिया जाय तो ये लक्षण उत्पन्न नहीं होते, केवल श्वसन गंभीर हो जाता है।

रक्तसंवहन पर प्रभाव

१. जब ओपजनभार ६५ मिलीमीटर तक कम हो जाता है तब हृदय की गति बढ़ जाती है, क्योंकि मस्तिष्क केन्द्र की उत्तेजना के कारण प्लीहा में संकोच होता है और रक्त निकल कर संस्थान में चला जाता है। रक्त का परिमाण बढ़ जाने से अधिक रक्त सिराओं द्वारा हृदय में आता है। फलतः हृदय की गति बढ़ जाती है।

२. श्वेतकणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है।

३. रक्तशुद्धकद्रव्य २० प्रतिशत बढ़ जाता है, जिससे रक्त का रंग गहरा हो जाता है।

उपर्युक्त क्रियायें रक्तमज्जा की क्रिया बढ़ जाने से होती हैं।

४. कार्बनडिऑक्साइड भार की कमी होने से रक्त की शारीर्यता बढ़ जाती है।

ओपजन में क्रमशः कमी होने से मनुष्य अपने को उसके अनुकूल बना लेता है। यहाँ तक कि १५००० फीट की ऊँचाई पर, जहाँ ओपजनभार ८६ मिलीमीटर है, मनुष्य जीवित रह सकते हैं। इस अवस्था में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं:—

१. गंभीर और अधिक श्रवसास २. रक्त का अधिक निर्यात

३. रक्तकणों तथा रक्तशुद्धकद्रव्य की वृद्धि

४. रक्तशुद्धक द्रव्य के ओपजन से संयुक्त होने की शक्ति में वृद्धि

५. रक्त में ओपजन का अधिक क्षोषण

कार्बन एकोपिड का प्रभाव

एह मादक विष है और कार्बनडिऑक्साइड से अधिक तीव्र है। वायु के १००० भाग में ०.५ भाग रहने से ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं और २-३ भाग रहने से तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण निम्नांकित लक्षण उत्पन्न होते हैं:—

१. शिरःशूल २. हृदयावसाद ३. संन्यास ४. ओपेप ५. हृदयावरोध

मृत्यु होने पर रक्त का रंग घमकीला छाछ पाया जाता है जब कि कार्बन-द्विओपिद् विष में रक्त गहरे रंग का हो जाता है ।

श्वसनप्रक्रिया का स्वरूप

पीछे बतलाया जा चुका है कि श्वसनकेन्द्र की क्रिया स्वतः होती रहती है किन्तु स्वभावतः यह इतनी कम होती है कि उसे संज्ञावह नादियों द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है । इसके अतिरिक्त रक्त की स्थिति का भी उन पर प्रभाव पड़ता है । जब मातृका धमनियों में गरम रक्त बहता है, तब श्वास की क्रिया बढ़ जाती है और जब शीतल रक्त बहता है तब श्वास मन्द हो जाता है । हूकर नामक विद्वान् का मत है कि श्वसन केन्द्रों की क्रिया मुख्यतः निरिन्द्रिय छवणों पर निर्भर रहती है । खटिक और पोटाशियम का साम्य होने पर केन्द्र की क्रिया समुचित रूप से होती रहती है । खटिक की अधिकता से केन्द्र उत्तेजित हो जाता है तथा पोटाशियम के आधिक्य से केन्द्र की क्रिया का अधरोध होता है ।

संश्लेष में, फुफ्फुसों में प्रश्वासोत्तेजना उत्पन्न हो कर प्राणदा के प्रश्वसन संज्ञावह सूत्रों के द्वारा पिण्डकेन्द्र में पहुँचती है और वह श्वसनकेन्द्र की संख्या तथा क्रम का नियमन करते हैं । रक्तगत कार्बनद्विओपिद् श्वास के गाम्भीर्य का नियमन करता है ।

इस प्रकार श्वसनकेन्द्र को प्रभावित करने वाले निम्नांकित कारण हैं:—

१. धमनीगत रक्त में ओपजन का परिमाण
२. कार्बन द्विओपिद् का भार
३. उदजन केन्द्रीभवन
४. रक्त की मात्रा
५. रक्त का तापक्रम
६. प्राणदा की संज्ञावह फुफ्फुसी शाखायें
७. अन्य संज्ञावह नादियाँ
८. महाधमनी से प्रारब्ध उत्तेजनायें
९. मातृका परिवाहिका से प्राप्त उत्तेजनायें
१०. उच्च मस्तिष्क केन्द्रों से उद्भूत उत्तेजनायें

‘ श्वसन का रक्तसंवहन पर प्रभाव

(क) हृदयगति पर:—हृदयगति प्रश्वास काल में प्राणदा तथा अलिन्द प्रत्यावर्तन के कारण बढ़ जाती है और निःश्वास काल में कम हो जाती है ।

(ख) रक्तभार पर:—प्राकृत प्रश्वासकाल में रक्तभार पहले कम होकर फिर बढ़ता है और निःश्वासकाल में पहले बढ़कर फिर कम होता है। प्रश्वास के समय रक्तभार बढ़ने के मुख्य कारण हैं हृदयगति की तीव्रता, रक्तवहसंचालक की उत्तेजना तथा रक्तनिर्यात में वृद्धि। इसके पूर्व प्रारंभिक हास का कारण यह है कि श्वास के प्रारंभ होते फुफ्फुसों का प्रसार अचानक होता है और वहाँ रक्त की कमी हो जाती है। इस प्रकार हृदय के वाम भाग में पूरा रक्त नहीं पहुँचने से हृदय का रक्तनिर्यात कम हो जाता है। इसके बाद फिर हृदय के दक्षिणभाग में सिराओं द्वारा रक्त अधिक आने से रक्तनिर्यात बढ़ जाता है और फलतः रक्तभार की भी वृद्धि होती है।

(ग) नाडी पर—हृदय का रक्तनिर्यात बढ़ने से प्रश्वासकाल में नाडी का आयतन कम हो जाता है तथा निःश्वासकाल में रक्तनिर्यात कम होने से नाडी का आयतन कम हो जाता है।

श्वासारोघ (Asphyxia)

प्राकृत श्वसन में बाधा होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन द्विऑक्साइड का संचय होने लगता है। इन दोनों कारणों की एककालिक उपस्थिति से श्वासारोघ की अवस्था उत्पन्न होती है।

कारण:—(क) श्वासमार्ग में बाधा:—

(१) श्वासनलिका में कोई बाधवस्तु (२) गला घोंटना

(३) श्वासप्रणालिकाओं में श्लेष्मा का सञ्चय

(४) वायुकोषों में व्रणशोथजन्य स्त्राव का संचय

(५) उरस्पाकोप के वेधन द्वारा फुफ्फुसों का आकुञ्चन

(ख) अन्य गैसों का आहरण:—

(१) हाइड्रोजन तथा अन्य गैस सूँघना (२) कार्बनद्विऑक्साइड से युक्त वायु

(ग) वायवीय विनिमय में बाधा:—

यथा कार्बन एक्सीडिड रक्तरक्तक द्रव्य के साथ मिलकर एक स्थिर यौगिक बनता है जिसका धातुओं के सम्पर्क में जाने पर विश्लेषण नहीं हो पाता और इस प्रकार वायवीय विनिमय में बाधा उपस्थित हो जाती है।

अवस्थायें:—श्वासावरोध की तीन अवस्थायें होती हैं:—

१. प्रथम अवस्था:—श्वासकृच्छ्र की अवस्था:—इसमें प्रश्वास तथा निःश्वास की अतिरिक्त पेशियाँ भी कार्य करने लगती हैं जिससे प्रश्वास तथा निःश्वास गभीर होते हैं । इसके अतिरिक्त, अहिगोलक बाहर निकलना, छाता-स्तर, स्वेदाधिक्य, ओष्ठनीलिमा आदि लक्षण होते हैं । कार्यन द्विओपिद् के आधिक्य से श्वसनकेन्द्र के उत्तेजित होने के कारण श्वास की संख्या भी बढ़ जाती है ।

२. द्वितीय अवस्था:—आचेपावस्था:—इसमें कार्यन द्विओपिद् की मात्रा अधिक होने से श्वसनकेन्द्र के अतिरिक्त सुपुम्नारेन्द्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है जिससे परतन्त्र पेशियों में आचेप आने लगते हैं । यह अवस्था कुछ मिनटों तक रहती है ।

३. तृतीय अवस्था:—धम या प्रसार की अवस्था:—रक्त में कार्यन द्विओपिद् अत्यधिक हो जाने से श्वसनकेन्द्र तथा अन्य सुपुम्नारेन्द्र निश्चेष्ट हो जाते हैं, पेशियाँ प्रसारित हो जाती हैं, श्वास घटते जाते हैं और अन्त में श्वासलोप होने से मृत्यु हो जाती है । यह अवस्था तीन मिनट या उसके कुछ अधिक रहती है ।

श्वासमार्ग में अवरोध के कारण रक्त में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं:—

१. कार्यन द्विओपिद् का अतिशय आधिक्य
२. ओपजन का नितान्त अभाव
३. दुग्धाम्ल का संचय और चारीय कोष की वृद्धि

श्वासावरोध का रक्तभार पर प्रभाव

प्रथम तथा द्वितीय अवस्थाओं में रक्त की अंशुद्धि बढ़ने से रक्तवहसंचालक केन्द्र उत्तेजित हो जाता है तथा कार्यन द्विओपिद् की वृद्धि से अधिवृक्क ग्रथियों के उत्तेजित होने से रक्त में अद्रिनिलीन की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे रक्तवहस्रोत संकुचित हो जाते हैं । अतः इन अवस्थाओं में रक्तभार बढ़ जाता है । तृतीय अवस्था में हृदयान्तराव के कारण धमनीगत रक्तभार अचानक कम हो जाता है ।

श्वासलोप (Apnoea)

नियमित श्वसन का क्षणिक लोप दो प्रकार से होता है:—

(१) नाडीजन्य—अधिक कार्य करने के बाद श्वसनकेन्द्र का थमहोने से।

(२) रासायनिक—रक्त में कार्बन द्विऑक्साइड की कमी होने से।

श्वासलोप तीन प्रकार का होता है —

(१) ऐच्छिक —जब मनुष्य अपनी इच्छा से अधिक गम्भीर तथा तीव्र सांस लेता है तब यह अवस्था उत्पन्न होती है।

(२) प्रायोगिक:—जन्तुओं में तीव्र कृत्रिम श्वसन के बाद यह अवस्था आती है।

(३) गर्भसम्बन्धी —यह गर्भावस्था के अन्तिम भागों में गर्भ में देखा जाता है जब फुफ्फुसों का पूर्णतः निर्माण हो जाता है और श्वसन की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है।

ऐच्छिक और प्रायोगिक ये दोनों प्रकार नाडीजन्य तथा रासायनिक इन दोनों कारणों से होते हैं। गर्भसम्बन्धी प्रकार में केवल रासायनिक कारण ही होता है क्योंकि श्वसनकेन्द्र में उस समय कोई उत्तेजना नहीं पहुँच पाती।

सान्तर श्वसन (Cheyne-stoke's respiration)

कारण:—ओपजन की कमी से केन्द्र उत्तेजित होने के कारण अतिश्वसन की अवस्था उत्पन्न होती है जिससे शरीर को ओपजन अधिक मिलने के कारण



चित्र ३५—सान्तर श्वसन

अम्लों का ओपजनीकरण होता है और कार्बनद्विओपिद् में कमी हो जाती है। इस कमी से श्वास लोप हो जाता है। इस अवस्था में शरीर सञ्चित ओपजन का उपयोग करता है और इस प्रकार कार्बनद्विओपिद् की घृद्धि हो जाती है। इससे केन्द्र पुनः उत्तेजित होता है और अतिश्वसन की अवस्था उत्पन्न होती है। इस रीति से अतिश्वसन तथा श्वासलोप की अवस्थाएँ क्रमशः आती जाती रहती हैं। इसे सान्तर श्वसन कहते हैं।

यह निम्नाङ्कित अवस्थाओं में पाया जाता है:—

१. छोटे बच्चों में निद्राकाल में स्वभावतः
२. मेदक आदि प्राणायामशील प्राणियों में स्वभावतः
३. पर्वतीय प्रदेशों में ओपजन की कमी होने से
४. ऐच्छिक श्वासलोप के बाद प्रारम्भिक श्वसन में
५. रक्तसंचलन की विकृति में
६. मूत्रविषमयता, मस्तिष्काघात, अहिफेन विष आदि विषजन्य अवस्थाओं में
७. फुफ्फुस, मातृकापरिवाहिका तथा महाधमनी से उद्भूत उत्तेजना के द्वारा श्वसनकेन्द्र का प्रत्यावर्तित और नियमित जोम तथा अवसाद

यह अवस्था केन्द्र का पोषण करने के लिए ओपजन तथा केन्द्र की उत्तेजना के लिए कार्बनद्विओपिद् देने से दूर की जा सकती है।

अनियमित श्वसन (Irregular breathing)

एक विशिष्ट प्रकार का अनियमित श्वसन क्षयज मस्तिष्कावरणशोथ आदि रोगों में देखा जाता है जिसे 'बायट का श्वसन' भी कहते हैं। इसमें श्वसन बिल्कुल अनियमित होता है तथा दो तीन गम्भीर और तीव्र श्वसन के बाद एक लम्बी श्वासलोप की अवधि आती है। यह अवस्था मस्तिष्कपिण्ड के आघात की निर्देशक है और सान्तर श्वसन की अपेक्षा अधिक गम्भीर होती है।

रक्त में गैसों की स्थिति

रक्त में स्थित प्रधान गैस ओपजन, कार्बनद्विओपिद् तथा नम्रजन हैं। ये निम्नाङ्कित कोष्ठक के अनुसार रक्त में उपस्थित होते हैं:—

	धमनीरक्त (शुद्ध)		सिरारक्त (अशुद्ध)	
	मात्रा	भार	मात्रा	भार
ओपजन	१९.५%	१०६ मि.मी.	१४.५%	४० मि.मी.
नष्टजन	१-१%	—	१-२%	—
कार्बोनिक अम्ल	५०%	३५ मि.मी.	५५%	४६ मि.मी.

धमनी रक्त में ओपजन १९.५ से २०.६ प्रतिशत तक उपस्थित रहता है तथा कार्बनडिऑक्साइड ४८.३ से ५२.८ प्रतिशत तक होता है। सिरागत रक्त में ओपजन तथा कार्बनडिऑक्साइड का परिमाण धातुओं की क्रियाशीलता तथा धातुओं में प्रवाहित होने वाले रक्त के परिमाण पर निर्भर करती है।

गैसों का निश्चित परिमाण देखने के लिए अनेक विधियों और यन्त्रों का प्रयोग होता है। इनके अनुसार यह देखा गया है कि धमनीगत रक्त में प्रति १०० सी० सी० २० सी० सी० ओपजन तथा ५० सी० सी० कार्बनडिऑक्साइड रहता है और सिरागत रक्त में १५ सी० सी० ओपजन तथा ५५ सी० सी० कार्बनडिऑक्साइड रहता है। सिरागत रक्त में इन गैसों का निश्चित परिमाण शरीर के विभिन्न भागों में उन उन अङ्गों की क्रियाशीलता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। केशिकाओं में जब रक्त बहता है तब उसमें से प्रति १०० सी० सी० ५ सी० सी० ओपजन निकल कर धातुओं में चला जाता है। अतः यह परिमाण विश्रामावस्था में धातुओं द्वारा गृहीत ओपजन का निर्देशक है। सिरागत रक्त में ओपजन का परिमाण विश्रामावस्था में अधिक से अधिक १५ सी० सी०, कठिन परिश्रम के समय ८ सी० सी० तथा अत्यधिक व्यायाम के समय ३.५ सी० सी० तक हो जाता है। व्यायाम के समय सिरागत रक्त में ६५ सी० सी० तक कार्बनडिऑक्साइड मिलता है।

रक्त में गैसों का दबाव नापने के लिए एक यन्त्र का प्रयोग होता है जिसे म्रौग का रक्त वायुमापक यन्त्र (Micro-aeroto-nometer) कहते हैं। इस यन्त्र का एक नलिका द्वारा रक्तवह सोत से सम्बन्ध कर दिया जाता है, जिससे रक्त भीतर प्रविष्ट होता है और पार्वर्तनी नलिका से बाहर निकल जाता

है। यन्त्र के भीतर कोष्ठ में एक वायु का बुलबुला रहता है। इसलिए कोष्ठ में रक्त के जाने पर रक्त तथा उस बुलबुले के बीच वायवीय विनिमय होता है जब तक कि साम्यस्थापित न हो जाय। साम्यस्थिति हो जाने पर वह बुलबुला सूक्ष्म केशिकानलिका द्वारा ऊपर खिंच जाता है और वहाँ उसका विश्लेषण हो जाता है। उसका विश्लेषण होने पर उसमें ४ प्रतिशत कार्बनडिऑक्साइड तथा १२ प्रतिशत ओपजन की उपस्थिति मिलती है। अथ निम्नाद्धित आधार पर उसका भार निश्चित किया जाता है:—

$$\begin{array}{r} \text{रक्तभार} \quad \quad \quad १०० \\ \text{वायुमण्डल का दबाव} \quad ७६० \\ \hline ८६० \end{array}$$

$$८६० \text{ का } ४\% = ३५$$

$$८६० \text{ का } १२\% = १०६$$

इसलिए कार्बनडिऑक्साइड का भार ३५ मिलीमीटर तथा ओपजन का भार १०६ मिलीमीटर निश्चित होता है।

रक्त में गैसों की स्थिति

रक्त में गैस दो रूपों में रह सकते हैं:—

(१) भौतिक विलयन (२) रासायनिक संयोग

द्रवपदार्थ में गैसों के विलयन के सम्बन्ध में निम्नाद्धित नियम हैं:—

(१) विलयनाङ्क:—यह गैस का वह परिमाण है जो एक सी० सी० जल में प्राकृत वायुमार् पर घुल जाता है।

$$\text{ओपजन का विलयनाङ्क} = ०.०४ \text{ सी० सी०}$$

$$\text{कार्बनडिऑक्साइड का " } = १.०० \text{ " "}$$

$$\text{नॉट्रोजन का " } = ०.०२ \text{ " "}$$

(२) गैस का दबाव:—अधिक दबाव होने से गैस का अधिक अंश तथा कम दबाव होने से कम अंश विलीन होता है। इसके सम्बन्ध में एक विशिष्ट नियम है जिससे 'डाल्टनहेनरीनियम' कहते हैं। यह इस प्रकार है:—

$$\text{गैसपरिमाण} = \text{विलयनाङ्क} \times \frac{\text{गैस का दबाव}}{\text{वायुमार्}}$$

(३) तापक्रम—द्रव का अधिक तापक्रम होने से कम तथा कम होने से अधिक विलीन होता है ।

(४) विलयन में ठोस भाग—ठोस भाग की उपस्थिति से विलयन की समता कम हो जाती है ।

(५) गैसों का मिश्रणः—द्रवपदार्थ में अनेक गैसों का मिश्रण होने से प्रत्येक गैस का दबाव पृथक् पृथक् उस पर पड़ता है । इस प्रकार उस मिश्रण का कुल दबाव पृथक् पृथक् गैसों के दबाव का योग फल है ।

रक्त में ओपजन की स्थिति

रक्त में ओपजन केवल विलयन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक शिथिल रासायनिक संयोग के रूप में रहता है । यह ओपजन तथा रक्तरञ्जकद्रव्य का एक यौगिक है जो दोनों के सम्पर्क से बनता है जो ओपरक्तरञ्जक कहलाता है । इस यौगिक पदार्थ में यह गुण है कि जब पार्श्ववर्ती धातुओं में ओपजन की कमी होती है तो उसका विश्लेषण होता है और ओपजन स्वतन्त्र होकर धातुओं में चला जाता है । शुद्ध वायु में जब ओपजन का दबाव ११२ मिलीमीटर हो तब रक्तद्रव्य ओपजन से पूर्णतः संतृप्त हो जाता है । इसे रक्त का 'ओपजन सामर्थ्य' (Oxygencapacity) कहते हैं । यदि ओपजन का दबाव इससे अधिक किया जाय तो वह भौतिक विलयन के रूप में रक्त में आने लगता है और आवश्यकता पड़ने पर पहले यही धातुओं में जाता है । रक्तसंवहन के समय यही क्रिया होती है । केशिकाओं में जब रक्त प्रविष्ट होता है तब १०० सी० सी० रक्त में २० सी० सी० ओपजन होता है, किन्तु एक सेकण्ड के बाद ही जब वह सिरा में पहुँचता है तो १२ सी० सी० ही रह जाता है । रक्त अधिक चारीय होने पर ओपजन रक्तरञ्जकद्रव्य से अधिक परिमाण में मिल पाता है । चूँकि कार्बन-द्विओपिदू अम्ल है, अतः उसका दबाव बढ़ने पर ओपजन रक्तरञ्जक के साथ कम मात्रा में मिलता है । रक्त में रक्तद्रव्य का ओपजन के साथ संयोग तथा ओपरक्तरञ्जक का विश्लेषण निम्नांकित कारणों पर निर्भर रहता हैः—

१. तापक्रम (३७ सेण्टीग्रेड) २. निरिन्द्रिय लवणों की उपस्थिति

३. उदजन केन्द्रीभवन (कार्बनद्विओपिदू का भार)

इन कारणों से रक्त एक समान रूप से ओपजन का ग्रहण तथा परिश्याग करता है ।

सारांश यह है कि रक्त के १०० सी० सी० में २० सी० सी० से कुछ अधिक ओपजन रहता है । रक्त के १०० सी० सी० में केवल ०.३९३ सी० सी० भौतिक विलयन के रूप में रक्तस में रहता है । शेष ओपरक्करजन के रूप में रहता है ।

रासायनिक संयोग के रूप में रहने का प्रमाण

(१) रक्त में ओपजन की मात्रा इतनी अधिक है कि उतना विलयन के रूप में नहीं रह सकता । विलयन के रूप में १०० सी० सी० रक्त में केवल ०.३९३ सी० सी० ओपजन रहता है जब कि रक्त में वह २० सी० सी० होता है ।

(२) ओपजन का दबाव साधारण दबाव से कुछ कम कर दिया जाय तो बहुत अल्प परिमाण में ओपजन अलग होता है, किन्तु उसका दबाव ३० मिलीमीटर तक कम करने से शीघ्र ही अधिक मात्रा में वह विरलेपित हो जाता है । यह क्रिया केशिकाओं में रक्तसंवहन के समय होती है ।

रक्त में कार्बनद्विओपिडू की स्थिति


यदि रक्त शुद्ध ओपजन की उपस्थिति में रखा जाय तो वह उसका ५१ प्रतिशत भाग शोषित कर लेगा । क ओ^२ का $\frac{1}{3}$ भाग रक्तकण में तथा $\frac{2}{3}$ भाग रक्तस में रहता है । यह रक्त में दो रूपों में रहता है :—

(१) कुछ अंश भौतिक विलयन के रूप में :—

रक्तस तथा रक्तकणों में कार्बोनिक अम्ल ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H} \cdot \text{HCO}_3$) के रूप में विलीन रहता है । यह क ओ^२ की पूर्ण मात्रा का ५-६ प्रतिशत लगभग २.५ सी० सी० से ३ सी० सी० तक होता है ।

(२) कुछ अंश रासायनिक यौगिक के रूप में :—

(क) लगभग २० सी० सी० रक्तस में चार से संयुक्त होकर सोडियम बाइकार्बनेट के रूप में रहता है ।




(ख) अवशिष्ट भाग लगभग ३०-३२ सी० सी० रक्तस तथा रक्तकणों के मांसतत्व से मिलकर कार्बोक्साजन के रूप में रहता है ।


जब धातुओं में रक्तप्रवाह होता है उसी समय उसमें कार्बनद्विओपिडू मिल जाता है और फुफ्फुसों में जाने पर इस रासायनिकरूप से संयुक्त क ओ^२ का

विश्लेषण होता और इस प्रकार क ओ^२ कोषगत वायु में मिल जाता है और फिर बाह्यनिकल जाता है। कुम्फुसों में इसका विश्लेषण दो प्रकार से होता है:—

(१) रक्तस तथा रक्तकणों में क ओ^२ क्षारीय कार्बोनेट के रूप में रहता है। कुम्फुसों में जो ओपरक्लरजक घनता है वह दुर्बल अम्ल के रूप में कार्य करता है और बाइकार्बोनेट को कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है।



इसका कार्बनिक अम्ल का पुनः क ओ^२ तथा जल में परिणाम होता है।



रफ्टन नामक विद्वान् का मत है कि रक्तकणों में स्थित कार्बनिक परिवर्तक नामक क्रिपवत्तत्व की सहायता से यह क्रिया क्षीप्र संरग्न होती है तथा यह क्रिपवत्तत्व प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। इसका स्वरूप सामान्य क्रिपवत्तत्व के समान है और एक प्रकार का मांसतत्व है। इसकी रचना में कुछ घनाद का भी अंश होता है। इसकी क्रिया मध्यम प्रतिक्रिया में होती है, अतः अधिक अम्ल या क्षारीय विलयनों में इसकी क्रिया नहीं होती।

(२) रक्तकणों में वर्तमान कुछ क ओ^२ रक्तरजक के साथ मिलकर मांस-सत्त्वों के साथ एक विश्लेषणीय कार्बोमिय यौगिक बनाता है जिससे क ओ^२ कुम्फुसों में विश्लेषित हो जाता है।


हैम्बर्गर की प्रतिक्रिया (Hamberger's reaction)

हैम्बर्गर नामक विद्वान् ने प्रयोगों द्वारा यह देखा है कि रक्तस सपूर्ण रक्त की अपेक्षा क ओ^२ का शोषण अधिक करता है। इसका कारण यह है कि कणों से अधिक क्षारीय अणु रक्तस में चले जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के रक्तस से अधिक क ओ^२ का शोषण होता है। कणों से रक्तस में क्षारीय अणुओं की गति को हैम्बर्गर प्रतिक्रिया कहते हैं।

क्लोराइड क्रमण

उपर्युक्त विधि से रक्तस में पहुँचे हुये थार वहाँ क ओ^२ से मिल कर बाइकार्बोनेट बनाते हैं। रक्तस में इसके अतिरिक्त एक अन्य पद्धति से अधिक बाइकार्बोनेट घनता है जिसे 'क्लोराइड क्रमण' (Chloride shift) कहते हैं। इसके द्वारा रक्तस से क्लोराइड निकल कर रक्तकणों में पहुँच जाते हैं। यथा:—


(१) रक्तस में क ओ^२ के जल में घुलने से पहले कार्बोनिक अम्ल बनता है :—



(२) यह कार्बोनिक अम्ल पोटेशियम क्लोराइड से मिलकर याइकार्बोनेट बनाता है :—



(३) रक्तकणों में अम्ल पोटेशियम फास्फेट तथा रक्तजलक द्रव्य होता है, जो दुर्बल अम्ल के रूप में कार्य करता है । इस प्रकार पोटेशियम क्लोराइड जो उपर्युक्त प्रतिक्रिया में समाप्त हो गया था पुनः अम्ल फास्फेट तथा मांसतरनों से मिलकर बन जाता है :—



इस प्रकार निर्मित पोटेशियम क्लोराइड कोषाणु के भीतर ही रहती है, क्योंकि उसकी कला पोटेशियम अणुओं के लिए प्रवेश्य नहीं होती और इस प्रकार क्लोराइड रक्तस से अलग होकर कणों के भीतर चले जाते हैं । रक्तस से क्लोराइड के पृथक् हो जाने से क ओ^२ के द्वारा अधिक याइकार्बोनेट बनते हैं ।

जब रक्त में क ओ^२ का आधिक्य होता है तब रक्तस से रक्तकणों में क्लोराइड चले जाते हैं तथा जब क ओ^२ की कमी हो जाती है, तब ये कणों से रक्तस में चले आते हैं । इसीलिए सिरागत रक्त में रक्तस के भीतर कणों की अपेक्षा कम क्लोराइड होते हैं तथा धमनीगत रक्त में इसके विपरीत होता है ।

रक्तजलकद्रव्य के द्वारा क ओ^२ का वहन

कपर बतलाया जा चुका है कि रक्त घातुओं से क ओ^२ का ग्रहण करता है तथा कोषगत वायु में इसका परित्याग कर देता है । इस प्रकार रासायनिक संयोग में स्थित क ओ^२ फुफ्फुसों में विरलेपित हो जाता है । ओषजन के समान ही कार्बोनाइडोपिद्र का परिमाण भी अम्ल से कम तथा चार से बढ़ जाता है । अम्ल मिलाने पर वह अधिक शीघ्रता से मूलतरनों के साथ संयुक्त हो जाता है और क ओ^२ से संयुक्त होने के लिए मूलतत्त्व कम बच जाते हैं और क ओ^२ निर्मूल होकर बाहर निकल जाता है ।

रक्तरजकद्रव्य अन्य अम्ल पदार्थों की भीति क्षारों के साथ संयुक्त होता है। रक्तकणों में यह पोटेशियम के साथ संयुक्त होता है और पोटेशियम हिमोग्लोबिनेट नामक यौगिक के रूप में रहता है। जब यह यौगिक धातुओं में स्थित क ओ^२ के सम्पर्क में आता है तब मूल पोटेशियम क ओ^२ के साथ मिल कर पोटेशियम चाइकार्बनेट बनाता है। ओपररक्तरजक रक्तरजक की अपेक्षा तीव्र अम्ल है अतः फुफुसों में स्थित ओपररक्तरजक के सम्पर्क में आने पर पोटेशियम चाइकार्बनेट विश्लेषित हो जाता है और क ओ^२ मुक्त हो जाता है। पृथक् हुआ पोटेशियम पुनः रक्तरजक से मिलकर पोटेशियम हिमोग्लोबिनेट बनाता है। इस प्रकार रक्तरजकद्रव्य क ओ^२ के वाहक के रूप में कार्य करता है।

रक्त में नम्रजन की स्थिति

रक्त में १ या २ प्रतिशत नम्रजन केवल भौतिक विलयन के रूप में रहता है। धमनी तथा सिरा दोनों के रक्त में इसकी मात्रा समान होती है। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक क्रियाओं में नम्रजन का कोई साक्षात् भाग नहीं होता है। कुछ अनुपात में यह रक्त में शोषित होता है और रक्त के साथ परिभ्रमण करता है इसका साक्षात् प्रभाव धातुओं पर नहीं होता। अब यह माना जाता है कि इसका बहुत थोड़ा अंश रक्तकणों के साथ मिल कर एक अस्थिर यौगिक बनाता है।

कोषगत वायु

कोषगत वायु (३२०० सी० सी०) संचित तथा अवशिष्ट वायु का योग है। यह फुफुस के उस अंश में स्थित है जहाँ केशिकाओं द्वारा प्रवाहित होने वाले रक्त से इसका निकटतम सम्पर्क होता है और गैसों का पारस्परिक विनिमय होता है।

कोषगत वायु धमनीगत रक्त में गैसों के दबाव का नियन्त्रण करता है और इसीलिए कोषगत वायु का प्रायः निश्चित संगठन प्राकृत श्वसन के द्वारा स्थिर और समान रहता है।

कोषगत वायु का परिमाण एक विशिष्ट यन्त्र द्वारा निश्चित किया जाता है जिसमें एक चार पुरूप प्राकृत प्रश्वास के बाद गंभीर निःश्वास करता है तथा दूसरी चार प्राकृत निःश्वास के बाद गंभीर प्रश्वास करता है। इन दोनों

प्रकारों से एकत्रित वायु का विश्लेषण किया जाता है और उसके मध्यम परिणाम के अनुसार कोषगत वायु का संगठन निश्चित किया जाता है:—

औसत संगठन	कोषगत वायु प्रतिशत आयतन	प्रशसित वायु प्रतिशत आयतन	निःशसित वायु प्रतिशत आयतन
नश्वजन	८०.०	७९.०२	७९.६०
ओपजन	१४.५	२०.९५	१६.०२
क ओ ^२	५.५	०.०३	४.३८

कोषगत वायु में क ओ^२ का औसत दबाव प्रायः ३५ से ४५ मिलीमीटर तथा ओपजन का १०५ से १२० मिलीमीटर है।

फुफुसों में वायवीय विनिमय की प्रक्रिया (Gaseous exchange in Lungs)

फुफुसों में ओपजन वायुकोष से फुफुसगत रक्तप्रवाह में चला जाता है और क ओ^२ फुफुसीय रक्तवह कोशों से वायुकोषों में चला जाता है। इन गैसों का गमन दो कलाओं से होता है:—

(१) वायुकोषों की दीवाल, (२) रक्तकेशिकाओं का अन्तःस्तर ।

इस वायवीय विनिमय के संबन्ध में दो सिद्धान्त हैं:—

(१) श्वसन का भौतिक सिद्धान्त ।

(२) श्वसन का रासायनिक सिद्धान्त ।

(१) श्वसन का भौतिक सिद्धान्त—

फुफुसों तथा धातुओं में वायवीय विनिमय वायु प्रसरण के भौतिक नियमों के अनुसार होता है। रक्त से ओपजन धातुओं में भौतिक प्रसरणविधि से छाला है। दूसरे शब्दों में, वायवीय विनिमय की प्रक्रिया में मध्यस्थ कला में निष्क्रिय भाग लेती है और निर्जीव कला के रूप में कार्य करती है। यदि एक प्रवेश्य कला दो भिन्न दबाव वाले गैसों तथा उनके विद्यमानों को शुद्ध करती है तब गैस के अणु दोनों दिशाओं में सब एक भागे जाते रहते हैं जब तक दोनों ओर दबाव समान नहीं हो जाता। गैसों की यह गति अधिक दबाव से कम दबाव की ओर होती है। इन कलाओं के द्वारा गैसों की गति मेचल दबाव के अन्तर

के अनुसार ही निश्चित नहीं होती, बल्कि गैस तथा कला के स्वरूप पर भी बहुत कुछ निर्भर रहता है। प्रसरण का द्रव्य गैसों के घनत्व के विपर्यस्त अनुपात में होता है। उदाहरणार्थ, क ओ^२ का प्रसरण ओपजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से होता है।

कला के दोनों ओर गैसों का दबाव बराबर हो जाने के कारण साम्यावस्था स्थापित हो जाने पर गैसों की प्रसरण क्रिया रुक जाती है। इस सिद्धान्त के अनुसार वायवीय विनिमय की क्रिया में शरीर की भौतिक परिस्थिति भी अनु-कूल होती है क्योंकि ओपजन तथा क ओ^२ का दबाव ऐसे अन्तर पर रहता है कि विनिमय आसानी से हो सके।

ओपजन

कार्बनिक अम्ल

यादव वायु—१५९ मिलीमीटर

घातु—५०-७० मिलीमीटर

कोषगत वायु—१०५-१२० "

सिरारक्त—४६ "

घमनीरक्त—१०४ "

कोषगत वायु—३६ "

घातु—२० "

यादव वायु—०.४ "

परिमाण	प्रश्वसित वायु	निःश्वसित वायु	कोषगत वायु	घमनी रक्त	सिरारक्त	घातु
ओपजन	२०.९५	१६.०२	१४.८	१९.५	१४.५	२०
क ओ ^२	०.०३	४.३८	५०.५	५०.५	५५.०	५१-५०
नम्रजन	७९.०२	७९.६०	७९.७	१.२	१-२	
दबाव						
ओपजन मि.मी.	१५९	१००	१०५-१२०	१०४	५०-४०	२०
क ओ ^२ "	०.२३	४०	३५-४५	४६	४६	५०-७०

(२) श्वसन का रासायनिक सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार गैसों के विनिमय में कलायें प्रायः क्रिया के द्वारा सक्रिय भाग लेती हैं। इस मन के पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर पर्याप्त प्रमाण हैं तथापि पक्ष में प्रमाण अधिक हैं।

घातु श्वसन (Tissue respiration)

इसे कोषाणुश्वसन (Cellular-respiration) या अन्तःश्वसन

Internal respiration भी कहते हैं । यह निम्न प्रकार से होता है:—

(क) ओपजन कोशिकाओं के रक्त से निकल कर धातुओं के कोषाणुओं में चला जाता है । यह क्रिया रक्त में ओपजन के दबाव पर निर्भर रहती है ।

(ख) क ओ^२ की विरुद्ध दिशा में गति ।

इन गैसों का विनिमय शरीर प्रक्रिया द्वारा न होकर प्रसरण की भौतिक विधि द्वारा होता है ।

ओपजन का दबाव धमनीगत रक्त में १०४ मि० मी० रहता है । ५० मि० मी० से कम दबाव होने पर ओपजन पृथक् होने लगता है और १० से २० मि. मी. तक बिलकुल पृथक् हो जाता है । अतः जब रक्त धातुओं में अल्पमात्रयुक्त ओपजन के संपर्क में आता है तब ओपजन रक्त से निकल कर धातुओं में प्रसरण के सामान्य नियम के अनुसार चला जाता है ।

इस प्रक्रिया की तीन अवस्थाएँ होती हैं:—

(१) धातु के अवयव निरन्तर लसीका से ओपजन ग्रहण करते रहते हैं ।

(२) परिणामस्वरूप, लसीका में ओपजन का दबाव कम हो जाता है तथा रक्तस की अपेक्षा लसीकास्थित ओपजन का दबाव कम होने से गैस रक्त-रस से कोशिका की दीवारों से होकर लसीका में चला जाता है ।

(३) फलस्वरूप, रक्तकणों के चारों ओर रक्तस में ओपजन का दबाव कम हो जाता है तथा ओपरक्तज्ञक का विश्लेषण होने लगता है ।

इस प्रकार धातुओं की ओपजन की प्राप्ति रक्तस से ही होती है । ओपरक्त-रक्त से ओपजन निकल कर रक्तस में चला जाता है और इस प्रकार इसमें ओपजन का दबाव समानरूप से स्थिर रहता है । रक्त से धातुओं में जानेवाला ओपजन का परिणाम इनके दबाव के अन्तर के अनुपात के अनुसार होता है ।

जब मांसपेशी विश्रामावस्था में होती है तब उसमें ओपजन का दबाव पेशीसूत्र के दबाव के समान, प्रायः २० मि. मी. होता है ।

जब पेशी सक्रिय होती है तब उसमें ओपजन का दबाव अत्यन्त कम हो जाता है और रक्त से अधिक ओपजन आकर्षित होता है । धातुओं की क्रिया जितनी अधिक होती है, ओपजन का दबाव उतना ही कम होता है, अतः अधिक परिमाण में ओपजन रक्त से खींचा जाता है । इस अवस्था में रक्तसवहन भी बढ़ जाता है ।

संकोचकालीन पेशी में निम्नांकित परिघटन होते हैं:—

(१) अधिक क्रियाशीलता, (२) कओ^१ की अधिक उत्पत्ति ।

(३) अधिक ओपजन का उपयोग तथा ताप का प्रादुर्भाव ।

ओपजन का उपयोग निम्नांकित कारणों पर निर्भर है:—

(क) क्रिया का स्वरूप (ख) धातु का स्वरूप (ग) तापक्रम ।

पेशियों की अपेक्षा ग्रन्थियाँ ओपजन का उपयोग अधिक करती हैं तथा सम्योजक वस्तु सप से कम उपयोग करते हैं ।

प्रतिक्लोप्राम प्रतिमिनट ओपजन का उपयोग:—

छालाग्रन्थि	२५ सी. सी.
अग्न्याशय	४० " "
अन्त्र	२३ " "
घृन्क	२६ " "
यकृत	३० " "
पेशी	४ " " से ८० सी. सी.

प्रेक्टिक मांसपेशी के द्वारा ओपजन का उपयोग उसकी स्थिति पर निर्भर करता है । विश्रामकाल में १ सी. सी. , साधारण परिश्रम के समय ३० सी. सी. तथा अत्यधिक परिश्रम के समय ८० सी० सी० तक ओपजन का उपयोग होता है । मांसपेशीय सामीकरण के परिणामस्वरूप रक्त में कओ^१ तथा दुग्धाम्ल का आधिक्य हो जाता है जिसके कारण रक्तगत ओपजन तथा पेशीगत ओपजन के दबाव का अन्तर बढ़ जाता है ।

रक्तरक्षकद्रव्य का ओपजनसामर्थ्य

ओपजनसामर्थ्य ओपजन का वह परिमाण है जो १०० सी० सी० रक्त द्वारा ग्रहीत होता है । रक्तरक्षक द्रव्य का विशिष्ट ओपजनसामर्थ्य ओपजन तथा रक्त-रक्षक द्रव्य के लोह के सम्बन्ध का द्योतक है । लोह का एक अणु ओपजन के दो अणुओं से मिलता है । इस प्रकार १ ग्राम लोह ४०० सी० सी० ओपजन से मिलता है ।

श्वासनाङ्क (Respiratory quotient)

शरीर में शक्ति आहार द्रव्यों के कार्बन तथा उद्जन के ओपजनीकरण से


उत्पन्न होती है तथा ओपजन का 'आहरण' और कार्बनद्विओपिद् का 'निर्हरण' फुफ्फुसीय व्यजन से होता है ।

सामान्यतः धातुओं के द्वारा उपयुक्त ५ सी० सी० ओपजन (धमनीगत (२० सी० सी०) तथा सिरागत (१५ सी० सी०) का अन्तर) के लिए १० सी० सी० कओ^२ निःश्वास के द्वारा बाहर निकाला जाता है । अतः—

निःश्वसित कओ^२
प्रश्वसित ओपजन का अनुपात ४.५ है । ओपजन का उपयोग केवल कार्बन के ओपजनीकरण में ही नहीं होता, बल्कि जल, मूत्रलवण आदि पदार्थ भी ओपजनीकरण के द्वारा यत्ते हैं । ओपजन का परिमाण जो जल तथा मूत्रलवण बनाने के काम में आता है, वह निःश्वसित वायु में गैस के रूप में बाहर नहीं निकलता । अतः प्रश्वसित वायु के कुल आयतन से निःश्वसित वायु का आयतन कम होता है ।


• निःश्वसित कओ^२
प्रश्वसित ओ का अनुपात र्वसनाङ्क कहलाता है । यह आहार के स्वरूप पर निर्भर करता है :—

(१) जब सारवर्कका का शरीर में ओपजनीकरण होगा तब गृहीत ओपजन तथा परित्यक्त कओ^२ का परिमाण समान होगा :—




स्नेह तथा मांसतरवों में उद्जन के अनेक अणु अनोपजनीकृत होते हैं, अतः कुछ ओपजन उन्हीं अणुओं के ओपजनीकरण में उपयुक्त हो जाता है अतः सब ओपजन निःश्वसित वायु में कओ^२ के रूप में नहीं जा पाता ।

(२) स्नेह प्रधान आहार में $\frac{\text{कओ}^2}{\text{ओ}^2} \frac{56}{24} = 0.7$ होता है :—



(३) मांसतत्व के आहार में $\frac{\text{कओ}^2}{\text{ओ}^2} \frac{63}{66} = 0.95$ होता है :—



आहारद्रव्यों की भिन्नता से श्वसनाङ्क में भिन्नता होने पर भी साधारणतः मिश्रित आहार करने पर एक व्यक्ति में स्वाभाविक अवस्थाओं में श्वसनाङ्क $\frac{1}{5} = 0.2$ होता है।



सप्तम अध्याय

शरीर का रासायनिक संघटन

मानवशरीर का निर्माण विभिन्न निरिन्द्रिय तथा सेन्द्रिय यौगिकों से होता है जिन्हें भौतिक तत्त्व कहते हैं। सेन्द्रिय यौगिक मांसतन्त्र, स्नेह तथा शास्त्र हैं और निरिन्द्रिय यौगिकों में जल, खटिक, सोडियम, पोटेशियम आदि के निरिन्द्रिय लवण और कुछ स्वतन्त्र अम्ल यथा आमाशयिक रस का उदहरिताम्ल आते हैं।

शरीर को बनाने वाले भौतिक तत्वों में कुछ मुख्य हैं जो प्रत्येक प्राणी के शरीर में अनिवार्य रूप से पाये जाते हैं। ये हैं कार्बन, उदजन, ओपजन, नत्रजन, गन्धक, स्फुरक, सोडियम, पोटेशियम, खटिक, मैग्नेशियम और लौह। इनके अतिरिक्त कुछ तत्व, यथा-सिलिका, आयोडिन, फ्लोरिन, प्रोमिन, अल्युमिनियम, मैंगनीज तथा ताम्र कुछ प्राणियों में पाये जाते हैं।

ये तत्व सम्पूर्ण शरीर में समरूप से विभक्त नहीं रहते। प्रायः सब खटिक तथा $\frac{1}{2}$ स्फुरक अस्थियों में पाया जाता है। प्रायः ७५ प्रतिशत लौह रक्तकणों में, सब आयोडिन अवटुग्रन्थि में तथा मैंगनीज और ताम्र मुख्यतः यकृत में रहते हैं।


उदजन, ओपजन, कार्बन तथा नत्रजन ये चार तत्व शरीर का मुख्यांश बनाते हैं और प्रायः सम्पूर्ण शरीर का ९६ प्रतिशत इनसे बनता है। खटिक

से २ प्रतिशत, स्फुरक से १ प्रतिशत तथा अन्य तत्वों से १ प्रतिशत घनता है । ये तत्व शरीर में विभिन्न कार्यों का संवादन करते हैं । सोडियम, पोटेशियम, खटिक, मैग्नेशियम और क्लोरीन विद्युद्भिस्लेपक के रूप में कार्य करते हैं तथा लौह, ताम्र और मैगनीज प्रयत्नक का कार्य करते हैं ।

इनमें केवल तीन तत्व स्वतन्त्ररूप में शरीर में पाये जाते हैं यथा रक्त में नम्रजन और ओपजन तथा आन्त्र में किण्वीकरण के फलस्वरूप उदजन प्राप्त होते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य तत्व उपर्युक्त सेन्द्रिय एवं निरिन्द्रिय यौगिकों के रूप में ही मिलते हैं ।


शाक्तत्व (Carbohydrate)

सजीव ओजःसार के घन अवयवों का अधिक भाग कार्बन से घनता है । शरीर में पाये जाने वाले कार्बन के यौगिक ज्वलनशील होते हैं अर्थात् वे ओपजन से मिलकर कार्बनद्विओपिद् बनाते हैं और इस रासायनिक परिवर्तन के क्रम में ताप उत्पन्न करते हैं । घनस्पतियों में प्रायः सब कार्बन कार्बनद्विओपिद् के रूप में रहता है । पौधों की हरी पत्तियों में कार्बनद्विओपिद् तथा जल के मिलने से श्वेतसार का निर्माण होता है:—




कार्बनद्विओपिद् तथा जल का यह संयोग सूर्यकिरणों द्वारा प्राप्त शक्ति के सहारे होता है और यही शक्ति श्वेतसार में स्थायी शक्ति के रूप में रहती है । जब शरीर में श्वेतसार का ओपजनीकरण होता है और उससे जल तथा कार्बनद्विओपिद् बनते हैं तब यह स्थायी शक्ति मुक्त होती है । यह देखा गया है कि १ ग्राम श्वेतसार ज्वलन होने पर ०.४ कैलोरी ताप उत्पन्न करता है ।

शाक्तत्व मुख्यतः घनस्पतियों में पाया जाता है जिनका आहार में प्रमुख भाग रहता है । कुछ शाक्तत्व प्राणियों के शरीर में भी बनते और पाये जाते हैं । श्वेतसार, सत्वशर्करा, फलशर्करा एवं दुग्धशर्करा शाक्तत्वों में प्रधान माने जाते हैं । रासायनिक दृष्टि से शर्कराओं का सम्बन्ध मद्यसार से होता है । प्राथमिक मद्यसार का ओपजनीकरण होने पर अल्डीहाइड और उसका पुनः ओपजनीकरण होने पर अम्ल की उत्पत्ति होती है । यथा:—



(एथिल अलकोहल) (एसिटैलिडहाइड)



(एसिटिक एसिड)


रासायनिक संघटन की दृष्टि से शर्कराओं के तीन वर्ग किये गये हैं:—

१. एकशर्करिद् (Mono—Sachharide)
२. द्विशर्करिद् (Di—Sachharide)
३. बहुशर्करिद् (Poly—Sachharide)—

एकशर्करिद् $\text{C}_6 \text{H}_{12} \text{O}_6$	द्विशर्करिद् $\text{C}_{12} \text{H}_{22} \text{O}_{11}$	बहुशर्करिद् $(\text{C}_6 \text{H}_{10} \text{O}_5)_n$
सहशर्करा (Glucose) फलशर्करा	इधुशर्करा दुग्धशर्करा यवशर्करा	श्वेतसार शर्कराजन द्रावीन इन्जुलीन कोष्ठावरण

स्नेह (Fat)

घनरूपितियों में श्वेतसार का कुछ अंश निरोपजनीकृत होने से स्नेह की उत्पत्ति होती है:—



इसीलिए बीजों के परिपाककाल में स्नेह का परिमाण बढ़ जाता है तथा शाकतत्व का परिमाण घट जाता है। श्वेतसार के समान बहुत सी शक्ति स्नेह में संचित रहती है जो शरीर में उसका उबलन होने पर उत्पन्न होती है। १ ग्राम स्नेह ९.० कैलोरी ताप उत्पन्न करता है।

स्नेह शरीर के अनेक घातुओं में पाया जाता है; विशेषतः मज्जा, मेदोघातु तथा स्तनग्रंथियों (स्तन्यकाल में) में पाया जाता है। मेदोघातु में वर्तमान स्नेह जीवनकाल में तरल होता है। शरीर में मिलने वाले स्नेहों में पामीटिन, स्टीयरिन तथा ओलीन मुख्य हैं जो रासायनिक संघटन और भौतिक स्वरूप में एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं।

स्नेह स्नेहाम्ल एवं ग्लिसरीन के मिश्रण से बनता है । तापाधिक्य, खनिज अम्लों एवं शारीर किण्वतत्त्वों के प्रभाव से स्नेह विदलेपित होकर स्नेहाम्ल एवं ग्लिसरीन में परिणत हो जाता है । सफेनीकरण की प्रक्रिया में लगभग इसी प्रकार का परिवर्तन होता है । शरीर में स्नेह का एक और भौतिक परिवर्तन होता है जिसे पयसीभवन कहते हैं ।

स्नेह का स्वरूप

- (१) वर्णहीन । (२) गन्धहीन ।
 (३) जल में अविलेय और तैरने वाले । (४) मेघसार में विलेय ।
 (५) ईथर, क्लोरोफार्म, बेन्जीन और फार्बन डाइसल्फ़ाइट में विलेय ।
 (६) पोटेशियम बाइसल्फेट ($KHso_4$) के साथ खूब गरम करने पर ग्लिसरीन का विघटन होने से एक्रोलीन के कटु घाण की उत्पत्ति ।

(७) जल, वाष्प या किण्वतत्त्वों के साथ गरम करने पर जलीय विदलेपन ।

(८) सफेनीकरण (Saponification)

(९) पयसीभवन, (Emulsification)

स्नेह में निम्नांकित वर्णप्रतिक्रियाएँ होती हैं:—

(१०) औष्मिक अम्ल के साथ—कृष्णवर्ण

(११) स्कॉलरक रेड के साथ—रक्तवर्ण

(१२) सूडन III के साथ—गहरा पीला

(१३) पोटेशियम हाइड्रोसल्फ़ाइट विलयन के साथ फेनोलयैलीन के रक्तवर्ण को दूर करता है ।

उपस्नेह

ये तत्त्व मांसतत्त्व के साथ ओजःसार में विशेषतः कोषाणु के बाह्यावरण में पाये जाते हैं । यद्यपि इनका परिमाण मांसतत्त्व की अपेक्षा स्वल्प होता है, तथापि ओजःसार के ये प्रधान और आवश्यक घटक हैं । ये विशेषतः नाडीतन्तु में अधिक परिमाण में पाये जाते हैं । शरीरक्रिया की दृष्टि से सर्वप्रधान उपस्नेह कोलेष्टरोल ($C_{27}H_{46}O$) है जो घातुओं में स्वतन्त्र रूप में तथा स्नेहाम्लों के साथ पाया जाता है ।

कोलेस्ट्रॉल

गुणधर्मः—यह जल में अविलेय है तथा ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसिटोन, कथित मद्यसार एवं पित्त में घुलनशील है।

स्रोतः—यह नाडीतन्तु का प्रमुख उत्पादान है और उसमें भी विशेष कर श्वेत मेदस कोष में पाया जाता है। भोज्यपदार्थों में यह मुख्यतः अडे, स्नेह, मक्खन, मस्तिष्क, यकृत और हृक्क में पाया जाता है। यह रक्तकणों, प्लीहा, पित्त और थोड़ी मात्रा में प्रत्येक प्रकार के ओजःसार में पाया जाता है। सभी तन्तुओं में इसकी अधिकता से यह प्रमाणित होता है कि यह विपाक्त पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। यह केवल मलपदार्थ ही नहीं है जैसा कि पहले लोगों का विश्वास था। जीवनीय द्रव्य 'ए' तथा 'डी' से इसका घनिष्ठ संबन्ध है।

सर्पविष रक्तविलायक होता है, किन्तु रक्तकणों के बाष्पावरण में स्थित कोलेस्ट्रॉल उसको रक्तकणों के भीतर नहीं घुसने देता और इस प्रकार शरीर की उससे नैसर्गिक रक्षा करने का प्रबन्ध है।

मांसतत्त्व (Protein)

मांसतत्त्व ऐसे पदार्थों का वर्ग है जो आमिषाण्डों एवं तन्त्रद्रव्यों के संयोग से बनते हैं। आमिषाण्ड एक सेन्द्रिय अण्ड है जिसके अणु में एक उदजन परमाणु को हटा कर उसके स्थान पर आमिषवर्ग (NH_2) आ जाता है।

प्राणियों तथा वनस्पतियों के ओजःसार में पाये जाने वाले यौगिकों में मांसतत्त्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन शब्द एक ग्रीक शब्द से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है 'सर्वप्रथम' और इसी से यह सूचित होता है कि यह प्रत्येक जीवित कोषाणु का आवश्यक घटक है। ये जटिल मन्त्रजनयुक्त सेन्द्रिय यौगिक हैं जिनमें कार्बन, उदजन, ओपजन और नम्रजन होते हैं। अधिकांश मांसतत्त्वों में गन्धक का अंश भी होता है। अधिक मांसतत्त्वों में स्फुरक भी स्थूल मात्रा में (०.४ से ०.८%) होता है। कुछ मांसतत्त्वों में लौह, मैंगनीज, ताँब और यशद भी होते हैं।

मांसतत्त्वों का सामान्य संघटन निम्नांकित होता हैः—

कार्बन—५०-५५	प्रतिशत	उदजन—६-७.३	प्रतिशत
ओपजन—१९-२४	"	नम्रजन—१५-१८	"
गन्धक—०.३-२.५		स्फुरक—०.४२-०.८५	

मांसतत्त्व में संचित शक्ति शरीर में ज्वलन होने पर मुक्त होती है । १
ग्राम मांसतत्त्व से ४०० कैलोरी ताप उत्पन्न होता है ।

आहारगत मांसतत्त्वों से ही शरीरधातुगत मांसतत्त्व बनते हैं, किन्तु दोनों के संघटन में अन्तर होता है । आहारगत मांसतत्त्व पाचन की प्रक्रिया से सरल पदार्थों में विश्लेषित हो जाते हैं जिन्हें 'सारपदार्थ' कहते हैं । इन्हीं सारपदार्थों से शरीर कोषाणु अपने मांसतत्त्वों का निर्माण कर लेते हैं ।

मांसतत्त्वों का वर्गीकरण

मांसतत्त्व तीन वर्गों में विभक्त किये गये हैं:—

(१) सरल (Simple)—प्रोटेमिन, हिस्टोन, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लुटेन, प्रोलेमिन, स्कलीरोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन ।

(२) संयुक्त (Conjugated)—ग्लुकोप्रोटीन, न्युक्लिओप्रोटीन, फो-
फोप्रोटीन ।

(३) उद्भूत (Derived)—मेटाप्रोटीन, प्रोटीभोज (मांसतत्त्वोन्न)
पेप्टोन (मांसतत्त्वसार), पौलिपेप्टाइड (बहुपाचित मांसतत्त्वसार)

मांसतत्त्व के भौतिक गुणधर्म:—

(१) विलेयता—प्रायः सभी मांसतत्त्व मद्यसार और ईधर में अविलेय होते हैं । कुछ जल में घुल जाते हैं और कुछ जल में अविलेय होते हैं, किन्तु छवण विलयन में घुल जाते हैं ।

(२) प्रसार्यता—मांसतत्त्वोन्न और मांसतत्त्वसार के अतिरिक्त सभी मांस तत्त्व घन होते हैं ।

(३) स्फटिकीकरण—रक्तरञ्जक आदि कुछ मांसतत्त्वों का आसानी से स्फटिकीकरण हो जाता है और अन्य मांसतत्त्वों का स्फटिकीकरण विलम्ब और कठिनाई से होता है ।

(४) प्रतिक्रिया—इनकी प्रतिक्रिया अम्ल होती है—

(५) केन्द्रितप्रकाश का प्रभाव:—कुछ मांसतत्त्व वामावर्तक और कुछ दक्षिणावर्तक होते हैं ।

अष्टम अध्याय

भौतिक रसायनशास्त्र और शरीरक्रिया-विज्ञान में उसका महत्त्वपूर्ण उपयोग ।

भौतिक रसायनशास्त्र के क्षेत्र में अनुसन्धानों से विलयनों के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक नवीन बातों का पता चला है जिनसे जीवन की प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है ।

जल एक ऐसा द्रव पदार्थ है जिसमें विरल वस्तु स्वभावतः विलीन रहती है। साधारण तापक्रम पर इसके अणु निरन्तर गतिशील होते हैं और तापक्रम जितना बढ़ता है उतनी ही अणुओं की गति भी बढ़ जाती है यहां तक कि अन्त में जब जल उबलने लगता है, इसके अणु विलयन को छोड़ कर बाहर निकल आते हैं। पूर्ण विशुद्ध जल H_2O सूत्र के अनुसार अणुओं से बना होता है और इन अणुओं का विश्लेषण विद्युदणुओं में बहुत कम होता है। यही कारण है कि शुद्ध जल विद्युत् का चालक नहीं होता ।

यदि जल में शर्करा घोल दी जाय, तब भी वह विलयन विद्युद्धारक का चालक नहीं होता, क्योंकि शर्करा के अणुओं का विश्लेषण नहीं होता । किन्तु यदि जल में नमक का विलयन बनाया जाय, तो वह विद्युद्धारक का चालक हो जाता है । इसका कारण यह है कि जल में उसका प्राथमिक उपादानों में विश्लेषण हो जाता है जिन्हे विद्युदणु कहते हैं । यथा, जब जल में सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाया गया तो उसके कुछ अणु सोडियम विद्युदणुओं में विभक्त हो जाते हैं जो धन विद्युत् से युक्त होते हैं और कुछ अणु क्लोरीन विद्युदणुओं में पृथक् हो जाते हैं जो ऋण विद्युत् से युक्त होते हैं । इसी प्रकार उदहरिताम्ल के जलीय विलयन में स्वतन्त्र उद्जन तथा क्लोरीन के विद्युदणु होते हैं । गन्धकाम्ल भी उद्जन और सल्फेट के विद्युदणुओं में विभक्त हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि विद्युदणु परमाणु या परमाणुओं का समूह हो सकता है ।

ऋण और धन विद्युत् के संयोग में भी अन्तर होता है । उदहरिताम्ल के दोनों विश्लेषित विद्युदणुओं में धन और ऋण विद्युत् समान होती है, किन्तु गन्धकाम्ल में सल्फेट विद्युदणु की ऋण विद्युत् दो उद्जन विद्युदणुओं की धन-

विद्युत् के समान होती है । इसी आधार पर विद्युदणुओं को एकशक्ति, द्विशक्ति, त्रिशक्ति प्रभृति संज्ञा दी गई है । धन विद्युत् से युक्त विद्युदणुओं को धन विद्युदणु (K&t-jons) कहते हैं और वह ऋण विद्युद्भुव की ओर गति करते हैं । इसी प्रकार ऋण विद्युत् से युक्त विद्युदणुओं को ऋणविद्युदणु (An-ions) कहते हैं और वह धनविद्युद्भुव की ओर गति करते हैं । नीचे कुछ विद्युदणुओं के नाम दिये जाते हैं:—

धनविद्युदणु—एकशक्ति—H, Na, K, Nh₄ आदि
 द्विशक्ति—Ca, Ba, Fe "
 त्रिशक्ति—As, Bi, Sb, Fe "

ऋणविद्युदणु—एकशक्ति—Cl, Br, I, Oh, No₃ आदि
 द्विशक्ति—S, Se, So₄ "

विलयन जितना अधिक होगा, विरलेपन की क्रिया उतनी ही पूर्ण होगी । विरलेपन के द्वारा युक्त विद्युदणु विद्युद्धार से युक्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसे विलयन में जब विद्युद्धार प्रवाहित की जायगी तो विद्युदणुओं की गति के सहारे विलयन में उमका चालन होगा । ऐसे पदार्थ जिनमें विरलेपन का गुण होता है विद्युद्विरलेपक (Elecrolytes) कहलाते हैं ।

शरीरगत द्रवपदार्थों के विलयन में विद्युत् विरलेपक होते हैं और इसी कारण वे विद्युद्धार का चालन करने में समर्थ होते हैं । विद्युद्विरलेपक वस्तुओं के द्वारा विरलेपन का विचार एरीनियस (Arrhenius) नामक विद्वान् के द्वारा व्यक्त किया गया था । यह व्यापन भार के सम्बन्ध में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विरलेपन की क्रिया से विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है, फलतः व्यापन-भार भी बढ़ जाता है । इस प्रकार हम दृष्टिकोण से विद्युदणु तथा अणु की क्रिया में कोई अन्तर नहीं होता । इसके अतिरिक्त, सजीव धातु अपने पारवर्त्यो प्रदेशों में विद्युदणुओं के स्वरूप और सान्द्रता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं ।

ग्रामपरमाणुविलयन (Gram molecular solution)—व्यापनभार के दृष्टिकोण से ग्रामपरमाणु सुविधाजनक इकाई है । किसी वस्तु की ग्रामों में मात्रा जो परमाणुभार के समान होती है, 'ग्रामपरमाणु' कहलाती है । जिस विलयन में प्रति लिटर वस्तु का एक ग्राम परमाणु हो, उसे 'ग्रामपरमाणुविलयन' कहते हैं ।

अष्टम अध्याय

भौतिक रसायनशास्त्र और शरीरक्रिया-विज्ञान में
उसका महत्त्वपूर्ण उपयोग ।

भौतिक रसायनशास्त्र के क्षेत्र में अनुसन्धानों से विलयनों के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक नवीन बातों का पता चला है जिनसे जीवन की प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती है ।

जल एक ऐसा द्रव पदार्थ है जिसमें विलेय वस्तु स्वभावतः विलीन रहती है। साधारण तापक्रम पर इसके अणु निरन्तर गतिशील होते हैं और तापक्रम जितना बढ़ता है उतनी ही अणुओं की गति भी बढ़ जाती है यहां तक कि अन्त में जब जल उबलने लगता है, इसके अणु विलयन को छोड़ कर बाहर निकल आते हैं। पूर्ण विद्युत् जल H_2O सूत्र के अनुसार अणुओं से बना होता है और इन अणुओं का विश्लेषण विद्युत् अणुओं में बहुत कम होता है। यही कारण है कि शुद्ध जल विद्युत् का चालक नहीं होता ।

यदि जल में शर्करा घोल दी जाय, तब भी वह विलयन विद्युद्वाहक का चालक नहीं होता, क्योंकि शर्करा के अणुओं का विश्लेषण नहीं होता । किन्तु यदि जल में नमक का विलयन बनाया जाय, तो वह विद्युद्वाहक का चालक हो जाता है । इसका कारण यह है कि जल में उसका प्राथमिक उपपदार्थों में विश्लेषण हो जाता है जिन्हें विद्युत् अणु कहते हैं । यथा, जब जल में सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाया गया तो उसके कुछ अणु सोडियम विद्युत् अणुओं में विभक्त हो जाते हैं जो धन विद्युत् से युक्त होते हैं और कुछ अणु क्लोरीन विद्युत् अणुओं में श्वक् हो जाते हैं जो ऋण विद्युत् से युक्त होते हैं । इसी प्रकार उदहरिताम्ल के जलीय विलयन में स्वतन्त्र उदजन तथा क्लोरीन के विद्युत् अणु होते हैं । गन्धकाम्ल भी उदजन और सल्फेट के विद्युत् अणुओं में विभक्त हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि विद्युत् परमाणु या परमाणुओं का समूह हो सकता है ।

ऋण और धन विद्युत् के संयोग में भी अन्तर होता है । उदहरिताम्ल के दोनों विश्लेषित विद्युत् अणुओं में धन और ऋण विद्युत् समान होती है, किन्तु गन्धकाम्ल में सल्फेट विद्युत् की ऋण विद्युत् दो उदजन विद्युत् अणुओं की धन-

विद्युत् के समान होती है । इसी आधार पर विद्युदणुओं को एकशक्ति, द्विशक्ति, त्रिशक्ति प्रभृति संज्ञा दी गई है । धन विद्युत् से युक्त विद्युदणुओं को धन विद्युदणु (Kat-jons) कहते हैं और वह ऋण विद्युद्भुव की ओर गति करते हैं । इसी प्रकार ऋण विद्युत् से युक्त विद्युदणुओं को ऋणविद्युदणु (An-ions) कहते हैं और वह धनविद्युद्भुव की ओर गति करते हैं । नीचे कुछ विद्युदणुओं के नाम दिये जाते हैं:—

धनविद्युदणु—एकशक्ति—H, Na, K, Nh₄ आदि
 द्विशक्ति—Ca, Ba, Fe "
 त्रिशक्ति—Al, Bi, Sb, Fe "

ऋणविद्युदणु—एकशक्ति—Cl, Br, I, Oh, No₃ आदि
 द्विशक्ति—S, Se, So₄ "

विलयन जितना अधिक होगा, विश्लेषण की क्रिया उतनी ही पूर्ण होगी । विश्लेषण के द्वारा युक्त विद्युदणु विद्युद्धार से युक्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसे विलयन में जब विद्युद्धार प्रवाहित की जायगी तो विद्युदणुओं की गति के सहारे विलयन में उसका चालन होगा । ऐसे पदार्थ जिनमें विश्लेषण का गुण होता है विद्युद्विश्लेषक (Elecrolytes) कहलाते हैं ।

शरीरगत द्रवपदार्थों के विलयन में विद्युत् विश्लेषक होते हैं और इसी कारण वे विद्युद्धार का चालन करने में समर्थ होते हैं । विद्युद्विश्लेषक वस्तुओं के द्वारा विश्लेषण का विचार एरीनियस (Arrhenius) नामक विद्वान् के द्वारा व्यक्त किया गया था । यह व्यापन भार के सम्बन्ध में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विश्लेषण की क्रिया से विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है, फलतः व्यापन-भार भी बढ़ जाता है । इस प्रकार हम दृष्टिकोण से विद्युदणु तथा अणु की क्रिया में कोई अन्तर नहीं होता । इसके अतिरिक्त, सजीव धातु अपने पारस्परिक प्रदेशों में विद्युदणुओं के स्वरूप और सांद्रता के प्रति अत्यधिक संवेदनाशील होते हैं ।

ग्रामपरमाणुविलयन (Gram molecular solution)—व्यापनभार के दृष्टिकोण से ग्रामपरमाणु सुविधाजनक इकाई है । किसी वस्तु की ग्रामों में मात्रा जो परमाणुभार के समान होती है, 'ग्रामपरमाणु' कहलाती है । जिस विलयन में प्रति लिटर वस्तु का एक ग्राम परमाणु हो, उसे 'ग्रामपरमाणुविलयन' कहते

यथा—सोडियम क्लोराइड के ग्रामपरमाणुविलयन में १ लिटर में सोडियम क्लोराइड ५८.४६ ग्राम (सोडियम = २३.०० क्लोराइड = ३५.४६) होता । सार्व-शर्करा के ग्रामपरमाणुविलयन में प्रतिलिटर १८० ग्राम सार्वशर्करा होती है ।


प्रसरण—(Diffusion)

यदि दो गैसों को एक मन्द स्थान में रखा जाय तो थोड़ी देर में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं । यह गैस के अणुओं की गति के कारण होता है । इसे प्रसरण कहते हैं । वही क्रिया पुष्पुसों में रक्त से गैसों के आगमन में होती है । इसी प्रकार प्रसरण की क्रिया से दो द्रवपदार्थों का समान मिश्रण हो जाता है । यदि छवणविलयन में ऊपर से और जल दिया जाय तो शीघ्र ही वह सम्पूर्ण विलयन में मिलकर एकाकार हो जाता है । इसी प्रकार यदि अलक्यूमिन के विलयन पर प्रयोग किया जाय तो यह क्रिया धीरे-धीरे होती है ।

कलाओं द्वारा वस्तुओं की गति

यदि छवण विलयन के ऊपर जल न डाल कर दोनों को एक सूक्ष्म कला से पृथक् कर दिया जाय, तो वहाँ भी प्रसरण की क्रिया होगी, यद्यपि मन्द-मन्द । थोड़े समय में, कला के दोनों ओर जल में छवण की मात्रा समान हो जायगी । जो पदार्थ इन कलाओं से उस पार चले जाते हैं उन्हें विशद (Crystalloids) तथा जो बृहत् अणुओं के कारण उस पार नहीं जा पाते उन्हें विच्छिद (Colloids) कहते हैं यथा श्वेतसार, मांसतन्व आदि । बहुत कम ऐसी कलाएँ हैं जिनसे जल तथा उसमें विलीन वस्तुओं की गति समान रूप से होती है ।


इस चित्र में कोष्ठ 'क' में शुद्ध जल भरा है और कोष्ठ 'ख' में सोडियम



चित्र ३६

क्लोराइड (छवण) विलयन । दोनों को एक मध्यवर्ती कला से पृथक् कर दिया गया है । थोड़ी देर में दोनों कोष्ठों का विलयन समान हो जायगा और प्रारम्भ में कोष्ठ 'ख' छवण की जितनी सान्द्रता थी उससे आधी सान्द्रता का विलयन दोनों में तैयार हो जायगा । इस क्रिया में सर्वप्रथम कोष्ठ 'ख' के द्रवका आयतन बढ़ता है, क्योंकि कोष्ठ 'क' से जल के अधिक अणु कोष्ठ 'ख' में चले जाते हैं और कोष्ठ 'ख' से छवण के अणु कोष्ठ

‘क’ में उतनी शीघ्रता से नहीं जा पाते । कला के द्वारा जल के अणुओं के प्रवाह को व्यापन (Osmosis) कहते हैं । कला के द्वारा प्रवेश्य और अप्रवेश्य दोनों प्रकार के पदार्थों को पृथक् करने की क्रिया को द्विविभाजन (Dialysis) कहते हैं । प्रारम्भ में, चूँकि व्यापन (जल का प्रसरण) द्विविभाजन (लवण अणुओं का प्रसरण) की अपेक्षा शीघ्रतर होता है, अतः कोष्ठ ‘ख’ का द्रव कोष्ठ ‘क’ की अपेक्षा अधिक हो जाता है । द्रवों का यह अन्तर सूचित करता है कि लवण विलयन का व्यापन भार अधिक है अर्थात् जल को शोषित करने की शक्ति उसमें अधिक है । यदि एक अर्धप्रवेश्य कोप में सान्द्र लवण विलयन रक्खा जाय और उसे परिष्कृत जल के एक पात्र में रख दिया जाय, तो व्यापन की क्रिया से जल कोप प्रविष्ट हो जाता है और कोप फूल जाता है तथा उससे संवद्ध भारमापकयन्त्र भार (व्यापनभार) की वृद्धि सूचित करता है ।



चित्र ३७

- क—परिष्कृत जलयुक्त बाह्य पात्र
ख—लवण विलयनयुक्त अन्तः पात्र
ग—भारमापक (पारदीय)

इससे ठीक ठीक व्यापनभार का पता नहीं चलता । इसके लिए ऐसी कला आवश्यक है जिससे जल तो पार कर जाय, किन्तु लवण पार नहीं करे । ऐसी कलाओं को अर्धप्रवेश्य (Semipermeable) कहते हैं और इनमें कौपर फेरोसाइनाइड की बनी सर्वोत्तम होती है । फिर भी व्यवहारतः व्यापनभार का मापन अतीव कठिन कार्य है ।

विलयनों के व्यापनभार का तुलनात्मक अध्ययन रक्तकणों या घनस्पति-कोषाणुओं पर उनके प्रभाव को देखकर किया जाता है । इस दृष्टिकोण से विलयनों के तीन वर्ग किये गये हैं:—

१. उच्चभारिक (Hypertonic)

२. न्यूनभारिक (Hypotonic)

३. समभारिक (Isotonic)

यदि उच्चभारिक विलयनों के संपर्क में रक्तकण आवें तो उनका द्रवभाग आकर्षित होकर बाहर निकल जाता है और वे सूख जाते हैं। यदि विलयन न्यूनभारिक होता है तो रक्तकण जल को आकर्षित कर फूल जाते हैं और फट जाते हैं। समभारिक विलयन यथा सामान्य लवण विलयन से उपर्युक्त कोई प्रभाव नहीं होता।

निःस्यन्दन (Filtration)

द्रवपदार्थ कलाओं के द्वारा पान्थिक या जलीय दबाव के अन्तर से भी गति करते हैं। इसमें कला के द्वारा विलीन पदार्थ पार कर निकल जाता है और दोनों ओर विलयन की सान्द्रता समान ही होती है।

शारीरक्रियासंबन्धी उपयोगः—

उपर्युक्त विचार शरीरक्रिया-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। शरीर में विविध वस्तुओं के जलीय विलयन स्थित हैं जो एक दूसरे से कलाओं के द्वारा पृथक् हैं। यथा केशिकाओं का अन्तःस्तर जो रक्त को लसीका से पृथक् करता है, शुक्कनलिकाओं का आवरक स्तर जो रक्त और लसीका को मूत्र से पृथक् करता है। इसी प्रकार की आवरक कला स्नायुप्रस्थियों में है। ऐसी ही पाचन नलिका की भीतरी दीवाल है जो पाचित आहार को रक्तवहस्रोत एवं पयस्विनी नलिकाओं से पृथक् करती है। अतः लसीकानिर्माण, मूत्र आदि मलों एवं स्नायुओं का निर्माण, रक्त का शोषण इन महत्वपूर्ण विषयों के संबन्ध में उन नियमों पर अवश्य ध्यान रखता चाहिये जो जल तथा उसमें विलीन पदार्थों की गति को नियन्त्रित करते हैं। शरीर में व्यापन और निःस्यन्दन दोनों क्रियाएँ होती हैं। इनके अतिरिक्त, जिन सजीव कोषाणुओं से कलाएँ बनती हैं उनकी अपनी विशिष्ट स्नायु या चयनात्मिका क्रिया होती है। इसे 'जीवनक्रिया' भी कहते हैं। निःस्यन्दन, व्यापन प्रभृति के नियम सुविज्ञात हैं और उनकी प्रयोगों द्वारा परीक्षा भी हो चुकी है; किन्तु सजीव कलाओं में इनके अतिरिक्त एक अन्य शक्ति होती है। समभवतः यह सजीव वस्तुओं का कोई भौतिक या

रासायनिक गुण है जो धभी तक निर्जीव जगत् में कार्य करने वाले रासायनिक या भौतिक नियमों के समकक्ष नहीं लाया जा सका है इसका अस्तित्व भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी यह व्यापन एवं निःस्पन्दन की सुविदित शक्तियों को भी बाधित कर देता है ।

ज्यों-ज्यों लसीका-निर्माण और ग्रन्थिगत खाव का अध्ययन किया जाता है, त्यों त्यों यह प्रकट होता जाता है कि केवल व्यापन और निःस्पन्दन उन क्रियाओं को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते । यद्यपि क्रिया का आधार भौतिक ही है, तथापि सजीव कोषाणुओं का कार्य एक निर्जीव कला के समान नहीं होता बल्कि उनमें एक चयनात्मिका क्रिया होती है जिससे वे कुछ पदार्थों को चुन लेते हैं और उन्हें पार जाने देते हैं और शेष को नहीं जाने देते । कुछ अंशों में इसका कारण यह भी है कि कुछ विद्युदणुओं के लिए प्रवेश्यता अपेक्षाकृत अधिक होती है । इस विषय की विस्तृत गवेषणा हैम्बर्गर नाकर विद्वान् ने की है ।

वस्तुतः वस्तुओं के आयात-निर्यात के संबन्ध में चुनाव करने की यथार्थ समता कोषाणुओं में होती है या नहीं यह विवादास्पद विषय है । यह देखा गया है कि विभिन्न विद्युदणुओं के प्रभाव से कोषाणु की प्रवेश्यता में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं । विद्युदणुओं की विद्युच्छक्ति कोषाणुओं से वस्तुओं के आयातनिर्यात के संबन्ध में एक प्रमुख कारण हो सकती है । रोग की अवस्थाओं में विद्युदणुओं के प्राकृत संबन्धों में अन्तर हो जाने के कारण कोषाणु की प्रवेश्यता में भी परिवर्तन हो जाता है और कोषाणु की क्रिया विकृत हो जाती है । इस प्रकार कोषाणु की प्रवेश्यता को प्रभावित करने वाले कारणों में विद्युच्छक्ति प्रमुख है । इसके अतिरिक्त अणुओं का आकार, विलयनशक्ति, पृष्ठभार आदि कारणों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है । उदाहरणार्थ, सत्वशर्करा प्राकृत अवस्था में मनुष्य के रक्त में रहती है, किन्तु पूर्णतः वह रक्तस में ही स्थित होती है क्योंकि रक्तकण उसके लिये अप्रवेश्य होते हैं । मधुमेह रोग में रक्तकण प्रवेश्य हो जाते हैं ।

कोषाणुओं के संबन्ध में कलाओं के द्वारा विलीन द्रव्यों के प्रसरण के सिद्धान्त में कोषाणु के आवरण की रचना के अनुसन्धानों से पर्याप्त सहायता मिली है । पूर्वकाल में यह समझा जाता था कि कला के द्वारा विच्छिन्नद्रव्यों

का प्रसरण नहीं होता इसका कारण यह है कि उन द्रव्यों के अणु बड़े होते हैं और वे कला के छोटे छिद्रों से पार नहीं कर सकते। इस प्रकार कला चलनी के सदृश कार्य करती है। किन्तु इससे रक्त का पूर्ण उत्स्राटन नहीं होता। अब यह माना जाता है कि इसमें विलयन शक्ति का प्रमुख भाग होता है। कला उन्हीं द्रव्यों के लिए प्रवेश्य होती है जो कला की वस्तु में विलेय होते हैं। इस प्रकार की विलेयता में रासायनिक संयोग हो सकता है या अधिशोषण (Adsorption) की क्रिया हो सकती है। अधिशोषण की क्रिया विशेषतः वहाँ होती है जहाँ पोषक पदार्थों का कोषाणुओं के द्वारा ग्रहण मांसतत्त्व विलयन के माध्यम से होता है जो कला के स्नेहाणुओं के मध्यवर्ती अवकाश में होकर जाता है। मद्य-सार, ईंधन, बलोरोफार्म प्रभृति द्रव्यों की प्रवेद्यता मुख्यतः इस बात पर निर्भर होती है कि वे कला के स्नेहयुक्त पदार्थों में कहां तक विलेय हैं। इन संज्ञाहर द्रव्यों का कोषाणुओं पर मादक प्रभाव कैसे पड़ता है, इसके सन्ध में स्थापित मेयरओवर्टन सिद्धान्त (Meyer-overton theory) का आधार भी यही है।

शोषण की प्रक्रिया पूर्णतः नहीं तो अधिकांश भौतिक सिद्धान्तों पर निर्भर करती है। परिष्कृत जल और शीघ्र प्रसरणशील द्रव्य रक्त और लसीका में शीघ्र पहुँच जाते हैं, किन्तु यदि उच्चभारिक लवण विलयन अन्त्र में दिया जाय तो रक्त से जल निकल कर अन्त्र में आने लगता है। कुछ रेचन पदार्थों यथा सलफेट का प्रभाव इसी प्रकार होता है जिनका शोषण बलोराइड के समान शीघ्र नहीं होता। यह देखा गया है कि यदि अन्त्र की सजीव आवरण कला पृथक् कर दी जाय तो शोषण की क्रिया लगभग बन्द हो जाती है।

विशद द्रव्यों का व्यापनभार पर्याप्त होता है। किन्तु शीघ्रप्रसरणशील होने के कारण शरीर में जल के प्रवाह पर उनका प्रभाव सीमित होता है। उदाहरणार्थ, यदि लवण का तीव्र विलयन रक्त में दिया जाय तो शीघ्र धातुओं से रक्त की ओर व्यापनप्रवाह प्रारम्भ हो जायगा। उसके बाद जब लवण धातुओं में चला जायगा तो वह विपरीत दिशा में व्यापन सार उत्पन्न करेगा। किन्तु ये दोनों प्रभाव अस्थायी होंगे, क्योंकि लवण का आधिक्य शीघ्र ही अलोस्तेजक अंगों द्वारा दूर हो जायगा।

मांसतत्त्वों का व्यापनभार:—

रक्त के संबन्ध में मांसतत्त्वों का व्यापनभार महत्वपूर्ण है जो ३० मिली-मीटर होता है । यही कारण है कि उदरावरणगुहा से प्रसरणशील विशदद्रव्य का समभारिक या उच्चभारिक विलयन पूर्णतः रक्त में शोषित हो जाता है । इस व्यापनभार में कुछ छवण पदार्थों का भी भाग होता है जो मांसतत्त्वों के साथ मिले होते हैं ।

धातुओं की प्राकृत क्रिया के परिणामस्वरूप मांसतत्त्व यूरिया, सलफेट और फास्फेट प्रभृति सरल घटकों में विश्लेषित होते रहते हैं । ये पदार्थ लसीका में जाकर उसकी आणविक सान्द्रता और व्यापनभार बढ़ा देते हैं, इसलिए जल रक्त से लसीका की ओर आकर्षित होता है और लसीका का आयतन एवं प्रवाह बढ़ जाते हैं । दूसरी ओर, जब इन द्रव्यों का लसीका में अधिक संचय हो जाता है और रक्त की अपेक्षा उसकी सान्द्रता बढ़ जाती है, तब वह रक्त की ओर जाने लगते हैं जिसके द्वारा वे मलौत्सर्जक अंगों में चले जाते हैं ।

किन्तु मांसतत्त्वों के संबन्ध में एक और कठिनाई है । ये धातुओं के पोषण के लिए अत्यावश्यक हैं, किन्तु उनमें प्रसरण का गुण एकदम नहीं होता । अतः यह मानना पड़ेगा कि लसीका में उनकी उपस्थिति रक्त से निरस्यन्दन के कारण होती है । यह मांसतत्त्वों के व्यापनभार का ही प्रभाव है कि रक्तगत द्रवार्श रक्तमहस्रोतों को छोड़ कर बाहर नहीं चला आता ।

केशिकाओं में इस दबाव का सन्तुलन होता है । एक ओर, रक्त का भार तथा धातुगत द्रवपदार्थों का भार होता है जो रक्तमहस्रोतों से द्रवपदार्थों का वहन करते हैं तथा दूसरी ओर, इसके विरोध में रक्त का व्यापनभार होता है जो छवणों और मांसतत्त्वों के कारण होता है । सन्तुलन बहुत मातृरु होता है क्योंकि केशिकाभार में वृद्धि होने से अधिक द्रवपदार्थ धातुओं में शोषित जाता है और शोथ उत्पन्न हो जाता है । इसके विपरीत, रक्तछान आदि अवस्थाओं में जब केशिकाभार कम हो जाता है तब धातुओं से द्रवपदार्थ रक्त में चला आता है । वृक्कोगों में जब भूय में अधिक मांसतत्त्व जाने लगता है, विशेषतः सीरम, अल्युमिन जिसके अणु छोटे तथा व्यापनभार अधिक होता है, तब भी शोथ हो जाता है जिसका कारण कुछ अंशों में पिच्छिलद्रव्य की कमी है ।

सामूहिक क्रिया का नियम :—(The law of mass action)

यह नियम पाचन-प्रक्रियाओं के समन्वय में विशेष महत्वपूर्ण है जिनसे आहारद्रव्यों का विरलेपन होता है और नये-नये धातुओं का निर्माण होता है ।

इस नियम का विधान यह है कि किसी प्रतिक्रिया का क्रम एक निश्चित आयतन में क्रियाशील द्रव्यसमूह के अनुपात में होता है अर्थात् प्रतिक्रिया का क्रम क्रियाशील द्रव्य समूह की सान्द्रता पर निर्भर करता है ।

पृष्ठभार :—(Surface tension)

द्रव पदार्थ के पृष्ठभाग में कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो उसके अवशिष्ट भाग में नहीं होते, क्योंकि उसके भीतरी भाग में वस्तु की व्यवस्था चारों ओर एक निश्चितक्रम से होती है किन्तु पृष्ठभाग में द्रवपदार्थ एक ही ओर होता है । गैस में, उसके अणु एक दूसरे के आकर्षक प्रभाव से रहित होते हैं और तीव्र वेग से इधर-उधर दौड़ते रहते हैं जिससे उसके आधारभूत पात्र की दीवाल पर दबाव पड़ता है । द्रव पदार्थ में, अणुओं का पारस्परिक आकर्षण अधिक होता है, इस लिए वह एक निश्चित आयतन में बना रहता है । उसके अणुओं को पृथक् करने तथा द्रव को गैस में परिणत करने के लिए अधिक दक्षि की आवश्यकता होती है जो वाष्पीभवन के अव्यक्त ताप से रूप में मिलती है । इस प्रकार द्रवपदार्थ में धात्विक आकर्षण अधिक होता है जिसके कारण पृष्ठ भाग का अणु भीतर की ओर खिंचा रहता है । इस खिंचाव के फलस्वरूप पृष्ठ भाग एक विस्तृत स्थितिस्थापक त्वचा का कार्य करता है । पृष्ठभाग के इस दबाव को पृष्ठभार कहते हैं । पृष्ठभार का प्रभाव जल बिन्दु में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । इसके पृष्ठभाग में कोई दबाव नहीं होने के कारण वह अधिक सङ्कुचित हो कर गोलाकार हो जाती और बिन्दु का आकार ग्रहण करती है ।

प्राणिकोपाणु भी द्रव हैं और विग्राम काल में वे गोलाकार होते हैं । इसकी आवरण कला भी पृष्ठभारयुक्त होती है । यह कला शारीरिक्रियाओं में महत्वपूर्ण योग देती है । उदाहरणार्थ, अमीबा में मिथ्यावाद का निःसरण कोपाणु-प्रान्त व विभिन्न भागों में पृष्ठभार के अन्तर के कारण ही होता है । ओजः सार एक सामान्य द्रव नहीं है, बल्कि उसमें विविध रासायनिक संघटनवाले द्रव्य होते हैं । अतः ऐसे द्रव्य जो पृष्ठभार को कम करते हैं सदैव पृष्ठ भाग पर ही

सञ्चित होते हैं । स्नेह और उपस्नेह पृष्ठभाग को कर्म करने वालों में मुख्य हैं, इसी लिए वे कोषाणु में अन्य भागों की अपेक्षा आवरक कला में अधिक परिमाण में होते हैं ।

अधिशोषण (Adsorption) :—

द्रवपदार्थ में विलीन कोई द्रव्य यदि किसी पृष्ठ के संपर्क में आवे, तो वह उस पृष्ठ पर केन्द्रित हो जाता है । इसी को अधिशोषण कहते हैं । किण्वतत्वों द्वारा पाचन में यह प्रक्रिया अधिक सहायक होती है । किण्वतत्व विच्छिन्न होते हैं और उनके पृष्ठभाग विस्तृत होते हैं अतः तनु अम्ल और चार उनके संपर्क में केन्द्रित हो जाते हैं और उनकी क्रिया तीव्र हो जाती है ।

नवम अध्याय

आहार—

आहार उस द्रव्य को कहते हैं जो पाचन-मलिका के द्वारा शरीर में शोषित होकर निम्नलिखित कार्यों के साधन में समर्थ हो :—

(क.) शरीर की उति की पूर्ति करना एवं उसके विकास में सहायता प्रदान करना ।

(ख) ताप या शक्ति का उत्पादन ।

(ग) उपर्युक्त दोनों क्रियाओं का नियन्त्रण ।

प्रथम कार्य मुख्यतः मांसतरय, खनिज लवण तथा जल के द्वारा सिद्ध होता है । द्वितीय कार्य चर्मा और शाकतरय के द्वारा पूर्ण होता है, यद्यपि कुछ शक्ति मांसतरय के द्वारा भी प्राप्त होती है । तृतीय कार्य जीवनीय द्रव्य और खनिज लवण सम्पादित करते हैं ।

शरीर की पेशियाँ सर्वदा बेठावान् रहती हैं जिनसे सर्वदा शक्ति का व्यय होता रहता है । अतः इस उति की पूर्ति के लिए निरन्तर नूतन आहार द्रव्यों की आवश्यकता होती है । शरीर के विकास काल में भी विकास के लिए आवश्यक उपादान एवं शक्ति आहार के द्वारा ही प्राप्त होती है, अतः उपर्युक्त आहार वही है, जो :—

(१) शक्ति का आवश्यक परिमाण उत्पन्न करे—

(२) क्षतिपूर्ति एवं विकास के लिए आवश्यक उत्पादनों की पूर्ति करे ।

(३) शरीर की आवश्यक रासायनिक क्रियाओं का नियन्त्रण करे ।

यह देखा गया है कि कुछ अंशों में खनिज लवण सामान्य पेशी के संकोचन के लिए आवश्यक है । साथ ही यह अस्थि और दन्त के निर्माण के लिए भी आवश्यक है । इसके बाद यह जीवनीय द्रव्य के साथ मिलकर शरीर की क्रियाओं एवं विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं ।

इस प्रकार आहार के विविध पोषक तत्वों की क्रियायें संघर्ष में निर्माकित रूप में निर्दिष्ट की जा सकती हैं—

(क) धातुनिर्माक—मांसतत्व, खनिजलवण और जल ।

धातु-निर्माक आहार दो प्रकार का होता है :—

(१) शरीर के ठोस अवयवों यथा अस्थि, पेशी आदि के लिए सामग्री प्रस्तुत करनेवाले—

(२) विकास एवं अन्य शारीर क्रियाओं का नियन्त्रण करने वाले—

प्रथम प्रकार में मांसतत्व, घसा और शाकतत्व आते हैं और द्वितीय प्रकार में जीवनीय द्रव्य और खनिज लवण आते हैं जिनकी कमी होने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार मांसतत्व, खनिजलवण, जल और जीवनीय द्रव्य धातु-निर्माक आहार द्रव्य हैं ।

(ख) ताप और शक्ति के उत्पादक—मांसतत्व, घसा और शाकतत्व ।

इस प्रकार के आहार-द्रव्यों में कार्यन होता है जिनका श्वास द्वारा गृहीत ऑक्सिजन से ओपजनीकरण होता है और इसी क्रम में ताप और शक्ति का प्रादुर्भाव होता है । शाकतत्व की अपेक्षा घसा में दूनी शक्ति होती है ।

(ग) शरीर-क्रियाओं के नियामक—खनिजलवण और जीवनीय द्रव्य ।

अधिकांश आहार-द्रव्यों में यह सभी उत्पादान होते हैं, किन्तु प्रायः किसी एक की अधिकता होती है यथा—

घी, मक्खन आदि में घसा, मांस में मांसतत्व, शाकाहार में शाकतत्व ।

आहारतत्वों का तापमूल्य (Heat-value)

एक किलोग्राम जलका तापक्रम एक डिग्री सेन्टीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना ताप आवश्यक होता है उसे एक 'कैलोरी' कहते हैं । इस प्रकार—

१ ग्राम मांसतत्त्व—शरीर में—४.१ कैलोरी ताप उत्पन्न करता है ।

१ " वसा " ९.४ " " " "

१ " शाकतत्त्व " ४ " " " "

‘शारीर तापमूल्य’ (Physiological heat-value) और भौतिक ताप मूल्य (Physical heat-value) में अन्तर है । शारीर तापमूल्य ताप की वह मात्रा है जो शरीर में आहारद्रव्यों के ज्वटन से उत्पन्न होती है तथा भौतिक तापमूल्य ताप की वह मात्रा है जो शरीर के बाहर भौतिक यन्त्रों में आहार को जलाने से प्राप्त होती है । यथा मांसतत्त्व का भौतिकतापमूल्य ५.६ है, किन्तु इसका शारीरतापमूल्य ४.१ ही है । इसका कारण यह है कि १ ग्राम मांसतत्त्व से $\frac{1}{3}$ ग्राम यूरिया उत्पन्न होता है जिसमें ०.८५ ताप नष्ट हो जाता है ।

पूर्ण विश्राम काल में लगभग १८०० कैलोरी ताप शरीर की भौतिक क्रियाओं के समुचित रूप से निर्वाह के लिए आवश्यक है । अधिक परिश्रम के समय यह ६००० तक हो जाता है । आयु के अनुसार भी इसमें विभिन्नता होती है । एक औसत व्यक्ति के लिए निम्नांकित आहार उचित हो सकता है :—

मांसतत्त्व	४.५	औंस
वसा	३.५	"
शाकतत्त्व	१४	"
लवण	१	"

तापमूल्य ३००० कैलोरी

अधिक परिश्रम के समय इसकी मात्रा कुछ बढ़ा दी जानी चाहिए । इनके अतिरिक्त तापमूल्य कम रहने पर भी उनमें लवणों एवं जीवनीय द्रव्यों की उपस्थिति के कारण फल और हरे शाक भी भोजन में आवश्यक हैं ।

किं .

मांसतत्त्व के प्रभाव

मांसतत्त्व के तीन कार्य होते हैं :—

(१) नये तन्तुओं के निर्माण द्वारा शारीरधातुओं की क्षति की पूर्ति करना ।

(२) शरीर में नये द्रव्य यथा अधिष्ठक—प्रनियन्त्रक उत्पन्न करना ।

(३) शरीर को ताप और शक्ति प्रदान करना ।

मांसतत्त्व के अधिक उपयोग से शरीर में नाइट्रोजन का आधिक्य हो जाता है, अतः उपर्युक्त कार्यों के प्रथम दो कार्य, उनमें भी मुख्यतः प्रथम कार्य के लिए उनका उपयोग किया जाता है और शेष कार्य के लिए वसा और शाकतत्त्व का

प्रयोग किया जाता है। मांसतत्त्व के द्वारा जितना नाइट्रोजन शरीर के भीतर लिया जाता है यदि उससे अधिक नाइट्रोजन का उत्सर्ग हो तो वह धातुचय का सूचक है। इसके विपरीत, यदि ली गई मात्रा से नाइट्रोजन का उत्सर्ग कम हो, तो वह शरीर में मांस के निर्माण का सूचक है। भोजन में मांसतत्त्व की कमी होने से पेशी का विकास कम होता है तथा रोगप्रवृत्ति भी कम हो जाती है। मांसतत्त्व में एक विशिष्ट गुण यह होता है कि इससे शरीर की समीकरणात्मक क्रियायें उत्तेजित हो जाती हैं अतः ताप का उत्पादन अधिक होता है। इसी लिए शीत काल तथा शीत देशों में मांसतत्त्व के अधिक परिमाण की आवश्यकता होती है और वस्तुतः उन दिनों उसका व्यवहार भी अधिक होता है। इस गुण को मांसतत्त्व का विशिष्ट प्रेरक धर्म (Specific dynamic action) कहते हैं।

जान्तव और औद्भिद मांसतत्त्वों की तुलना

(१) जान्तव मांसतत्त्व अधिक सुपाच्य अतः बुद्धिजीवियों के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह देखा गया है कि जान्तव मांसतत्त्व का ९७ प्रतिशत तथा औद्भिद मांसतत्त्व का ८५ प्रतिशत शरीर में शोषित होता है।

(२) औद्भिद मांसतत्त्व में शक्ति कम होती है।

(३) उतनेही मांसतत्त्व के लिये अधिक शाकाहार की आवश्यकता होती है।

(४) पोषकता की दृष्टि से भी औद्भिद मांसतत्त्व जान्तव मांसतत्त्व की अपेक्षा हीन होती है।

वसा और शक्तत्व के प्रभाव

दोनों ही पदार्थ शरीर को ताप एवं शक्ति प्रदान करते हैं, फिर भी दोनों ही शरीर के सामान्य समीकरण के लिए आहार में आवश्यक है। वसा नाइट्रोजन की उत्पत्ति बढ़ाता है और शक्तत्व उसको कम करता है और इस प्रकार उसकी मात्रा को स्थिर रखता है। वसा का सेवन प्रतिदिन ६० ग्राम से कम नहीं होना चाहिये। बच्चों को तो इससे भी अधिक मात्रा आवश्यक है।

कटुजनक तथा प्रतिकटुजनक पदार्थ (Ketogenic and antiketogenic)

शरीर में वसा का पूर्ण ज्वलन तभी होता है जब कि उसी समय कुछ शर्करा का भी ज्वलन हो रहा हो, अन्यथा उसका ज्वलन अपूर्ण ही होता है और उससे एसिटोन पदार्थ बनते हैं। इसलिए शक्तत्व प्रतिकटुजनक कहलाते हैं क्योंकि

वह एसिटो-एसिटिक अम्ल आदि कटुद्रव्यों की उत्पत्ति को रोकते हैं। केवल वसा ही नहीं, मांसतत्त्व भी कटुजनक होते हैं। साधारणतः कटुजनक तथा प्रतिकटुजनक द्रव्यों का अनुपात २. १ होना चाहिये, अन्यथा वसा और मांस तत्त्व का पूर्ण ज्वलन नहीं होने पाता और कटुभाव (Ketosis) का प्रादुर्भाव होता है। कटुभाव इसलिए निम्नांकित अवस्थाओं में पाया जाता है:—

- (१) उपवास—जब कि शक्ततत्त्व की कमी हो जाती है—
- (२) इक्षुमेह—जिसमें शर्करा के स्वाभाविक ज्वलन में बाधा हो जाती है—
- (३) भोजन में जब वसा का आधिक्य होता है।

जीवनीय द्रव्य (Vitamins)

मांसतत्त्व, वसा, शक्ततत्त्व, खनिजलवण और जल के अतिरिक्त आहार में कुछ और सूक्ष्म पोषक द्रव्य होते हैं जिनका रासायनिक संकठन निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। वह प्राकृत भोजन के अनिवार्य अङ्ग हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं की प्राकृतिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। साथ ही वह शरीर की समीकरणात्मक क्रियाओं के सञ्चालन के लिए भी आवश्यक हैं। उन्हें 'विटामिन' या 'जीवनीय द्रव्य' कहते हैं। यह नामकरण सर्वप्रथम १९११ में फ्रड मे किया था। यह द्रव्यों की तथा युवा व्यक्तियों में प्राकृत स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है, अतः उन्हें 'सहायक आहारतत्त्व' भी कहते हैं। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी क्रिया बहुत अल्प मात्राओं में होती है। जब वह आहार में अनुपस्थित होते हैं तब कुछ पोषणसम्बन्धी विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्षयज रोग कहते हैं। प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि यदि मागी को विटामिन न देकर केवल मांसतत्त्व, वसा, शक्ततत्त्व और खनिजलवणों पर रक्खा जाय तो अल्पकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जीवनीयद्रव्य इस अर्थ में आहार नहीं है कि वे शरीर घातुओं का निर्माण करते हैं या क्षतिपूर्ति करते हैं या ताप और शक्ति उत्पन्न करते हैं, बल्कि इस अर्थ में कि वह सभी कोषाणवीय क्रियाओं में निश्चित रूपा से संश्लेषणात्मक या रचनात्मक प्रभाव डालते हैं। वह शरीर की रक्षा और वृद्धि के लिए पूर्णतः आवश्यक है। वस्तुतः जीवनीय द्रव्य से रहित केवल मांसतत्त्व, वसा एवं शक्ततत्त्व से युक्त आहार 'निर्जीव' आहार ही कहा जा सकता है।

जीवनीय द्रव्य अनेक प्रकार के होते हैं:—

१. जीवनीय द्रव्य (ए) २. जीवनीय द्रव्य (बी) ३. जीवनीय द्रव्य (सी)
४. जीवनीय द्रव्य (डी) ५. जीवनीय द्रव्य (ई) ६. जीवनीय द्रव्य (के)
७. जीवनीय द्रव्य (पी)

जीवनीयद्रव्य (ए)

यह दूध, मक्खन, लण्ठों, सभी जान्त्रव वसा, घृहों की हरी पत्तियाँ यथा कोबी इत्यादि, धान्याङ्कुर, यकृत, हृदय और वृक्क में पाया जाता है। यह जीवनीय द्रव्य हरी पत्तियों में होता है, अतः हरी पत्तियाँ खाने वाले जन्तुओं के दूध में यह अधिक पाया जाता है। फलों में टोमाटो में यह अधिक पाया जाता है।

जीवनीय द्रव्य 'ए' के कार्य

इसके तीन मुख्य कार्य हैं:—

१. वृद्धि में सहायता प्रदान करता है।
२. सन्तानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है।
३. रक्ता तथा आसार्थों की आन्तरिक चलेपमल कला के रक्षाध्य की रक्षा करता है।

इस प्रकार यह शरीर की आवश्यक रचनाओं के प्राकृत रक्षाध्य एवं पूर्णता की रक्षा करता है जिससे यह जीवाणुओं के आक्रमण को प्रतिकार करने में समर्थ होते हैं। इसी लिए इसे 'प्रतिसंक्रामक जीवनीय द्रव्य' कहते हैं।

आहार में इसकी अनुपस्थिति के निम्न लिखित परिणाम होते हैं:—

१. पोषण में कमी २. अस्थिरता ३. विकास में कमी
४. नेत्र रोग—शुष्कनेत्रता, रात्र्यन्धता आदि
५. जीवाणुओं के संक्रमण का भय
६. वृक्क और मूत्राशय की जरमरी
७. क्षय तथा अन्य फुफ्फुस के रोग

जीवनीय द्रव्य 'बी'

यह गेहूँ, चावल, दाल, मटर, शाक तथा फलों में पाया जाता है। कुछ मात्रा में मांस एवं दूध में भी मिलता है। इसकी कमी से 'बेरी बेरी' नामक रोग हो जाता है। इसका प्रधान कार्य शाकताव के समीकरण में सहयोग प्रदान करना है।

जीवनीय द्रव्य 'सी'

यह फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा धारोष्ण दूध में भी स्वल्प परिमाण में होता है । फोषणुओं के ओपजनीकरण की क्रिया के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है । इसकी कमी से तन्तुओं में विषटनात्मक परिवर्तन प्रारम्भ हो जाते हैं और स्वर्ची रोग उत्पन्न हो जाता है । रक्तकणों के निर्माण में भी यह सहायक होता है । अतः इसकी कमी से पाण्डुरोग हो जाता है । अस्थियों की वृद्धि में भी यह सहायक होता है ।

जीवनीय द्रव्य 'डी'

जित द्रव्यों में जीवनीय द्रव्य 'ए' पाया जाता है, उनमें यह मिलता है, किन्तु उनमें निम्नलिखित विशेषता के कारण भेद स्पष्ट गोचर नहीं होता है:—

जीवनीय द्रव्य 'ए'

१. वनस्पतिक तैलों में नहीं मिलता
२. ताप और ओपजनीकरण से नष्ट हो जाता है ।
३. सूर्य प्रकाश के द्वारा नष्ट होता है ।

जीवनीय द्रव्य 'डी'

१. मिलता है ।
२. नष्ट नहीं होता ।
३. सूर्य प्रकाश के नीललोहितोत्तर किरणों से उत्पन्न होता है ।

जीवनीय द्रव्य 'ए' और 'डी' द्रव्यों में विभिन्न अनुपातों में उपस्थित रहते हैं । घसा कौडलिवर तैल में 'ए' की अपेक्षा 'डी' अधिक होता है, किन्तु मक्खन में 'डी' की अपेक्षा 'ए' अधिक होता है ।

जीवनीय द्रव्य 'डी' खटिक और स्फुरक के समीकरण से निकट सम्बन्ध रखता है अतः अस्थिक्षय के प्रतिपेघ या चिकित्सा में यह विशेष महत्व पूर्ण है । वनस्पतियों से प्राप्त जीवनीय द्रव्य 'डी' सूर्यप्रकाश से उत्पन्न 'डी^१' तथा कौडलिवर तैल इत्यादि में रहने वाला 'डी^२' कहलाता है । यह अस्थिक्षय-प्रतिपेघक तात्व कहा जाता है, क्योंकि आहार में इसकी अनुपस्थिति से खटिक एवं स्फुरक का प्राकृत समीकरण विकृत हो जाता है और 'अस्थिक्षय' नामक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसका प्रधान लक्षण है अस्थि और रक्त में खटिक एवं स्फुरक की अल्पता ।

इस जीवनीय द्रव्य का प्रधान कर्म है पाचन-नलिका के द्वारा खटिक और स्फुरक के शोषण में योग प्रदान करना और रक्त तथा धातुओं में खटिक एवं

स्फुरक के प्राकृत परिमाण की रक्षा करता। अतः अस्थि-कङ्काल के समुचित निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसलिये उसे खटिकीकरण-जीवनीय द्रव्य कहते हैं। जब इस जीवनीय द्रव्य की कमी हो जाती है तब खटिक और स्फुरक पुरीष के साथ अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगते हैं। समुचित शोषण न होने के कारण रक्त में उपर्युक्त पदार्थों की कमी हो जाती है और अस्थि तथा दंतों को वह पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते और प्राकृत अस्थि-निर्माण में बाधा होने लगती है। यह अस्थि एवं दंतों के निर्माण में ही सहायक नहीं होता, हृदय के नियमन, पेशियों के संकोचन, एवं रक्त के स्कन्दन के लिए भी आवश्यक है।

सूर्य प्रकाश का स्वभा के नीचे बसा पर प्रभाव होने से 'जीवनीयद्रव्य की' उत्पन्न होता है। इसलिये खुली हवा में सुले पदन खेलने वाले बच्चों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है।

जीवनीयद्रव्य 'ई'

यह गर्भ की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह घान्याद्वारों, वानस्पतिक तैलों तथा हरे शाकों में पाया जाता है। यह गेहूँ के अङ्गुर के तैल में सर्वाधिक परिमाण में पाया जाता है। यह थोड़ी मात्रा में दूध, बसा, जानवर जन्तुओं, विशेषतः बसा और पेशियों में पाया जाता है। कौडलिवरतैल में यह नहीं मिलता।

यह सन्तानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है अतः यह सन्तानोत्पादक जीवनीय द्रव्य कहलाता है। इसके अभाव से सन्तानोत्पत्ति की क्रियाओं में विकृति हो जाती है। इसके अभाव में पुरुषों के शुक्रवह स्त्रियों का चयन एवं शुक्रकीटों का दीर्घलथ और शक्तिहीनता हो जाती है। स्त्रियों में यद्यपि गर्भाधान हो जाता है, तथापि अपरासम्बन्धी क्रियाओं में बाधा होने से गर्भ शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि इसकी कमी से अपरा में बिनाशायक परिवर्तन होने लगते हैं। इन कारणों से इस तत्त्व को 'अपरीय जीवनीयद्रव्य' भी कहते हैं।

जीवनीयद्रव्य 'के'

यह हरे शाकों, घासों तथा वानस्पतिक तैलों में पाया जाता है। यह रक्त के प्राकृत स्कन्दन के लिए आवश्यक है और इस प्रकार कुछ रक्तछावसम्बन्धी रोगों का प्रतिषेध करता है। इसमें दो तत्त्व होते हैं के^१ और के^२। प्रथम तत्त्व हरे शाकों और वनस्पतियों में पाया जाता है तथा द्वितीय तत्त्व अन्न में जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। पित्त लवण इस जीवनीयद्रव्य के शोषण में सहायक होते

हैं । कामला आदि रोगों में जब आँत्र में पित्त की कमी हो जाती है, तब इस सत्व का पूर्ण शोषण नहीं हो पाता और उससे रक्तधात्र की प्रवृत्ति होने लगती है।

जीवनीयद्रव्य 'पी'

यह हृदयी देश के लाल मिर्चों से निकाला जाता है । इसकी क्रिया जीवनीयद्रव्य 'सी' के समान ही होती है । इसकी अनुपस्थिति से त्वचा की केशिकायें विदीर्ण हो जाती हैं और रक्त त्वचा में सञ्चित एवं सुत होने लगता है ।

आहार के रक्तक द्रव्य

कुछ आहार में कैरोटिन नामक पीत वर्ण का रक्तक द्रव्य होता है और प्रायः जीवनीयद्रव्य 'ए' के साथ पाया जाता है । उसकी क्रिया भी 'ए' के समान ही होती है । मस्तिष्क की शक्ति इसी द्रव्य के आधार पर होती है ।

निरिन्द्रिय लवण

निरिन्द्रिय लवण शरीर के धातुनिर्माण की क्रिया में महत्वपूर्ण योग देते हैं, अतः आहार में इनका भी प्रमुख स्थान है । शरीर में उनका ओपजनीकरण नहीं होता, अतः ताप की उत्पत्ति उनसे नहीं होती जिस प्रकार कि अन्य आहार-द्रव्यों से होती है, किन्तु शरीर में ताप का नियमन करने के कारण इस दृष्टि से इनका अधिक महत्व है ।

मानवशरीर में लगभग ५ प्रतिशत खनिज लवण होते हैं, अतः उनकी निर्मांकित मात्रा प्रतिदिन आहार में अवश्य मिलनी चाहिये:—

खटिक—१ ग्राम, स्फुरकाम्ल—३ ग्राम, मैगनेशियम—०.५ ग्राम, क्लोरिन—८ ग्राम, लौह—०.०१५ ग्राम, पोटाशियम—३ ग्राम, सोडियम—५ ग्राम ।

ये लवण प्रायः आहार में सेन्द्रिय संयोग के रूप में मिलते हैं यथा गन्धक मांसतत्व में, खटिक दुग्ध में तथा लौह मांस में ।

कार्य:—

खनिज लवणों के दो मुख्य कार्य होते हैं:—

(१) कुछ खनिज लवण धातुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं । शरीर में लगभग ९९ प्रतिशत खटिक और ७० प्रतिशत स्फुरक दाँतों और

स्फुरक के प्राकृत परिमाण की रक्षा करना। अतः अस्थि-कण्डाल के समुचित निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसलिये उसे खटिकीकरण-जीवनीय द्रव्य कहते हैं। जब इस जीवनीय द्रव्य की कमी हो जाती है तब खटिक और स्फुरक पुरीष के साथ अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगते हैं। समुचित शोषण न होने के कारण रक्त में उपर्युक्त पदार्थों की कमी हो जाती है और अस्थि तथा दंतों को वह पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते और प्राकृत अस्थि-निर्माण में बाधा होने लगती है। यह अस्थि एवं दंतों के निर्माण में ही सहायक नहीं होता, हृदय के नियमन, पेशियों के संकोचन, एवं रक्त के संचरण के लिए भी आवश्यक है।

सूर्य प्रकाश का स्वभा के नीचे चला पर प्रभाव होने से 'जीवनीयद्रव्य' ही उत्पन्न होता है। इसलिए खुली हवा में खुले घटन रोलने वाले पक्षों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है।

जीवनीयद्रव्य 'ई'

यह गर्भ की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह धान्यादुरों, घानस्पतिक तैलों तथा दूधे ज्ञातों में पाया जाता है। यह गेहूँ के अक्षुर के तैल में सर्वाधिक परिमाण में पाया जाता है। यह थोड़ी मात्रा में दूध, चना, जानवर जन्तुओं, विशेषतः चना और पेशियों में पाया जाता है। कौडिलिवरतैल में यह नहीं मिलता।

यह सन्तानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है अतः यह सन्तानोत्पादक जीवनीय द्रव्य कहलाता है। इसके अभाव से सन्तानोत्पत्ति की क्रियाओं में विकृति हो जाती है। इसके अभाव में पुरुषों के शुक्रवह स्त्रियों का चयन एवं शुक्रक्रीटों का दौर्बल्य और शक्तिहीनता हो जाती है। स्त्रियों में यद्यपि गर्भाधान हो जाता है, तथापि अपरासम्बन्धी क्रियाओं में बाधा होने से गर्भ शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि इसकी कमी से अपरा में विनाशात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। इन कारणों से इस तरंग को 'अपरीय जीवनीयद्रव्य' भी कहते हैं।

जीवनीयद्रव्य 'के'

खनिज का नाम	शारीर क्रिया	तदभावजन्य रोग
४. आयोडिन	१. थाइरोक्सिन का निर्माण २. अबदुप्रन्थि का आकार तथा क्रिया नियमित रखना ३. गलगण्ड से रक्षा	अबदुप्रन्थि की वृद्धि (गलगण्ड)
५. लौह	रक्तरञ्जक का निर्माण, रक्तकोषाणु का विकास, प्राकृत वर्ण	रक्ताल्पता, रक्तरञ्जक की कमी, रक्तकोषाणुओं का क्षय, शारीरिक वृद्धि का निरोध
६. मैगनेशियम	शोधक प्रभाव, किण्वतत्त्वों की क्रिया में प्रेरक	मस्तिष्क दौर्बल्य, पाचनविकार, शारीरिक वृद्धि का निरोध, हृदय-गति की तीव्रता
७. मैगनीज	प्राकृतिक वृद्धि के लिए आवश्यक, ताम्र के समान प्रभाव	शारीर विकास का निरोध
८. स्फुरक	अस्थि तथा दन्त का निर्माण किण्वतत्त्वों की क्रिया में प्रेरणा, शक्ति तत्त्वों तथा स्नेहों का सात्मीकरण	अस्थि तथा दन्त का क्षीण विकास, शारीरिक वृद्धि का निरोध
९. पोटेशियम	प्राकृत विकास, पेशीक्रिया में सहायता	दुर्बल पेशीनियन्त्रण, शरीरभार में कमी, पाचनशक्तिहास
१०. सोडियम	कोषाणुओं तथा द्रवों में व्यापन-भार का नियमन, रक्तप्रवाह में क्षाररक्षण	नाडीविकार, लवणशय दुर्बल जलधारणाशक्ति
११. गन्धक	शारीर विकास के लिए आवश्यक, विचर्चिका तथा अन्य धर्म रोगों का प्रतिपेय, धातुओं के लौह परिमाण का मन	शारीर वृद्धि का निरोध, त्वचाविकार

अस्थियों में पाया जाता है। इन अंगों की कठिनता इन्हीं लवणों पर आश्रित होती है।

बच्चों में विकास के लिए खटिक की अधिक आवश्यकता होती है जो उन्हें दूध के द्वारा मिलता है। स्त्रियों को गर्भावस्था के अन्तिम दो मासों में तथा स्तन्यकाल में खटिक तथा स्फुरक की विशेष आवश्यकता होती है। खटिक की कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है और अस्थिशोष की अवस्था उत्पन्न होती है। खटिक के समुचित सात्मीकरण के लिए जीवनीय द्रव्य डी की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा इसके अभाव में खटिक की अत्यधिक मात्रा देने पर भी कोई लाभ नहीं होता।

(२) खनिजलवण शरीर के विभिन्न स्त्रावों और रसों में घुले रहते हैं और उनकी आग्लिकता एवं चारीयता को स्थिर रखते हैं। वे हृदय, नाड़ियों तथा पेशियों की प्राकृत क्रिया के लिये भी आवश्यक अणु पहुँचाते हैं।

निम्नतलिक्का में खनिज लवणों की क्रिया का विवरण दिया गया है:—

खनिज का नाम	शारीर क्रिया	तदभावजन्य रोग
१. खटिक	१. अस्थि तथा दन्त का निर्माण (जीवनीयद्रव्य डी को उपस्थिति में)	अस्थि और दन्त का दुर्बल विकास, अस्थि-भंगुरता, अस्थिशोष दन्तकोटर, अत्यधिक रक्तस्ताव
२. क्लोरीन	१. पाचन में सहायक २. आमाशयिक रस के स्राव में सहायक ३. रक्त तथा धातुओं के व्यापन-भार का नियमन ४. विष्वतत्त्वों को क्रियाशील बनाना	जलधारणाशक्ति का क्षय, शरीरभार में कमी, पाचनविकार
३. सोड	रक्तरक्षक द्रव्यों के निर्माण में लौह के सात्मीकरण के लिए आवश्यक	रक्ताल्पता, लौह का कम उपयोग

खनिज का नाम	शारीर क्रिया	तदभावजन्य रोग
४. आयोडिन	१. थाइरोक्सिन का निर्माण २. अवटुप्रस्थि का आकार तथा क्रिया नियमित रखना ३. गलगण्ड से रक्षा	अवटुप्रस्थि की वृद्धि (गलगण्ड)
५. लौह	रक्तरञ्जक का निर्माण, रक्तकोषाणु का विकास, प्राकृत वर्ण	रक्ताल्पता, रक्तरञ्जक की कमी, रक्तकोषाणुओं का क्षय, शारीरिक वृद्धि का निरोध
६. मैग्नेशियम	शोधक प्रभाव, किण्वतत्त्वों की क्रिया में प्रेरक	भस्तिष्क दौर्बल्य, पाचनविकार, शारीरिक वृद्धि का निरोध, हृदय-गति की तीव्रता
७. मैंगनीज	प्राकृतिक वृद्धि के लिए आवश्यक, ताम्र के समान प्रभाव	शारीर विकास का निरोध
८. स्ट्रुरक	अस्थि तथा दन्त का निर्माण किण्वतत्त्वों की क्रिया में प्रेरणा, शाक्ततत्त्वों तथा स्नेहों का सात्मीकरण	अस्थि तथा दन्त का क्षीण विकास, शारीरिक वृद्धि का निरोध
९. पोटेशियम	प्राकृत विकास, पेशीक्रिया में सहायता	दुर्बल पेशीनियन्त्रण, शरीरभार में कमी, पाचनशक्तिहास
१०. सोडियम	कोषाणुओं तथा द्रवों में व्यापन-भार का नियमन, रक्तप्रवाह में क्षाररक्षण	नाडीविकार, लवणक्षय दुर्बल जलधारणाशक्ति
११. गन्धक	शारीर विकास के लिए आवश्यक, विचर्चिका तथा अन्य चर्म रोगों का प्रतिषेध, धातुओं के लौह परिमाण का मन	शारीर वृद्धि का निरोध, त्वचाविकार

दशम अध्याय

पाचन-संस्थान

पाचन

पाचन के द्वारा अविलेय और अप्रसार्य आहारद्रव्य विलेय एवं प्रसार्य हो जाते हैं जिससे वे आसानी से शोषित हो सकें। यह क्रिया मुख्यतः रासायनिक है और पाचक रसों में कुछ पदार्थों की उपस्थिति पर निर्भर रहती है जिन्हें 'किण्वतत्त्व' (Enzymes) कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की क्रिया कुछ जीवाणुओं के द्वारा भी होती है जिसे 'किण्वीकरण' कहते हैं। आन्त्र में उपस्थित ऐसे जीवाणुओं को 'सेन्द्रिय किण्व' तथा अनेक पाचक रसों के निर्जीव पदार्थों को 'निरिन्द्रिय किण्व' कहते हैं। इस प्रकार 'किण्वतत्त्व' की परिभाषा निम्नोक्त रूप से की जा सकती है:—

'किण्वतत्त्व' एक निरिन्द्रिय विलेय किण्व है जो प्राणिज एवं औद्भिज कोषाणुओं से उत्पन्न होता है और जिसकी क्रिया उन कोषाणुओं की जीवनक्रिया से पूर्णतः स्वतन्त्र है। इसकी क्रिया खनिज परिवर्तनों के समान है, अतः उन्हें 'सेन्द्रिय परिवर्तक' या प्राणिज 'परिवर्तक' कहते हैं जो कुछ शारीर प्रतिक्रियाओं के वेग को उत्तेजित करते हैं। वह सजीव कोषाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और प्रायः जीवन-सम्बन्धी सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक रूप में आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विषयनारमक परिवर्तनों में भी मुख्य-कारण होते हैं।

किण्वतत्त्वों का वर्गीकरण

(क) इनकी क्रिया के स्वरूप के अनुसार—

१. लवविश्लेषक किण्वतत्त्व यथा लालागत किण्वतत्त्व।
२. ओपजनीकरण "—यथा मूत्राम्लनिर्मापक "
३. निरामीकरण "—जो अमिषार्त्तासे आम समूह को वृथक् करता है।
४. स्कन्दनीय "—जो विलेय मांसतत्त्व को अविलेय में परिवर्तित कर देता है।

(ख) क्रिया के अधिष्ठान के अनुसार—

१. वहिः कोषाणवीय—
२. अन्तःकोषाणवीय—

(ग) पाच्य आहार द्रव्य के अनुसार—

१. शाकतत्त्व विश्लेषक—
२. मांसतत्त्व विश्लेषक—

(क) मांसतत्त्वीय—जो मांसतत्त्व के अणुओं पर क्रिया करते हैं ।

(ख) मांसजातीय—जो अन्य मांस जातीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं ।

३. स्कन्दनीय

४. मेदोविश्लेषक

५. आवर्तक

किण्वतत्त्वों के साधारण लक्षण

किण्वतत्त्व जल, ग्लिसरीन के तनु विलयन एवं लवण विलयन में घुलनशील हैं । वह तनु मद्यसार में घुल जाते हैं, किन्तु उसकी अधिकता होने पर अवक्षिप्त हो जाते हैं । इनके निम्नलिखित लक्षण होते हैं:—

१. घनीय अवस्था (Colloidal State)—किण्वतत्त्व अल्प प्रसार्यता तथा उच्च भार के घनीय विलयन द्रव्य है ।

२. जनकरूप (Zymogens) यह:कोपाणवीय किण्वतत्त्व कोपाणुओं के भीतर जनककणों के रूप में रहते हैं ।

३. सह-किण्वतत्त्व (Co-enzymes) किण्वतत्त्वों की क्रिया में यह सहायक होते हैं ।

४. पूर्ण क्रिया वैशिष्ट्य (Specificity of enzyme action) इनकी क्रिया विशिष्ट पदार्थों पर ही होती है, सब द्रव्यों पर नहीं । इसे 'तालकुञ्जिका क्रिया' (Lock and key action) भी कहते हैं । कुछ किण्वतत्त्व समान यौगिकों के सम्पूर्ण वर्ग पर कार्य करते हैं, किन्तु विभिन्न तीव्रता से । इसे आवेष्टिक क्रिया कहते हैं ।

५. तापक्रम का प्रभाव—

शरीर के स्वाभाविक तापक्रम पर इनकी क्रिया सर्वोत्तम होती है । अधिक तापक्रम होने से इनकी क्रिया नष्ट हो जाती है । शून्य तापक्रम पर यह निश्चेष्ट रहते हैं, किन्तु तापक्रम की वृद्धि के अनुसार उनकी क्रिया में भी वृद्धि होने लगती है ।

६. उदजन केन्द्रीभवन का प्रभाव:—

अधिकांश किण्वतत्त्वों की क्रिया ४५ से ७५ उदजन केन्द्रीभवन पर सर्वोत्तम होती है । बहुत अधिक या न्यून होने पर उनकी क्रिया नष्ट होती है ।

७. अक्षयता: (Inexhaustibility)

यदि समय दिया जाय तो किण्वतत्त्व की अल्प मात्रा भी आहार्य द्रव्य के अधिक परिमाण पर कार्य करती है । इसकी क्रिया निरिन्द्रिय परिवर्तकों की समान होती है । यदि किण्वतत्त्व की मात्रा बढ़ा दी जाय तो क्रिया तीव्रता से

(क) मांसपरीच—जो मांसपरीच के अणुओं पर किया करते हैं ।

(ख) मांसवशील—जो वन्य मांस जातीय पदार्थों पर किया करते हैं ।

३. स्कन्दनीय ४ मेदोविश्लेषक

५. आवर्तक

क्रियतत्त्वों के साधारण लक्षण

क्रियतत्त्व विलयन के तनु विलयन एवं लवण विलयन में घुलनशील । वह तनु लवण में घुल जाते हैं, किन्तु उसकी अधिकता होने पर अविलीन हो जाते हैं । इनके निम्नलिखित लक्षण होते हैं:—

१. क्रीम अवस्था (Colloidal State)—क्रियतत्त्व अल्प प्रसार्यता तथा उच्च गर के धर्मीय विलयन द्रव्य हैं ।

२. जन्तु (Zymogens) बहिःकोषाणवीय क्रियतत्त्व कोषाणुओं के भीतर अणुओं के रूप में रहने हैं ।

३. सह-क्रियतत्त्व (Co-enzymes) क्रियतत्त्वों की क्रिया में यह सहायक होते हैं ।

४. विशिष्ट क्रिया (Specificity of enzyme action) इनकी क्रिया विशिष्ट पदार्थों पर ही होती है, सब द्रव्यों पर नहीं । इसे 'तालकुञ्जिका क्रिया' (Lock and key action) भी कहते हैं । कुछ क्रियतत्त्व समान शीतोष्ण के मूल्य भाँ पर कार्य करते हैं, किन्तु विभिन्न तीव्रता से । इसे धार्मिक क्रिया कहते हैं ।

५. तापक्रम का प्रभाव—

गैर-सामान्य तापक्रम पर इनकी क्रिया सर्वोत्तम होती है । अधिक तापक्रम पर इनकी क्रिया नष्ट हो जाती है । शून्य तापक्रम पर वह निश्चेष्ट रहते हैं, किन्तु शून्य की छूट के अनुसार उनकी क्रिया में भी वृद्धि होने लगती है ।

६. शून्य केन्द्रीयमवन का प्रभाव:—

शरीर का क्रियतत्त्वों की क्रिया ४५ से ७५ उदजन केन्द्रीयमवन पर सर्वोत्तम होती है । बहुत अधिक या न्यून होने पर उनकी क्रिया नष्ट होती है ।

७. अक्षयता: (Inexhaustibility)

यदि समय दिया जाय तो क्रियतत्त्व की अवयव मात्रा भी आहार्य द्रव्य के शरीर पर परिमाण पर कार्य करती है । इसकी क्रिया निरिच्छिन्न परिवर्तकों की समान होती है । यदि क्रियतत्त्व की मात्रा बढ़ा दी जाय तो क्रिया शीघ्रता से

होती है। इस प्रकार क्रिया का वेग क्रियतत्त्व के परिमाण के अनुपात से होता है।

८. विपर्ययात्मक क्रिया (Reversible action)

क्रियतत्त्व की क्रिया सदा विपर्ययात्मक होती है। यथा जय किण्वतत्त्व के द्वारा मेद घसागल और ग्लिसरीन में परिवर्तित हो जाता है तब इन दोनों पदार्थों के मिलने से कुछ मेद भी प्रस्तुत होता है।

९. क्रिया की अपूर्णता—

वर्ष्युक्त विपर्ययात्मक क्रिया के कारण कुछ आहार्यद्रव्य सदैव अवशिष्ट रहता है, अतः क्रिया सदा अपूर्ण रहती है। इसके विपरीत, निरिन्द्रिय परिवर्तकों की क्रिया कुछ हद तक अधिक पूर्ण होती है। इसीलिए मांसतत्त्व के अणुओं पर मांसविलायक किण्वतत्त्व की अपेक्षा अम्लों का प्रभाव अधिक पूर्ण होता है।

१०. प्रतिक्रियतत्त्व (Anti-enzymes)

जब किण्वतत्त्व रक्त में प्रविष्ट किये जाते हैं तब शरीर में विविध प्रतिक्रियतत्त्व उत्पन्न होते हैं जो उसकी विनाशक क्रिया से अंगों की रक्षा करते हैं।

११. आत्मपरिवर्तक—

किण्वतत्त्व अपनी ही क्रिया से कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न करता है जो इसकी क्रिया को उत्तेजित करते हैं।

किण्वतत्त्व को क्रिया पर प्रभाव डालने वाले कारणः—

(क) आहार्य द्रव्य की सान्द्रता—

कुछ सीमा तक आहार्य द्रव्य की सान्द्रता के अनुसार किण्वतत्त्व की क्रिया का वेग बढ़ जाता है।

(ख) किण्वतत्त्व की सान्द्रता—

किण्वतत्त्व की मात्रा पर पाचन का परिमाण निर्भर नहीं रहता क्योंकि किण्वतत्त्व की अल्प मात्रा से ही अपरिमित आहार्यद्रव्य पर क्रिया हो सकती है, किन्तु किण्वतत्त्व की मात्रा के अनुपात से ही उसकी क्रिया का वेग होता है।

कोषाणवीयः—(Intracellular or kathepsins)

शरीर के हर एक कोषाण में अन्तःकोषाणवीय किण्वतत्त्व रहता है जिससे आत्मविलयन होता है। कोषाण में मांसतत्त्व विरलेषु किण्वतत्त्व रहता है जिसे कोषाणवीय किण्वतत्त्व कहते हैं। इसका कार्य किंचित् अगल प्रतिक्रिया में अच्छी तरह होता है। अन्तःकोषाणवीय किण्वतत्त्व से तन्तुओं के केवल मांसतत्त्व का ही पाचन नहीं होता बल्कि शर्करा तथा मेद का भी पाचन होता है।

होती है। इस प्रकार क्रिया का वेग किण्वतत्त्व के परिमाण के अनुपात से होता है।

८. विपर्ययात्मक क्रिया. (Reversible action)

किण्वतत्त्व की क्रिया सदा विपर्ययात्मक होती है। यथा जब किण्वतत्त्व के द्वारा मेद वसाजल और ग्लिसरीन में परिवर्तित हो जाता है तब इन दोनों पदार्थों के मिलने से कुछ मेद भी प्रस्तुत होता है।

९. क्रिया की अपूर्णता—

वर्ष्युक्त विपर्ययात्मक क्रिया के कारण कुछ आहार्यद्रव्य सदैव अवशिष्ट रहता है, अतः क्रिया सदा अपूर्ण रहती है। इसके विपरीत, निरिन्द्रिय परिवर्तकों की क्रिया कुछ हद तक अधिक पूर्ण होती है। इसीलिए मांसतत्त्व के अणुओं पर मांसविलायक किण्वतत्त्व की अपेक्षा अम्लों का प्रभाव अधिक पूर्ण होता है।

१०. प्रतिकिण्वतत्त्व (Anti-enzymes)

जब किण्वतत्त्व रक्त में प्रविष्ट किये जाते हैं तब शरीर में विविध प्रतिकिण्वतत्त्व उत्पन्न होते हैं जो उसकी विनाशक क्रिया से अंगों की रक्षा करते हैं।

११. आरम्भपरिवर्तक—

किण्वतत्त्व अपनी ही क्रिया से कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न करता है जो इसकी क्रिया को उत्तेजित करते हैं।

किण्वतत्त्व की क्रिया पर प्रभाव डालने वाले कारणः—

(क) आहार्य द्रव्य की सान्द्रता—

कुछ सीमा तक आहार्य द्रव्य की सान्द्रता के अनुसार किण्वतत्त्व की क्रिया का वेग बढ़ जाता है।

(ख) किण्वतत्त्व की सान्द्रता—

किण्वतत्त्व की मात्रा पर पाचन का परिमाण निर्भर नहीं रहता क्योंकि किण्वतत्त्व की अल्प मात्रा से ही अपरिमित आहार्यद्रव्य पर क्रिया हो सकती है, किन्तु किण्वतत्त्व की मात्रा के अनुपात से ही उसकी क्रिया का वेग होता है।

कोषाणवीय :—(Intracellular or kathyopsins)

शरीर के हर एक कोषाणु में अन्तःकोषाणवीय किण्वतत्त्व रहता है जिससे आत्मविख्यन होता है। कोषाणु में मांसतत्त्व विरलेपक किण्वतत्त्व रहता है जिसे कोषाणवीय किण्वतत्त्व कहते हैं। इसका कार्य किंचित् अम्ल प्रतिक्रिया में अच्छी तरह होता है। अन्तःकोषाणवीय किण्वतत्त्व से त-तुओं के केवल मांसतत्त्व का ही पाचन नहीं होता बल्कि शर्करा तथा मेद का भी पाचन होता है।

२४० आहार द्रव्य मांसवत्त्व स्नेह शर्करा कलारी (ताप) जीविनीय द्रव्य

तैल तिल	२८.००	२५२			
" धिनीले	"	"			
" कोकोजम	"	२१४	+	+	
" मारगरीन	२३.८				
चीनी		२८.३	११३			
शकर	"	२६.९	१०८			
गुड	०.००८	२५.०	८१	०	कम	—
मधु	०.११	२०.२१	९७	+	+	०
साबुदाना	२.८	०.०४	२२.०.	—			
गन्ना	०.४२	०.१६	६.२०	२८			
गेहूँ का मैदा	३.१४	०.३७	२१.५४	१०२	०	++	०
" आटा	३.९०	०.५४	२०.३५	१०२	+	+	+
सूजी	४.२०	०.६८	१४.२०	८०	+	++	०
बघ	२.९७	०.६२	२०.६२	१०	+	++	०
चावल	२.३०	०.०८५	२२.३०	९९	+	+	०
" भोया	१.६२	०.१५	२६.३४	११३	०	०	०
" संस्कृत	१.७९	०.१३	२६.०९	११३	०	+	०
यजरी	२.७८	०.४६	२३.३५	१०९	++++	++	१०
जई	३.३७	२.४३	१९.८२	११५	+	++	०
मकई	२.१३	०.४८	२०.८०	९६	++	++	०
धरहर	६.४४	०.५०	११२	+	++	०
चना	६.७	१.४	१२०	+	++	०
उदद	६.९१	०.२२६	११३	+	++	०
मसूर	७.५६	०.१९	११२	+	++	०
मूँग	७.२	०.२२५	११३	+	++	०
बादाम	५.२६	१५.९६	४.३०	१८२	कम	++	०
गोला	१.६१	१४.३१	७.९०	१६७	+	++	०
अखरौट	७.३०	१०.९२	६.९०	१५५	कम	+	०
सुनका	०.४८	०.०९	११.९९	५०
खजूर	०.४५	०.०३	१९.७३	८१	+
अजीर	०.५६	०.१४	१५.९९	६७	+
इमली	०.३९	८.८९	३७	+	+
नारङ्गी	२.२५	०.०३	२.६९	१२	+	+	+++
सेब	०.०९	०.०६	३.५४	१५	+	+
केला	०.४५	०.०३	२.२६	११	कम	+	+
अमूर	०.१७	०.०३	३.९३	१७	+	कम

शुष्क और शिम्बी वर्ग के प्रधान धान्यों का रासायनिक संगठन

	नाम	मांसतत्त्व	रनेह	शाकतत्त्व	सनिज	जल
शुष्क वर्ग	१. गेहूँ	१२.४	२.१८	७.९२	२.२७	१२.८३
	२. चोकर	१६.४	३.५	४३.६	६.०	११.५
	३. चावल	६.२६	०.८	७८.८	१.२३	११.५
	४. यव	८.९२	१.९०	७६.१	२.३	१२.३
	५. मकई	९.५२	४.४४	६८.९	३.७५	११.५
शिम्बी वर्ग	१. मूंग	२३.६२	२.६९	५३.४५	३.५७	१०.८७
	२. अरहर	२७.६७	३.३१	२७.२७	५.५	१०.८
	३. मसूर	२५.४७	३.०	५५.३	३.३३	१०.२३
	४. चन्ना	१९.९४	४.३१	५१.१३	३.७२	१०.७
	५. उदुद	२२.३२	१.९५	५५.२२	३.०	१७.५०
	६. मटर	२१.०	१.८	६१.४	२.६	१३.०
फुल	आलू	१.२	०.१	१९.७	०.९	७६.७
	रतालु	१.६	०.५	२४.३	०.७	७३.९
	प्याज	१.६	०.३	९.३	०.६	८९.१
	मूली	१.४	०.१	४.६	०.९	९०.८
	गाजर	०.५	०.३	१०.१	०.९	८५.७
	चुकन्दर	०.५	०.१	१४.०	०.९	८३.९
	शालजम	०.९	०.१५	६.८	०.८	९३.४
शाक	कशेरुक	४.१	०.१०	१७.६	१.६	७५.१
	बदगोभी	१.८	०.४	५.८	१.३	८९.६
	फूलगोभी	२.२	०.४	४.७	०.८	९०.७
	टमाटर	१.३	०.२	५.०	०.७	९६.९
	खीरा	०.८	०.२	३.१	०.५	९५.४
	केला	१.३	०.६	२२.०	०.८	७५.३
	दूधम	०.८९	०.९४	३.४८	०.२६	९०.९८
	भिण्डी	१.९६	१.१	५.७२	०.८	९०.४०
कद्दू	कद्दू	०.९०	१.०	३.९६	०.७	९३.४०

पदार्थ	जल	शाक्तत्त्व	मांसतत्त्व	स्नेह	फलारी ताप
	प्र० श०	प्र० श०	प्र० श०	प्र० श०	प्र० श०
गेहूँ	१००२०	१९०६	१२०२५	२०१७	४००१०
” आटा	९०८२	२०३३	१४०५६	३०३९	४००९३
मकई	१०००	१०७७	११००६	५३	४०१३२
” आटा	९९०४	१०५२	९५०	४०४१	४००५७
अरहर की दाल	९०७०	३०५८	२२०३८	१०५१	४००६७
चने की दाल	९०००	३०५०	२१०८८	४०८१	४०९०
उड़द की दाल	९०९५	३०९६	२४०७५	००७५	४००२६
मसूर की दाल	९०७८	४०२३	२६०४४	००६७	४००६३
मटर की दाल	९०८२	४०२२	२६०३८	००९०	४००४१
बर्सा का चावल	८०९५	१०२६	७०८८	००४२	३०८२३
रंगूनी ”	११०५९	१०२९	८००६	००४३	३०८१८
नया ”	१००८२	१०२३	७०६६	००१९	३०८१
पुराना ”	११०६९	१०१९	७०४४	००२९	३०८०१
भूँगा की दाल	९०८०	४००९	५०५६	००८५	४००५१

दूध	मांसतत्त्व	स्नेह	शर्करा	जीवनीय द्रव्य		
	प्र० श०	प्र. श.	प्र. श.	ए.	मी.	सी.
गो दुग्ध	३०३	३०६	४०९	+++	++	+
खी ”	१०४४	५०२४	२०६४	+++	+	+
भेड़ ”	५०२८	७००४	४०९	+++	+	+
घकरी ”	४०२६	४००	४०२६	+++	+	+
भैंस ”	४०८	७०६७	४०३६	+++	+	+

आँटा	गेहूँ	यव	जई	चावल	मटर	आलू
जल	१३०६	१३०८	१२०४	१३०१	१४०८	७६००
प्रोटीन	१२०४	११०१	१००४	७०९	२३०७	२००
वसा	१०५	२०२	५०१	००९	१०६	००२
श्वेतसार	६७०९	६४०९	५७०८	७६०५	४९०७	२००६
सेल्युलोज	२०५	५०३	११०२	००६	७०५	००७
अनिजलवण	१०८	२०७	३००	१००	३००१	१००

नाम	मांसतत्त्व	वसा	शाकतत्त्व	खनिज	जल
बादाम	२१.०	५४.६	१७.२	२.३	४.६२
अखरोट	१५.५७	५७.४३	१३.०८	१.७	१२.२
पिस्ता	२२.६	५४.८	१५.६	२.८	४.२

लालिक पाचन (Salivary digestion)

लालाग्रन्थि—

लालास्राव हृन्वर्षीय, जिह्वाधरीय तथा कर्णमूलिक इन तीन मुख्य ग्रन्थियों के द्वारा होता है। इनमें पूर्वोक्त दो ग्रन्थियाँ अधोहृन्वर्षिक के अन्तः पृष्ठ में स्थित रहती हैं तथा अन्तिम ग्रन्थि कर्णमूल में स्थित रहती है और शंखास्थि से बँधी रहती है। ये ग्रन्थियाँ अनेक छोटे-छोटे कोष्ठों में विभक्त रहती हैं जिन्हें अनुस्रग्घ कहते हैं और इन्हीं अनुस्रग्घों के समूह से एक ग्रन्थि का निर्माण होता है। प्रत्येक अनुस्रग्घ से एक नलिका निकलती है जो इसी प्रकार की अन्य नलिकाओं से मिलकर यदी नलिकाएँ बनाती हैं। ये यदी नलिकाएँ भी परस्पर मिल कर मुख्य नलिका बनाती हैं जो मुख के भीतर छुलती हैं। छुम नलिकाएँ चपटे कोषाणुओं से तथा वृहद् नलिकाएँ घनाकर या स्तम्भाकार कोषाणुओं से आच्छादित रहती हैं। वृहद् नलिकाओं की आवरक आधारकला के बाहर की ओर लसीकावहाय तथा केशिकायें पायी जाती हैं। यहाँ पर कुछ स्वतन्त्र पेतीसूत्र भी रहते हैं।

प्रत्येक कोष्ठ में नलिका से लगी हुई एक आधार कला होती है जिस पर दो प्रकार के स्रावक कोषाणु स्थित रहते हैं जिन्हें स्नेहिक और श्लैष्मिक कोषाणु कहते हैं। इस कला के चारों ओर केशिकाओं का जाल रहता है। स्नेहिक कोषाणुओं में बहुत सूक्ष्म लालागत किण्वतावजनक कण होते हैं जिनसे लालागत किण्वताव तथा अल्यूमिन की उत्पत्ति होती है। ये कण रसस्राव के अनन्तर लुप्त हो जाते हैं। श्लैष्मिक कोषाणुओं में बड़े पड़े श्लेष्मजनक कण होते हैं जिनसे श्लेष्मा का स्राव होता है। रसस्राव के बाद ये कण छोटे हो जाते हैं और एक तृतीय प्रकार के कोषाणु, जिन्हें अर्द्धचन्द्र कोषाणु कहते हैं, अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। यह कोषाणु आधारकला के बाद अर्द्धचन्द्र

समूहों में स्थित होते हैं। कुछ लोग अर्द्धचन्द्र कोषाणुओं को प्रकार और मात्रा की दृष्टि से स्नेहिक मानते हैं तथा कुछ लोग मानते हैं कि ये श्लेष्मत्तापी हैं।

यह स्नेहिक और श्लैष्मिक कोषाणु विभिन्न लालाग्रन्थियों में विभिन्न अनुपातों में पाये जाते हैं। स्तनधारी जीवों की कर्णमूलिक ग्रन्थियों में केवल स्नेहिक कोषाणु पाए जाते हैं। हृन्मधरीय तथा जिह्वाधरीय ग्रन्थियों में दोनों प्रकार के कोषाणु होते हैं किन्तु प्रथम में स्नेहिक एवं द्वितीय में श्लैष्मिक कोषाणुओं का आधिक्य होता है।

विश्राम काल में ग्रन्थि अधिक संख्य वर्णों से परिपूर्ण रहती है, किन्तु रस-प्राव के बाद इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, केवल नलिकामुख के निकट कुछ वर्ण देखे जाते हैं। अतः यह अनुमान किया जाता है कि ये वर्ण ग्रन्थि के प्राव का एक अंश बनाते हैं और स्वयं कोषाणु के भोजनसार से निर्मित होते हैं। यह प्राव के एक प्रधान सेन्द्रिय अवयव के रूप में रहते हैं। अनुमानतः यह वर्ण सक्रिय अवयवों के पूर्ववर्ती जनक के रूप में रहते हैं जिन्हें 'लालिक क्रिय-तत्त्व जनक' (Ptyalinogen) तथा श्लेष्मजनक (Mucinogen) कहते हैं। यह एक नवीन यौगिक है जो रक्त में उस रूप में नहीं मिलता, बल्कि रक्त द्वारा आनीत जटिल पदार्थों से ग्रन्थि की विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। अतः इनकी निर्माण विधि लवण और जल के समान पूर्ण भौतिक प्रसारण की नहीं है, बल्कि लालिक क्रियतत्त्व तथा श्लेष्मा के सक्रिय उत्पादन की है।

लालास्राव का नाडीजन्य सञ्चालन—

'लाला का स्राव मुख में निरन्तर नहीं होता रहता, बल्कि विशिष्ट अवस्थाओं में इसका स्राव होता है और शरीर की आवश्यकता के अनुसार इसकी मात्रा और गुण में भी परिवर्तन होता रहता है। इससे सिद्ध है कि स्राव आत्मजात नहीं है, किन्तु मस्तिष्क में स्थित नियन्त्रक केन्द्र के अधीन ही है।

नाडीजन्य संचालन के तीन भाग हैं:—

(१) संज्ञावह नाडियाँ, (२) केन्द्र, (३) चेष्टावह नाडियाँ।

((१)) संज्ञावह नाडियाँ—इसकी संज्ञावह नाडियाँ कण्ठरासनी तथा पृथ्वी रासनी नाडियाँ हैं। यह देखा गया है कि जब मुख में तीक्ष्ण द्रव्यों के द्वारा

इन सूत्रों को उत्तेजित किया जाता है तब छालाछाव होने लगता है । जब इन सूत्रों को काट दिया जाता है तब भी उनके केन्द्रीय भागों को उत्तेजित करने से छालाछाव होता है ।

(२) केन्द्र—यह मस्तिष्क केन्द्र में चतुर्थ गुहा के तल में स्थित होता है यह निम्नलिखित कारणों से उत्तेजित होता है:—

(१) उपर्युक्त स्वादग्राही संज्ञावह नाडियों के द्वारा—

(२) भोजन के दर्शन और गन्ध से इसमें छटिनाडी और घ्राणनाडी के द्वारा उत्तेजना जाकर छाला केन्द्रको उत्तेजित करती है और मुख से छालाछाव होने लगता है ।

(३) शरीर के अन्य संज्ञावह नाडियों के द्वारा—

गृध्रभी नाडी के विभिन्न केन्द्रीय भाग को उत्तेजित करने से छालाछाव भी प्रवृत्ति होती है । हृत्तास और यमन के समय भी घ्राणनाडी के औदरिक सूत्र उत्तेजित हो जाते हैं और छाला केन्द्र को प्रत्यावर्तित रूप से प्रभावित करते हैं और छालाछाव होने लगता है ।

(४) मानस भाव—स्वादित्त भोजन का ध्यान करने से छालाछाव होने लगता है । इसके विपरीत भय, शोक इत्यादि मानस कारणों से केन्द्र की क्रिया रुक जाती है और सुँह सूख जाता है । इन अवस्थाओं में न केवल छालीय वरिष्क आमाशयरस का स्राव भी रुक जाता है और क्षुधा जाती रहती है । पैचलो ने इसी लिए कहा है 'क्षुधा ही रस है' । इसके विपरीत, हर्ष, निखिन्तता इत्यादि अवस्थाओं में छाला एव आमाशय रस दोनों का स्राव होता है और पाचन भी अच्छा हो जाता है । जिघौट ने कहा है—'हास्य सर्वोत्तम पाचन है' ।

(५) रक्त के कुछ घटकों के द्वारा केन्द्र सादात् रूप से भी उत्तेजित हो जाता है । यथा र्वासावरोध में, रक्त में क ओ^२ के आधिक्य से केन्द्र उत्तेजित होकर अधिक छालाछाव होने लगता है और इसी लिए मुख में फेनागम पाया जाता है ।

(६) कुछ औषध—यथा पाह्लोकार्पाइन और फिजोस्टिग्मिन क्षीर्ण्य या प्रसावेदनिक नाडियों के अग्रभाग को उत्तेजित करके छालाछाव को बढ़ाते

हैं। इसके विपरीत, पेट्रोपीन इन नाड़ी भागों को शून्य करके लालास्राव को रोक देता है।

(३) चेष्टावह नाड़ियाँ:—

यह दो प्रकार की है—(क) शीर्षण्य, (ख) सांवेदनिक—

(क) शीर्षण्य नाड़ियों में हृन्वधरीय तथा जिह्वाधरीय के लिए रसग्रहा-
कर्णान्तिका (Chorda tympani) और कर्णमूलिक ग्रन्थि के लिए कण्ठरासनी
नाड़ी (Glossopharyngeal nerve) है। रसग्रहा कर्णान्तिका के चेष्टावह स्रावक
सूत्र लैंगले ग्रन्थि तथा हृन्वधरीय नाड़ी ग्रन्थि के आसपास शाखाएं देकर समाप्त
हो जाते हैं। लैंगले ग्रन्थि के फिर नये सूत्र (अनुग्रन्थिक) निकलते हैं जो
हृन्वधरीय ग्रन्थि में समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हृन्वधरीय ग्रन्थि से निकले
हुए सूत्र एक जाल के रूप में कोपाणुओं के सम्पर्क में जाकर समाप्त हो जाते हैं।
कर्णमूलिक ग्रन्थि के लिए चेष्टावह स्रावक सूत्र कण्ठरासनी नाड़ी की पट्तीय
शाखा के साथ चलते हैं और उसके बाद लघु उत्तान अश्मकूटीय के साथ पट्तीय
नाड़ी तक तक जाकर कर्णग्रन्थि में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से नये सूत्र
(अनुग्रन्थिक) निकल कर पंचम शीर्षण्य नाड़ी के द्वितीय भाग की कर्णशंखीय
शाखा के साथ जाते हैं और इस प्रकार कर्णमूल ग्रन्थि में जाकर वह सूत्र
समाप्त हो जाते हैं।

(ख) सांवेदनिक:—

सांवेदनिक नाड़ीसूत्र सुषुम्ना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उरस्म पूर्व
मूलों से निकल कर प्रथम उरस्य ग्रन्थि से होते हुए एक चक्र बनाते हैं। उसके
बाद अधः ग्रैवेयक ग्रन्थि से होते हुए ऊर्ध्व ग्रैवेयक ग्रन्थि में समाप्त हो जाते हैं।
यहाँ से नये सूत्र (अनुग्रन्थिक) निकल कर बहिर्मातृका धमनी की शाखाओं के
चारों ओर एक जाल बनाते हैं और इस प्रकार तीनों लाला ग्रन्थियों में इसके
सूत्र जाते हैं।

इन नाड़ियों की चेष्टावाहकता इस बात से सिद्ध है कि यदि लालास्राव
सेवावह नाड़ियों की उत्तेजना के कारण हो रहा हो तो रसग्रहा के काट देने से
वह शीघ्र ही रुक हो जाता है। साथ ही विच्छिन्न ग्रन्थीय भाग को उत्तेजित
करने से पुनः लालास्राव होने लगता है।

रसग्रहा और सांवेदनिक स्त्रावों में अन्तरः—

रसग्रहा कर्णान्तिका को उत्तेजित करने पर लालास्राव की प्रवृत्ति होने लगती है और उसका परिमाण उत्तेजक की शक्तिके अनुसार होता है और वह तब तक रहता है जब तक कि उत्तेजक रहता है। कुछ ही मिनटों में ग्रन्थि के भार से कई गुना अधिक लाला उत्पन्न होती है। लाला में उपस्थित खनिज लवणों की मात्रा उत्तेजक की शक्ति के अनुपात से होती है, किन्तु सेन्द्रिय अवयवों (लालिक किण्वतत्त्व और श्लेष्मा) का परिमाण ग्रन्थि की प्राक्तन दशा पर निर्भर रहता है। यदि ग्रन्थि पहले विग्राम काल में हो तो उत्तेजक की शक्ति बढ़ाने में लालिक किण्वतत्त्व तथा श्लेष्मा का परिमाण भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत, यदि ग्रन्थि पूर्व कालिक स्राव के कारण रिक्त हो चुकी हो तो बलवान उत्तेजक से भी इनका स्राव नहीं हो पाता।

इस प्रकार रसग्रहा की उत्तेजना से हमें प्रचुर, तनु और जलीय स्राव मिलता है जो उत्तेजना की उपस्थिति तक होता रहता है।

सांवेदनिक नाडियों की उत्तेजना से हृन्वघरीय तथा जिह्वाधरीय ग्रन्थियों से सान्द्र, पिच्छिल और स्वरूप स्राव होता है जो केवल १५ सेकेंड तक रहता है और बाद में नाडी को उत्तेजित करने पर भी धीरे-धीरे स्राव कम होने लगता है और अन्त में बिलकुल बन्द हो जाता है। सांवेदनिक सूत्रों की उत्तेजना से कर्णमूल ग्रन्थि से स्राव नहीं होता, केवल आन्तरिक रचनात्मक परिवर्तन होते हैं अर्थात् लालिक किण्वजनक कणों का लोप हो जाता है।

इस क्रियासम्यग्धी भेद का कारण यह है कि लालास्रावक सूत्र दो प्रकार के होते हैंः—

(१) स्रावचेष्टावह सूत्र ।

(२) पोषक सूत्र ।

पोषकसूत्र किण्वों की उत्पत्ति से सम्बद्ध है और जब वह उत्तेजित होते हैं तो ग्रन्थि में विशिष्ट परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इससे लालिक किण्वतत्त्वजनक तथा श्लेष्मजनक के कण टूट जाते हैं और उनसे लालिक किण्वतत्त्व और श्लेष्मा उत्पन्न होता है। इसीलिए उन्हें 'विरलेपक नाडीसूत्र' भी कहते हैं।

स्रावचेष्टावह सूत्रों की उत्तेजित करने से ऐसा परिवर्तन होता है कि ग्रन्थि के बाहर की ओर स्थित लसीका से जठ आसानी से आन्तरिक कोषाणुओं में

चला आता है और वहाँ से कोष्ठ के केन्द्रस्थित नलिका-मुख में पहुँच जाता है और इस प्रकार प्रचुर परिमाण में स्राव उत्पन्न होता है। जब ये सूत्र उत्तेजित नहीं होते तो जल ग्रन्थि के कोषाणुओं के भीतर ही रहता है क्योंकि केन्द्रस्थ नलिका-मुख तक पहुँचने में कोषाणुओं के सीमानियामक स्तर के कारण रुकावट होती है। इन सूत्रों की उत्तेजना से यह रुकावट कम हो जाती है और कोषाणुओं का स्तर अधिक प्रवेश्य हो जाता है। इस प्रकार अवरोध कम होने से जल आसानी से नलिकामुख में चला जाता है। उसमें लालिक किण्वत्ताव और श्लेष्मा भी मिला होता है जो लालिककिण्वत्ताजनक तथा श्लेष्मजनक कणों से पोषक सूत्रों की क्रिया के द्वारा बनते हैं।

रसप्रदा कर्णान्तिका नाडी में सावचेष्टावह सूत्र अधिक और पोषक सूत्र कम होते हैं। अतः उसकी उत्तेजना से लाला का प्रचुर परिमाण में स्राव होता है, क्योंकि ग्रन्थि का बाह्यतल नलिका में आसानी से जाने लगता है। साथ ही पोषक सूत्रों के कम रहने के कारण इस स्त्राव में सेन्द्रिय घटक उत्तेजना की पहली अवस्था में ही होते हैं। रसप्रदा कर्णान्तिका का ग्रन्थियों पर पोषक प्रभाव भी होता है जो आघातज स्राव के द्वारा प्रत्यक्ष है। जब एक ओर की नाडी काट दी जाती है तो २-३ दिनों के बाद लाला का निरन्तर स्राव होने लगता है उसे आघातज स्राव कहते हैं। कुछ समय के बाद दूसरे पार्श्व की ग्रन्थि से भी तनु स्राव होने लगता है जिसे 'प्रतिविश्लेषात्मक स्राव' कहते हैं।

इसके विपरीत, हृन्वधरीय तथा जिह्वाधरीय ग्रन्थियों में जानेवाले संवेदनिकसूत्रों में पोषकसूत्र अधिक तथा सावचेष्टावह सूत्र कम होते हैं। अतः इसकी उत्तेजना से सान्द्र, पिच्छिल और स्वरूप स्राव होता है।

कर्णमूलिक ग्रन्थि में जानेवाले सूत्र पूर्णतः पोषक हैं और सावचेष्टावह सूत्र नितान्त अनुपस्थित रहते हैं। अतः उनकी उत्तेजना से स्राव नहीं होता, केवल आन्तरिक रचनात्मक परिवर्तन होते हैं अर्थात् कण लुप्त हो जाते हैं। इसका प्रमाण यह है कि उसके बाद कणरासरी नाडी की उत्तेजना से जो स्राव होता है उसमें लालिक किण्वत्ताव तथा श्लेष्मा अधिक होता है।

लालास्राव की प्रवृत्ति

प्रत्येक प्रकार का यान्त्रिक या रासायनिक उत्तेजक स्राव का प्रवृत्ति में

समर्थ नहीं होता । ठंडा यरफ का पानी मुँह में लेने से लालाघ्राव नहीं होता । इसी प्रकार पत्थर के टुकड़े यदि कुत्ते के मुँह में कुछ दूरी से गिराये जाय तो यान्त्रिक उत्तेजना प्रबल होने पर भी स्राव नहीं देखा जाता । लाला की मात्रा का जहाँ तक सयन्ध है, भोज्य पदार्थ जितना ही शुष्क होता, लाला का स्राव उतना ही अधिक होता । इस नियम में दुग्ध अवश्य अपवादरूप है जिससे अत्यधिक लाला का घ्राव होता है । दूसरी ओर, लाला का स्वरूप और गुण-धर्म पदार्थों के स्वरूप के अनुसार होता है । उदाहरण स्वरूप, यदि कुत्ते के मुँह में सूखा चालू रखा दिया जाय तो अत्यधिक तनु और जलीय लाला का स्राव होता है, जिसमें घन अवयवों तथा श्लेष्मा का बहुत कम अंश रहता है । इसी प्रकार अन्य हानिकारक द्रव्यों, यथा वीर अम्ल, कटु और दाहक चार, के सेवन से अत्यधिक लाला घनती है, क्योंकि उन द्रव्यों के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए अधिक लाला की आवश्यकता होती है । दूसरी ओर, यदि उसे कुछ रुचिकर भोज्यपदार्थ यथा—रोटी दिये जाय, तो पिच्छिल श्लेष्मल द्रव लाला का स्राव होता है जिसमें घन अवयवों की उपस्थिति पर्याप्त रहती है और जो आहार को विलज्ज करके निवारण में सहायक होता है । इसी प्रकार मांस चूर्ण और दुर्बल भन्नों से भी लालाघ्राव होता है, किन्तु मांसचूर्ण के द्वारा लालाघ्राव में ५ गुना अधिक सेन्द्रिय पदार्थ होते हैं । इस प्रकार आहार की भौतिक अवस्थाओं के अनुकूल अपने को बना लेने की एक विचित्र शक्ति लाला ग्रन्थियों में पाई जाती है । यह भी देखा गया है कि दोनों ग्रन्थियों में कर्णमूलिक ग्रन्थि के लिए शुष्कता सर्वोत्तम उत्तेजक है । भौतिक अवस्थाओं के अनुकूल अपने को बनाने की शक्ति केवल शारीर क्रियाओं में ही नहीं, बल्कि मानसभावों में भी देखी जाती है । उदाहरणतः, यदि कुत्ते के मुँह में चालू फेंकने का बहाना करें तो तनु जलीय स्राव और यदि रोटी फेंकने का बहाना करें तो सान्द्र पिच्छिल लालाघ्राव होता है । इसी प्रकार यदि आहार शुष्क हो तो लाला का अधिक परिमाण और यदि आर्द्र हो तो स्वल्प परिमाण में स्राव होता है ।

लालाघ्राव की उत्पत्ति

यह प्रश्न विचारणीय है कि लालाघ्राव भौतिक कारणों के परिणाम स्वरूप होता है या ग्रन्थियों की शारीरक्रिया के कारण ? पहले यह समझा जाता था

कि निस्यन्दन की भौतिक विधि के द्वारा ही लाला की उत्पत्ति होती है और इसलिए यह प्रक्रिया की रक्तवाहिनियों में प्रवाहित रक्त की मात्रा पर निर्भर रहती है। इस रक्त के ही कुछ उपादान बाहर निस्यन्दित होकर निकल जाते हैं और इस प्रकार लाला की उत्पत्ति होती है। इस मत की स्थापना के निम्न प्रकार हैं:—

(क) जब रसप्रवाह को उत्तेजित किया जाता है तब दो परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं:—

(१) रक्तवाहिनियों का प्रसार और परिणामस्वरूप अधिक रक्तप्रवाह

(२) लालास्राव की वृद्धि

(ख) दूसरी ओर, सन्निदिनक सूखों की उत्तेजना से

(१) रक्तवाहिनियों का संकोच और रक्तप्रवाह की कमी

(२) लालास्राव की कमी

अब यह प्रमाणित हो चुका है कि रक्तप्रवाह और स्राव यह दोनों क्रियाएँ पूर्णतः स्वतन्त्र हैं, किन्तु रसप्रवाह में दोनों प्रकार के नाडीसूत्र स्पष्टतया स्पष्ट पृथक् अवस्थित हैं।

लालास्राव की शारीरिक उत्पत्ति के प्रमाण

लालास्राव सजीव कोषाणुओं की जीवनक्रियाओं के कारण होता है, अतः एक शारीरिक प्रक्रिया है। इसके पक्ष में निम्न प्रमाण हैं:—

(१) ऐट्रोपीन प्रयोग—

यदि रसप्रवाह की उत्तेजना के पूर्व ऐट्रोपीन का अन्तःश्लेप किया जाय तो रक्तवाहिनियों का प्रसार होने पर भी लालास्राव एक घूँद भी नहीं होता।

(२) शिरश्छेद—

यदि प्राणी का शिरश्छेद करने के बाद रसप्रवाह को उत्तेजित किया जाय तो रक्तप्रवाह के अभाव में भी कुछ काल तक लालास्राव होगा।

(३) लाला में रक्त की अपेक्षा लवणों की न्यूनता—

यदि लाला केवल निस्यन्दन विधि से ही उत्पन्न होती तो इसमें रक्त के समान ही खनिज लवणों की उपस्थिति होनी चाहिए, किन्तु लाला में रक्त की अपेक्षा लवण न्यून होते हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई ऐसी क्रिया अवश्य है

जिससे जल का अंश तो चला जाता है, किन्तु लवणों के आगमन में रुकावट होती है ।

(४) लालानलियों में घमनी की अपेक्षा भाराधिक्य—

यह देखा गया है कि यदि लालानलिका को घन्दकर मुख में लाला के प्रवाह को रोक दिया जाय तो इसका दबाव बढ़ता जाता है और धीरे धीरे यह घमनी के दबाव से दूना हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि साव दबाव के विपर्यय होने पर भी हो सकता है । अतः यह निस्सन्देह विधि के द्वारा नहीं होता ।

(५) सात्मीकरण की वृद्धि—

लालास्राव की वृद्धि के साथ सात्मीकरण की वृद्धि भी देखी जाती है अर्थात् ओपजन अधिक मात्रा में उपयुक्त होता है और कार्बन की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है ।

लाला का संगठन

जल—९९.४ प्रतिशत

सेन्द्रिय पदार्थ—०.४ "

श्लेष्मा—

लालाकिण्वत्त्व

यवशर्करास्तर

अलब्यूमिन

ग्लोब्यूलिन

यूरिया

निरिन्द्रिय लवण—०.२ प्रतिशत

खटिक

सोडियम
 पोटेशियम
 मैग्नेशियम

इनके क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और फास्फेट ।

प्रतिक्रिया—मन्द चारीय

शरीरता का कारण वाद—सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट तथा विलयन में क लो^२ की उपस्थिति है ।

इसमें कुछ पोटाशियम थायोसाइनाइड भी पाया जाता है, जो एक मल द्रव्य है और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में धूम्रपान के तुरन्त बाद लाला में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है ।

लाला की सूक्ष्मदर्शक परीक्षा के बाद इसमें निम्न अवयवों की उपस्थिति देखी जाती है :—

लालाकण, जीवाणु, आहारकण, आवरक कोषाणु, श्लेष्मा, फंगस ।

तीनों विभिन्न ग्रन्थियों की लाला के संगठन में भी अन्तर होता है । कर्णमूलिक ग्रन्थि का स्राव तनु और जलीय होता है तथा अन्य दो ग्रन्थियों का स्राव सान्द्र और श्लेष्मयुक्त होता है, इनमें भी जिह्वाधारीय ग्रन्थि का स्राव विरोध श्लेष्मल होता है ।

मात्रा—प्रतिदिन एक व्यक्ति में कुछ १००० से १५०० सी० सी० लाला का स्राव होता है । चर्वण और धूम्रपान से स्राव बढ़ जाता है । विश्रामकाल में स्राव प्रायः नहीं के बराबर होता है । १० घण्टे के निद्राकाल में कठिनता से १ सी० सी० लाला उत्पन्न होती है ।

लाला के कार्य

लाला के कार्य प्रधानतः दो प्रकार के होते हैं :—

(१) यांत्रिक—(Mechanical)

(२) रासायनिक—(Chemical)

प्रथम कार्य अर्थात् आहार का चलेदन श्लेष्मा और जल के कारण होता है और द्वितीय कार्य अर्थात् श्वेतसार का पाचन लालिक किण्वतरंग के कारण होता है । इनमें भी यांत्रिक कार्य ही प्रधान होता है । इसका प्रमाण यह है कि कुत्ते तथा अन्य अंतस्हारी जीवों की लाला में लालिक किण्वतरंग अनुपस्थित रहता है । लाला के निम्नोक्ति कार्य हैं :—

(१) शुष्क आहार द्रव्यों को आर्द्र बनाना ।


(२) विलेप पदार्थों को घुलाना ।

- (३) पृथुल एवं कठिन पदार्थों का विलेदन और स्नेहन ।।
- (४) मुख का निर्मलीकरण और विपाक्त पदार्थों को बाहर निकालना ।
- (५) श्वेतसार पर रासायनिक क्रिया और उसका यवशर्करा में परिवर्तन ।

लालिक क्लिप्तत्त्व यदासीन-या अत्यल्प अम्ल माध्यम में कार्य करता है ।

— इसकी क्रिया उद ४ से उद ९ तक अच्छी होती है । इसकी क्रिया शाक्तत्त्व के आवरण पर नहीं होती है, अतः इसका प्रभाव केवल पक्क शाक्तत्त्व पर ही होता है । दूसरी बात, इसकी क्रिया शाक्तत्त्व पर क्लोरिन की अनुपस्थिति में नहीं होती । अतः लवण की उपस्थिति से इसकी क्रिया में सहायता मिलती है ।

लाला के द्वारा निम्नांकित परिवर्तन होते हैं:—




लालिक क्लिप्तत्त्व की क्रिया का मापन

(क) श्वेतसार की एक निर्धारित मात्रा पर लालिक क्लिप्तत्त्व की क्रिया का अवसर दिया जाता है और इस प्रकार उत्पन्न शर्करा का परिमाण फेहलिङ्ग या पेची की विधि से निश्चित किया जाता है ।

(ख) पतली कांचनलिका के टुकड़ों को आयोडिन से नीले किये हुए श्वेतसार से भर दिया जाता है और कुछ समय के लिए प्रायः आधे घण्टे तक शरीर तापक्रम पर रक्खा जाता है । जैसे जैसे क्लिप्त की क्रिया होती है, नील वर्ण लुप्त होता जाता है और इस प्रकार श्वेतसार के विवर्ण स्तम्भ की लम्बाई से लालिक क्लिप्तत्त्व की श्वेतसार विरलेयक क्रिया मापी जाती है ।

आमाशयिक पाचन (Gastric digestion)



चित्र ३८-पाचननलिका (महालोत)

१. कर्णमूलिक ग्रन्थि २. जिह्वा ३. अन्ननलिका
 ४. आमाशय ५. पित्तकोष ६. अग्न्याशय
 ७. क्षुद्रान्त्र ८. आरोही बृहदन्त्र ९. अनुप्रस्थ
 बृहदन्त्र १०. अवरोही बृहदन्त्र ११. कुडलिका
 १२. मलाशय १३. उज्ज्वक १४. अन्नपुच्छ

आमाशय की रचना :—

आमाशय अन्ननलिका का एक विस्तृत भाग है, जो आशय और पाचन अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। इसमें चार स्तर होते हैं—

१. स्नेहिक, २. पेशीमय,
३. उपरछैष्मिक, ४. श्लैष्मिक।

स्नेहिक स्तर उदरोवरण का ही एक अंश है। पेशीमय स्तर में स्वतन्त्र पेशीसूत्र बाह्य, मध्य और अन्त इन तीन स्तरों में विभक्त रहते हैं। बाह्यस्तर के सूत्र अनुदैर्घ्य, मध्यस्तर के अनुप्रस्थ तथा अन्तःस्तर के सूत्र तिर्यक् स्थिति में सन्निविष्ट रहते हैं। पेशीमय स्तर के भीतर उपरछैष्मिक स्तर होता है, जिसमें बड़ी बड़ी रक्तवाहिनियाँ, स्तापनियाँ और नादीचक्र उपस्थित होते हैं। श्लैष्मिक स्तर में ग्रन्थियाँ होती हैं, जिनके तीन प्रकार हैं—

१. हार्दिक ग्रन्थियाँ।

यह बहुत थोड़ी संख्या में हार्दिक द्वार के निकट पाई जाती है।

२. स्कन्धीय ग्रन्थियाँ।

३. मुद्रिकीय।

स्कन्धीय ग्रन्थियाँ स्त्रावक शोषाणुओं से युक्त हैं जो दो प्रकार के होते हैं—

(क) केन्द्रीय कोषाणु—विश्रामकाल में यह कोषाणुपाचकतरवजनक तथा अभिप्यन्दिजनक के स्थूलकणों से परिपूर्ण रहते हैं । स्त्राव के बाद ये कण कम हो जाते हैं और भीतर की ओर अवस्थित हो जाते हैं ।

(ख) पार्श्विक कोषाणु—यह केन्द्रीय कोषाणु और आधार कला के बीच में रहते हैं । ये विश्रामकाल में फूले हुए तथा स्त्राव के बाद सिकुड़े हुए दिखाई देते हैं । ये कोषाणु आमाशय रस के उदहरिताम्ल का स्त्राव करते हैं और केवल स्कन्धीय प्रत्नियों में ही पाई जाती हैं । मुद्रिकीय प्रत्नियों में केवल केन्द्रीय कोषाणु होते हैं जिनसे पाचकतरव तथा स्यन्दकतरव युक्त सान्द्र चारीय रस का स्त्राव होता है ।

आमाशय के स्त्राव का नाडीजन्य संचालन

इसके तीन भाग हैं:—

(क) सञ्चायक—कण्ठ रासनी और जिह्विका नाडियाँ ।

(ख) केन्द्र—

(ग) चेष्टावह—प्राणदा ।

मानस या क्षुधा रस

कुछ प्राणियों पर प्रयोग करने के बाद यह देखा गया कि यदि कुत्ता क्षुधित न हो तो उसके मुख की श्लेष्मलकला को किसी प्रकार की रासायनिक या यान्त्रिक उत्तेजना रसोत्पादन में असमर्थ होती है । इसी प्रकार उदासीन या अहचिकर पदार्थों के चर्वण से लालास्त्राव के अतिरिक्त कोई प्रभाव नहीं होता ।

अतः केवल वही द्रव्य रसोत्पादन में समर्थ होते हैं जो रुचिकर रूप में स्वादप्राप्ति नाडियों को उत्तेजित करते हैं । सरसों, मिर्चा, भसाले और कटु औषध इसी प्रकार अपनी प्रभाव डालती हैं, क्योंकि इन्हें सीधे आमाशय में डालने से यह प्रभाव नहीं देखे जाते । यहाँ तक कि यदि कुत्ता भूखा न हो तो उसके मुँह में मांस डालने से भी कोई स्त्राव नहीं होता । ऐसी स्थिति में कण्ठरासनी और जिह्विका नाडियों की उत्तेजना से भी कोई कार्य नहीं होता । कुत्ता के भूखा रहने तथा अन्नमिलाप होने पर ही इन नाडियों की उत्तेजना से स्त्राव उपपन्न होता है । अतः रसोत्पत्ति का उत्तेजक केवल मानस अर्थात् आहार की उत्कट अभिलाषा और उसकी प्राप्ति होने पर सन्तोष और आनन्द का

अनुभव है। इसके विपरीत, प्रबल आवेश की अवस्थाओं में अद्रिनिलीन के अधिक स्त्राव के कारण यह मानस भाव रुक जाता है और रस का निर्माण भी बन्द हो जाता है।

प्रत्यावर्तित स्त्राव

आमाशयिक केन्द्र

यह मस्तिष्क फन्ड में लाला केन्द्र के निकट स्थित है और स्वादपाही-नाडियों तथा मानसवेगों तथा आहार के ध्यान से उत्तेजित होता है।

चेष्टावह सूत्र

यह प्राणदा की हार्दिक शाखाओं के रूप में है। इसका प्रमाण यह है कि इन सूत्रों के काट देने से केन्द्र को उत्तेजित करने पर भी प्रत्यावर्तित स्त्राव नहीं होता।

रासायनिक स्त्राव

प्राणदा नाड़ी का पूर्ण-विच्छेद करने पर भी आमाशय में भोजन के प्रविष्ट होने पर आमाशय रस का स्त्राव होने लगता है। यह स्त्राव चूंकि आमाशयिक केन्द्र की उत्तेजना के कारण नहीं होता, अतः यह समझा जाता था कि यह स्थानीय नाडीजन्य क्रियाओं के कारण होता है, किन्तु घटुतः ऐसी बात नहीं है क्योंकि निकोटीन के प्रयोग से नाडियों को शून्य करने के बाद भी स्त्राव उत्पन्न होता है। उसके बाद लोगों का विश्वास था कि आमाशय में प्रविष्ट आहार के द्वारा आमाशयिक ग्रन्थियों की यान्त्रिक उत्तेजना के कारण ही यह स्त्राव होता है किन्तु प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि साधारण या तीव्र किमी प्रकार की यान्त्रिक उत्तेजना के कारण स्त्राव उत्पन्न नहीं होता। अतः प्राणदा नाड़ी का विच्छेद होने के बाद आमाशय में आहार के प्रविष्ट होने पर जो स्त्राव होता है, वह ग्रन्थियों की रासायनिक उत्तेजना के कारण होता है।

पाचकतत्त्वजन

सभी आहार द्रव्य रमोत्पादन में समर्थ नहीं होते। अतः उत्तेजक विशिष्ट स्वरूप का और निश्चित होता है। रोटी, रबेतसार और अण्डे का रबेतमाग इत्यादि आहार द्रव्यों का कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार जो द्रव्य रसके उत्पादन में समर्थ होते हैं उन्हें 'पाचकतत्त्वजन' कहते हैं। इस वर्ग के पदार्थों में मांससाव, द्राक्षकर्करा, मांसतण्डूज, मांसतण्डूसार आदि मुख्य हैं। ये पहले

आमाशय की श्लेष्मलकला में वर्तमान पूर्वामाशयीन नामक द्रव्य पर क्रिया करते हैं और उसे आमाशयीन नामक एक सक्रिय द्रव्य में परिवर्तित कर देते हैं जो रक्त में शोषित होकर रक्त के द्वारा आमाशयिक ग्रन्थियों में पहुँच जाता है और रासायनिक उत्तेजक के रूप में स्त्राव को उत्पन्न करता है । प्रमाणतः सुद्रिफा द्वार की श्लेष्मलकला या अन्य पाचकत्वजन पदार्थों के काय का अन्तःश्लेष किया जाय तो आमाशय रस का स्त्राव होने लगेगा । केवल आमाशयीन ही ऐसा द्रव्य नहीं है, बल्कि अर्बुद, यकृत, अग्न्याशय आदि अन्य तन्तुओं से प्राप्त स्त्रावकप्रभावयुक्त सक्रिय पदार्थ यथा हिरटेमीन भी अन्तःश्लेष करने पर आमाशय रस का स्त्राव उत्पन्न करते हैं ।

माणदा नाडी का विच्छेद करने पर यदि अल्प परिमाण (१००-१५० सी० सी०) में जल आमाशय में डाला जाय तो कोई स्त्राव नहीं होगा, किन्तु यदि (४००-५०० सी० सी०) दिया जाय तो स्त्राव को उत्तेजित करता है । यह ध्यान देने की बात है कि जल का आमाशयिक श्लेष्मलकला के साथ दीर्घकालीन तथा विस्तृत सम्पर्क ही स्त्रावोत्पादन में समर्थ होता है और इस प्रकार श्लेष्मलकला के सम्पर्क में, आनेवाले जल के आयतन के अनुपात से ही आमाशय का परिमाण निश्चित होता है । यही कारण है कि प्रकृति में जल का वितरण बहुत अधिक है और इसकी स्वभाविक आकांक्षा क्षुधा से भी प्रचल होती है । अतः जहाँ मानस या केन्द्रीय स्त्राव नहीं होता हो, वहाँ जल उत्तेजक का कार्य करता है और भोजन के पाचन के लिए आमाशयरस उत्पन्न करता है । यदि क्षुधा के बिना शुष्क आहार दिया जाय तो स्वभावतः पिपासा यहाँ तीव्र हो जाती है और जल लेना ही पड़ता है जिससे पाचन के लिए आवश्यक स्त्राव उत्पन्न होता है । समबल लवण-विलयन स्त्राव नहीं उत्पन्न करते, किन्तु लवण और शर्करा के अतिवृद्ध विलयन अत्यधिक स्त्राव उत्पन्न करते हैं । लालिक पाचन के द्वारा जो द्राव शर्करा बनती है वह भी एक पाचकत्वजन के रूप में आमाशयिक स्त्राव उत्पन्न करती है । इसी प्रकार आमाशय में मांसतत्त्व के पाचन से जो पदार्थ बनते हैं, वह भी पाचकत्वजन के रूप में कार्य करते हैं । इसके अतिरिक्त, मांसरस, चाय, कौफी, कोको सया सेन्द्रिय अम्ल यथा भोजन के समय गृहीत सोडा-याइकार्ब भी आमाशय स्त्राव को उत्पन्न करते हैं । इसके विपरीत, तैल, घसा और निरिन्द्रिय अम्ल आमाशय रस के स्त्राव में अवरोध उत्पन्न करते हैं ।

मानस और रासायनिक स्त्राव में अन्तर

रासायनिक स्त्राव भोजन के २०-३० मिनट के बाद उत्पन्न होता है और पाचन की सम्पूर्ण अवधि तक वर्तमान रहता है, किन्तु मानस स्त्राव अल्पकाल तक ही रहता है। दूसरे, मानस स्त्राव रासायनिक स्त्राव की अपेक्षा अधिक प्रचुर, अल्पकालीन, अग्लतर और मांसतत्त्व विश्लेषक क्रिया की दृष्टि से प्रबल होता है। इसका महत्त्व इसी में है कि यह भोजन के पाचन का प्रारम्भ करता है, जिससे उत्पन्न द्रव्य आमाशय रस का और अधिक स्त्राव उत्पन्न करते हैं।

आमाशयिक स्त्राव पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारण

जीवनीय द्रव्य—भोजन में वर्तमान जीवनीय द्रव्य से भी रासायनिक स्त्राव उत्पन्न होता है। इसकी क्रिया निम्नरीति से होती है:—

१. साक्षात् रक्त से आमाशयिक ग्रन्थियों को उत्तेजित करने से।
२. रक्त में घोषित होकर उसके द्वारा ग्रन्थियों को उत्तेजित करने से।
३. पूर्वामाशयीन के साथ मिल कर उसे आमाशयीन में परिवर्तित करने से।

प्लीहा—अनुमानतः प्लीहा में एक ऐसा द्रव्य घनता है जो रक्त के द्वारा आमाशयिक ग्रन्थियों में पहुँच कर उसकी क्रिया को बढ़ाता है और सुत पाचक-तत्त्व के परिमाण की भी वृद्धि करता है।

दुग्धः—कुत्तों पर प्रयोगों से यह देखा गया है कि दुग्ध में भी एक ऐसा तत्त्व है जो आमाशयिक ग्रन्थियों की स्त्रावक क्रिया को उत्तेजित करता है।

आमाशयिक स्त्राव की प्रवृत्ति

१. आहार का परिमाण—मुक्त आहार के परिमाण और उत्पन्न आमाशय रस की मात्रा में प्रायः निश्चित सम्बन्ध है यथा—

मुक्त आहार का परिमाण			स्त्राव	
ग्राम	मांस		सी.	सी.
१००			२६	
२००	"	"	४५	"
४००	"	"	१०६	"

आमाशय रस पाचन की समस्त अवधि तक वर्तमान रहता है, किन्तु प्रथम दो घण्टे में अधिक परिमाण में स्त्राव होता है और उसके बाद धीरे-धीरे कम होने

लगता है । यही नहीं, छाव के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है यथा छाव का पहला अंश अधिक प्रयत्न होता, किन्तु बाद में उसकी पाचक शक्ति घटती जाती है ।

२. आहार का प्रकार—आहार के प्रकार के अनुसार भी छाव की मात्रा में अन्तर होता है । १०० ग्राम मांस, २५० ग्राम रोटी और ६०० ग्राम दुग्ध में प्रायः नग्नजन का समान परिमाण ही रहता है, फिर भी रोटी में अधिकतम, दुग्ध में न्यूनतर तथा मांस में न्यूनतम छाव होता है । छाव के स्वरूप का जहाँ तक सम्बन्ध है, पाचकतर रोटी पर अधिकतम, मांस में न्यूनतर और दुग्ध में न्यूनतम उत्पन्न होता है । इसी प्रकार उदहरिकाम्ल मांस में सर्वाधिक, दुग्ध में न्यूनतर और रोटी में न्यूनतम होता है । इन बातों से यह स्पष्ट है कि आमाशयिक प्रक्रियाओं की क्रिया विशिष्ट, सोढेय और सुनिश्चित होती है ।

आमाशयिक छाव की सामान्य प्रक्रिया

पाचन की प्रक्रिया मानस प्रयादित क्रिया से आरम्भ होती है । उर्वोही मनुष्य को भूख लगती है और वह आहार का ध्यान करता है या भोजन की वस्तुओं को देखता है तो केन्द्र की मानस उत्तेजना होती है और ५-१० मिनट के बाद आमाशय में नादीजन्य या मानस रस का छाव होता है । यह मानस छाव शुद्धा की शक्ति एवं भोजनजन्य सन्तोष के अनुभव से बढ़ जाता है । निगरण क्रिया से यह और भी बढ़ जाता है । भोजन के प्रथम घास पर तो इस रस का आक्रमण होता है और उसके मांसतर मांसतरवौज (*Proteoses*) और मांसतत्त्वसार (*Peptone*) में परिवर्तित हो जाते हैं जो पाचकतत्त्वजन के रूप में रासायनिक छाव को अधिक उत्पन्न करते हैं । लाटिक पाचन के परिमाणस्वरूप उत्पन्न द्रव्य (अर्कद्रावीन), मांसरस इत्यादि भोज्य पदार्थ और विशेषतः जल पाचकतत्त्वजन के रूप में रासायनिक छाव को बढ़ाते हैं । जितना रासायनिक छाव अधिक होगा, उतना ही अधिक मांसतत्त्व-विश्लेषण का कार्य सम्पन्न होगा और इस विश्लेषण के फलस्वरूप उत्पन्न द्रव्य पाचकतत्त्वजन के रूप में तब तक छाव को जारी रखते हैं जब तक आमाशय में स्थित आहार का पूर्ण पाचन नहीं हो जाता ।

इस प्रकार सर्वप्रथम मानस रस का छाव होता है जो थोड़ी देर तक ही

रहता है और उसके बाद रासायनिक खाव होता है जो पाचन की पूर्ण अबधि तक घना रहता है।

आमाशय रस

संगठन—विशिष्ट गुरु व	१.००२ से १.००६ %
जल	९९.७७ " ९८.९० %
घन सेन्द्रिय	०.३४ " ०.४७ %
निरिन्द्रिय	०.४६ " ०.५९ %
स्वतन्त्र उदहरिकाम्ल	०.३५ " ०.४५ %
कुल अम्लता	०.४५ " ०.६० %
क्लोराइड	०.५ " ०.५८ %

क्रियतत्त्व—निम्नलिखित तीन किण्वतत्त्व पाए जाते हैं:—

१. पाचकतत्त्व
२. मेदोवर्त्तक
३. अभिष्यन्दक

परिमाण—सामान्य व्यक्ति में सामान्य भोजन करने पर—

१५०० से ३००० सी. सी.

आमाशय रस की अम्लता

प्रणियों से स्तुत आमाशय रस सदा अम्ल रहता है, किन्तु प्रारम्भिक अंश में अम्लता कुछ कम रहती है और धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। आमाशयिक भोज्य पदार्थों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि वहाँ दुग्धाम्ल भी उपस्थित रहता है जिसे आमाशय रस का ही एक अवयव समझा गया था, किन्तु वस्तुतः यह शक्तिरस के जीवाणुजन्य किण्वीकरण के कारण उत्पन्न होता है जिससे शक्तिरस शर्करा और दुग्धाम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उदहरिकाम्ल की अधिकता से पाचन के अन्तिम चाल में यह रुक हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में अम्लोत्पादक कोषाणुओं के विकसित न होने से उदहरिकाम्ल का खाव नहीं होता। इस अवस्था को उदहरिकाम्लभाव कहते हैं।

उदहरिकाम्ल की उत्पत्ति

अम्लोत्पादक कोषाणुओं के द्वारा तीव्र उदहरिकाम्ल जैसे उत्पन्न होता है, यह

ज्ञात नहीं है । संभवतः रक्त में वर्तमान लवण के द्वारा आवश्यक क्लोरीन की पूर्ति निम्न प्रकार से होती है:—

(१) कार्बोनिक अम्ल और लवण की अन्योन्य क्रिया के द्वारा (H_2




(२) सोडियम फास्फेट और सैन्धव की अन्योन्य क्रिया के द्वारा (Na



द्वितीय उपपत्ति विशेष उपयुक्त है । इसके द्वारा रक्त में मौलिक तत्वों का संचय होने लगता है और चारीयता की वृद्धि हो जाती है उसे 'चारीयवेग' (Alkaline Tide) कहते हैं । इससे भोजन के बाद मूत्र की प्राकृत अम्ल प्रतिक्रिया चारीय हो जाती है ।

आहार के विभिन्नतत्त्वों पर आमाशय रस की क्रिया


शक्तरस—आमाशयरस की कोई क्रिया श्वेतसार या एक शर्करीय द्रव्यों पर नहीं होती, केवल उदहरिकाम्ल के कारण ईक्षुशर्करा पर आवर्तक क्रिया होती है जिससे यह द्राचशर्करा और वामावर्तक शर्करा में परिणत हो जाती है:—



वसा—रस के कण ताप और आमाशय की घूर्णन गति के द्वारा छोटे-छोटे कणों में परिणत हो जाते हैं और इस प्रकार पयसीभूत वसा पर आमाशयिक रस में उपस्थित वसावर्तक की क्रिया होती है और वह वसांश और ग्लिसरीन में परिवर्तित हो जाता है । पयसीभवन की क्रिया पूर्ण न होने से आमाशयरस का वसा पर पूर्ण प्रभाव नहीं होता । दुग्ध में वसा के कण सूक्ष्म रहने के कारण उस पर कुछ अधिक क्रिया होती है । आमाशयिक वसावर्तक की क्रिया में अम्लों के द्वारा द्रुक्तावृत्ति होती है । अतः पाचन की प्रथमावस्था में ही इसकी क्रिया सर्वाधिक होती है ।

मांसतरस—आमाशयरस की प्रधान क्रिया मांसतरसों पर होती है । उदहरिकाम्ल की क्रिया से मांसतरसमय द्रव्य फूल जाते हैं और जालिक [मांसतरस में परिवर्तित हो जाते हैं । इस पर पुनः पाचकतरस और उदहरिकाम्ल की

संयुक्त क्रिया होने से उसका दो पदार्थों में जलीय विरलेपण हो जाता है जो प्राथमिक मांसतत्त्वौज वर्ग के हैं और जिन्हें विलेय मांसतत्त्वौज और अविलेय मांसतत्त्वौज कहते हैं। ये दोनों पुनः लाल का एक अणु लेकर दो साधारण यौगिकों में विभक्त हो जाते हैं जिन्हें द्वितीयक मांसतत्त्वौज कहते हैं। इनका पुनः जलीय विरलेपण होता है और मांसतत्त्वसार नामक अन्य साधारण यौगिक उत्पन्न होते हैं।



आन्त्रिक पाचन

अग्न्याशय रस (Pancreatic Juice)

अग्न्याशय की रचना—अग्न्याशय लालाग्रन्थियों के समान ही एक ग्रन्थि है। इसके कोष्ठ शिथिल संयोजक तन्तु से बंधे रहते हैं जिसमें घृत या घनाकार कोषाणुओं के छोटे और अनियमित समूह होते हैं जिन्हें 'अग्निद्वीप' कहते हैं। इनसे 'अंशुलीन' नामक अन्तःस्राव होता है जो शक्त्वत्त्व के सारमीकरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग देता है। इनके अतिरिक्त अग्न्याशय में एक प्रकार के और कोषाणु होते हैं जिन्हें 'सात्रक कोषाणु' कहते हैं। यह उपयुक्त

कोपाणुओं से स्वरूप और रक्तन प्रतिक्रिया में भिन्न होते हैं तथा इनसे अग्न्याशयरस नामक बहिःस्राव होता है । विद्यमानावस्था में यह कोपाणु कणों से भरे रहते हैं जो विभिन्न अग्न्याशयिक पाचक किण्वत्तुओं के जनक रूप में होते हैं यथा—पूर्वाग्न्याशयिकतत्त्वजनक, पूर्वस्नेहावर्तक, पूर्वशाकतत्त्वविश्लेषक तथा पूर्वदुग्धाभिष्यन्दक किण्वत्तु । कोष्ठों के चारों ओर केशिकाओं का घना जाल होता है तथा अग्निद्वीप में बड़ी बड़ी केशिकाएँ स्रोतरूप में होती हैं ।

अग्न्याशय रस की उत्पत्ति

अग्न्याशय रस दो अवस्थाओं में उत्पन्न होता है :—

१. जब प्राणदा नाडी के सूत्र अग्न्याशय—कोपाणुओं में स्रावक उत्तेजना ले जाते हैं अतः यह 'प्रत्यावर्तित स्राव' (Reflex Secretion) कहलाता है ।

२. जब अग्न्याशयकोपाणु रक्त द्वारा आनीत 'साचक तत्त्व' (Secretory Principle) नामक रासायनिक उत्तेजक के द्वारा साक्षात् रूप से उत्तेजित होते हैं । अतः इसे 'रासायनिक स्राव' (Chemical Secretion) कहते हैं ।

प्रत्यावर्तित रूप से उत्पन्न स्राव परिमाण में अत्यल्प होता है, अतः सामान्य अवस्थाओं में साचकतत्त्व के प्रभाव से ही रस का स्राव होता है ।

(१) प्रत्यावर्तित नाडीजन्य स्राव—वेबर्लेव ने यह दिखलाया कि विच्छिन्न प्राणदा के प्रान्तीय भाग को उत्तेजित करने से थोड़ा स्राव प्राप्त किया जा सकता है । कुछ लोगों का यह ख्याल था कि प्राणदा की उत्तेजना से आमाशयिक स्राव उत्पन्न होता है जिसका कुछ अंश ग्रहणी में जाने से अग्न्याशयिक स्राव उत्पन्न होता है, किन्तु यस्तुतः यात ऐसी नहीं है, क्योंकि आमाशय के मुद्रिकाद्वार को पूर्णरूप से बंद करने पर भी स्राव की उत्पत्ति देखी जाती है ।

इसके अतिरिक्त, मानस उत्तेजनाओं से भी अग्न्याशय रस उत्पन्न होता है अर्थात् जब उसे भोजन दिया जाता है या मिथ्या आहार कराया जाता है । यह ध्यान देने की बात है कि मानस उत्तेजना से आमाशयिकरस भी उत्पन्न होता है, किन्तु यह अग्न्याशयिकरस की अपेक्षा कुछ घट में होता है । इस प्रकार अग्न्याशयरस की उत्पत्ति में आमाशयरस का किंचित् भी नहीं होता ।

इस वाडीजन्य स्त्राव में रासायनिक स्त्राव की अपेक्षा किण्वतत्वों का अधिक परिमाण होता है।

(२) रासायनिक स्त्राव—जब स्त्रावकत्वाव नामक रासायनिक उत्तेजक के द्वारा अग्न्याशयकोषाणु उत्तेजित होते हैं तब अग्न्याशयरस का स्त्राव होता है। यह तत्त्व ग्रहणी और मग्न्यान्त्र की रलैप्मिक कला में 'पूर्वस्त्रावकत्वाव' रूप में रहता है, जो अम्लरस के द्वारा स्त्रावक तत्त्व में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त, स्नेह, चारीय फेनक में भी यह गुण पाया जाता है, अतः वह भी अग्न्याशयरस के उत्तेजक हैं। यह स्त्रावकत्वाव हार्मोन या रासायनिक वाहक पदार्थों की श्रेणी का ही है। इसमें और किण्वतत्त्व में अन्तर यह है कि इसकी क्रिया कृमन से घटती नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया बहुपाचित मांसतत्त्व के समान होती है। डिस्टेमोन भी अग्न्याशयस्त्राव उत्पन्न करता है।

जे. मिलेनबी के मतानुसार पूर्वस्त्रावकत्वाव स्त्रावकत्वाव में अम्ल के द्वारा परिणत नहीं होता, किन्तु पित्तलवणों के द्वारा। उसके अनुसार जब भोजन ग्रहणी में जाता है तब 'पित्तस्त्रावक' नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जिससे पित्ताशय का संकोच होता है और थोड़ा सा पित्त ग्रहणी में चला आता है। यह पित्त क्षोपित होकर पूर्वस्त्रावकत्वाव पर प्रभाव डालता है और इस प्रकार स्त्रावकत्वाव उत्पन्न होकर अग्न्याशय-कोषाणुओं को उत्तेजित करता है। अतः अग्न्याशयरस का मुख्य उत्तेजक अम्ल पित्त है न कि अम्ल। इस मत के समर्थन में प्रमाण यह है कि आमाशयिक रसाभाव की अवस्था में भी जब कि अम्ल ग्रहणी में नहीं पहुँचता, यह प्राकृत रूप से होता है।

मिलेनबी ने यह भी दिखाया है कि नाशोजन्य स्त्राव सान्द्र और किण्व-तत्त्वयुक्त होते हैं जब कि रासायनिकस्त्राव तनु तथा सक्रिय किण्वतत्वों से रहित होते हैं।

अग्न्याशयरस का संगठन

यह एक तीव्र चारीय द्रव है (उद् ८.५ से अधिक) जिसमें लगभग १.८ प्रतिशत ठोस द्रव्य जिनमें अलक्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, किण्वतत्वाव तथा निरिन्द्रिय छरण मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट रहते हैं। इसमें निम्नलिखित किण्वतत्वाव होते हैं:—

१. अग्न्याशयिक पाचकतत्त्वजनक
२. रसपाचकतत्त्वजनक ।
३. कार्बोपपाचित मांसतत्त्व परिवर्तक—पाचित-मांसतत्त्वपरिवर्तक
४. अग्न्याशयिक दुग्धाभिष्यन्दक
५. शाकतत्त्वावर्तक
६. यमशर्करावर्तक
७. दुग्धशर्करावर्तक
८. अग्न्याशयिक स्नेहावर्तक

निष्क्रिय अग्न्याशयिक पाचकतत्त्व जनक अन्न में उपस्थित अन्न किण्वीज के द्वारा सक्रिय पाचकतत्त्व में परिणत हो जाते हैं। यह परिणाम खटिक लवणों से भी हो सकता है। मिलेनबी के आधुनिक अनुसन्धानों के अनुसार अम्लपित्त इसका अत्यधिक प्रबल साधन है। कुछ प्राणीरक्रियावेत्ताओं के मत में 'अग्न्याशयिक पाचकतत्त्व' का ही स्राव होता है, किन्तु इसके साथ-साथ एक निरोधक द्रव्य भी होता है। अन्न किण्वीज इस निरोधक द्रव्य को उदासीन कर देता है और पाचकतत्त्व सक्रिय रूप में स्वतन्त्र हो जाता है।

यदि अग्न्याशय रस को अन्न में न गिरने देकर नलिका से ही लेकर देना शाय तो इसमें मांसतत्त्व-विस्लेपक शक्ति नहीं होती, किन्तु इसमें थोड़ा अन्न रस या कुछ विलेय खटिक लवणों को मिला देने से यह शक्ति शीघ्र प्रकट हो जाती है।

परिमाण—प्रतिदिन एक व्यक्ति में ५०० से ८०० सी. सी. अग्न्याशय रस का स्राव होता है।

आहारतत्त्वों पर प्रभाव

शाकतत्त्व—शाकतत्त्व-विस्लेपक-किण्वतत्त्व की क्रिया लालिक किण्वतत्त्व के समान होती है और उससे श्वेतसार यवशर्करा में परिणत हो जाता है। यह लालिकतत्त्व की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है और इसकी क्रिया अपक श्वेतसार पर भी होती है और उसके कोष्ठावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरे, इसकी क्रिया तीव्रतर और अधिक शीघ्र होती है। इस किण्वतत्त्व का एक भाग श्वेतसार के ४०००० भाग को एक मिनट से कम में ही परिवर्तित कर देता है। मनुष्यों में शाक के कोष्ठावरण पर इस किण्वतत्त्व का बहुत कम प्रभाव पड़ता है और उसका अधिक भाग अपरिवर्तित रूप में मल के साथ बाहर निकल जाता है। शानाहारियों में, शाक के इस कोष्ठावरण पर पहले एक

प्रकार के विशिष्ट जीवाणुओं की क्रिया होती है और उससे उत्पन्न द्रव्यों का पाचक किण्वतत्त्वों के द्वारा पूर्णतः पाचन हो जाता है। इस किण्वतत्त्व की क्रिया थोड़े अम्ल माध्यम में भी हो सकती है, किन्तु अत्यधिक अम्ल या चार मद्य, बलैरोफार्म, ईथर आदि सजाहर, यवानी सत्व आदि से इसकी क्रिया रक जाती है।

नवजात शिशु में कुछ मास तक यह किण्वतत्त्व वर्तमान नहीं होता, अतः ६ मास तक बच्चों को श्वेतसारयुक्त आहार नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त अग्न्याशयरस में ययशर्करावर्तक तथा दुग्धशर्करावर्तक भी पाया जाता है।

स्नेह—सर्वप्रथम स्नेह का पयसीभवन होता है जिसमें चार और सावुन की उपस्थिति से सहायता मिलती है। यह पयसीभूत स्नेह स्नेहावर्तक किण्वतत्त्व के द्वारा स्नेहाम्ल और ग्लिसरीन में विश्लेषित हो जाता है। यह स्नेहाम्ल उपस्थित चार से संयुक्त होकर फेनक में परिणत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सफेनीकरण कहते हैं। यदि अग्न्याशय नलिका को बांध कर अग्न्याशय रस को प्रवृत्ति में आने न दिया जाय, तो ८०% स्नेह अपक्वरूप में मल के बाहर निकल जाता है। अग्न्याशयिक स्नेहावर्तक की शक्ति बहुत अधिक, लगभग चौदहगुनी, पित्त के संयोग से बढ़ जाती है। स्नेह का जलीय विश्लेषण पित्त लवणों की भौतिक क्रिया से बहुत बढ़ जाता है। अग्न्याशयिक स्नेहावर्तक की क्रिया निरिन्द्रिय लवणों से बहुत घट जाती है।

मांसतत्त्व—अग्न्याशयिक कोषाणुओं में मांसतत्त्व-विश्लेषक-किण्वतत्त्व अपने द्वितय जनक (पूर्वाग्न्याशयिक पाचकतत्त्वजनक) के रूप में रहता है जो स्तवकाल में अग्न्याशयिक पाचकतत्त्वजनक में परिवर्तित हो जाता है। यह आन्त्र में अन्त्रीय रस में उपस्थित अन्त्रकिण्वोज नामक सहकिण्वतत्त्व के द्वारा सक्रिय पाचक तत्त्व में परिणत हो जाता है। मिलेनबी ने दिखलाया है कि पाचक किण्वतत्त्वजनक स्रष्टिक बलैरिड के द्वारा भी पाचकतत्त्व में परिणत हो जाता है।

सक्रिय पाचकतत्त्व का प्रथम प्रभाव यह होता है कि मांसतत्त्व आमाशयिक पार्चन के समान फूलता नहीं, किन्तु शीघ्र ही विश्लेषित होकर मधुकोष के समान हो जाता है। इससे पहला द्रव्य चारीय उपमांसतत्त्व बनता है जो जलीय विश्लेषित होकर द्वितीयक मांसतत्त्वोज और यह पुनः मांसतत्त्वसार में

परिणत हो जाता है । आमाशयिक पाचन के समान यह मांसतत्त्वसार भी अन्तिम द्रव्य नहीं होते, बल्कि इनका अधिकांश टूटकर पाचित मांसतत्त्व तथा आमिपाण्ड में परिणत हो जाता है ।

आमाशयिक और अग्न्याशयिक पाचकतत्त्व में अन्तर

आमाशयिक पाचकतत्त्व

१. अम्ल माध्यम में क्रिया होती है ।

२. भोजन का प्रारम्भिक फूलना ।

३. अम्लमांसतत्त्व का निर्माण ।

४. प्राथमिक मांसतत्त्वोद्भिन्न की उत्पत्ति ।

५. स्थितिस्थापक इत्यादि कुछ मांस-
तत्त्वों के पाचन का अभाव ।

६. अन्तिम द्रव्य मांसतत्त्वोद्भिन्न और
मांसतत्त्वसार ।

अग्न्याशयिक पाचकतत्त्व

१. धारीय माध्यम में क्रिया होती है ।

२. प्राथमिक विस्तार का अभाव
और मधुकोषपत्र आकृति ।

३. धारीय उपमांसतत्त्व का निर्माण ।

४. द्वितीय मांसतत्त्वोद्भिन्न की उत्पत्ति ।

५. पाचन हो जाता है ।

६. अन्तिम द्रव्य मधुपाचित मांस-
तत्त्व और आमिपाण्ड ।

आन्त्ररस

क्षुद्रान्त्र की रचना—आमाशय के समान अन्त्र में भी चार स्तर होते हैं
यथा—

(१) स्नेहिक आवरण ।


(२) पेशीमयस्तर—इसमें भीतर की ओर घुत्ताकार एवं बाहर की ओर
अनुलम्ब पेशीसूत्र होते हैं । दोनों के बीच में सर्पथिक नाड़ीसूत्रों का जाल होता
है जिसे अर्वाक्जाल कहते हैं ।

(३) उपरलैम्बिककला—इसमें शिथिल सान्तर तन्तु होता है जिसमें
नाड़ीसूत्रों के सूक्ष्मजाल होते हैं जिन्हें मिश्रणजाल कहते हैं ।

(४) रलैम्बिककला—यह स्थूल है और स्वतन्त्र पेशियों के दो स्तरों के
द्वारा उपरलैम्बिक कला से पृथक् रहती है जिन्हें रलैम्बिक पेशी कहते हैं ।

रलैम्बिककला में स्थित ग्रन्थियों से आन्त्ररस का स्राव होता है । यह
सबसे अधिक ग्रहणी में जिसरी उपरलैम्बिककला में और उसके बाद मज्जान्त्र
एवं अन्तिमान्त्र में भी उत्पन्न होता है । क्षुद्रान्त्र के समस्त अन्तः पृष्ठ में लंगुलि के

आकार के प्रवर्धन है जिन्हें रसाक्षरिका कहते हैं। इनकी आधारकला के निकट शृङ्खलाहिनियाँ हैं और मध्य में एक रसायनी रहती है जिसे 'केन्द्रीय पराशिवनी' कहते हैं।



चित्र—३९ छुदान्न की सूक्ष्मरचना

१ दैर्घिक कला २ रसाक्षरिका ३ उपदैर्घिकस्तार ४ पेशीभयस्तार ५ ७ स्तरीय स्तर

आन्नरस की उत्पत्ति

अन्न की खाद्यक प्रस्थियों पर खाद्यक की क्रिया से आन्नरस उत्पन्न होता है। आम्ब्याशयिन्नरस के किन्न इस रस के उत्तेजक होते हैं। आन्नरस के लिपुं खाद्यक नाडीसूत्रों का पता नहीं चला है, फिर भी प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि केन्द्रीय नाडीसंस्थान का शायद पर अवरोधक प्रभाव पड़ता है। नाडीजन्य अतिसार से भी यही सिद्ध होता है। भय या मन बोध से नाडियों का अवरोधक प्रभाव नष्ट हो जाता है

अतः अत्यधिक मात्रा में स्त्राव उत्पन्न होता है । अन्त्र रस का यान्त्रिक उत्तेजकों से भी स्त्राव होता है । कोई बाह्यद्रव्य यथा घातुखंड या अपाच्य आहार लेने से स्त्राव अत्यधिक परिमाण में उत्पन्न होता है और उससे अतितीव्र अतिसार प्रकट होता है । इस स्थिति में स्त्राव जलीय और किण्वतत्वों से रहित होमा ।

आंत्ररस का संगठन

प्रतिक्रिया—शरीर (उद् ८-३)

(१) क्लिप्तस्व—आन्त्रकिण्वीज—यह आम्याशयिक पाचक तत्त्वजनक को पाचक तत्त्व में परिवर्तित कर देता है । इसकी क्रिया केवल प्रवर्तक नहीं है, बल्कि पाचकतत्त्वजनक के साथ मिलकर पाचकतत्त्व उत्पन्न करता है, इसलिए उत्पन्न पाचकतत्त्व की मात्रा आन्त्रकिण्वीज के अनुपात से ही होती है । मिलेनवी और दूसरे विद्वानों का मत है कि पाचकतत्त्वजनक सक्रिय पाचकतत्त्व और प्रोटीन के एक अणु का संयुक्त द्रव्य है, जो उसकी पूर्ण क्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है । आन्त्र किण्वीज इस संयोग का विच्छेद कर देता है और सक्रिय पाचकतत्त्व स्वतन्त्र हो जाता है ।

(२) इधुशर्करावर्तक—यह इधुशर्करा को सत्वशर्करा और धामानर्शर्करा में परिवर्तित कर देता है ।

(३) दुग्धशर्करावर्तक—इधुशर्करा को सधशर्करा और दुधशर्करा में बदल देता है ।

(४) यवशर्करावर्तक—यवशर्करा को सधशर्करा में परिणत कर देता है ।

(५) श्वेतसारावर्तक—श्वेतसार पर क्रिया करता है ।

(६) स्नेहावर्तक—यह स्नेह का सफेनीकरण कर देता है ।

(७) आन्त्रिक पाचकतत्त्व—यह मांसतत्त्व विश्लेषक किण्वतत्व है । यह आम्याशयिक और अम्याशयिक पाचक किण्वतत्वों से इस घात में मिलता है कि वह सामान्य शक्ति प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार यह अपाच्य-यिक और अम्याशयिक पाचकतत्त्व की क्रिया में योग देकर उसे पूर्ण कर देता है । इसके अन्तर्गत अनेक आवर्तक तत्त्व होते हैं जो पाचित मांसतत्त्व के भिन्न भिन्न वर्गों पर क्रिया करते हैं ।

(८) निरामीकरणतत्व—यह आमिषामलों को क्षमोणिया और

अण्डों में विभक्त करते हैं। यह अमोनिया प्रतिहारिणी सिरा के रक्त में पाया जाता है।

(९) मूत्रतत्त्वजनक—यह 'आर्जिनिन' को यूरिया (मूत्रतत्त्व) और ऑर्निथिन में विभक्त कर देता है।

इस प्रकार आन्तरिक में अनेक किण्वतत्त्व होते हैं, जिनकी विभिन्न आहार-तत्त्वों पृथक् आमाशयिक और अग्न्याशयिक रसों के द्वारा परिणत आहार द्रव्यों पर क्रिया होती है।

जीवाणुज किण्वीकरण (Bacterial fermentation)

विभिन्न किण्वतत्त्वों (निरिन्द्रिय किण्वों) की क्रिया के अतिरिक्त आहार पर अनेक जीवाणुओं (सेन्द्रिय किण्वों) की क्रिया होती है। किण्वतत्त्वों के समान विविध आहार द्रव्यों के लिए पृथक् पृथक् जीवाणु होते हैं। सामान्य अवस्था में आमाशय में जीवाणुओं की कोई विशिष्ट क्रिया नहीं होने पाती, क्योंकि आहार के साथ प्रविष्ट जीवाणु आमाशय रस के अम्ल के कारण नष्ट हो जाते हैं। अन्त्र में यह क्रिया स्पष्टरूप से देखी जाती है। जीवाणुज किण्वीकरण का परिमाण पाचक किण्वतत्त्वों की क्रिया के विपरीत अनुपात में होता है अर्थात् यदि पाचक किण्वतत्त्वों की क्रिया से आहार का पाचन अधिक हो चुका है, तो जीवाणुओं की क्रिया के लिए बहुत कम अवशिष्ट रहता है। यही कारण है कि विहृत पाचन में जीवाणुज किण्वीकरण अधिक होता है।

विभिन्न आहारतत्त्वों पर प्रभाव

शाक्ततत्त्व—शाक्ततत्त्व का किण्वीकरण अत्यन्त साधारण है। यह आमाशयिक पाचन की प्रथम अवस्था में आमाशय में भी कुछ सीमा तक होता है, किन्तु क्षुद्रान्त्र में विशेषरूप से होता है।

शाक्ततत्त्व के जीवाणुज किण्वीकरण के द्वारा उत्पन्न द्रव्यों में मद्यसार, दुग्धाम्ल, पिपीलिकाम्ल, सिरिकाम्ल, वेजोइकअम्ल, व्यूटिरिक अम्ल, कओ^२, मिथेन और उदजन हैं। ये द्रव्य निर्विष हैं। कोष्ठावरण जो शाकाहारी प्राणियों के आहार का प्रधान भाग होता है, शक्ति का प्रधान स्रोत होता है और यह भी सत्वराकरा, कैक्टिक अम्ल इत्यादि द्रव्यों में परिणत हो जाता है। जीवाणुओं की

क्रिया से कोष्ठावरण अन्त में उदजन और मिथेन में परिणत हो जाता है अतः शाकप्रधान भोजन करने से आन्त्र में अत्यधिक वायु की उत्पत्ति होती है ।

स्नेह—स्नेह स्नेहाम्ल और ग्लिसरीन में परिणत हो जाने हैं । फिर स्नेहाम्ल भी निम्नवर्ग के स्नेहाम्लों यथा ब्यूटिरिक अम्ल, वेलरिक अम्ल में परिणत हो जाते हैं । अन्त में यह सभी कबो^२ और जल में परिणत हो जाते हैं ।

मांसतत्त्व—मांसतत्त्वों पर जीवाणुओं की क्रिया सामान्यतः वृद्धान्त्र में होती है और मांसतत्त्व विश्लेषक क्रिवाओं के समान वह मांसतत्त्वों, मांसतत्त्व-सार, आमिपाम्लों और अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं । इन पदार्थों पर पुनः जीवाणुओं की क्रिया होती है, जिससे इण्डोल, स्केटोल, फेनोल, पैराक्रोसोल आदि उदजशील नत्रजनयुक्त द्रव्य बनते हैं, तथा हाइड्रोजन सल्फेट की तत्कालीन उत्पत्ति से एथिल हाइड्रोजन, सल्फाइड या एथिल मरकैप्टन, कबो^२, मिथेन और उदजन ये द्रव्य उत्पन्न होते हैं । इण्डोल और स्केटोल नामक द्रव्यों से पुरीष में दूषित और विशिष्ट गन्ध प्रतीत होती है ।

इण्डोल, स्केटोल और फेनोल विषात्मक द्रव्य हैं जिनका शरीर पर अत्यन्त हानिकारक प्रभाव हो सकता है, किन्तु यकृत तथा अन्य धातुओं के निर्भिषीकरण के द्वारा इनका विषैला प्रभाव नष्ट हो जाता है और यह मूत्र के साथ शरीर के बाहर निकल जाते हैं । इण्डोल मूत्र में इण्डिकन के रूप में तथा स्केटोल और फेनोल सेमिद्रय सल्फेट के रूप में मिले रहते हैं ।

सामान्यतः मांसतत्त्व और स्नेह का जीवाणुज किम्वीकरण क्षुद्रान्त्र में अधिक नहीं होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल के जीवाणु मांसतत्त्व और शाकतत्त्व पर कार्य करनेवाले अन्य जीवाणुओं के विरोधी होते हैं । दुग्ध भी मांसतत्त्व का प्रतिभवन रोकता है । जब दुग्धशर्करा की अधिक मात्रा मुख के द्वारा ली जाती है, तब क्षुद्रान्त्र में दुग्धशर्करावर्तक की क्रिया इस पर अधिक नहीं होती और उसका अधिक भाग नीचे की ओर चला जाता है, जहाँ जीवाणुओं की क्रिया से वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है । यह लैक्टिक अम्ल के जीवाणु स्वयं निर्दीप होते हैं तथा अन्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं । इसीलिए भोजनान्त में तक्र की महिमा प्राचीन संहिताओं में बतलाई गई है । कभी कभी आमिपाम्लों से विघटन के द्वारा टोमेन नामक विषात्मक द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं । यह टोमेन सड़े मांस या मछली में भी उत्पन्न होते हैं । सामान्यतः

उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पित्ताम्लों के द्वारा अन्न की स्थिति इनके विकास के अनुकूल नहीं रह जाती है। द्रव्य यदि शोषित हो जायें और घृक के द्वारा उनका उत्सर्ग न हो, तो वह बहुत हानि करते हैं। उनकी प्रबल क्रिया रक्तवहसंस्थान पर विरोध होती है, जिससे अद्रिनिलीन के समान उनसे भी रक्तमार अधिक हो जाता है। हस्तमोन की क्रिया अद्रिनिलीन के विपरीत होती है।

जीवाणुज किण्वीकरण का महत्त्व

यद्यपि इसके अतियोग से विकार उत्पन्न हो सकता है, तथापि प्राकृत पाचन के लिए थोड़े अंश में यह आवश्यक समझा गया है। कोष्ठावरण पर जीवाणुओं की क्रियासे यह लाभकरपदार्थों में परिवर्तित हो जाता है जिसने चर्वित-चर्वण करने वाले प्राणियों को शक्ति प्राप्त होती है। अन्न में जीवनीय द्रव्य के भी किण्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होता है। छोटे-छोटे जन्तुओं पर प्रयोग कर देखा गया है कि जीवाणु रहित आहार से उनका घट्ट होने लगता है और वह मर जाते हैं। अतः इन प्राणियों के जीवन के लिए अन्तरीय जीवाणुओं की उपस्थिति आवश्यक है। उत्तरी भूव के निवासी स्वस्थ प्राणियों में जीवाणु नहीं देखे गये हैं।

आहार का शोषण (Absorption)

अन्ननलिका के विभिन्न रसों की क्रिया के द्वारा आहार शोषण के अनुकूल भौतिक या रासायनिक अवस्था में परिणत हो जाता है। आहार पहले ही शोषण योग्य हो अथवा पाचन क्रिया के द्वारा इस योग्य बना दिया गया हो, इस प्रकार शोषण इस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा आहारस्तरण रक्त और लसीका के द्वारा धातुओं में पहुंचते हैं।

जल का शोषण

आमाशय—प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि आमाशय से जल का शोषण नहीं होता। आमाशय प्रसार तथा मुद्रिका द्वारा—पंकोच के रोमियों में मुख के द्वारा अत्यधिक जल देने पर भी विपासा अधिक देखी जाती है और जब वही जल मुदा के द्वारा दिया जाता है तो वृष्णा शान्त हो जाती है।

क्षुदान्त्र—क्षुदान्त्र से जल अधिक मात्रा में शोषित होता है। यह शोषण रक्त वह खोतों के द्वारा होता है न कि रासायनियों के द्वारा क्योंकि क्षुदान्त्र में

जलाधिक्य होने से प्रतीहारी सिरा रक्त अधिक सन्तु हो जाता है, किन्तु लसीका प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं होती ।

वृहदन्त्र—वृहदन्त्र से भी जल का शोषण होता है । इसका प्रमाण यह है कि क्षुद्रान्त्र से द्रव्यपदार्थ वृहदन्त्र में जाते हैं, किन्तु गुरीप टोस और कठिन होता है । इसके अतिरिक्त गुदद्वार से पानी देने पर वृण्णा की शान्ति हो जाती है, जिसका कारण जल का शोषण ही है ।

शोषित जल का परिमाण उपयुक्त जल की मात्रा तथा शरीर की आवश्यकता दोनों पर निर्भर करता है । शरीर जलसाम्य की स्थिति में रहता है । यदि आवश्यकता से अधिक जल का ग्रहण किया जाय, तो जल का परित्याग भी अधिक होने लगता है, विशेषतः वृकों का मुख्य भाग होने के कारण मूत्र का आधिक्य हो जाता है । इसी प्रकार यदि जल स्वल्प मात्रा में लिया जाय तो शरीर के छावों और उरस्थ मलों की मात्रा में भी कमी हो जाती है और सीमा से अधिक कम हो जाने पर 'सन्तुवृण्णा' की अवस्था उत्पन्न हो जाती है ।

निरिन्द्रिय लवणों का शोषण

आमाशय—कुछ सान्द्रता रहने पर निरिन्द्रिय लवणों का शोषण आमाशय से होता है, अधिक सन्तु विलयनों में इनका शोषण नहीं होता । कुछ अन्य द्रव्यों, यथा मधुसार या मसालों की उपस्थिति से इसमें सहायता मिलती है ।

क्षुद्रान्त्र—क्षुद्रान्त्र से इनका शोषण होता है, किन्तु सभी लवणों का शोषण नहीं होता और विभिन्न लवणों के शोषण क्रम में भी विविधता होती है । आपेक्षिक शोष्यता के अनुसार कसानी और चैरेस, ने उनका निम्नाह्वित वर्गीकरण किया है—

१. सोडियम क्लोराइड, प्रोमाइड, आयोडाइड, एसिटेट,
२. एथिलसलफेट, नाइट्रेट, सैलिसिलेट, लैक्टेट
३. सलफेट, फास्फेट, साइट्रेट, टारटरेट,
४. आक्जलेट, फ्लोराइड ।

प्रथम श्रेणी के लवण बहुत आसानी से शोषित हो जाते हैं और द्वितीय श्रेणी के लवणों के शोषण में कुछ कठिनाई होती है । तृतीय वर्ग के लवण बहुत धीरे-धीरे शोषित होते हैं और उनके द्वारा अन्त्यवहिका में बहुत अधिक जल आकर्षित हो जाता है जिससे अन्त्यपरिसरण गति बढ़ जाती है । अतः यह लवण रेचन का कार्य करते हैं । यह निम्नांकित प्रयोग द्वारा देखा जा सकता है—

धुद्रान्त्र के किसी अंश में तीन यन्त्रों के द्वारा उसके दो समान खण्ड बना दिए जाँय। एक खण्ड में प्राकृत लवण विलयन भर दिया जाय तथा दूसरे में मैगसल्फ के सान्द्र विलयन की कुछ बूंदें दी जाँय। एक घण्टे के बाद देखने पर पहला खण्ड लवण विलयन के शोषित हो जाने के कारण सिकुड़ा हुआ मिलेगा तथा दूसरा खण्ड रक्त से जल को आकर्षित कर लेने के कारण फूला हुआ रहेगा।

स्नेह का शोषण

आमाशय—स्नेह का शोषण आमाशय से एकदम नहीं होता।

धुद्रान्त्र—धुद्रान्त्र में स्नेह स्नेहागुलों और गिलसरीन में विभक्त हो जाता है तथा स्नेहान्त्र फेनक में परिणत हो जाते हैं। यह फेनक पित्त में घुल जाता है और विलेय फेनक तथा गिलसरीन के रूप में धुद्रान्त्र से शोषित हो जाता है। इस प्रकार स्नेह के शोषण के लिए धुद्रान्त्र में पित्त की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिए कामला रोग में जब पित्त ग्रहणी में नहीं जाता तब पुरीय अशोषित स्नेह के कारण मृत्तिका वर्ण होता है।

अग्न्याशय का अन्तःलाव स्नेह के शोषण के लिए आवश्यक है। इसलिए जब अग्न्याशय रस अन्त्र में नहीं जा पाता तब स्नेह का शोषण कुछ सीमा तक कम हो जाता है, किन्तु यदि अग्न्याशय ग्रन्थि का विच्छेद कर दिया जाय तो स्नेह का शोषण बिल्कुल नहीं होता। जीवनीय द्रव्य की से भी स्नेह के शोषण में सहायता मिलती है। इसके अभाव में स्नेह बंदी-बड़ी बूंदों के रूप में सञ्चित होने लगता है।

शोषण रक्त पेशिकाओं के द्वारा नहीं होता, किन्तु रसाङ्कुरिका की रसायनियों के द्वारा होता है। विलेय फेनक और गिलसरीन रसाङ्कुरिका के आवरक स्तम्भाकार कोषाणुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं और मेंदो विरलेयक किण्वतत्त्व की विपर्यय क्रिया के द्वारा पुनः उदासीन स्नेह में परिवर्तित हो जाते हैं। यह उदासीन स्नेह-कण लसीकाणुओं के द्वारा गृहीत हो कर रसाङ्कुरिका की केन्द्रीय पयस्विनी में चले जाते हैं। इन स्नेहकणों को पयस्विनी तक पहुँचा कर लसीकाणु फिर लौट आते हैं और अन्य स्नेहकणों को ले जाते हैं। इस प्रकार लसीकाणु वाहक का कार्य करते हैं।

निम्नाश्रित धातों से यह प्रमाणित होता है कि शोषण रसायनियों के द्वारा होता है न कि रक्तवाह स्रोतों के द्वारा—

(क) स्नेहशोषण—काल में प्रतीहायी रक्त में स्नेहकणों का आधिक्य नहीं होता।

(ख) रसकुसुमा को बांध देने से शोषण में बाधा होने लगती है ।

(ग) रक्तवह स्रोतों में साठुन का अन्तःक्षेप करने से विषय प्रभाव देखा जाता है ।

सामान्यतः ६० प्रतिशत स्नेह का शोषण लसीका के द्वारा होता है । शेष ४०% के सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि वह क्षुद्रान्त्र की दीवारों में ही विश्लेषित होने के बाद रक्त में पहुँचता है ।

स्नेह का शोषण स्नेह की अवस्था, प्रकार तथा द्रवणांक पर निर्भर करता है । स्वतन्त्र अवस्था तथा कम द्रवणांक वाले स्नेह अधिक परिमाण में शोषित होते हैं ।

शाकतत्त्व का शोषण

शाकतत्त्व शाकाहारी तथा सर्वाहारी प्राणियों के आहार का एक प्रधान अंश है । यह प्रधानतः बहुशर्करीय यथा कोष्ठारण, श्वेतसार आदि रूप में होते हैं जिनका शोषण नहीं हो सकता । अतः पाचक किण्वतरंगों के द्वारा विश्लेषित होकर अन्तर् में बहु एक-शर्करीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उस रूप में क्षुद्रान्त्रों में शोषित होते हैं ।

आमाशय—निरिन्द्रिय लवणों के समान तनु विलयनों में शर्करा का भी शोषण नहीं होता । कम से कम ५ प्रतिशत सान्द्रता रहने पर ही उनका शोषण होता है ।

द्विशर्करिद्र का शोषण उस रूप में नहीं होता, किन्तु जलीय विश्लेषण के अनन्तर एक-शर्करीय रूप में उनका शोषण होता है । अतः निरिन्द्रिय लवणों की भाँति द्विशर्करीय, विशेषतः दुग्धशर्करा, अधिक मात्रा में रहने पर रेषन कार्य करते हैं ।

क्षुद्रान्त्र—अन्त्रीय श्लेष्मलकला की विशिष्ट क्रिया के कारण कुछ शर्करा का शोषण अन्य शर्कराओं की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से होता है । यथा दुग्धशर्करा सत्त्वशर्करा की अपेक्षा शीघ्र शोषित होता है और फलशर्करा उससे भी शीघ्रतर शोषित होती है ।

शर्करा के शोषण का क्रम प्रायः एक-सा रहता है और उस पर शर्करा की मात्रा या सान्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह अनुमान किया गया है कि एक निश्चितकाल में सत्त्वशर्करा के कुछ ही अणु अन्त्रीय श्लेष्मलकला के द्वारा भीतर जा सकते हैं । इसका कारण यह है कि शोषण के पूर्व शर्करा का शरीरभवन होता है जिसका क्रम निश्चित रहता है । यह भी देखा गया है कि

यदि अन्य द्रव्यों का भी शोषण उस समय हो रहा हो यथा मिश्रित आहार में, तो उस शर्करा का शोषण—क्रम मन्द हो जाता है। जीवनीय द्रव्य भी की कमी से भी शर्करा का शोषण कम हो जाता है।

शोषण के स्रोत—शोषण सीधे रक्तवह स्रोतों के द्वारा होता है न कि रसायनियों से। इसका प्रमाण यह है कि शर्करा के शोषण के बाद प्रतीहारी-रक्त में एक-शर्करियों का आधिक्य हो जाता है तथा रसकुल्या के बांधने से उसके शोषण में कोई बाधा नहीं होती।

मांसतत्त्व का शोषण

आमाशय—सामान्यतः आमाशय में मांसतत्त्व का शोषण बिल्कुल नहीं होता।

क्षुद्धान्त्र—क्षुद्धान्त्र में मांसतत्त्व का शोषण शीघ्रता से मुख्यतः आमिषाण्डों के रूप में होता है। शोषण रसांकुरिका की रक्तवाहिनियों से होता है न कि रसायनियों से, जो निम्नांकित बातों से प्रमाणित होता है:—

(क) मांसतत्त्व के शोषण के समय प्रतीहारी रक्त में आमिषाण्डों का आधिक्य हो जाता है।

(ख) रसकुल्या के बांधने से मांसतत्त्व के शोषण में कोई बाधा नहीं होती।

शोषण का परिमाण मांसतत्त्व के प्रकार पर निर्भर करता है। क्षुद्धान्त्र में प्रविष्ट आहाररस की परीक्षा करने पर उसमें जान्तव मांसतत्त्व बिल्कुल नहीं मिलते, किन्तु औज्जिद मांसतत्त्व १५ से ३० प्रतिशत पाए जाते हैं। इससे सिद्ध है कि क्षुद्धान्त्र में दुग्ध, अण्डे, मांस इत्यादि जान्तव मांसतत्त्वों का शोषण पूर्णरूप से हो जाता है, किन्तु औज्जिद मांसतत्त्व ७० से ८५ प्रतिशत ही शोषित होते हैं।

बृहदन्त्र—इसमें रसांकुरिकाएँ नहीं होती तथा अनुलग्न येशीसूत्र भी तीन गुच्छों में स्थित रहते हैं। बृहदन्त्र से केवल जल, शर्करा और विलेय लवणों का शोषण होता है। इस प्रकार बृहदन्त्र में न तो पाचन की शक्ति होती है और न शोषण की।

शोषण की प्रक्रिया

पाचन के परिणामस्वरूप उत्पन्न अनेक पदार्थों का शोषण निस्पन्दन, प्रसारण या व्यापन की भौतिक प्रक्रियाओं के कारण ही नहीं होता, बल्कि प्रधा-

तः कोषाणुओं की शारीरिक्रियाओं पर निर्भर करता है । इसके पक्ष में निम्न गमाण हैं:—

(१) शोषणकाल में घातुओं के द्वारा अधिक ऑक्सीजन का उपयोग होता है ।

(२) शोषणकाल के आवरक कोषाणुओं की क्रिया 'निर्वाचनिक' होती है यथा इलुशर्करा की अपेक्षा द्रावशर्करा अधिक शीघ्रता से तथा मैगनेसियम की अपेक्षा सोडियम ब्रोराइड अधिक शीघ्रता से शोषित होता है । इसके अतिरिक्त यह निर्वाचनिक शक्ति कोषाणुओं के आहत या विपाक हो जाने पर नष्ट या कम हो जाती है ।

(३) अनेक लवणों तथा अन्य पदार्थों का शोषण उनकी प्रसार्यता से स्वतन्त्र रूप से होता है यथा द्रावशर्करा का शोषण शुद्रान्त्र द्वारा सोडियम ब्रोराइड के समान ही शीघ्र होता है यद्यपि उसकी प्रसार्यता उससे कम होती है ।

(४) शोषण दबाव के विरुद्ध होता है—क्योंकि अन्त्र की अपेक्षा रक्तवाहिनियों में दबाव अधिक (३० मि० मी०) होता है ।

(५) शोषण साधारणतः अविपर्ययात्मक क्रिया है ।

(६) यह भी देखा गया है कि यदि उसी प्राणी का रक्तरस शुद्रान्त्र में प्रविष्ट कर दिया जाय तो उसके अवयव रक्त के समान होने पर भी उसका पूर्ण शोषण हो जाता है ।

सारमीकरण (Metabolism)

स्नेह

पोषणसम्बन्धी इतिहास—शे स्वरूपों में स्नेह का आहार किया जाता है—

(क) स्वतन्त्र स्थिति में—यथा मक्खन, तेल, घी, मोम ।

(ख) कोषाणुकला में अन्तर्बद्ध—यथा मेदसतन्तु ।

पाचनजन्य परिवर्तन—

आमाशय—आमाशय में मेदसतन्तु का आवरण आमाशयिक भ्रमरस के द्वारा गल जाता है और इस प्रकार अन्तर्बद्ध स्नेह स्वतन्त्र हो जाता है । इस स्नेह का आमाशय के ताप तथा पूर्णनगति के द्वारा पयसीभवन होता है, किन्तु भ्रमरप्रतिक्रिया के कारण इसमें कुछ बाधा पड़ती है । पयसीभूत स्नेह के एक अंश पर आमाशयिक स्नेहावर्तक की क्रिया होती है और उसका सफेदी

करण हो जाता है, अर्थात् वह स्नेहाम्ल और ग्लिसरिन में परिवर्तित हो जाता है। विशेषतः दुग्धगत स्नेह इस पाचन क्रिया से अधिक प्रभावित होता है।

अन्न—अन्त्रों में प्रतिक्रिया जारी होने के कारण स्नेह का पयसीभवन ठीक-ठीक होता है तथा उत्पन्न फेनक के द्वारा भी इस क्रिया में सहायता मिलती है। अन्न में उपस्थित पित्तलवणों के द्वारा इस क्रिया में अत्यधिक सहायता होती है। इससे पयसीभूत स्नेह क्षारीय अम्लवातयिक रस के निकट सम्पर्क में चला आता है और इस प्रकार स्नेहावर्तक क्रिया की क्रिया इस पर समुचित रूप से हो पाती है तथा पयसीभूत स्नेह का शीघ्रता तथा पूर्णरूप से सफेनीकरण हो जाता है।

शोषण—पित्तस्नेह के शोषण में आवश्यक योग्य होता है। पित्त के लवण उत्पन्न फेनक को घुला देते हैं और स्नेह विलेय फेनक तथा ग्लिसरीन के रूप में शोषित होता है। रसाङ्कुरिका को जावृत करनेवाले स्तम्भाकार कोषाणुओं में विलेय फेनक तथा ग्लिसरीन पुनः सश्लिष्ट होकर स्नेहकणों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह स्नेहकण लसीकाणुओं में प्रविष्ट होकर उनके द्वारा रसाङ्कुरिका की मध्यस्थ पयस्विनी में चले जाते हैं और वहाँ से रसकुक्ष्या के द्वारा हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। स्नेह का पूर्ण भाग रासायनियों द्वारा शोषित नहीं होता, बल्कि उसका कुछ भाग रक्तवाहिनियों में प्रविष्ट हो जाता है और स्नेहाम्ल का कुछ भाग तथा थोड़ा अपक्व स्नेह पुरीष के साथ निष्कृत जाता है।

सात्मीकरण—शरीर में पाया जानेवाला स्नेह (मेद) की प्राप्ति निम्न लिखित रूप से होती है—

(१) आहार के साथ लिप्त भये स्नेह के द्वारा।

(२) मांसतत्त्व के द्वारा।

कुछ आमिषाम्ल सत्व शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं और सत्वशर्करा पुनः स्नेह में परिणत हो जाती है। इस प्रकार, मांसतत्त्व से स्नेह का निर्माण होता है। उसकी विधि निम्न प्रकार की है—

(क) अलेनीन के निरामीकरण से लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है—

(अलेनिन + जल = लैक्टिक अम्ल + अमोनिया)

(ख) लैक्टिक अम्ल से मेथिलग्लायौक्सल बनता है—

(लैक्टिक अम्ल + जल = मेथिलग्लायौक्सल)

(ग) मेथिलग्लायौक्सल से सत्वशर्करा की उत्पत्ति—

(मेथिलग्लायौक्सल + २ जल = सत्वशर्करा)

प्रायः आसिपालों का ५०% प्रतिशत भाग सत्वशर्करा में परिवर्तित हो जाता है अतः भोजन में मांसतत्व के आधिक्य से मेदःसञ्चय हो सकता है । स्नेह का सम्पूर्ण भाग शोषित हो कर रक्त में पहुँच जाता है और रक्तमस्तु के लेसिथिन नामक अवयव के द्वारा धातुओं में चला जाता है । रक्तकणों का इसमें कोई भाग नहीं होता ।

(३) शाकतरवों के द्वारा—

(क) पाचन के द्वारा उत्पन्न कुछ सत्वशर्करा का किण्वीकरण होता है और उससे ग्लिसरील की उत्पत्ति होती है :—

(सत्वशर्करा \rightarrow ग्लिसरील \rightarrow ग्लिसरील)

(ख) शाकतरव के समीकरण से ग्लूकोसिक अम्ल बनता है । इसके विरलेपण से एसोटेल्डोहाइड्रोन सकते हैं और यह पुनः स्नेहान्द्र और स्नेह में परिवर्तित हो सकते हैं ।

स्नेह का अन्तिम परिणाम—रक्त के द्वारा धातुओं तक पहुँचने पर स्नेहकणों में निम्नाङ्कित परिवर्तन होते हैं :—

(१) स्नेह का कुछ भाग शर्करा में परिवर्तित हो जाता है ।

(२) मेदःसञ्चय—स्नेह का कुछ भाग जो तुरत काम में नहीं आता, शरीर में मुख्यतः मध्यान्त्रकला तक मेदःमस्तु के रूप में सञ्चित होने लगता है । शरीर में विजातीय स्नेह को सजातीय स्नेह में परिवर्तित करने की शक्ति होती है, किन्तु यह शक्ति सीमित होने के कारण यदि विजातीय स्नेह का सेवन अधिक मात्रा में किया जाय, तो उनका उसी रूप में सञ्चय होने लगता है ।


(३) सञ्चित स्नेह का जलीय विरलेपण हो कर वह धातुओं तक पहुँचता है और वहाँ शर्करा की भाँति अन्तःकोषाणवीय किण्वतत्त्वों के द्वारा ओपजनीकरण होने के बाद उससे शक्ति उत्पन्न होती है और वह कार्बनडाइ-ऑक्साइड और जल में परिणत हो जाता है । इसकी पूरी प्रक्रिया अभी तक ज्ञात नहीं है । पूर्ण ओपजनीकरण न होने से इससे व्यूटिरिक अम्ल तथा आक्सिब्यूटिरिक अम्ल उत्पन्न होता है ।

(४) कुछ स्नेह स्फुरकयुक्त स्नेह में परिवर्तित हो जाता है यथा लेसिथिन ।

(५) स्नेह का उत्सर्ग—स्नेहाम्ल तथा उदासीन स्नेह अधिक परिमाण में पुरीष के साथ उत्सृष्ट होते हैं। उपवासकाल में भी पुरीष में स्नेह का पर्याप्त भाग रहता है।

स्नेह का सात्मीकरण

स्नेह + स्नेहावर्तक



स्नेह के कार्य

(१) स्नेह का सबसे बड़ा कार्य ताप और शक्ति उत्पन्न करना है। एक ग्राम स्नेह ९.४ कैलोरी ताप उत्पन्न करता है जब कि एक ग्राम श्वेतसार केवल ४.० कैलोरी उत्पन्न करता है। निम्नश्रेणी के स्नेहाम्लों का अधिक अनुपात रहने पर स्नेह की तापोत्पादक शक्ति भी कम हो जाती है।

(२) स्नेह शरीर में आसानी से सञ्चित हो जाता है और इस प्रकार शरीर में शक्ति का एक सञ्चित कोष बनाने में यह मुख्य साधन है।

(३) प्राकृतिक स्नेह में जीवनीय द्रव्य ए और डी का आधिक्य होता है, जो अस्थि की वृद्धि और निर्माण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मांसतत्त्व

पोषणसम्बन्धी इतिहास

मांसतत्त्व स्थावर या जड़म रूप में, विशेषतः शरीरमांसतत्त्व, स्फुरकमांस-
तत्त्व और केन्द्रक मांसतत्त्व के रूप में लिये जाते हैं ।

पाचनसम्बन्धी परिवर्तन

आमाशय में शरीर मांसतत्त्व सर्वप्रथम फूल जाते हैं और आग्निक मांस-
तत्त्व में परिणत हो जाते हैं । इस पर पुनः आमाशयिक पाचकतत्त्व की क्रिया
होती है और वह प्राथमिक मांसतत्त्वज, द्वितीयक मांसतत्त्वज तथा मांसतत्त्व-
सार में परिवर्तित हो जाता है । सामान्य अवस्था में, इसमें अधिक आमाशय में
परिवर्तन नहीं होते ।

अन्त्र में अन्त्रिय पाचकतत्त्व की क्रिया आमाशय में उत्पन्न मांसतत्त्वज तथा
मांसतत्त्वसार पर होती है, जिसके कारण वह बहुपाचित मांसतत्त्व तथा विविध
आमिपान्ल इत्यादि में विश्लेषित हो जाते हैं । यह देखा गया है कि अनशन
की अवस्था में एक कुत्ते के प्रति १०० घन सेंटीमीटर रक्त में लगभग ४ या ५
मिलीग्राम आमिपनत्रजन (Amino-nitrogen) पाया जाता है जब कि
मांसाहार के बाद वह १५ मिलीग्राम तक हो जाता है ।

शोषण

मांसतत्त्वों का शोषण आमाशय से नहीं होता । यद्यपि मांसतत्त्वसार, जो
आमाशय में बगते हैं, प्रसरणशील द्रव्य हैं, तथापि उनका शोषण नहीं होता,
क्योंकि—

- (१) मांसतत्त्वसार रक्तप्रवाह में जाने पर विष के समान कार्य करते हैं ।
- (२) वह रक्त की स्वाभाविक रुकन्दनीयता को नष्ट कर देते हैं ।
- (३) वह रक्तभार को कम कर देते हैं ।
- (४) वह केशिकाओं को अधिक प्रवेश्य बना देते हैं और इस प्रकार
लसीका के उत्पादन को बढ़ा देते हैं ।

अधिकांश मांसतत्त्वों का शोषण क्षुद्रान्त्र से होता है । प्रायः समस्त जोंगम
मांसतत्त्व तथा ७० से ८५ प्रतिशत स्थावर मांसतत्त्व का यहाँ से शोषण होता
है । यह शोषण रक्तवहस्रोतों के द्वारा होता है न कि रसायनियों के द्वारा ।
प्रयोगों द्वारा यह निश्चित किया गया है कि उपवास करते हुये कुत्ते के प्रतीहारी
रक्त में प्रति १०० घन सेंटीमीटर रक्त में लगभग ४ से ५ मिलीग्राम आमिप-

नम्रजन मिलता है जो कि मांसाहार के बाद १० से १४ मिलीग्राम तक बढ़ जाता है। इससे यह भी सिद्ध है कि मांसतत्त्वों का शोषण आमिपाम्लों के रूप में होता है।

सात्मीकरण

इस प्रकार मांसतत्त्वविश्लेषण से उत्पन्न द्रव्य जो यकृत में पहुँचते हैं, उनमें आमिपाम्ल, अमोनिया और केन्द्रकाम्ल मुख्य हैं। शोषित आमिपाम्ल दो वर्गों में विभक्त हो जाते हैं:—

१. सात्त्विक (Fuel) (२) सात्त्विक (Essential)


सात्त्विक आमिपाम्ल

अधिकांश सात्त्विक आमिपाम्लों का मुख्यतः यकृत तथा कुछ धातुओं में भी निरामीकरण होता है और वह विशिष्ट होकर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं:—

- (१) नम्रजनयुक्त भाग (Nitrogenous) (२) नम्रजनरहित भाग (Non-nitrogenous).

नम्रजनयुक्त भाग का अन्तिम परिणाम


(१) नम्रजनयुक्त वर्ग (NH_2) का निराकरण ओपजनीकरण के द्वारा होता है। ओपजनीकरण से (NH_2) वर्ग अमोनिया में परिणत हो जाता है और वह कोषाणुओं में विद्यमान कार्बोनिक अम्ल से मिल कर अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाता है। उसका विश्लेषण होने पर अमोनियम कार्बोनेट यशता है और उससे पुनः जलविश्लेषण के बाद यूरिया की उत्पत्ति होती है।




(अमोनियम कार्बोनेट) (अमोनियम कार्बोनेट) (यूरिया)

आजकल यह समझा जाता है कि एक द्वि-आमिपाम्ल, आर्निथिन, प्रवर्तक के रूप में अमोनिया के यौगिकों से यूरिया की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण योग देता है। यह आर्निथिन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर आर्गिनिन नामक द्रव्य में परिणत हो जाता है। यह पुनः यकृत तथा कुछ में उपस्थित 'अरिगनावर्तक' (Arginase) नामक क्षिप्यतत्त्व के द्वारा यूरिया

और आर्निथिन में विघटित हो जाता है। इस प्रकार आर्निथिन सदैव उपयोग में आता रहता है।




चारनर के मत क अनुसार, आमिपाम्लो के ओपजनीकरण से सापनिक अम्ल की उत्पत्ति होती है:—



इस सायनिक अम्ल का वंशत जलीय विश्लेषण होता है और वह अमोनिया और कार्बन डाइ-ऑक्साइड में विभक्त हो जाता है:-



इस प्रकार उत्पन्न अमोनिया सायनिक अम्ल के अधिश्लेषित भाग से मिल जाता है और यूरिया बनाता है:—



(२) भामिपात्रों के निरासीकरण के द्वारा उत्पन्न अमोनिया यूरिया के निर्माण के अतिरिक्त निम्नांकित रूप से अन्य महावपूर्ण योग देता है :—

सभी आहार द्रव्यों के पाकक्रम में तथा देशियों की क्रिया के फलस्वरूप अणुओं की उत्पत्ति होती है, यथा—

(क) लकटक जंगल पेशियों की क्रिया तथा शाकतरय के साथीकरण से उत्पन्न होता है।

(ख) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्नेह द्रव्यों से ।

(ग) हाइड्रोक्लिस या कटु थल्यों की उत्पत्ति मासतत्वों से ।

यदि इन अम्लों को उदासीन बनाकर निष्क्रिय न कर दिया जाय तो इनसे रक्त का उदजन-द्रोम-जन बढ़ जायगा किन्तु मांसतत्वों के निरामीकरण से प्राप्त अमोनिया इन अम्लों से संयुक्त होकर लवण बनाता है जो रक्त की स्वाभाविक क्षारीयता को बनाये रखने में सहायता करता है। इस प्रकार आमिपाम्लों के निरामीकरण से उत्पन्न अमोनिया सामीकरणसम्बन्धी क्रियाओं

के क्रम में उत्पन्न हानिकारक द्रव्यों से शरीर की रक्षा करता है और इसलिए यह शरीर का प्रधान रक्षक माना गया है।

(ख) नवजनरहित भाग का अन्तिम परिणाम

आमिपाग्लों का अवशिष्ट नवजनरहित भाग (कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सिजन) पूर्ण ज्वलन फलित ताप और शक्ति उत्पन्न करने योग्य रूप में रहता है। अतः इन आमिपाग्लों को 'सात्त्विक' आमिपाग्ल कहते हैं। यह नवजनरहित भाग स्नेह और शाक्तत्वों के समान-ताप और शक्ति उत्पन्न करने का ही कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह सामीकरण को उत्तेजित करता है और इसीलिए मांसतत्वों को विशिष्टप्रेरक क्रियाशील कहा गया है।

तात्त्विक आमिपाग्ल

मांसतत्वों का बहुत थोड़ा अंश तात्त्विक आमिपाग्लों के रूप में अपरिवर्तित अवस्था में ही यकृत से होता हुआ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न धातुओं में पहुँचता है। वहाँ यह पुनः संगठित होकर विभिन्न धातुओं में व्यवस्थित हो जाता है और उससे विशिष्ट धातुगत मांसतत्व बनते हैं, यथा मांसधातु में मायो-सिनोजन और अन्य मांसतत्व, रक्त में रक्तसंगत अल्ब्यूमिन तथा अन्य रक्तगत मांसतत्व। दूसरे शब्दों में, मांसतत्व के इस अंश से जीवित ओजःसार का निर्माण होता है, जो क्षीणधातुओं की पूर्ति तथा पृथ्वीरील चालकों में नवीन धातुओं की उत्पत्ति का कार्य करता है। इसे 'अन्तर्जात सामीकरण' (Endogenous metabolism) कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि तात्त्विक आमिपाग्लों को रक्त में प्रविष्ट करने पर यकृत में उनका निरामोक्षण नहीं होता और इसलिए मूत्रलवण के रूप में वह प्रकट नहीं होते। इन्हीं प्रयोगों द्वारा यह भी पाया गया है कि ट्रिप्सोफेन शरीरभार को स्थायी रखने के लिए आवश्यक है तथा लाइसिन, सिसटीन, हिस्टीडिन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जन्तुओं को उपर्युक्त तत्वों से रहित आहार देने पर उनकी वृद्धि रुक जाती है और उन तत्वों के देने पर वृद्धि पुनः प्रारम्भ हो जाती है। दुग्ध इन तत्वों से परिपूर्ण होने के कारण बच्चों के विकास के लिए एकमात्र आहार माना गया है। इन तथ्यों से यह सिद्ध है कि वृद्धि के लिए मांसतत्वों का परिमाण उतना अधिक आवश्यक नहीं, जितना कि उनका गुणधर्म अर्थात् शरीर की वृद्धि के लिए निर्माणक शिलाओं के समान तात्त्विक आमि-

पाम्लों की समुचित प्राप्ति आवश्यक है । कुछ मांसतत्त्वों में यह तात्त्विक आमिपाम्ल प्रचुर परिमाण में होते हैं और ऐसे मांसतत्त्वों का जीवनसंबन्धी मूल्य भी अधिक समझा जाता है । नियमतः जांगम मांसतत्त्व इसी श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें प्रथम श्रेणी का मांसतत्त्व कहा गया है । प्राकृत भोजन में १०० से १२० ग्राम मांसतत्त्व होना चाहिये जिसमें कम से कम ३० ग्राम प्रथम श्रेणी का मांसतत्त्व होना चाहिये ।

यह तात्त्विक आमिपाम्ल बच्चों में वृद्धि के लिए नितान्त आवश्यक है तथा युवा व्यक्तियों में भी व्याधिमोच की अवस्था में इनकी आवश्यकता होती है क्योंकि रोगावस्था में हीन धातुओं की पूर्ति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक होते हैं । यह अनुमान किया गया है कि युवा व्यक्तियों के धातुकोषाणुओं में धातुनिर्माण के लिए आवश्यक शिलारूप तत्त्वों का समन्वय करने की शक्ति होती है और इस समन्वय कार्य के लिए जीवनीय द्रव्यों को आवश्यक माना गया है । इस कार्य के द्वारा आमिपाम्ल पुनः संघटित होकर मांसतत्त्व में परिणत हो जाते हैं । धातुओं में इस विशिष्ट गुणधर्म की सत्ता अनेक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित की गई है । कुछ कुत्तों को कुछ महीनों तक केवल आमिपाम्लों के मिश्रण पर रखा गया और कोई मांसतत्त्व नहीं दिया गया, फिर भी उनका शरीर मांसल और विकसित हो गया ।

भोजन के साथ कितना भी मांसतत्त्व लिया जाय, किन्तु उसके कुछ अंश का ही इस प्रकार तात्त्विक उपयोग होता है । अवशिष्ट भाग का यकृत में निरामीकरण होता है जिससे उसका नष्टजन्युक्त भाग यूरिया में परिणत हो जाता है और शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है । कटु अम्ल स्नेह और शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ताप और शक्ति उत्पन्न करते हैं । इसे 'वहिर्जात सात्मीकरण' (Exogenous metabolism) कहते हैं ।

आमिपाम्लों का समन्वय

मेण्डल ने प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध किया है । उसने एक कुत्ते के बच्चे को ऐसे मांसतत्त्वों पर रखा, जिनमें लायसिन तथा अन्य आमिपाम्ल अनुपस्थित थे । इस आहार से उसके शरीर की वृद्धि नहीं हुई । जब उसकी माता को वही आहार दिया गया तो उसके शरीर की वृद्धि होने लगी और उसके स्तन्य से उसका बच्चा भी बढ़ने लगा । इससे प्रमाणित होता है कि आवश्यक तात्त्विक

धामिपाम्लों का उसके शरीर में समन्वय हुआ और उसी के फलस्वरूप उसके शरीर का विकास हुआ।

ऐसा समझा जाता है कि यह तात्त्विक आमिषाण्ड धातुनिर्माण के लिए आवश्यक कुछ अन्तःस्रावों को शरीर में उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसके पक्ष में एक यह भी प्रमाण है कि अद्रिनिलीन तथा थायरोक्सीन रासायनिक संघटन में थायरोक्सीन से अत्यन्त निकटतः सम्बद्ध है।

इस प्रकार शरीर में उत्पन्न धातुगत मांसतत्त्वों में भी क्षयात्मक परिवर्तन (Katabolic changes) होते हैं। यह अन्तःक्रोमणवीय किण्वतत्त्व के द्वारा मांसतत्त्वों के विरलेपण के रूप में होता है, अर्थात् इसे आत्मविरलेपण (Autolysis) कहते हैं। इस विरलेपण से उत्पन्न अन्तिम द्रव्य यूरिया, क्रिस्टिनीन, मूत्राग्ल तथा उडनशील सल्फेट मल के रूप में शरीर से उत्सृष्ट होते हैं। इसलिये मांसतत्त्व का चय दो प्रकार का होता है:—

(१) वहिर्जात—यह आहार के परिमाण के अनुसार होता है और इससे यूरिया तथा निरिन्द्रिय सल्फेट बनते हैं।

(२) अन्तर्जात—जो सदा एक समान और कम मात्रा में होता है और जिससे यूरिया, क्रिस्टिनीन तथा उडनशील सल्फेट बनते हैं।

मांसतत्त्व के कार्य

(१) आमिषाण्डों के भ्रूजनरहित भाग, जो स्नेह और शर्करा में परिणत हो जाते हैं, के कारण मांसतत्त्व ताप और शक्ति उत्पन्न करता है। १ ग्राम मांसतत्त्व ४.१ कैलोरी ताप उत्पन्न करता है।

(२) मांसतत्त्व के तात्त्विक आमिषाण्डों से नये धातुगत मांसतत्त्व बन जाते हैं और इस प्रकार शरीर की वृत्तिपूर्ति होती है। नवीन धातुओं की वृद्धि और वृत्तिपूर्ति के लिए आवश्यक भ्रूजन और गन्धक का एक मात्र साधन यही तात्त्विक आमिषाण्ड हैं।

(३) आमिषाण्डों का उपयोग शरीर में किण्वतत्त्वों तथा अन्तःस्रावों के निर्माण में भी होता है।


(४) उनमें एक विशिष्ट प्रेरक क्रिया होती है, जिससे शरीर की सात्मी कारण क्रियापे उत्तेजित होती है।

मांसतत्त्व का सात्मीकरण

मांसतत्त्व
↓
आम्लिक या, रापीय मांसतत्त्व + आत्माशायिक पाचकतत्त्व
↓
मांसतत्त्वौज
↓
मांसतत्त्वसार + आन्त्रिक पाचकतत्त्व
↓

दशम अध्याय ।

२५७



शाकतत्व

पोषणसम्बन्धी इतिहास

स्वरूप—शाकतत्व मुख्यतः श्वेतसार यथा रोटी, चावल, आलू इत्यादि के रूप में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त द्विशर्करीय यथा इक्षुशर्करा और दुग्धशर्करा तथा एकशर्करीय यथा सत्वशर्करा और फलशर्करा इत्यादि के रूप में भी यह आहार के साथ लिया जाता है।

पाचनसम्बन्धी परिवर्तन

श्वेतसार पर सर्वप्रथम मुख में लालिक किण्वतत्व की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है और आमाशय के स्कन्ध तक होती रहती है। उसके द्वारा श्वेतसार द्रावीन तथा व्यवशर्करा में परिणत हो जाते हैं। क्षुदान्त्र में श्वेतसारविश्लेषक की क्रिया होती है जिससे यह व्यवशर्करा में परिवर्तित हो जाता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार से उत्पन्न व्यवशर्करा पर अन्त्रीय रस के व्यवशर्करावर्तक किण्वतत्व की क्रिया होती है और वह सरवशर्करा तथा फलशर्करा में परिवर्तित हो जाता है। इक्षुशर्करा (द्विशर्करीय) पर आमाशय में आमाशयिक रस के उद्दहरितान्न की मुख्य क्रिया होती है और उसे सरवशर्करा और फलशर्करा में परिवर्तित कर देता है। अवशिष्ट इक्षुशर्करा तथा दुग्धशर्करा पर इक्षुशर्करावर्तक तथा दुग्धशर्करावर्तक की क्रमशः क्रिया होती है और वह एकशर्करीय में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार किसी भी रूप में शाकतत्वों का आहार करने से वह एकशर्करीय में परिवर्तित हो जाते हैं और इस रूप में वह शोषण के योग्य हो जाते हैं। यदि इक्षुशर्करा अधिक मात्रा में ली जाय तो उसका एक अंश रक्त में शोषित हो जाता है, जिसका उत्सर्ग वृक्षों द्वारा होता है और वह मूत्र में प्रकट होता है।

जाती है । इस शर्कराजनक की उत्पत्ति यकृत कोषाणुओं की जीवनी क्रियाओं के कारण होती है । इसके निम्नांकित प्रमाण हैं :—

(१) शाकतत्व बहुल आहार करने पर जब सत्वशर्करा का शोषण होता रहता है तब प्रतीहारी रक्त में वह ०.२ से ०.३ प्रतिशत रहती है जब कि संस्थानिक रक्तप्रवाह में लगभग ०.१ प्रतिशत ही मिलती है । इससे स्पष्ट है कि यकृत में प्रतीहारिणी सिराओं के द्वारा जो रक्त पहुँचता है, उससे कुछ सत्वशर्करा यकृत ग्रथक् कर देती है ।

(२) यकृत में यह विभिन्न परिमाणों में उपस्थित रहता है । उपवास की अवस्था में यह नितान्त अनुपस्थित रहता है तथा शाकतत्व-प्रचुर भोजन के बाद १० से १५ प्रतिशत मिल सकता है । सामान्यतः सत्वशर्करा से दसगुना शर्कराजनक पाया जाता है । पेशियों में भी विश्राम काल में ०.५ से ०.९ प्रतिशत मिलता है, किन्तु सक्षोभ काल में उसका उपयोग हो जाने के कारण वह नहीं मिलता ।

(३) यकृत में जब शुद्ध रक्त की बनी हो जाती है, तब शर्करा जनक की मात्रा भी घट जाती है ।

इस प्रकार शाकतत्वों को आहार में किसी रूप में लेंने पर वह शर्कराजनक के रूप में ही यकृत में परिणत होते और उसी रूप में संचित होते हैं । सत्व शर्करा, फलशर्करा एवं मधुशर्करा से शर्कराजनक बनाने की इस क्रिया को शर्करा-जनकोत्पत्ति (Glycogenesis) कहते हैं । यह समस्त यकृत में ही होती है । इसके अतिरिक्त यकृत ही एक ऐसा अङ्ग है जो आमिषाग्न, ग्लिसरोल तथा यसाम्लों से भी शर्कराजनक का उत्पादन कर सकता है । इसप्रकार से शर्कराजनक की उत्पत्ति को 'नवशर्कराजनकोत्पत्ति' (Glyconeogenesis) कहते हैं ।

शर्कराजनक (Glycogen)

गुणधर्म :—यह एक श्वेत चूर्ण है जिसकी जल में मिलाने पर विच्छिन्न विलयन बनता है । यह ईयर और मद्यसार में आँचलेय है । शाकतत्व-बहुल आहार देने के चार घण्टे बाद एक मारित पशु के यकृत खण्डों को उपयुक्त जल में डालकर इसे प्राप्त किया जा सकता है ।

उत्पत्ति

(क) शाकतत्व से—प्रतीहारी रक्त के द्वारा जो शोषित एक शर्करीय

यकृत कोषाणुओं में पहुँचते हैं, उन्हीं से शर्कराजनक की उत्पत्ति होती है। सभी एक-शर्करीय से सम परिमाण में शर्कराजनक का निर्माण नहीं होता। यह देखा गया है कि सत्त्वशर्करा की अपेक्षा फलशर्करा से इसका निर्माण अधिक मात्रा में होता है। द्विशर्करीय से शर्कराजनक की उत्पत्ति नहीं होती। यदि इक्षुशर्करा का प्रतीहारिणी सिरा में अन्तःश्लेष किया जाय तो वह यकृत से अपरिवर्तित रूप में बाहर चला आता है और उसी रूप में संश्लेषित रक्त में पाया जाता है।

(ख) मांसतत्त्व से—यह देखा गया है कि यदि केवल मांसतत्त्वमय आहार पर किसी को रखा जाय, तब भी उसके यकृत में शर्कराजनक की उपलब्धि होती है। अतः यह सिद्ध है कि मांसतत्त्व से भी शर्कराजनक की उत्पत्ति होती है। यह निम्नप्रकार से होता है:—

(१) कुछ मांसतत्त्व तो स्वयं शाकतत्त्वयुक्त होते हैं, अतः उसी से शर्कराजनक की उत्पत्ति होती है।

(२) अमिषाम्लों से भी इसका निर्माण पर्याप्त मात्रा में होता है।

(ग) स्नेह से—स्नेह से शर्कराजनक की उत्पत्ति नहीं होती, कि भी आहार में स्नेह की मात्रा यदा देने पर यकृत में शर्कराजनक की मात्रा अधिक हो जाती है। इसका कारण शर्कराजनक का अधिक निर्माण नहीं है, बल्कि श्वश्वुपादन का कार्य स्नेह से सम्पन्न हो जाने के कारण शर्कराजनक का व्यय कम होता है। इस प्रकार स्नेह 'शर्कराजनकरचक' (Glycogen-sparer) के रूप में कार्य करता है।

शर्कराजनक का भविष्य

सन् १८५७ में सर्वप्रथम लुडो वनर्ड ने शर्कराजनक का आविष्कार किया और उसने घसलाया कि वह शाकतत्त्व का सञ्चित कोष है जिसका उपयोग शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण शाकतत्त्व शोषित होकर एक-शर्करीय रूप में यकृत में पहुँचते हैं और वहाँ शर्कराजनक (बहुशर्करीय) में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को 'शर्कराजनकोत्पत्ति' कहते हैं। यह यकृत में सञ्चित रहता है और क्रमशः सत्त्वशर्करा में पुनः परिणत होकर संश्लेषित रक्त में प्रविष्ट होता है और उसीके साथ-साथ धातुओं में पहुँचता है। यकृत में स्थित शर्कराजनक का सत्त्वशर्करा में परिणाम

शर्कराजनक-विश्लेषण' (Glycogenolysis) कहलाता है । यह क्रिया एक किण्वतत्त्व के कारण होती है, जिसे 'यकृतशर्करा' या 'शर्कराजनकविश्लेषक' (Liver diastase or Glycogenase) कहते हैं। इस किण्वतत्त्व की क्रिया निम्नलिखित अवस्थाओं में बढ़ जाती है:—

(क) यकृत रक्तसंवहन का अवरोध—

(ख) श्वासावरोध— (ग) तीव्र रक्तस्राव—

इसलिए इन अवस्थाओं रक्त में शर्कराधिक्य (Hyperglycaemia) की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। शर्कराजनक के विश्लेषण की क्रिया पर अधिष्ठक, अवटु और अग्न्याशय के अन्तःस्रावों का भी प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार शर्कराजनक से उत्पन्न सबशर्करा सस्यानिक रक्तसंवहन के द्वारा पेशियों में पहुँच जाती है और वहाँ पेशीगत (Musclic glycogen) के रूप में सञ्चित होती है। पेशियों की क्रिया के समय यह पुनः सबशर्करा में परिणत हो जाता है, ओपजन के साथ संयुक्त होकर ताप और शक्ति उत्पन्न करता है तथा अन्त में कार्बनडाईऑक्साइड और जल में परिणत हो जाता है। इस क्रिया को 'शर्कराविश्लेषण' (Glycolysis) कहते हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण शोषित शक्तित्व शरीर में उपयुक्त नहीं होता, बल्कि उसका एक अंश स्नेह में परिणत हो जाता है। केवल शक्तित्व का आहार करने से यकृत में शर्कराजनक के साथ-साथ स्नेहकण भी सञ्चित होने लगते हैं। इसी कारण प्रारम्भ में पेवी का यह मत था कि सम्पूर्ण शर्कराजनक स्नेह में परिणत हो जाता है। दूसरे पक्षों में, यह समझते थे कि शरीर में ताप और शक्ति स्नेह के द्वारा ही उत्पन्न होती है और शर्करा भी स्नेह में रूपान्तरित होने पर शक्त्युत्पादन में समर्थ होती है।

शक्तित्व के कार्य

- (१) शक्त्युत्पादन इसका मुख्य कार्य है।
- (२) ताप की उत्पत्ति में महत्पूर्ण योग देता है।
- (३) जब शक्तित्व और स्नेह अनुपस्थित रहते हैं, तब मांसतत्त्व का ही उपयोग होता है। अतः यह प्रधान 'मांसतत्त्वचक्र' के रूप में कार्य करता है।
- (४) शर्करायुक्त मांसतत्त्वों के निर्माण में भाग लेता है।
- (५) स्नेह के शक्त्युत्पादन कार्य की सम्पूर्णता के लिए इसकी उपस्थिति

आवश्यक है। इसीलिए यह लोकोक्ति है कि 'रुहेह श्वावसत्त्व की आग में प्रज्वलित होते हैं।'

तालिका

श्वेतसार + लालिक विण्वत्त्व और श्वावसत्त्वविश्लेषक



विलेय श्वेतसार (Erythroextrin)



अर्कद्राक्षीन (Achroodextrin)



मयशर्करा + मयशर्करावर्तक



एक शर्करीय



↓ + मयस्य कोषाण

↓ (२) रुहेह

↓ + जीवाण

(१) शर्कराजनक

+ शर्कराजनकविश्लेषक

सावशर्करा

ग्लिसरिक अल्डीहाइड

मेथिल ग्लायोक्सल

लैक्टिक अम्ल

पिहविक अम्ल

एसिटेलडीहाइड

सिरफाम्ल

एथिल अल्कोहल

↓
कभी

↓
जल

लैक्टिक अम्ल
सिरफाम्ल
म्यूटिरिक अम्ल
सक्सिनिक " "
मद्यसार
 CO_2
जल
 CH_3
हाइड्रोजन

+ अम्लकोषाणपीय शर्कराविश्लेषक क्रियवत्त्व और अशुद्धीन

इक्षुमेह (Glycosuria)

सामान्यतः शरीर के संस्थानिक रक्त में ०.०८ से ०.१ प्रतिशत तक सावशर्करा पाई जाती है जिसका निरन्तर धातुओं द्वारा उपयोग होता है तथा यकृत भी शर्कराजनक को सावशर्करा में परिणत करके निरन्तर इसके परिमाण को बनाये रखता है । मनुष्य में सावशर्करा प्रायः रक्तस तथा रक्तकणों में समान रूप से उपस्थित रहती है । धमनीगत रक्त में सिरागत रक्त की अपेक्षा शर्करा का परिमाण अधिक पाया जाता है, क्योंकि रक्तसंचयन से सावशर्करा की मात्रा धातुओं द्वारा ले ली जाती है और फलतः सिरागत रक्त में उसकी मात्रा कम हो जाती है ।

सामान्यतः रक्त में शर्करा की प्रतिशत मात्रा समान ही रहती है । शर्करा के शोषण-काल में जब रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा प्रविष्ट होती है तब निम्नांकित प्रक्रिया से रक्त की प्रतिशत शर्करा की मात्रा स्थिर रहती है:—

(१) यकृत, पेशियों तथा अन्य धातुओं के द्वारा शर्करा की अधिक मात्रा शर्कराजनक में परिवर्तित हो जाती है ।

(२) शरीर में शर्करा का ओपजनीकरण बढ़ जाता है ।

(३) शर्करा की कुछ मात्रा स्नेह में परिणत हो जाती है ।

(४) मूत्र में शर्करा का उत्सर्ग होने लगता है, इसे 'इक्षुमेह' कहते हैं । प्राकृत रक्त शर्करा ०.१ से ०.१८ प्रतिशत तक बढ़ जाती है जो शर्करा के लिए वृक्षदेहली (Renal threshold) कहलाता है । वृक्षकोपाशु ०.१८ प्रतिशत तक शर्करा को रक्त में रहने देते हैं किन्तु जब शर्करा इससे अधिक हो जाती है तब वह वृक्षकोपाशुओं से निकलने लगती है जिसके फलस्वरूप मधुमेह या इक्षुमेह उत्पन्न हो जाता है ।

इक्षुमेह के प्रकार

इक्षुमेह के निम्नांकित प्रकार हैं:—

(१) आहारज इक्षुमेह:—आहार में शर्करा की अधिक मात्रा लेने से यह अवस्था उत्पन्न होती है । साधारणतः शर्करा शोषित होने पर यकृत में जाकर पूर्णतः शर्कराजनक में परिणत हो जाती है, किन्तु इसकी भी एक सीमा होती है । इससे अधिक शक्तशाल का आहार करने से उसकी कुछ मात्रा शर्करा-

जनक में परिचलित नहीं हो पाती और वह उसी रूप में सस्थानिक रक्त में प्रविष्ट हो जाती है जिससे रक्त में शर्कराधिशय (Hyperglycaemia) की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यह वृद्धदेहली को पारकर मूत्र में निकलने लगती है। यह एक प्राकृतिक अवस्था है जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सततशर्करा का अन्तःक्षेप करने से उत्पन्न की जा सकती है।

शर्करासहिष्णुता-सीमा

यदि किसी व्यक्ति को २०० ग्राम सत्वशर्करा मुख के द्वारा दी जाय तो सम्पूर्ण भाग का सात्मीकरण हो जाता है और मूत्र में शर्करा नहीं पाई जाती। जब ३०० से ५०० ग्राम दिया जाय तब मूत्र में शर्करा प्रकट हो जाती है। यदि सत्वशर्करा १०० ग्राम लेने पर भी मूत्र में शर्करा प्रकट हो जाय, तो उस व्यक्ति की शर्करासहिष्णुता घटी हुई समझनी चाहिये। यह सहिष्णुतासीमा भिन्न-भिन्न शर्कराओं के लिए भिन्न-भिन्न होती है।

(२) याकृत इक्षुमेह—यकृत के कुछ विकारों तथा मधु या स्फुरकविष में शर्करा की सामान्य मात्रा लेने पर भी उसका शर्कराजनक में पूर्ण परिणाम नहीं हो पाता। अतः उसका कुछ अवशिष्ट अंश सस्थानिक रक्त में प्रविष्ट हो जाता है और रक्त में शर्कराधिशय की अवस्था उत्पन्न होकर इक्षुमेह उत्पन्न हो जाता है।

(३) वेधजन्य इक्षुमेह—शर्कराजनक के विश्लेषण का परिमाण एक प्रत्यावर्तन चाप पर निर्भर रहता है जिसका केन्द्र चतुर्थ गुहा के तल में स्थित है। स्वभावतः जब पेशियाँ काम परती रहती हैं तब उनमें स्थित शर्कराजनक का भी उपयोग होता रहता है और उन पेशियों से एक उत्तेजना उपर्युक्त केन्द्र को जाती है। केन्द्र से चालक प्रेरणा यकृत में वृहद् आशयिक नाड़ी के द्वारा जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यकृत में स्थित शर्कराजनक का परिणाम शर्करा में अधिक होने लगता है, जो सस्थानिक रक्त द्वारा पेशियों में पहुँचती है। वृहद् आशयिक नाड़ी के उन पेटानह सूत्रों की शर्कराजनक विश्लेषक सूत्र कहते हैं। अत एव चतुर्थ गुहा के तल में वेधन करने से रक्त में शर्करा का परिणाम बढ़ जाता है और इससे इक्षुमेह उत्पन्न होता है। कन्दाधिक भाग (Hypothalamus) में अभिघात होने से भी इक्षुमेह उत्पन्न होता है। वेधजन्य इक्षुमेह

यकृत में स्थित शर्कराजनक के परिमाण पर निर्भर करता है । उपवास के समय जब यकृत में शर्कराजनक नहीं होता तब वेधजन्य इक्षुमेह की अवस्था उत्पन्न नहीं होती ।

(४) अभिघातज इक्षुमेहः—यह नाड़ीजन्य विकारों के कारण होता है और शिर पर तीव्र अभिघात होने से यह अवस्था उत्पन्न होती है ।

(५) अद्रिनिलीन इक्षुमेहः—यदि एक स्वस्थ व्यक्ति में अद्रिनिलीन का अन्तःक्षेप किया जाय तो अत्यधिक परिमाण में शर्करा मूत्र में आने लगती है । इसका कारण यह है कि अन्तःस्त्राव का प्रभाव बृहद् आशयिक नाडी पर पड़ता है जिससे यकृत के शर्कराजनक का शर्करा में अधिक परिणाम होने लगता है । इसी कारण अधिक मानसिक परिश्रम या चिन्ता करने वाले व्यक्ति इक्षुमेह से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि मानसिक परिश्रम या चिन्ता से अद्रिनिलीन का स्त्राव बढ़ जाता है । इसी प्रकार पोषणक या अवदुग्धप्रन्थि के अन्तःस्त्राव का निक्षेप करने से भी यह अवस्था उत्पन्न होती है ।

(६) आवेशजन्य इक्षुमेहः—अत्यधिक भावावेश के कारण भी इक्षुमेह उत्पन्न हो जाता है । इसका कारण यह है कि भावावेश से अद्रिनिलीन का स्त्राव बढ़ जाता है और उससे उपर्युक्त प्रकार में वर्णित क्रम से मूत्र में शर्करा आने लगती है । तीव्र वृक्कशूल से पीड़ित व्यक्ति में २० प्रतिशत तक शर्करा मूत्र में पाई गई है जो पीड़ा की शान्ति के बाद लुप्त हो जाती है ।

(७) अग्न्याशयिक इक्षुमेहः—आहार में शर्करा उचित परिमाण में लेने पर तथा यकृत में शर्कराजनक-विश्लेषण समुचित रूप से होने पर भी यदि अग्न्याशय का ओपजनीकरण पाचकतत्त्व, अंशुलीन, उत्पन्न नहीं होता, फलतः धातुओं में उपस्थित नहीं रहता, तब धातुओं में शर्करा का समुचित रूप से ओपजनीकरण नहीं होता और इस प्रकार अपरिणत शर्करा मूत्र में आने लगती है । प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि यदि किसी प्राणी के शरीर से अग्न्याशय प्रन्थि निकाल दी जाय तो उसे अत्यन्त भयानक और घातक प्रकार का इक्षुमेह उत्पन्न हो जाता है, जो अंशुलीन का अन्तःक्षेप करने से बहुत ठीक हो जाता है । इसके साथ साथ स्नेह का भी समुचित सामोदरण नहीं हो पाता जिससे उसके अपूर्ण ओपजनीकरण से उत्पन्न द्रव्य, मुख्यतः एसिटोन और एसिटोएसिटिक अम्ल रक्त तथा मूत्र में पाये जाते हैं ।

स्नेहः—उपवासकाल में शर्करा उपयुक्त हो जाने पर शक्ति के साधन केवल स्नेह और धातुगत मांसतत्त्व ही अवशिष्ट रह जाते हैं, किन्तु इनमें भी स्नेह का ही पहले उपयोग होता है। मेदस धातु का स्नेह पहले यकृत में जाना है, जहाँ वह विसन्तुप्त हो कर लेसिथिन में परिणत हो जाता है और वहाँ से फिर धातु कोषाणुओं में ओषजनी करण के लिए जाता है। रक्त में वर्तमान स्नेह का भाग परिवर्तित नहीं होता और बहुत दिनों तक उसी स्थिति में रहता है। असनाङ्क प्रथम दो दिनों तक प्रायः ०.९३ रहता है, किन्तु बाद में घट कर ०.७५ हो जाता है और वह ही बना रहता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्नेह शक्त्युपादन के मुख्य साधन हैं। कुछ समय बाद शाक्तत्व के अभाव से स्नेह का ज्वलन पूर्णरूप से नहीं होता। अतः एसिटो-एसिटिक अम्ल तथा ऑक्सिब्यूटिरिक अम्ल बनने लगते हैं और मूत्र के साथ बाहर निकलते हैं। आम्लिकता की इस वृद्धि के निराकरण के लिए शरीर में निम्नोक्त क्रियायें होती हैंः—

(१) बाइकार्बोनेट लवणों का आधिक्य

(२) फुफुसीय व्यजन की वृद्धि तथा वायु कोषों में कार्बन डाइऑक्साइड के भार की कमी

(३) मूत्र में अम्लता की वृद्धि

(४) अमोनिया के उत्सर्ग की वृद्धि

मांसतत्त्वः—धातुगत मांसतत्त्वों का विश्लेषण होने लगता है और विश्लेषित हो कर वह सत्त्वशर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके दो प्रयोजन होते हैं—एक तो यह रक्तशर्करा को प्राकृत स्तर पर स्थिर रखता है और दूसरे इससे स्नेह का ज्वलन पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रथम अवस्था में धातुगत मांसतत्त्व आमिपाम्लों में विश्लेषित हो जाते हैं, जो यकृत में चले जाते हैं। वहाँ उनका निरामीकरण होता है और इस प्रकार अमोनिया शर्करा और एसिटोन द्रव्यों में परिणत हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि मूत्रपथ यूरेिया धातुगत मांसतत्त्वों के शरीर उपयोग का सङ्केत है।

आहार में मांसतत्त्वों की कमी होने से जिस प्रकार नम्रजन का उत्सर्ग कम हो जाता है, उसी प्रकार उपवासकाल में भी वह घट जाता है और दिनानुदिन घटता ही जाता है, जो एक सीमा पर आकर कुछ दिनों तक स्थिर हो जाता

(८) वृक्कजन्य इक्षुमेहः—इस अवस्था में वृक्कदेहली कम हो जाती है जिससे रक्त में शर्करा का परिमाण अल्प रहने पर भी उसका उत्सर्ग पृष्कों द्वारा होने लगता है। यही परिणाम प्राणी को फेलोरिजिन नामक द्रव्य देने पर भी दृष्टिगोचर होता है। इसके कारण निम्नांकित प्रतीत होते हैंः—

(क) रक्तस में विद्यमान शर्करा के लिए पृष्कों की प्रवेश्यता बढ़ जाती है।

(ख) रक्तस की शर्करा में परिवर्तन जिससे वह वृष्कों के द्वारा आसानी से निकल जाती है।

(ग) आन्त्रों से शर्करा के शोषण तथा पृष्क की नलिकाओं से उसके पुनः शोषण में बाधा होती है।

(९) गर्भावस्थिक इक्षुमेहः—मासः १०-१५ प्रतिशत सगर्भा स्त्रियों में इक्षुमेह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसमें रक्त में शर्करा का आधिष्य नहीं होता अतः वृक्कदेहली कम होने से ही यह अवस्था होती है। यह अवस्था प्रथम गर्भ में तथा गर्भावस्था के पिछ्ने महीनों में अधिक देखी जाती है, अतः इसका कारण पोषणक खाद्य की वृद्धि समझा जाता है, जिससे अंशुलीन की क्रिया का विशेषी प्रभाव पड़ता है।

उपवासकाल में सात्मीकरण

अनेक प्राणियों में उपवास के प्रभावों का निरीक्षण किया गया है और यह देखा गया है कि मनुष्य ५० दिनों तक बिना आहार के रह सकता है। इस अवस्था में उसके शरीर के अपने धातुगत मांसतत्त्व, सञ्चित स्नेह और शर्कराजनक ही आहार का कार्य करते हैं और उन्हीं पर उसकी शरीर यात्रा चलती रहती है।

‘आहारं पचति शिखी धातुआहारवर्जितः पचति ।’

शर्कराजनकः—सर्व प्रथम यकृत में स्थित शर्कराजनक उपयोग में आता है, किन्तु यह थोड़ा मात्रा में होने के कारण विशेष महत्त्व का नहीं होता। यद्यपि यह शीघ्रता से कार्य में आने लगता है, तथापि यह पूर्णतः लुप्त नहीं होता। हृदय और पेशियों में विद्यमान शर्कराजनक का अधिक परिणाम नहीं होता। इस प्रकार पहले तो रक्त शर्करा घट जाती है, किन्तु बाद में यह बढ़ जाती है, क्योंकि स्नेह का भी परिणाम शर्करा में होने लगता है।

स्नेहः—उपवासकाल में शर्करा उपयुक्त हो जाने पर शक्ति के साधन केवल स्नेह और धातुगत मांसतत्त्व ही अवशिष्ट रह जाते हैं, किन्तु इनमें भी स्नेह का ही पहले उपयोग होता है। मेदस धातु का स्नेह पहले यकृत में जाता है, जहाँ वह विसन्तृप्त हो कर लेसिथिन में परिणत हो जाता है और वहाँ से फिर धातु कोषाणुओं में ओषजनी करण के लिए जाता है। रक्त में वर्तमान स्नेह का भाग परिवर्तित नहीं होता और बहुत दिनों तक उसी स्थिति में रहता है। असनाहू प्रथम दो दिनों तक प्रायः ०.०२ रहता है, किन्तु बाद में घट कर ०.०५ हो जाता है और वह ही बना रहता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्नेह शक्त्युपादन के मुख्य साधन है। कुछ समय बाद शाकतत्त्व के अभाव से स्नेह का ज्वलन पूर्णरूप से नहीं होता। अतः एसिटो-एसिटिक अम्ल तथा ऑक्सिब्यूटिरिक अम्ल बनने लगते हैं और मूत्र के साथ बाहर निकलते हैं। आम्लिकता की इस वृद्धि के निराकरण के लिए शरीर में निम्नीकित क्रियायें होती हैंः—

(१) बाइकार्बोनेट द्रव्यों का आधिक्य

(२) कुकुबीय व्यजन की वृद्धि तथा वायु कोशों में कार्बन डाइऑक्साइड के भार की कमी

(३) मूत्र में अम्लता की वृद्धि

(४) अमोनिया के उत्सर्ग की वृद्धि

मांसतत्त्वः—धातुगत मांसतत्त्वों का विरलेपण होने लगता है और विरलेपित हो कर वह सत्वशर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके दो प्रयोजन होते हैं—एक तो यह रक्तशर्करा को प्राकृत स्तर पर स्थिर रखता है और दूसरे इससे स्नेह का ज्वलन पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रथम अवस्था में धातुगत मांसतत्त्व आमियाओं में विरलेपित हो जाते हैं, जो यकृत में चले जाते हैं। वहाँ उनका निरामीकरण होता है और इस प्रकार अमोनिया शर्करा और एसिटोय द्रव्यों में परिणत हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि मूत्रगत यूरिया धातुगत मांसतत्त्वों के शरीर उपयोग का सकेत है।

आहार में मांसतत्त्वों की कमी होने से जिस प्रकार नम्रजन का उत्सर्ग कम हो जाता है, उसी प्रकार उपवासकाल में भी वह घट जाता है और दिनानुदिन घटता ही जाता है, जो एक सीमा पर आकर कुछ दिनों तक स्थिर हो जाता

है। जब शरीर का सारा स्नेह उपयुक्त हो चुकता है, तब धातुगत मांसतत्वों पर अधिक भार आ जाता है और नग्नजन का उत्सर्ग पुनः बढ़ जाता है। इसे 'मृत्यु-पूर्व घृद्धि' कहते हैं। अन्त में, मृत्यु के लक्षणों का प्रारम्भ होने पर यह एक दम कम हो जाता है, जिसका प्रधान कारण वृक्कों का कार्यावरोध है।

साल्मीकरण का प्रम लगभग २० प्रतिशत कम हो जाता है। यह देखा गया है कि प्रायः ७१ ग्राम मांसतत्व और १९० ग्राम स्नेह प्रतिदिन नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त प्रायः २५० घनसेंटीमीटर जल तथा ९ ग्राम लवणों का भी विनाश होता है। धातुओं का क्षय उनके महत्व के विपर्यस्त अनुपात में होता है यथा—

केन्द्रीय नाड़ी मण्डल	३ प्रतिशत
हृदय	" "
पेशियाँ	३० "
यकृत	५४ "
वृक्क	२६ "
स्नेह	९७ "

प्रथम दस दिनों में रोगी का भार अधिक और अचानक घटता है, किन्तु बाद में मन्द गति से क्रमशः नीचे उतरता है। जब स्नेह का कोष रिक्त हो जाता है, तब मृत्यु हो जाती है। यह प्रायः उपवास के चौथे सप्ताह में होता है, जब शरीर भार आधा हो जाता है।

उपवास काल में श्वसन प्रम और आयतन में घट जाता है, किन्तु तापक्रम साधारण ही रहता है। पेशीशक्ति तथा सहिष्णुता प्रायः प्रथम १०-१५ दिनों तक बढ़ती है, किन्तु इसके बाद पेशीयल का ह्रास होने लगता है और क्षीय ही पेशी श्रम का प्रारम्भ हो जाता है।

अम्लभाव, कटुभाव और क्षारभाव (Acidosis, ketosis and alkalosis)

अम्लभाव ऐसी विकृत अवस्था है जो शरीर में लैक्टिक एसिड या क्षार का जमा होने से उत्पन्न होती है तथा क्षार मात्र ऐसी विकृत अवस्था है जो क्षार के

सञ्चय या अम्ल के संचय होने से उत्पन्न होती है। पहले 'अम्लभाव' शब्द से ऐसी अवस्था का बोध होता था जिसमें शरीर में स्नेह के अपूर्ण ओपजनीकरण के कारण रक्त और मूत्र में एसिटोन द्रव्य पाये जाते थे। एसिटोन द्रव्य निम्नांकित हैं:—

(१) हाइड्राक्सि-ब्यूटिरिक अम्ल $\text{CH}_3 \text{CHOH} \cdot \text{CH}_2 \text{COOH}$.

(२) एसिटोएसिटिक अम्ल $\text{CH}_3\text{CO} \cdot \text{CH}_2 \text{COOH}$.

(३) एसिटोन $\text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3$

एसिटोएसिटिक अम्ल तथा एसिटोन कटुद्रव्य हैं और उनके ओपजनीकरण में जब शरीर असमर्थ हो जाता है, तब मूत्र में पाये जाते हैं। ये द्रव्य बिप के समान कार्य करते हैं और श्वसन केन्द्र को अत्यधिक उत्तेजित कर गम्भीर श्वसन उत्पन्न कर देते हैं। साथ ही उच्च केन्द्रों को अप्रसादित करने से संज्ञानाश भी हो जाता है। अतः ऐसी अवस्था को अम्लभाव न कह कर यथार्थतः कटुभाव कहा जा सकता है। एक विद्वान् ने लिखा है:—

'स्नेह बाह्यत्व की आग में प्रज्वलित होते हैं और कटुभाव सात्मीकरण की अग्नि का धूम है।'

इस प्रकार रक्त में कटुद्रव्यों के सञ्चय को कटुभाव कहते हैं और मूत्र में इन द्रव्यों के अधिक उत्सर्ग को कटुमूत्रता कहते हैं।

यह कमी नहीं समझना चाहिये कि रक्त की प्रतिक्रिया सदैव चारीय से आम्लिक में परिवर्तित होती रहती है। यह नितांत असम्भव है, क्योंकि यदि रक्त अम्लप्रतिक्रिया का हो जाय तो जीवन स्थिर रहना ही कठिन है। अतः अम्लभाव का अभिप्राय यही है कि रक्त प्राकृत की अपेक्षा कम चारीय हो गया है तथा चारभाव का अर्थ यह है कि रक्त प्राकृत की अपेक्षा अधिक चारीय हो गया है।

अम्लभाव निम्नांकित अवस्थाओं में हो सकता है:—

(क) शरीर में अम्लों की अधिक उत्पत्ति—यथा

(१) कुछ सात्मीकरण के विकार यथा मधुमेह

(२) व्यायाम के समय उत्पन्न लैक्टिक अम्ल का सञ्चय

(ख) उत्पन्न अम्लों का उत्सर्ग समुचित रूप से न होना

है। जब शरीर का सारा स्नेह उपयुक्त हो चुकता है, तब धातुगत मांसतत्त्वों पर अधिक भार आ जाता है और नम्रजन का उत्सर्ग पुनः बढ़ जाता है। इसे 'मृत्यु-पूर्व घृद्धि' कहते हैं। अन्त में, मृत्यु के लक्षणों का प्रारम्भ होने पर यह एक दम बम हो जाता है, जिसका प्रधान कारण वृद्धों का कार्यावरोध है।

सार्मीकरण का क्रम लगभग २० प्रतिशत कम हो जाता है। यह देखा गया है कि प्रायः ७१ ग्राम मांसतत्त्व और १९० ग्राम स्नेह प्रतिदिन नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त प्रायः २५० घनसेंटीमीटर जल तथा ९ ग्राम लवणों का भी विनाश होता है। धातुओं का क्षय उनके महस्र के विपर्यस्त अनुपात में होता है यथा—

पेन्ट्रीम नादी मण्डल	३ प्रतिशत
हृदय	" "
पेशियाँ	३० "
यकृत	५४ "
शुक्ल	२६ "
स्नेह	९७ "

प्रथम दस दिनों में रोगी का भार अधिक और अचानक घटता है, किन्तु बाद में मन्द गति से क्रमशः नीचे उतरता है। जब स्नेह का कोष रिक्त हो जाता है, तब मृत्यु हो जाती है। यह प्रायः उपवास के चौथे सप्ताह में होता है, जब शरीर भार आधा हो जाता है।

उपवास काल में श्वसन क्रम और आयतन में घट जाता है, किन्तु तापक्रम साधारण ही रहता है। पेशीरक्ति तथा सहिष्णुता प्रायः प्रथम १०-१५ दिनों तक बढ़ती है, किन्तु इसके बाद पेशीबल का हास होने लगता है और शीघ्र ही पेशी श्रम का प्रारम्भ हो जाता है।

अम्लभाव, कटुभाव और चारमाव (Acidosis, ketosis and alkalosis)

अम्लभाव ऐसी विकृत अवस्था है जो शरीर में अम्ल का सञ्चय या चार का चय होने से उत्पन्न होती है तथा चार भाव ऐसी विकृत अवस्था है जो चार के

सञ्चय या अम्ल के क्षय होने से उत्पन्न होती है। पहले 'अम्लभाव' शब्द से ऐसी अवस्था का बोध होता था जिसमें शरीर में स्नेह के अपूर्ण ओपजनीकरण के कारण रक्त और मूत्र में एसिटोन द्रव्य पाये जाते थे। एसिटोन द्रव्य निम्ना-
द्धित है:—

(१) हाइड्राक्सि-ब्यूटिरिक अम्ल $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2\text{OH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{COOH}$.

(२) एसिटोएसिटिक अम्ल $\text{CH}_3\text{CO} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{COOH}$.

(३) एसिटोन $\text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3$

एसिटोएसिटिक अम्ल तथा एसिटोन कटुद्रव्य हैं और उनके ओपजनीकरण में जब शरीर असमर्थ हो जाता है, तब मूत्र में पाये जाते हैं। ये द्रव्य विर के समान कार्य करते हैं और श्वसन केन्द्र को अत्यधिक उत्तेजित कर गम्भीर श्वसन उत्पन्न कर देते हैं। साथ ही उच्च केन्द्रों को असादित करने से सज्जानाश भी हो जाता है। अतः ऐसी अवस्था को अम्लभाव न कह कर यथार्थतः कटुभाव कहा जा सकता है। एक विद्वान् ने लिखा है:—

'स्नेह शाश्वतत्व की भाग में प्रज्वलित होते हैं और कटुभाव सारणीकरण की अग्नि का धूम है।'

इस प्रकार रक्त में कटुद्रव्यों के सञ्चय को कटुभाव कहते हैं और मूत्र में इन द्रव्यों के अधिक उत्सर्ग को कटुमूत्रता कहते हैं।

यह कभी नहीं समझना चाहिये कि रक्त की प्रतिक्रिया सदैव चारीय से आंग्लिक में परिवर्तित होती रहती है। यह नितान्त असम्भव है, क्योंकि यदि रक्त अम्लप्रतिक्रिया का हो जाय तो जीवन स्थिर रहना ही कठिन है। अतः अम्लभाव का अभिप्राय यही है कि रक्त प्राकृत की अपेक्षा कम चारीय हो गया है तथा चारभाव का अर्थ यह है कि रक्त प्राकृत की अपेक्षा अधिक चारीय हो गया है।

अम्लभाव निम्नाद्धित अवस्थाओं में हो सकता है:—

(क) शरीर में अम्लों की अधिक उत्पत्ति—यथा

(१) कुछ सारणीकरण के विकार यथा मधुमेह

(२) व्यायाम के समय उत्पन्न लैक्टिक अम्ल का सञ्चय

(ख) उत्पन्न अम्लों का उत्सर्ग समुचित रूप से न होना

(ग) शरीर से अत्यधिक चार का क्षय यथा वृद्धशोथ या अतिसार

रक्त और सजीवधातु सदा क्षारीय रहते हैं। रक्त की प्राकृत क्षारीयता ७.३४

(सिरारक्त) ७.३३ (धमनीरक्त) मुख्यतः रक्त में उपस्थित बाइकार्बोनेट लवणों के कारण रहती है। प्राकृतिक क्षारीयता कम होने पर अम्लभाव के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं:—

अवसाद, हृष्टास, अप्रिमान्ध, शिरःशूल, अनिद्रा, अम्लमूत्र, आम्लाशय में अम्लाधिक्य तथा वित्तप्रकोप के अन्य लक्षण ।

शरीर में कुछ ऐसी क्रियायें हैं जो अम्लभाव तथा क्षारभाव के विरुद्ध शरीर की रक्षा करती हैं तथा उसकी प्रतिक्रिया सामान्य स्तर पर रखती हैं। वह क्रियायें निम्नलिखित हैं:—

(१) श्वसनकर्म

(३) रक्त में रक्त पदार्थों की क्रिया

(२) पुष्ककर्म

(४) प्राकृतिक अम्लक्षार-समीकरण

(१) श्वसनकर्म—निम्नाङ्कित कारणों से रक्त की क्षारीयता कम हो जाती है:—

(क) अग्न्याशयिक क्षारीयरस के खावकाल में (ख) अम्ल आहार

(ग) मांसाहार (घ) अम्लभस्माहार

उपर्युक्त कारणों से अम्लभाव की वृद्धि होने से श्वसन क्रिया उत्तेजित हो जाती है और श्वास अधिक तेजी से आने लगता है। इससे वायुकोषों में कओ^२ का भार कम हो जाता है, फलतः धमनीगत रक्त में भी उसका भार कम हो जाता है और आम्लिकता का निराकरण हो जाता है।

इसके विपरीत, निम्नलिखित अवस्थाओं में रक्त की क्षारीयता बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है:—

(क) आम्लाशयिक अम्ल के खाव काल में

(ग) शाकाहार

(ख) क्षारीय कार्बोनेट का आहार

(घ) क्षारभस्माहार

क्षारीयता की वृद्धि होने से श्वसनकेन्द्र की क्रिया अवसादित हो जाती है।

फलतः वायुकोषगत का कओ^२ भार बढ़ जाता है और धमनीगत रक्त में कओ^२ अधिक हो जाता है। फलस्वरूप उद्गम केन्द्री भवन बढ़ जाता है और इस प्रकार क्षारीयता का निराकरण होता है।

(२) वृक्कर्मः—वृक्क प्राकृत क्षारीयता को बनाये रखने में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से रक्त की क्षारीयता बढ़ जाती है, किन्तु उसी समय वृक्क अधिक मात्रा में चार को बाहर निकाल देता है और क्षारीय कोष में कमी हो जाती है। जिस प्रकार कजोर का आधिक्य श्वसनकर्म को उत्तेजित करता है, उसी प्रकार चार की वृद्धि वृक्कों को क्रियाशील बना देती है। इस प्रकार वृक्क रक्त की प्राकृत क्षारीयता को स्थिर रखने में सहायक होते हैं।

स्वभावतः मूत्र की प्रतिक्रिया अम्ल होती है क्योंकि मूत्र में चारद्रव्यों की अपेक्षा अम्लपदार्थों का उत्सर्ग अधिक होता है। निम्नलिखित तीन कारण प्राकृत मूत्र को अम्ल रखने में सहयोग देते हैं :—

- (१) स्वाभाविक द्विधार्मिक फास्फेट का एक-धार्मिक फास्फेट में परिवर्तन
- (२) सेन्द्रिय अम्ल का उसीरूप में मूत्र में उत्सर्ग
- (३) वृक्कों में अमोनिया बनाने की क्षमता।

जब कभी अम्लभाव होता है वृक्कों द्वारा अमोनिया अधिक परिमाण में बनने लगता है जो अम्लों के साथ संयुक्त होकर अमोनिया के लवण बनाता है और मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है।


(३) रक्त में चाररक्षक (Buffer) पदार्थों की उपस्थिति :—चाररक्षक वह पदार्थ हैं जो किसी विलयन से उद्जन या उद्जोनिपल अणुओं को निकाल लेते हैं और उनसे मिलकर ऐसे यौगिक बनाते हैं, जिससे उद्जन केन्द्रीभवन में कोई अन्तर नहीं आता। इस प्रकार इन पदार्थों की क्रिया उद्जनकेन्द्रीभवन में परिवर्तन का प्रतिरोधकरूप है। यदि ये पदार्थ शरीर में नहीं होते, तो रक्त में उपस्थित कजोर या कार्बोनेट लवणों के द्वारा अम्लभाव या क्षार भाव इतना अधिक हो जाता कि जीवन यात्रा असम्भव हो जाती। रक्त में उपस्थित निम्नाङ्कित पदार्थ चाररक्षक के रूप में कार्य करते हैं :—

- (१) सोडियम बाइकार्बोनेट (NaHCO_3)
- (२) सोडियम फास्फेट (Na_2HPO_4)
- (३) सोडियम एसिड फास्फेट (NaH_2PO_4)

(४) रक्तजलक या अन्य मांसतत्त्व (आम्लिक मांसतत्त्व या क्षारीय मांसतत्त्व)—

शरीर का क्षारकोष (Alkali Reserve)

सभी स्थिर अम्लों को उदासीन करने, के बाद अवशिष्ट क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है। इसका उपयोग रक्त द्वारा अम्लाधिक्य को उदासीन करने में होता है। अतः स्वाभाविक अवस्था में रक्तस में सोडियम बाइकार्बोनेट का परिमाण स्थिर रहता है और यह प्रतिक्रिया-रचक पदार्थ या शरीर के क्षारकोष के रूप में कार्य करता है। इसकी क्रिया निम्नांकित रीति से होती है:—



इस प्रकार उत्पन्न सैन्धवलवण वृक्ष के द्वारा तथा CO_2 फुफुस के द्वारा उत्सृष्ट होता है।

जब कभी शरीर में अम्लभाव होता है, बाइकार्बोनेट लवण अम्लाधिक्य से संयुक्त होकर अम्लभाव का निराकरण करते हैं। इसलिए रक्तस में उनकी मात्रा कम हो जाती है। इसी कारण एक विद्वान् ने अम्लभाव की परिमाणा निम्नांकित रूप से दी है:—

‘अम्लभाव वह अवस्था है जिसमें रक्त में बाइकार्बोनेट की कमी हो जाती है।’

इसके विपरीत, जब शरीर से अम्ल का क्षय होता है, तब रक्त में बाइकार्बोनेट लवणों का आधिक्य हो जाता है और क्षारभाव की अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसका निराकरण निम्नप्रकार से होता है:—

(१) वृक्षों से क्षार का अधिक उत्सर्ग

(२) फुफुसीय व्यजन में कमी

उपर्युक्त रीति से शरीर का क्षारकोष समावस्था में रहता है।

इसी प्रकार सोडियम फास्फेट की क्रिया भी प्रतिक्रिया-रचक के रूप में होती है। रक्तजलक तथा रक्त के अन्य मांसतत्त्व भी इसमें सहायता करते हैं,

क्योंकि उनमें अम्ल और चार के साथ संयुक्त होकर लक्षण बनाने की शक्ति रहती है । इनमें भी रक्तस्राव की क्रिया सर्वोत्तम होती है और वह दो प्रकार से कार्य करता है :—

(क) वह अधिक परिमाण में चार उत्पन्न करता है ।

(ख) वह छोराइड को रक्तस्राव से रक्तकों की ओर आकर्षित करता है और इस प्रकार अधिक याइकार्बोनेट बनता है ।

शरीर के धातुओं में भी कुछ सीमा तक यह शक्ति होती है । यकृत में यह शक्ति अधिक होती है जिससे वह कैल्शियम अम्ल को शोषित कर उसे शर्कराजनक में परिणत कर देता है और इस प्रकार रक्त की प्रतिक्रिया को बनाये रखने में सहायक होता है ।

चार और अम्ल आहार का सन्तुलन

(प्राकृतिक अम्लचार-समीकरण)

स्वभावतः शरीर में शर्करा, स्नेह और मांसतन्त्रों के उपयोगकाल में कभी उत्पन्न होता है जिसका उत्सर्ग श्वसन के द्वारा हो जाता है और इसलिए शरीर के क्षारकोष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । श्वसनक्रम में बाधा होने से, यथा न्यूमोनिया में, या स्वाभाविक रक्तप्रवाह में बाधा होने से जब कि अशुद्ध रक्त का फुफुसों में समुचित संश्लेषण नहीं होता, अम्लभाव उत्पन्न होता है ।

पद्यपि आहार के प्राकृत सामीकरण के मुख्य परिणत पदार्थ कभी जल और यूरिया हैं तथापि कुछ निरिन्द्रिय अवयवों के भी अवशेष रह जाते हैं और सभी आहारद्रव्य ओपजनीकरण के बाद कुछ भस्म उत्पन्न करते हैं, जो स्वभावतः वृक्क द्वारा उत्सृष्ट होता है । यदि वृक्कों की क्रिया ठीक न हो या अम्लबहुल आहार का सेवन किया जाय, तो शरीर की प्राकृतिक क्षारीयता कम हो जायगी और अम्लभाव उत्पन्न हो जायगा । अम्ल आहार क्षार आहार के द्वारा ही उदासीन होता है, अतः मूत्र में अम्ल का आधिक्य यह सूचित करता है कि या तो अम्लआहार अधिक किया गया है या क्षार आहार की कमी की गई है ।

निम्न तालिका में कुछ सामान्य आहार द्रव्यों की आम्लिकता या क्षारीयता का निर्देश किया गया है ।

तालिका

अम्ल आहार

प्रति १०० ग्राम में अम्ल का परिमाण
रोटी—७.१ सी. सी.
अण्डे—१२.५
अण्डे का श्वेत—६.३
” ” पीत—३२.०
मछली—१५.०
मांस—१०.०
चावल—८.१

उदासीन आहार

मसखन, प्याज
शर्करा, वनस्पति तैल
मोम, मलाई

क्षार आहार

प्रति १०० ग्राम में क्षार का परिमाण
बादाम—११.३ सी. सी.
सेब—३.४
केला—८.४
सेम—११.७
पातगोभी—४.३
फूलगोभी—५.३
नींबू—५.५
सन्तरा—६.१
आलू—८.२
मटर—३.७
मेवा—२३.७
गाजर—१०.८

यह आश्चर्य का विषय है कि नींबू, सन्तरा आदि अम्ल फल अम्लभाव को रोकते हैं और रोटी, अण्डे और चावल अम्लभाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार आहार में फलों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वह केवल खनिज लवण और जीवनीयद्रव्य ही शरीर को नहीं प्रदान करते, बल्कि वह अम्लआहार के कारण प्रादुर्भूत अम्लभाव को उदासीन करने में भी उपयोगी होते हैं।

सारांश—अम्लभाव या कटुभाव निम्न कारणों से उत्पन्न होता है:—

(क) शरीर में अम्लों या कटु पदार्थों की अधिक उत्पत्ति:—

- (१) स्नेह का अपूर्ण ओपजनीकरण—फलतः एसिटोन द्रव्यों की उत्पत्ति
- (२) शक्तियों का अभाव और स्नेह का अत्यधिक उपयोग
- (ख) शरीर में उत्पन्न अम्लों का समुचित निर्हरण न होना:—

(१) वृक्कों का कार्य ठीक न होना और श्फाकाम्ल का समुचित निर्हरण न होना।

(२) वृक्कों में विकृति के कारण अमोनिया के

(३) रक्तसंवहन का क्षीण होना, यथा हृदयरोग में, जिससे फुफुसों में रक्त समुचित परिमाण में नहीं जाता और कथो^१ का निहरण भी पूर्ण नहीं होता ।

(४) फुफुस के रोग यथा वायुकोष विस्तृति—

उदजन-केन्द्रीभवन (Hydrogention-Concentration)

रासायनिक विश्लेषण में किसी विलयन की आम्लिकता या क्षारीयता उस विलयन के १ लिटर में विलीन द्रव्य के ग्राम-अणुओं की संख्या के अनुसार अभिव्यक्त की जाती है । एक प्राकृत $\frac{\text{ग्रा}}{१}$ विलयन में द्रव्य का अणुमार होता है अर्थात् उसके १००० सी. सी. में एक ग्राम उदजन होता है ।

धातुनिक विचार के अनुसार विलयन की क्षारीयता या आम्लिकता उसमें विलीन अम्ल या क्षार पदार्थ के परिमाण के कारण नहीं होती, बल्कि इन द्रव्यों के विश्लेषण से उत्पन्न उदजन अणुओं तथा उदोपित् अणुओं की संख्या के अनुसार होती है । कोई अम्ल जब जल में मिलाया जाता है तब यह पूर्णतः अणुओं के रूप में नहीं रहता, बल्कि इसके कुछ अणु विश्लेषित होकर धन उदजन अणुओं तथा ऋण उदोपित् अणुओं में परिणत हो जाते हैं । जब उदजन अणुओं की अधिकता होती है तब विलयन को अम्ल तथा उदोपित् अणुओं का आधिक्य होने से विलयन को क्षारीय कहते हैं । जब शुद्ध जल के समान उसमें दोनों अणुओं की संख्या समान हो तब वह उदासीन कहलाता है ।

अतः १००० सी. सी. विलयन में विलीन उदजन के ग्राम-अणुओं की संख्या उस विलयन का उदजन-केन्द्रीभवन कहलाता है ।

१ लिटर शुद्ध जल में उदजन अणु $\frac{१०००००००००}{१०००००००००}$ अर्थात् $\frac{१०}{१०००००००००}$ ग्राम होते हैं । चूँकि उदासीन विलयन में उदोपित् अणुओं की संख्या भी उदजन अणुओं के समान ही होती है, अतः शुद्ध जल में उदोपित् अणुओं की संख्या भी $\frac{१०}{१०००००००००}$ होती है । यह ध्यान में रखना चाहिये कि भौतिक नियम के अनुसार एक निश्चित तापक्रम पर किसी विलयन में उदजन तथा उदोपित् अणुओं की संख्या समान है ।

इस प्रकार विलयन चाहे अम्ल हो या क्षारीय, उदजन केन्द्रीभवन \times उदोपित् केन्द्रीभवन = १०-१४ होता है । उदाहरणतः, यदि किसी विलयन का

उदजन केन्द्रीभवन १०-५ है तो उसका उद्घोषित अणु केन्द्रीभवन १०-९ होगा। इसलिये व्यवहारतः आम्लिकता या क्षारीयता की मात्रा उदजन केन्द्रीभवन से ही अभिव्यक्त की जाती है। दूसरी बात यह है कि उसके निर्देशक अङ्क में से १० और ऋण का चिह्न हटा दिया जाता है और अवशिष्ट अङ्क को विलयन का उद कहते हैं।

उदासीन विलयनों का उद ७ है। अम्ल विलयनों का उद ७ से कम तथा क्षारीय विलयनों का ७ से अधिक है। इस प्रकार अत्यधिक अम्ल विलयनों का उद लगभग ० तथा अत्यधिक क्षारीय विलयनों का कुछ लगभग १४ होता है।

उदाहरण:—

(१) शुद्ध जल का उद ७

(२) सोडियम हाइड्रोक्साइड का उद १३.२

(३) उदहरिताम्ल का उद १

चार या अम्ल की तीव्रता उसके विरलेपण पर निर्भर करता है। यदि विरलेपण पूर्ण हुआ तब यह तीव्र अन्यथा दुर्बल कहा जाता है। कुछ अम्लों एवं क्षारों के विरलेपण का परिमाण प्रतिशत में नीचे दिया जाता है:—

उदहरिताम्ल	९१.०
औइनेलिक अम्ल	५०.०
सिरकाम्ल	१.३४
कार्बनिक अम्ल	०.१७
सोडियम हाइड्रोक्साइड	९१.०७
पोटाशियम	९१.०
अमोनियम	०.४

उदजन-केन्द्रीभवन का मापन

किसी विलयन का उद निश्चित करने के लिए दो विधियाँ उपयुक्त होती हैं:—

(१) विद्युन्मापक विधि (Electrometric Method)

(२) वर्णमापक विधि (Colourimetric Method)

विद्युन्मापक विधि से विश्लेषित अणुओं की घन और ऋण विद्युत् वं आधार पर संख्या निश्चित की जाती है और इस प्रकार घन विद्युत् की अधिकता में अम्ल तथा ऋण विद्युत् के आधिक्य में क्षार का परिज्ञान होता है।

वर्णमापकविधि में विलयन के वर्णपरिवर्तन के अनुसार उद का निश्चय होता है । यथा लिटमसपत्र उद ७ के दृढ़ासीन विलयनों में बैंगनी रंग का होता है और ७ से कम होने पर लाल तथा अधिक होने पर नीला हो जाता है । यद्यपि इसके द्वारा सामान्यतः अम्ल और क्षार की प्रतीति हो जाती है तथापि ठीक ठीक उसका निर्णय नहीं हो पाता । इसलिए एक सर्वनिर्देशक (Universal indicator) प्रस्तुत किया गया है जिससे अनेक वर्णपरिवर्तनों के अनुसार विलयन का उद निश्चित किया जाता है ।

यह सर्वनिर्देशक निम्नांकित विधि से प्रस्तुत किया जाता है:—

फेनोल थैलीन	०.१ ग्राम
लाल मेथिल	०.२ "
डाइमेथिल एमिडो एजोबेन्जोल	०.२ "
नीला क्रोमो थाइमोल	०.४ "
नीला थाइमोल	०.५ "
एथसैलुट अलकोहल	५०.० सी० सी०

इस निर्देशक की एक थूँद एक सी० सी० विलयन में डाल देने से वर्ण परिवर्तनों के अनुसार उद का निश्चय किया जाता है यथा:—

लाल वर्ण	लगभग	उद	■
नारङ्गी "	"	"	४
पीला "	"	"	६
पीताम्बर हरित	"	"	७
हरित	"	"	८
नील	"	"	१०

मानव शरीर के कुछ द्रवों का उद नीचे लिखा जाता है:—

रक्तमस्तु	७.३	से	७.५
सुषुम्नाद्रव	७.३	"	७.५
लाला	६.५	"	७.५
अम्लाशयिकरस	१.२	"	१.२
अग्न्याशयिकरस	८.२	"	८.२
मूत्र	४.८	"	८.४
दुग्ध	६.६	"	७.६
पित्त	६.८	"	७.०

पाचन-यन्त्र

चर्वण (Mastication)

सर्वप्रथम आहार का चर्वण किया जाता है। चर्वण के द्वारा ठोस आहार छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है तथा लाला से मिलकर इलेप्सा से युक्त एक आर्द्र और विलिप्त वस्तु में परिणत हो जाता है। इस रूप में ही आहार निगरणक्रिया के द्वारा अन्ननलिका में प्रविष्ट होता है।

चर्वण एक प्रत्यावर्तित क्रिया है। इस प्रत्यावर्तन चाप का केन्द्र मस्तिष्क में होता है। संज्ञावह सूत्रों के द्वारा मुख और जिह्वा से स्पर्श और भार की संज्ञायें तथा चर्वण पेशियों से देशीसंज्ञा केन्द्र तक पहुंचती है। चेष्टावह सूत्रों के द्वारा केन्द्र से चर्वण पेशियों तक चालक उत्तेजना आती है। निम्नांकित पेशियाँ चर्वण कार्य को संपन्न करती हैं:—

१. हनुकूटकर्पणी २. शस्त्रच्छदा ३. हनुमूलकर्पणी उत्तरा ४. हनुमूलकर्पणी अधरा ५. जिह्वाकण्ठिका ६. तन्तु गुच्छिका रसनापेशी

निगरण (Deglutition)

बलेदक इलेप्सा से विलिप्त आहार निगरण क्रिया के द्वारा मुख से गला होते हुये अन्ननलिका में और वहाँ से आमाशय में पहुंचता है। निगरणक्रिया की तीन अवस्थायें होती हैं:—

प्रथम अवस्था—ऐच्छिक होती है। इसमें आहारगोलक मुख से गले तक पहुंचता है।

द्वितीय अवस्था—अनैच्छिक है। इसमें आहारगोलक गले से होता हुआ अन्ननलिका के ऊर्ध्वभाग तक पहुंच जाता है।

तृतीय अवस्था—अनैच्छिक है। आहारगोलक अन्ननलिका से होते हुये आमाशय में प्रविष्ट होता है।

प्रथम अवस्था

लाला से विलिप्त आहारगोलक जिह्वा के पूर्वभाग के उन्नयन से गले की ओर चला जाता है। जिह्वा अग्रभाग से शृष्ठ भाग की ओर कोमलतालु पर दबाव डालती है, इसलिए इसके शृष्ठभाग पर स्थित आहारगोलक पीछे की ओर चला जाता है। जिह्वा का यह उन्नयन अनुलम्ब रसनापेशी और जिह्वाकण्ठिका पेशियों के सकोच से होता है।

द्वितीय अवस्था

मुखभूमि में स्थित मुखभूमिकण्डिका के संकोच से आहार सहसा तीव्र गति से अघ्ननलिका में प्रविष्ट होता है। इसमें कण्ठजिह्विका पेशियाँ भी सहायता करती हैं।

इस अवस्था में गले के आस पास स्थित अन्य स्रोत बन्द हो जाते हैं जिससे आहार उनमें प्रवेश नहीं करता। यथा—

मुखस्रोत—निम्न प्रकार से बन्द होता है:—

(१) जिह्वा के पूर्वभाग का कठिनेतालु पर दबाव होने से।

(२) जिह्वामूल का उन्नयन होने से।

(२) गलबिल की पूर्वस्तम्भगत पेशियों के संकोच से।

नासास्रोत बन्द होने के निम्न कारण हैं:—

(१) कोमल तालु का उन्नयन।

(२) गलबिल की पश्चिमस्तम्भगत पेशियों का संकोच।

(३) काकलक का उन्नयन।

जब गले की पेशियाँ क्षुब्धनाशीपंक्त रोग या रोहिणीविष आदि के कारण निश्चेष्ट हो जाती हैं तब निगरण में कठिनेता होती है और आहार नासागुहा में प्रविष्ट हो जाता है।

स्वरयन्त्र द्वारा बन्द होने के निम्न कारण हैं:—

(१) स्वरतन्त्रियों का अन्तर्नयन

(२) सम्पूर्ण स्वरयन्त्र का प्रबल उन्नयन

(३) उपजिह्विका का स्वरयन्त्र पर अवतमन

जब स्वरयन्त्र की नाडियाँ विकृत हो जाती हैं तब आहार स्वरयन्त्र में प्रविष्ट हो जाता है।

यह जठिल और सहयद् गतियाँ आहार के द्वारा पश्चिम भित्ति के सवेदना-शील बिन्दुओं की याम्बिक उत्तेजना से प्रामाण्यरूप में उत्पन्न होती हैं। इस प्रत्यावर्तित क्रिया में सञ्जावह नाडियाँ कण्ठरासनी और ऊर्ध्व स्वरयन्त्रीय नाडियाँ होती हैं। यह क्रिया कण्ठ में कोकन के प्रयोग से नष्ट हो जाती है, जिससे आहार नासागुहा या स्वरयन्त्र में प्रविष्ट हो सकता है।

तृतीय अवस्था

अन्ननलिका में आहार की गति भोजन का स्वरूप, भोक्ता की स्थिति तथा आहारगोलक के आकार पर निर्भर करती है। यदि भोजन द्रव या अल्पन्त मृदु हो तो वह ०.१ सेकण्ड में ही तीव्र गति से अन्ननलिका को पार कर जाता है। यदि भोजन ठोस हो तो वह अन्ननलिकागत पेशियों की परिसरणगति से क्रमशः नीचे की ओर ६ सेकण्ड में उतरता है। यह परिसरणगति एक प्रायावर्तित क्रिया है जिसके निम्नलिखित भाग हैं :—

(१) संज्ञावह नाडियाँ—जठ और अन्ननलिका की श्लेष्मलकला से सम्बद्ध नाडीसूत्र—यथा—कण्ठरासनी, त्रिधारा, प्राणदा की गलीय शाखाएँ तथा ऊर्ध्व स्वरयंत्रीय शाखा।

(२) पेशावह नाडियाँ :—

अधोजिह्विका, त्रिधारा की पृथ्वीय शाखा, प्राणदा और कण्ठरासनी—

(३) निगरणकेन्द्र—यह असनकेन्द्र के निकट पिण्ड में है। यह संभवतः हृदयावरोधक तथा असनकेन्द्रों के सम्मिकट स्थित है, इसीलिए निगरण के समय हृदय की गति धीम और असन बन्द हो जाता है।

आमाशय की गति

सामान्यतः आमाशय सङ्कोच की स्थिति में रहता है और अपने भीतर स्थित पदार्थों पर १०० मिलीमीटर दबाव डालता है। खाली रहने पर इसकी दीवाल एक दूसरे से मिली रहती है और जब भोजन इसमें प्रविष्ट होता है तब इसका आयतन समान रूप से बढ़ जाता है। यह जन्तुओं को विस्मययुक्त आहार देकर एवसरे के द्वारा देखा गया है।

भोजन करने के बाद शीघ्र आमाशय के छगमग बीच में एक सङ्कीर्णता उत्पन्न हो जाती है जिसे पूर्वमुद्रिका सङ्कोचक कहते हैं। इसके द्वारा आमाशय का हार्दिक द्वार मुद्रिकाद्वार से पृथक् हो जाता है। छोटा मुद्रिकाद्वार पुनः एक सङ्कीर्ण भाग के द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है :—मुद्रिका कुहर और मुद्रिका नली। पूर्वमुद्रिका सङ्कोचक से एक सङ्कोच की तरङ्ग मुद्रिकाद्वार की ओर जाती है और इसके पीछे पुनः एक तरङ्ग उठती है। इस प्रकार आमाशय का मुद्रिका भाग सक्रिय एवं गतिशील हो जाता है। यह परिसरण सङ्कोच प्रायः

४ से ६ प्रतिमिनट होता है और बहुत ही इसके साथ गुरुगुद शब्द भी होता है जो नाभि और वसोस्थि के बीच में मध्यरेखा के कुछ बायें ध्रुवणयन्त्र रखने से प्रतीत किया जा सकता है ।

आमाशय का हार्दिक मातृ कोष का काम करता है । इसमें परिसरण सञ्कोच नहीं होता, किन्तु यह स्थायी सञ्कोच की स्थिति में रहता है, जिससे आमाशयिक भोजन दवाय के कारण मुद्रिका भाग में जाता है और वह धीरे धीरे आकार में घटता जाता है तथा आमाशयिक पाचन के अन्त में पूर्णतया रिक्त हो जाता है ।

मुद्रिकाद्वारा मुद्रिका संकोचक पेशी द्वारा बना रहता है जो कभी-कभी प्रसारित होने पर आमाशय के अतिरिक्त द्रव पदार्थों को अन्त्र में जाने देती है । यह प्रसार प्रारम्भ में थोड़ा और क्षणिक होता है, किन्तु धीरे यह अधिक होने लगता है और जब पाचन पूर्ण हो जाता है (प्रायः ५-६ घण्टे के बाद) तब सञ्कोचक पेशी पूर्णतः प्रसारित हो जाती है और आमाशय रिक्त हो जाता है । मुद्रिकाद्वारा का उद्घाटन एक स्थानिक नाडीयन्त्र के द्वारा नियन्त्रित होता है जो अम्ल आमाशयिक पदार्थों के ग्रहणी में जाने पर प्रत्यावर्तित क्रिया के कारण प्रवृत्त होता है । इससे मुद्रिकाद्वारा शीघ्र बन्द हो जाता है और तब तक नहीं खुलता, जब तक कि ग्रहणीगत पदार्थ उसके धारीय स्तरोंद्वारा उदासीन न हो जाय । इसे मुद्रिका द्वार का अम्ल निपन्त्रण कहा जाता है । इसके कारण आमाशयिक पदार्थ अति शीघ्र बाहर नहीं निकलने पाता और भोज्य पदार्थ को पाचन के लिए भी प्रयाप्त समय मिल जाता है ।

स्नेह और शाकतत्त्व आमाशय में अधिक देर तक रह जाते हैं, क्योंकि मांसतत्त्व की अपेक्षा इनकी उपस्थिति में आमाशय का सञ्कोच कम होता है । यह सञ्कोच की कमी आमाशय से नाडी विच्छेद के बाद भी देखी जाती है, अतः यह अनुमान किया जाता है कि स्नेह और शाकतत्त्वों से कुछ ऐसे अवरोधक पदार्थ बनते हैं जो आमाशयिक गति को बन्द कर देते हैं । आमाशयिक घन की अवस्था में संज्ञाबह नादियाँ अधिक उत्तेजित हो जाती हैं जिससे मुद्रिकाद्वारा अधिक सङ्कुचित हो जाता है और आमाशय के खाली होने में विलम्ब हो जाता है ।

आमाशय में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की गति का क्रम देखा गया है, जिससे यह पता चलता है कि शाकतत्त्व सर्वाधिक शीघ्रता तथा स्नेह सर्वाधिक

मन्दता से गति करते हैं। आमाशय के पूर्ण रिक्त होने का काल निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है:—

१. आहार का परिणाम ।
२. आहार की पाच्यता ।
३. मन और शरीर की साधारण दशा ।

सामान्यतः यह काल २ से ५ घंटा है। बच्चों में आमाशय शीघ्र खाली हो जाता है, अतः बच्चे भोजन काल में अत्यधिक प्रवृत्तियों का ग्रहण कर सकते हैं। यह भी देखा गया है कि रिक्तावस्था में भी आमाशय में लगातार प्रायः दो घण्टे पर परिसरणगति की तरंग चटखी रहती है। इसी समय मनुष्य को कड़ी भूल मालूम होती है।

आमाशयिक गति का नाडीयन्त्र

(क) आन्तरिक—(Intrinsic)

सभी आमाशयिक नाडियों की काट देने पर भी देखा गया है कि आमाशय की गति निरन्तर नियमित रूप से होती रहती है। अतः यह नियन्त्रण आमाशय के पेशीगत स्तर में स्थित नाड़ी जालकों द्वारा होता है।

(ख) बाह्य—(Extrinsic)

(१) प्राणदा नाड़ी पेशीस्तर के सङ्कोच को बनाये रखती है और मुद्रिका की गति में वृद्धि करती है। यह हार्दिक द्वार को प्रसारित करती है तथा मुद्रिका द्वार को सङ्कुचित करती है।

(२) सांवेदनिक सूत्र—मुद्रिका सङ्कोचक की शक्ति एवं गति को कम करते हैं।

छुद्रान्त्र की गति

अन्त्रीय पदार्थ अन्त्रनलिका में धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और साथ ही उनका सम्मिश्रण भी होता जाता है। यह गति कई प्रकार की होती है:—

(१) पुरस्सरण—यह सङ्कोच की तरङ्गों के द्वारा होता है जो अन्त्र के पेशी-स्तर में प्रत्येक तीन या चार मिनट पर उत्पन्न होती हैं। इसी को परिसरणगति कहते हैं। इससे अन्त्रीय पदार्थ प्रतिमिनट १-२ इंच आगे बढ़ते हैं।

(२) सम्मिश्रण—अन्त्र में भोज्य पदार्थों का सम्मिश्रण मुद्रिका सङ्कोच के द्वारा होता है। इससे भोजन आगे तो नहीं बढ़ता, किन्तु एकदम मिल जाता

है। इसके द्वारा आहार सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है और अन्नरस से सुमिश्रित हो जाता है। इससे भोज्य पदार्थ रसा रिकाओं के निकट सम्पर्क में आ जाता है जिससे शोषण में सहायता मिलती है इसके अतिरिक्त यह श्लेष्मल तथा अन्त्रीय रस के साथ तथा लसीका एवं रक्त के संवहन में सहायता पहुँचाती है।

(३) घटिकागति—यह गति प्रतिमिनट लगभग १० बार होती है और अनुलम्ब पेसीसूत्रों के नियमित सङ्कोच के कारण होता है। इससे भोज्य पदार्थों में सामने और पीछे की ओर गति होती है।

(४) अङ्कुरगति—यह अनियमित होती है और इसके द्वारा अन्न के एक खण्ड विशेषतः वृहदन्न में एककालिक सङ्कोच उत्पन्न होते हैं। अन्तिम दो गतियाँ नाड़ी विच्छेद के बाद भी अन्न में देखी जाती है, इसका कारण यह है कि यह अन्न में कोलीन के द्वारा उत्पन्न एस्टिल कोलीन नामक द्रव्य की उत्तेजना के फलस्वरूप प्रादुर्भूत होती है।

परिसरणगति (Peristalsis)

किसी यान्त्रिक उत्तेजक से इसका प्रारम्भ होता है। सामान्यतः आहार-गोलक पर्याप्त उत्तेजक है। अतः शाकाहार का अपाच्य भाग इस गति के उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण है। इसके दो चिह्न हैं:—

१. इसके पूर्व प्रसार की एक तरङ्ग होती है।

२. यह केवल आगे की ओर ही जाती है।

यह गति निम्नकारणों से बढ़ जाती है:—

१. अन्न में भोजन या अन्य पदार्थ।

२. आमाशय में भोजन तथा—पुरीपोतसर्ग के पूर्व जलपान या लव्हाहार।

३. मानसिक आवेश।

४. शीत वस्त्र।

५. औषध।

क्षुद्रान्न की नाड़ियाँ

१. प्राणदा—इसकी उत्तेजना से प्रारम्भिक प्रसार के बाद अन्न की दीवाल में संकोच होता है।

२. संवेदनिक नाड़ी को उत्तेजित करने से अन्नभित्ति का प्रसार एवं अन्नो-ण्डक—संकोचक का संकोच होता है।

केन्द्रीय नाडीमण्डल का प्रभाव भी देखा जा सकता है। यथा शूल के समय गति का अवरोध तथा मानसिक आदेशों के समय गति की वृद्धि स्पष्टः प्रतीत की जा सकती है।

बृहदन्त्र की गति

उष्णक और आरोही बृहदन्त्र भोजन के प्रायः तीन घण्टे के बाद क्षुदान्त्र की परिसरणगति से प्रभावित हो जाते हैं और उस काल में पूर्णतः निष्क्रिय रहते हैं जिससे जल के पुनः शोषण एवं पुरीष के निर्जलीकरण के लिए पूरा समय मिल जाता है। बाद में वहा भी क्षुदान्त्र के समान ही मुद्रिका गति



चित्र ४०-बृहदन्त्र

१ अग्रयुग्म २ उष्णक ३ आरोही भाग ४. वाहक कोण ५. अनुप्रस्थ भाग ६ प्लेविक कोण ७ अवरोही भाग ८. कुण्डलिका ९ मलाशय।

प्रारम्भ हो जाती है, जिससे नलिकास्थित पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं तथा अल

के शोषण में सहायता मिलती है । इन भागों से अनुप्रस्थ एवं अवरोही भाग में पुरीष का निर्गमन देर के बाद प्रायः २४ घण्टों में तीन से चार बार परिसरण संकोचों के द्वारा होता है । ये गतिर्या सामान्यतः आमाशय में आहार प्रविष्ट होने पर होती हैं और आमाशयान्त्रिक प्रत्यावर्तन (Gastrocolioreflex) या आहार प्रत्यावर्तन में कारण होती है ।

बृहदन्त्र की नाडियाँ

- (१) बृहदन्त्र के ऊर्ध्वभाग के लिए प्राणदा ।
- (२) अवशिष्टभाग के लिए तथा मलाशय के लिए श्रोणिगुहोय नाडियाँ ।
- (३) सावेदनिक ।

पुरीषोत्सर्ग (Defaecation)

बृहदन्त्र के मलपदार्थों के मलाशय में प्रविष्ट होने, फलतः उसका प्रसार होने से पुरीषोत्सर्ग का वेग आता है । जब मलाशय में मल का पर्याप्त संचय होने के कारण दबाव ४० मि० पारद के लगभग हो जाता है तब बृहदन्त्र में एक संकोचतरङ्ग उठती है, जो गुदसंकोचक पेशियों के संकोच पर विजय प्राप्त करने पर पुरीषोत्सर्ग में परिणत हो जाती है ।

सामान्यतः पुरीषोत्सर्ग की क्रिया ऐच्छिक नियन्त्रण के अधीन रहती है । यह महाप्राचीरा एवं उदर की पेशियों के सङ्कोच से उत्पन्न उदर के भीतर दबाव की वृद्धि के परिणामस्वरूप होती है । कभी-कभी बच्चों में तथा संज्ञाहीन अवस्था में चुवा व्यक्तियों में भी अनैच्छिक रूप से पुरीषोत्सर्ग होता है । उसका कारण गुदसंकोचक पेशियों की क्रियाहीनता समझी जाती है ।

पुरीष का संगठन

जल	७५%	घनभाग	२५%
----	-----	-------	-----

अशोषित आहारद्रव्य ।

अवशिष्ट अम्लीय खाद

श्रीगणु

पुरीष का प्रमाण

यह प्रधानतः आहार के स्वरूप पर निर्भर करता है । शाकाहार से पुरीष का परिमाण अधिक निकलता है ।



खण्डों के भीतर नलिकाओं में प्रविष्ट होता है । ये नलिकायें यकृत पिण्डों में परस्पर मिलने लगती हैं और इन्हीं के द्वारा पित्तनलिका बनती है । वाम और दक्षिण यकृत नलिकाओं के मिलने से सामान्य पित्तनलिका बनती है जो अग्न्याशयनलिका के साथ ग्रहणी में खुलती है । पित्त यकृत नलिका के द्वारा सीधे ग्रहणी में प्रविष्ट होता है, किन्तु जब पाचनक्रिया नहीं होती है तब वह पित्ताशयनलिका द्वारा पित्तकोष में संचित होता है ।

पित्तकोष पित्त का सञ्चयस्थान है । यहाँ जलौंश का अधिक शोषण हो जाने के कारण पित्त गाढ़ा हो जाता है । यकृत में रक्त प्रतीहारिणी सिरा तथा याकृती धमनी द्वारा आता है । प्रतीहारिणी सिरा याकृती धमनी, पित्तनलिका और रसायनियों के साथ यकृत के अधःपृष्ठ पर एक आवरण में बँधी रहती है जिसे ग्लिस्सन का आवरण (Glisson's Capsule) कहते हैं । यकृत के खण्ड संयोजक तन्तु द्वारा एक दूसरे पृथक् रहते हैं जिसमें अन्तःखण्डीय रक्तसहस्रोत (Interlobular blood vessels) अवस्थित रहते हैं । प्रत्येक खण्ड के प्रान्तभाग में प्रतीहारिणी सिरा की शाखाएँ पाई जाती हैं जिनसे होकर रक्त याकृती केशिकाओं में जाकर यकृत कोषाणुओं के सान्नात् सम्पर्क में आता है । इन केशिकाओं में याकृती धमनियों से भी रक्त आता है और यह खण्ड के केन्द्र में जाकर याकृती सिरा की अन्तःखण्डीय शाखा बनाती है ।

याकृत कोषाणुओं के अतिरिक्त यकृत में कुछ और कोषाणु होते हैं जिन्हें 'कूपर के तारक-कोषाणु' (Stellate cells of kupffer) कहते हैं । ये अनियमित आकार के होते हैं और इन से याकृत केशिकाओं का अन्तःस्तर निर्मित होता है । यह तीव्र कणमशक होते हैं और उनमें रक्तकण विनाश की विभिन्न अवस्थाओं में देखे जाते हैं । ये कोषाणु जालकान्तःस्तरिय घन्घ के सदस्य होते हैं ।


याकृत कोषाणु तथा तारक कोषाणु दोनों पित्त एवं शर्कराजनक के उत्पादन अवयवों को उत्पन्न करते हैं तथा यकृत की यन्त्रशाला का प्रीतिनिधिरूप करते हैं ।

यकृत के कार्य
प्रधान कार्य हैं—

एकादश अध्याय

यकृत

यकृत शरीर में सब से बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रन्थि है और यकृत कोषाणुओं से संघटित छोटे और वृत्ताकार खण्डों से बनी है। ये कोषाणु कणयुक्त होते हैं तथा इनके ओजःसार में छोटी छोटी नलिकायें होती हैं। जालक तन्तु के सूक्ष्म जाल के द्वारा ये परस्पर आसन्न और आधित रहते हैं। इन कोषाणुओं के ओजःसार में मेद के कण, शर्कराजनक एवं लौहयुक्त रक्तकण रहते हैं। पित्त पहले अन्तःकोषाणवीय अवकाशों (क्षीतों) में जाता है, उसके बाद यकृत



चित्र ४१-यकृत

१. यकृत २. यकृती नलिका ३. पित्ताशय नलिका ४. सामान्य पित्तनलिका
५. पित्ताशय ६. आमाशय स्कन्ध ७. आमाशय मध्य ८. मुद्रिका भाग ९. मुद्रिका द्वार
१०. अग्न्याशय-नलिका ११. अग्न्याशय १२. ग्रहणी १३. धुद्रान्त

खण्डों के भीतर नलिकाओं में प्रविष्ट होता है । ये नलिकायें यकृत पिण्डों में परस्पर मिलने लगती हैं और इन्हीं के द्वारा पित्तनलिका बनती है । घाम और दक्षिण यकृत नलिकाओं के मिलने से सामान्य पित्तनलिका बनती है जो अग्न्याशयनलिका के साथ ग्रहणी में खुलती है । पित्त यकृत नलिका के द्वारा सीधे ग्रहणी में प्रविष्ट होता है, किन्तु जब पाचनक्रिया नहीं होती है तब वह पित्ताशयनलिका द्वारा पित्तकोष में संचित होता है ।

पित्तकोष पित्त का सञ्चयस्थान है । यहाँ जलोंश का अधिक शोषण हो जाने के कारण पित्त गाढ़ा हो जाता है । यकृत में रक्त प्रतीहारिणी सिरा तथा याकृती धमनी द्वारा आता है । प्रतीहारिणी सिरा याकृती धमनी, पित्तनलिका और रसायनियों के साथ यकृत के अधःश्ल पर एक आवरण में बँधी रहती है जिसे ग्लिस्सन का आवरण (Glisson's Capsule) कहते हैं । यकृत के खण्ड संयोजक तन्तु द्वारा एक दूसरे पृथक् रहते हैं जिसमें अन्तःखण्डीय रक्तवह स्रोत (Interlobular blood vessels) अवस्थित रहते हैं । प्रत्येक खण्ड के प्रान्तभाग में प्रतीहारिणी सिरा की शाखाएँ पाई जाती हैं जिनसे होकर रक्त याकृती केशिकाओं में जाकर यकृत कोषाणुओं के साक्षात् सम्पर्क में आता है । इन केशिकाओं में याकृती धमनियों से भी रक्त आता है और यह खण्ड के केन्द्र में जाकर याकृती सिरा की अन्तःखण्डीय शाखा बनाती है ।

याकृत कोषाणुओं के अतिरिक्त यकृत में कुछ और कोषाणु होते हैं जिन्हें 'कूपर के तारक-कोषाणु' (Stellate cells of kupffer) कहते हैं । ये अनियमित आकार के होते हैं और इन से याकृत केशिकाओं का अन्तःस्तर निर्मित होता है । यह तीव्र कणभक्षक होते हैं और उनमें रक्तकण विनाश की विभिन्न अवस्थाओं में देखे जाते हैं । ये कोषाणु जालकान्तःस्तरीय यन्त्र के सदस्य होते हैं ।

याकृत कोषाणु तथा तारक कोषाणु दोनों पित्त एवं शर्कराजनक के उपादान अवयवों को उत्पन्न करते हैं तथा यकृत की यन्त्रशाला का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

यकृत के कार्य ।

यकृत के निम्नलिखित प्रधान कार्य हैं:—

१. शर्कराजनक का निर्माण (शर्करात्व के सारभोक्षण का नियमन)
२. मूत्रलवण का निर्माण (मांसदाव के " ")

३. मूत्राम्ल का निर्माण (प्यूरिन सारमीकरण का नियमन)
४. पित्त का निर्माण ।
५. औषधों का वहिर्लसर्ग ।
६. निर्विषीकरण (अमोनिया लवणों का यूरिया में परिवर्तन)
७. रक्तनिर्माण (रक्तद्रव्य का निर्माण)
८. रक्तकण का विनाश ।
९. प्रतिस्कन्दिन द्रव्य का निर्माण ।
१०. सुषुप्ति का निर्माण ।

पित्त

पित्त याकृत कोषाणुओं द्वारा उत्पन्न एक रस है जो आहार के पाचन में सहायक होने के कारण पाचकरस कहा जाता है। अन्य पाचकरसों से यह भिन्न एवं विशिष्ट है, क्योंकि—

- (१) इसमें कोई विशिष्ट क्लिबतरंग नहीं होता ।
- (२) इसका उत्पादन निरन्तर होता रहता है और पाचन के अवकाशकाल में भी यह पित्तकोष में संचित होता रहता है ।
- (३) यह किसी सावोत्पादक नाडीयन्त्र के साक्षात् नियन्त्रण में नहीं है ।
- (४) इसका परिमाण यकृतस्रवहन के द्वारा नियमित रहता है ।

इस प्रकार पित्त का निर्माण बहुत कुछ मूत्र के स्राव के समान है, किन्तु दोनों में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि वृक्क अन्य अङ्गों के द्वारा प्रस्तुत तथा उसी रूप में रक्त में विद्यमान व्याज्य पदार्थों का उत्सर्ग करते हैं जब कि पित्त के अवयव याकृत कोषाणुओं की क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वृक्क निष्क्रिय रूप में तथा यकृत सक्रिय रूप में कार्य करते हैं ।

पित्त का निर्माण

जन्तुओं पर प्रयोग करने के बाद यह देखा गया है कि पित्त का निरन्तर स्राव होता रहता है यद्यपि विभिन्न अवस्थाओं में इसके परिमाण में भेद हो जाता है। उपवासकाल में इसका स्राव कम हो जाता है और मांस या स्निग्ध आहार के लगभग १ घण्टे के बाद इसका स्राव बढ़ जाता है। शाकाहार का स्राव के क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

पित्त का निर्माण बहुत निम्न दबाव पर होता है, अतः पित्त के प्रवाह में थोड़ी बाधा होने पर भी वह अन्त्र में नहीं जा पाता और पयस्विनियों के द्वारा वह रक्त में शोषित हो जाता है जिससे 'शोषण-कामला' (Absorption Jaundice) की अवस्था उत्पन्न हो जाती है । पित्तोत्पादन का कार्य मौलिक पद्धति से नहीं होता, बल्कि कोषाणुओं की शरीर क्रियाओं के द्वारा होता है । इसका प्रमाण यह है कि इसका निर्माण दबाव के विपरीत होता है । नलिका में दबाव ३० मिलीमीटर है जब कि पाकृती सिरा में तीन गुना कम है ।

यह देखा गया है कि पित्त का स्राव गर्भावस्था के १२ वें सप्ताह से प्रारम्भ होकर जीवन भर जारी रहता है । लम्बे उपवासकाल में भी यह बन्द नहीं होता । स्रावक नामक अन्तःस्राव की क्रिया भी यकृत कोषाणुओं पर होती है और पित्तस्राव में सहायता करता है । पित्तस्रावकों में सर्वोत्तम पित्तलवण ही माने गये हैं ।

पित्तकोष से ग्रहणी में पित्त का प्रवेश आहार के स्वरूप और परिणाम के द्वारा नियमित होता है । जब भोजन आमामशय में पहुँचता है तब उसके साथ घण्टे के बाद पित्त का स्राव अन्त्र में होने लगता है और समस्त पाचनकाल तक जारी रहता है । सब से अधिक स्राव भोजन के ५-६ घण्टे के बाद होता है जब भोजन शोषित होकर प्रतीहारी रक्त के द्वारा यकृत में पहुँचता है । पच्यमान भोजन के ग्रहणी में प्रविष्ट होने पर उससे एक सक्रिय स्राव उत्पन्न होता है, जिसे पित्तस्रावक (Cholecystokinin) कहते हैं ।

यकृतजन्य पैत्तिक स्राव के प्रमाण

ऊपर बतलाया जा चुका है कि पित्त के विभिन्न अवयव यकृत कोषाणुओं की क्रिया से निर्मित होते हैं और न कि मूत्र के समान रक्त से लेकर ही उनका उत्सर्ग होता है । इसके पक्ष में निम्न लिखित प्रमाण हैं:—

- (१) प्रतीहारी रक्त में पित्तलवण या पित्तस्रावक द्रव्य नहीं मिलते ।
- (२) यदि यकृत शरीर से शृङ्खल कर दिया जाय तो रक्त में पित्त के अवयवों का संचय नहीं होता ।
- (३) इसके विपरीत, यदि पित्तनलिका बाँध दी जाय तो रक्त में पित्त के अवयवों का संचय होने लगता है और कामला की अवस्था उत्पन्न हो जाती है ।

(४) यकृत के मेदस अपरुप में न तो पित्तलाव होता है और न कामला ही होती है ।

(५) यदि पित्त के लवण मांसतत्व के सामीकरण के क्रम में उत्पन्न परि-
त्याज्य द्रव्य ही केवल होते, तो मांसतत्व के अनुपात से ही उनका परिमाण
निश्चित किया जाता, किन्तु ऐसी बात नहीं है । यह देखा गया है कि २ गुना
मांसतत्व का आहार करने पर भी पित्त के लवण केवल दूने हो जाते हैं और वही
परिणाम तब देखने में आता है, जब मांसतत्व की मात्रा वही रहती है, किन्तु
स्नेह अधिक मात्रा में लिया जाता है ।

(६) पित्तराजक द्रव्य रक्तकों से प्राप्त होते तथा यकृत के भीतर बनते हैं
इसका प्रमाण यह है कि जब शरीर में अधिक रक्तव्य होता है तो मूत्र में पित्त-
राजक द्रव्य बहुत अधिक मिलने लगते हैं । किन्तु यदि रक्तव्य के पूर्व ही यकृत
को पृथक् कर दिया जाय तो मूत्र में पित्तराजक द्रव्यों के स्थान पर रक्तराजक
द्रव्य ही अधिक मात्रा में मिलता है ।

अब यह सिद्ध किया गया है कि यद्यपि पित्तराजक द्रव्य मुख्यतः यकृत में
बनते हैं, तथापि अन्य तन्तुओं के कोषाणुओं में भी इनके उत्पादन की शक्ति
होती है । अतः यकृत के पृथक् करने पर भी जन्तुओं के रक्तस और मूत्र में
पित्तराजक द्रव्य मिलते हैं । कुछ लोगों का यह भी मत है कि पित्तराजक द्रव्य
मुख्यतः मज्जा और प्लीहा में बनते हैं और यकृत के द्वारा केवल उनका उत्सर्ग
होता है ।

पित्त का संघटन

जल	८६%
घनभाग	१४%
पित्तलवण	९%
पित्तराजक, ग्लूटिन	३%
स्नेह	१%
कौलेस्ट्रॉल	०.२%
खनिज लवण	०.८%

(सोडियम क्लोराइड, मैग्नेसियम, खटिक तथा छोह के फास्फेट आदि)

परिमाण—मनुष्य में २४ घंटे में लगभग ५०० से १००० सी० सी० पित्त का निर्माण होता है ।

प्रतिक्रिया—इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती है ।

वर्ण—इसका वर्ण सामान्यतः स्वर्णिम पीत से लेकर नींबू के समान हरा होता है । वर्ण में भिन्नता पित्तांशक द्रव्यों (बिलीरुबिन तथा बिलीवर्दिन) पर निर्भर करता है । बिलीरुबिन के आधिक्य से पित्त का वर्ण सुनहला पीला तथा बिलीवर्दिन की अधिकता से हरा होता है । मनुष्य में दोनों रंजकद्रव्य प्रायः समान परिमाण में पाये जाते हैं ।

स्वरूप—यकृत कोषाणुओं द्वारा छुत पित्त तनु द्रव होता है तथा ग्रहणी में प्रविष्ट होने वाला पित्त पित्त-कोष तथा पित्त-नलिकाओं की झेलमलकला के छाव से मिलने के कारण गाढ़ा हो जाता है ।

पित्तलवण

पित्तकोष में सञ्चित पित्त में सोडियम के शैरोकैलेट ($C_{26}H_{44}NaNo_{7.8}$) तथा ग्लाइकोकैलेट ($C_{26}H_{43}NaNo_8$) नामक लवण लगभग ९ प्रतिशत मिलते हैं । ये लवण सोडियम के ग्लाइशोकोलिक एसिड ($C_{26}H_{49}No_8$) तथा शैरोकैलिक एसिड ($C_{26}H_{45}No_{7.8}$) नामक दो पित्तानुओं के साथ संयुक्त होने से बनते हैं ।

पित्तलवण के कार्य

(१) यह स्नेह के कणों को सूक्ष्म बना कर उनका पयसीकरण करते हैं और इस प्रकार अग्न्याशय रस के विघ्नतत्वों विशेषतः मेदोविश्लेषक विघ्नतत्वों के कार्य में सहायक होते हैं ।

(२) रक्त पदार्थों के शोषण में सहायता करते हैं ।

(३) कैलेस्टरोल तथा लेसिथिन को विलीन कर लेते हैं । जब पित्तलवण कम होते या अनुपस्थित होते हैं तब कैलेस्टरीन सञ्चित होने लगता है और उसीको केन्द्र बनाकर पित्तारमरी बनने लगती है । इस प्रकार पित्त के द्वारा अनेक विषों का निहर्ण होता है ।

(४) अन्न की पुरस्तरण गति में सहायता करते हैं ।

(५) ये जीवाणु नाशन का कार्य करते हैं । पित्त की अनुपस्थिति में अन्नगत भोज्यपदार्थ में सड़न पैदा हो जाती है ।

(६) ये पित्तसावक का कार्य करते हैं ।

(७) पित्तलवण अन्त्र में अविलेय स्नेहागुणों को घुलाकर रखते हैं और उनको अवशिश नहीं होने देते ।

पित्तलवणों की परीक्षा

इक्षुशर्करा तथा सीम गन्धकाम्ल घोड़ी मात्रा में पित्त में मिलाओ । इससे उसका रंग लाल हो जायगा ।

मात्रा—मातृ पित्तकोपगत पित्त में पित्तलवण ९.५ प्रतिशत होते हैं । वस्तुतः इनका परिमाण आहार के स्वरूप पर निर्भर है—नासाहार में साकाहार की अपेक्षा इनका साय अधिक होता है । सामान्य अवस्था में, पित्तलवण ग्रहणी में प्रविष्ट होने पर पुनः शोषित होकर प्रतीहारी रक्त के साथ यकृत में चले आते हैं । यह पित्तसावक का कार्य करते हैं और पुनः पित्तकोप तथा अन्त्र में चले जाते हैं । मिलेनबी के अनुसार पित्तलवण पुनः शोषित होने के समय ग्रहणी की श्लेष्मलकला में सपन्न सावक तत्त्व को भी साथ ले जाते हैं जो आन्व्याशय की क्रिया को प्रेरित करता है । इस प्रकार एक 'आन्त्रयकृत संवहन' (Intestino-hepatic circulation) स्थापित हो जाता है और पित्त को अपनी क्रिया की पुनरावृत्ति के लिए समय मिल जाता है । नाडीमण-की दशा में जब पित्त ग्रहणी में प्रविष्ट नहीं होने पाता, तब आन्त्रयकृत संवहन नहीं होता और फलतः याकृत कोषाणुओं की सावक क्रिया में अवरोध होने से पित्तलवणों का निर्माण अत्यल्प हो जाता है ।

पित्तलवणों का भविष्य

पित्तलवण अन्त्र में कोलेलिक एसिड, ग्लाइसिन और टॉरिन में विश्लेषित हो जाते हैं और इसी रू में वह पुगीय और थोड़ा मूत्र में पाये जाते हैं । इन विश्लेषित पदार्थों का $\frac{1}{2}$ भाग प्रतिहारिणी सिरा द्वारा शोषित हो जाता है तथा यकृत में जाकर पुनः पित्तलवणों में संश्लेषित हो जाते हैं ।

पित्तरक्तद्रव्य

पित्तरक्त द्रव्य रक्तरक्त द्रव्य के विनाश से बनते हैं । इन द्रव्यों में दो मुख्य हैं:—

१. पीत पित्तरक्त ($C_{53}H_{36}N_4O_4$)—Bilirubin

२. हरित पित्तरक्त ($C_{53}H_{36}N_4O_8$)—Biliverdin

पीत पित्तरञ्जक मोसहारी जन्तुओं के पित्त में तथा हरित पित्तरञ्जक शाकाहारी प्राणियों के पित्त में पाया जाता है । मनुष्य के पित्त में दोनों प्रकार होते हैं, किन्तु पीत पित्तरञ्जक अधिक होता है ।

पित्तरञ्जक द्रव्यों की उत्पत्ति

पित्तरञ्जक द्रव्यों का निर्माण रक्तरञ्जक द्रव्यों से होता है । रक्तनिर्माण संस्थान, विशेषतः यकृत के कूपर कोषाणुओं में जब रक्तकोषाणुओं का विघटन होता है, सब एक लौहयुक्त रक्तद्रव्य उत्पन्न होता है, जिसे 'हिमेटिन' कहते हैं । जब इससे लौह घृथक् हो जाता है तब यह 'हिमेटोपॉरफिरीन' नामक द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है जो पीत पित्तरञ्जक का समवर्गीय है । घृथक् हुआ लौह यकृत में जमा होता है और हिमेटोपॉरफिरीन पीत पित्तरञ्जक में परिणत हो जाता है । हिमेटोपॉरफिरीन एक विपाक पदार्थ है अतः इसका पीत पित्तरञ्जक (निर्विष पदार्थ) में परिणाम यकृत की निर्विषीकरण क्रिया का एक उदाहरण है । कुछ पीत पित्तरञ्जक ओषधनीकरण के अनन्तर हरित पित्तरञ्जक में परिणत हो जाता है ।

पित्तरञ्जकद्रव्यों का स्वरूप

पीत पित्तरञ्जकः—

यह सुनहला, पीला स्कटिकीय भौतिक है तथा जल में अविलेय, ईयर या बेन्जीन में किञ्चित् विनेय एवं क्लोरोफार्म में अधिक विलेय है ।

हरित पित्तरञ्जकः—

यह हरे रंग का चूर्ण है जो भयसार में घुलनशील है, किन्तु जल, क्लोरोफार्म या ईयर में अविलेय है ।

ये दोनों द्रव्य, नवजात उदजन के सयोग से सोदपित्तरञ्जक में परिणत हो जाते हैं ।

पित्तरञ्जक द्रव्यों का भविष्य

पित्तरञ्जक द्रव्यों का कुछ अंश अन्त्र में जीवाणुओं की क्रिया से परिवर्तित होकर पुरीपित्त ($C_{33}H_{44}N_4O_6$) के रूप में पुरीप के साथ बाहर निकल जाता है । इसी के कारण पुरीप का रङ्ग पीठाम परिवर्तित हो जाता है जो अन्य अपरिणत पित्तरञ्जक द्रव्यों के साथ कपिल होता है । कुछ अंश पुनः मूत्रपित्तजन ($C_{33}H_{44}N_4O_6$) में अन्त्र में शोषित हो जाते हैं और घृथक द्वारा मूत्रपित्त, यूरोपरिथिन तथा मूत्ररक्षक के रूप में मूत्र के साथ वस्यते होते हैं ।

परीक्षा

मेलिन की परीक्षा:—

एक पात्र में थोड़ा पित्त लेकर उसमें १ ग्राम नम्रिकागुल डालने से रक्तक
द्रव्यों के ओपजनीकरण के कारण उसमें पीला, छाल, धैमनी, नीला और हरा
रंग उत्पन्न होते हैं। हरा रंग पीत पित्तरक्त से ओपजनीकरण के द्वारा हरित-
पित्तरक्त बनने के कारण होता है। अन्य वर्णों का उत्पत्ति उत्तरोत्तर द्रव्यों के
परिणाम से होती है:—

पीत पित्तरक्त
| + ओ
हरित पित्तरक्त
| + ओ
नील पित्तरक्त
| + ओ
अरुण पित्तरक्त
| + ओ
कोलेस्टिनिन

कोलेस्टरौल

पित्त में प्रायः ०.०१ से ०.१ प्रतिशत तक कोलेस्टरौल होता है। इसकी
उत्पत्ति के सम्बन्ध में अभी तक स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ है, तथापि अनुमानतः
यह निम्नांकित प्रकार से बनता है:—

१. पित्तनलिकाओं की आवरक कला से।
२. नश्यमान यक्षुत कोषाणुओं से।
३. रक्तकोषाणुओं के विघटन से।

यह समझा जाता था कि शरीर में कोलेस्टरौल से कोलिक अम्ल बनता
है, किन्तु यह देखा गया है कि जन्तुओं को कोलेस्टरौल देने, परं पित्तागुल के
उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई।

यह पित्तलवणों के विलयन में घुलनशील है अतः पित्त के द्वारा ही इसका
अधिक अंश उत्सृष्ट होता है। पित्तलवण रक्तविलायक हैं, किन्तु ये उसके
विपरीत गुणवाले होते हैं।

द्वादश अध्याय

प्लीहा

यह स्पष्ट के समान एक अङ्ग है जो आमाशय के बाईं ओर स्थित रहता है। यह एक कोमल स्थितिस्थापक सौत्रिक आवरण से ढँका रहता है। इससे अङ्कुरवत् प्रवर्धन निकलकर भीतर की ओर फैले रहते हैं। इसकी आन्तरिक कला केशिकाओं के साथ मिली रहती है जिसके कारण प्लीहा के सिक्कने से रक्त बाहर स्रावों में चला जाता है। भावावेश, ओपजन की कमी तथा सांवेदनिक संस्थान को उत्तेजित करने वाले कारणों से यह संकुचित होता है।

कार्य—

(१) इसमें रक्तकण सञ्चित रहते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर रक्तसंवहन में आते हैं।

(२) इसमें श्वेतकणों का भी निर्माण होता है।

(३) रक्तकणों के निर्माण में भी इसका महत्त्वपूर्ण योग रहता है। इसके हटा देने से छाल अस्थिमज्जा बंद जाती है।

(४) रक्तकणों के विनाश में भी सहायक होता है। अतः इसमें स्नेह तथा छोट का अंश अधिक पाया जाता है।

(५) नवजनयुक्त पदार्थों के सात्विकरण, विशेषतः मूत्राम्ल के निर्माण में योग देता है।

सामान्य अवस्थाओं में इसकी क्रियाओं पर ध्यान नहीं जाता, किन्तु रोग की अवस्थाओं में इसकी क्रियायें विपन्न हो जाने से, इसका आकार अत्यधिक बढ़ जाता है।



त्रयोदश अध्याय

मूत्रवह संस्थान

इस संस्थान में घृक्क, गचीनी, बस्ति तथा मूत्रप्रसेक इन चार अवयवों का समावेश होता है। घृक्क में मूत्रनिर्माण कार्य होता है जहाँ से मूत्र गचीनी के द्वारा बस्ति में पहुँचता है और थोड़ी देर तक वहाँ ठहरता है। बस्ति से मूत्रप्रसेक नामक नलिका के द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है।


वृषा

इनका आकार महाशिव्बी बीज के समान होता है तथा ये उदरगुहा के कटिप्रदेश में वृष्टवंश के दोनों ओर एकादश एवं द्वादश पशुका के समीप रहते हैं। इनकी लम्बाई ४ इंच तथा भार ४३ औंस होता है। उदयकला इनके सामने की ओर रहती है।

रचना:—घृक्क एक सौम्यिक कोप से आवृत रहते हैं जो उनके भीतरी वृष्ट पर सूक्ष्म सूत्रगुच्छों के द्वारा लगा रहता है। घृक्क का छेदन करने पर उसके निम्नोक्ति भाग दृष्टिगोचर होते हैं:—

(१) घृक्कतस्तु:—यह घृक्क का स्थूल उपादानभाग होता है। यह दो प्रकार का है:—(क) वहिर्वस्तु (Cortical matter) जो घृक्क का बाह्य परिधि भाग बनाता है तथा (ख) अन्तर्वस्तु (Medullary matter) जो भीतर की ओर रेखाओं से अंगित होता है और घृक्कद्वार की ओर अभिमुख शिखरिकाओं से युक्त है। शिखरिकाओं के मूलभाग स्थूल तथा वहिर्वस्तु से सन्नद्ध होते हैं और अप्रभाग पुष्पमुकुलाकार वृक्कालिन्द भाग में देते जाते हैं।

घृत की सूक्ष्म रचना



चित्र ४३

- १-मूत्रोत्सिका २-प्रथम कुडलिका भाग ३-द्वितीय कुडलिका भाग ४-अवरोही भाग
 ५-आरोही भाग ६-संचायक नलिकायें ७-महानलिकायें ८-धमनी
 ९-वहिवंशी १०-सिरा

(३) घृक्ककोषः—(Renal Capsule) :—

यह प्रत्येक घृक्क के चारों ओर लगा हुआ स्थूलकलामय आवरण है । यह कला घृक्कद्वार के पास पहुँच कर घृक्कद्वार के चारों ओर स्थित होकर घृक्कालिन्द का परिसर भाग बनाती है और वहाँ से पीछे की ओर मुड़ कर गव्दीनी के शिरोभाग को आपृत करती है ।

सूक्ष्मनिर्माणः—घृक्क का सूक्ष्मनिर्माण अत्यन्त विचित्र है । घृक्क के परिधि भाग में स्थित बहिर्वस्तु मूत्रनिर्माक सूक्ष्म, गोलाकार तथा जालकमय यन्त्रों से निर्मित है । उन्हें मूत्रोत्सिका (Glomerulus) कहते हैं, क्योंकि उनसे निरन्तर जल चूता रहता है । उनकी संख्या एक अंगुल स्थान में प्रायः ९० होती है । ये सूक्ष्मसिरा और धमनियों के बीच-बीच में फल के गुच्छे के समान स्थित होती हैं । एक-एक उत्सिका में एक-एक गुच्छमुखी सूक्ष्म धमनी प्रविष्ट होती है और वहाँ बगुलाकार गुच्छ में परिणत हो जाती है । इसे एक कलामय कोष आवृत करता है जिसे 'उत्सिकापुटक' (Bowman's Capsule) कहते हैं । इस पुटक के भीतर धीरे धीरे सूक्ष्मयिन्दुओं के रूप में रक्त का जलीय प्लाज्मा भाग निःसृत होता है जिसे मूत्र कहते हैं । मूत्र वहाँ से उत्सिकापुटक से निकले हुये सूक्ष्म मूत्रवहस्रोत के द्वारा घृक्क के भीतर चला जाता है । ये मूत्रवह स्रोत शुद्धाश्र के समान फैले होते हैं और सर्प की तरह कुण्डलाकार गति में केन्द्र की ओर जाते हैं । इस प्रकार प्रत्येक स्रोत में ४ भाग होते हैं :—

चित्र ४३

- १ (१) आद्यकुण्डलिकाभाग (First convoluted tubule)
- (२) पाशभाग (Henle's loop)
- (३) अन्त्यकुण्डलिकाभाग (Second convoluted tubule)
- (४) शशुभाग (Straight tubule)

एक दूसरे के पार्श्वभाग में स्थित शशुस्रोतों से घृक्कसिस्तरिकाओं का निर्माण होता है । अन्त्र के समान फैले रहने के कारण इन स्रोतों को आन्त्र स्रोत (Uriniferous or convoluted tubules) कहते हैं ।

रक्तसंवहनः—प्रत्येक उत्सिका से मूत्रोत्सर्गावशिष्ट रक्त उससे

हुई सूक्ष्मसिरा के द्वारा छोट जाता है। इस प्रकार उत्सिकाओं से निकली हुई छोटी-छोटी सिरायें परस्पर मिलकर घमनी के साथ रहने वाली सिराओं में प्रविष्ट हो जाती हैं। ये भी घृक्केन्द्र की ओर जाने वाले मूत्रवह स्त्रोतों के साथ साथ चलती हुई परस्पर एकत्रित होकर स्थूल सिराओं में परिणत हो जाती हैं और अन्त में अनुघृक्क सिराओं के द्वारा अधरा महासिरा में प्रविष्ट होती हैं।

अनुघृक्क घमनी की अन्तिम अनुशाखायें घृक्क के यद्विर्वस्तु में दोनों ओर स्थित होकर उत्सिका का अपनी शाखाओं के द्वारा धारण और पोषण करती हैं। इन्हें ऋजुका धमनियाँ (Arteriae rectae) कहते हैं। उन्हीं के पार्श्व में उन्हीं के समान ऋजुका सिरायें (Venae rectae) हैं जिनमें उत्सिकाओं से निकली हुई सिरायें मिलती हैं। घृक्क रोगों के अतिरिक्त मूत्र के साथ रक्तस्थ लसीका का स्राव नहीं होता, इसका कारण उत्सिकापुटकों की आम्बन्तरकला का विशिष्ट प्रभाव है।

गयीनी (Ureters)

ये घृक्क में निर्मित मूत्र को मूत्राशय में पहुँचानेवाली नलिकायें हैं। इनकी लम्बाई १२ से १६ इंच तक होती है तथा नलिका का विस्तार हंसपत्र-गत नलिका के बराबर होता है। इनका शिर ऊपर की ओर घृक्कालिन्द से सलग्न है और नीचे की ओर तिरछी गति से पृष्ठवंश के सामने श्रोणिगुहा में उतर कर वस्ति के दोनों पार्श्वों में पीछे की ओर खुलती हैं।

रचना:—इसमें तीन आवरण होते हैं:—

(क) सौम्रिक (यादा) (ख) पेशीय (मध्यम)

(ग) श्लेष्मलकला (आम्बन्तर)

वस्ति (Bladder)

यह छोटे कद्दू के आकार का होता है और वस्तिगुहा में भगस्थसन्धि के पृष्ठभाग में स्थित है। यह पुरुष में गुदनलक के आगे तथा स्त्रियों में योनि और गर्भाशय के आगे रहता है। ऊपर और पीछे की ओर इसके चौड़े भाग को शिर तथा निचले संकीर्ण भाग को ग्रीवा कहते हैं जो मूत्रप्रसेक से मिला रहता है।

रचना:—यह चार स्तरों से निर्मित होता है:—

(१) सैदिक (Serous)

(२) पेशीय (Muscular)

(३) उपश्लैमिक (Submucous or areolar)

(४) श्लैमिक (Mucous)

इसकी स्वतन्त्र पेशियाँ आमाशय के समान घृत, लम्ब तथा तिर्यक् तीनों दिशाओं में व्यवस्थित होती हैं । प्रोवा के पास घृत पेशियाँ विशेषतः विकसित होती हैं जिनसे वस्तिसंकोचनी (*Sphincter vesicae*) का निर्माण होता है । इसकी श्लेष्मलकला गवीनी के समान ही होती है जिसमें श्लेष्मग्रन्थियाँ रहती हैं । इन ग्रन्थियों का प्रोवा के पास बाहुल्य होता है ।

वस्ति में रक्तवह तथा रसवह स्रोत एवं नाडियों की घट्टता होती है । यहाँ ग्रिक तथा वस्तिप्रदेश में स्थित नाडीचक्रों की शाखाएँ जाती हैं । नाडीसूत्रों के मार्ग में जहाँ तहाँ गण्डकोपाणु भी पाये जाते हैं ।

मूत्रप्रसेक (Urethra)

यह मूत्रवाहिनी बलिका कला निर्मित तथा १२ अंगुल लम्बी है और पुरुष के वस्तिद्वार से शिरनाम तक शिरन के अधोभाग में मध्यरेखा में फैली हुई है । इसके तीन भाग होते हैं :—

(१) वस्तिद्वारिक (Prostatic)

(२) मूलाधारिक (Membranous)

(३) शैशिक (Penile)

प्रथम भाग दो अंगुल लम्बा पौष्टग्रन्थि के बीच में फैला हुआ है । उसके भीतर दोनों ओर शुक्रप्रसेक के छिद्र होते हैं । द्वितीय भाग मूलाधार देश में स्थित है तथा कलानिर्मित और एक अंगुल लम्बा है । यहाँ पर मूत्रद्वार संकोचनी पेशी रहती है । अन्तिम भाग शिरन के अधोभाग में लगा रहता है और सबसे लम्बा है । यह मार्ग में कुछ विस्तृत और ९ अंगुल लम्बी है । उसका मूलभाग विस्तृत गोलाकार और शिरनमूल में रहता है । उसके बाहर दोनों ओर शिरन-मूलिक ग्रन्थियाँ रहती हैं जिनके स्रोत मूलप्रसेक के भीतर खुलते हैं । स्त्रियों का मूत्रप्रसेक २ अंगुल लम्बा होता है और उसका द्वार योनिद्वार के ऊपर आगे की ओर तथा भगशिरिका के नीचे देखा जा सकता है ।

वृक्क का कार्य

वृक्क का कार्य रक्त से मूत्र के उपादानों को पृथक् करना है जिसमें रक्त का संवदन समानरूप से बना रहता है । वृक्क के कोपाणु अत्यन्त उत्तेजनाशील हैं

जिससे रक्त के संघटन में स्थल परिवर्तन होने से भी उनके द्वारा पता चल जाता है और उसके कारण मूत्र का अधिक चाव या उसके रासायनिक संघटन में अन्तर आ जाता है। मूत्र के कुछ उपदार्थों, जैसे यूरिया का घृक् के द्वारा पूर्णतः वासर्ग हो जाता है और कुछ, जैसे सामान्य लवण, प्राकृत परिमाण से अधिक होने पर त्याज्य होते हैं। फुफ्फुसों के साथ मिलकर घृक् प्राकृत रक्त-प्रतिक्रिया को भी बनाये रखते हैं।

यद्यपि घृक् के विभिन्न भागों की क्रिया के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं, तथापि घृक् का कार्य समष्टिरूप से आसानी से समझा जा सकता है। घृक् में एक प्रकार का द्रव (धमनीरक्त) प्रविष्ट होता है और दो प्रकार के द्रव (सिरारक्त और मूत्र) उससे बाहर निकलते हैं ये दोनों द्रव धमनीरक्त से संघटन में भी भिन्न होते हैं। निम्नांकित सारिका में धमनीरक्त तथा मूत्र के प्रमुख अवयवों की तुलना की गई है:—

	धमनीरक्त		मूत्र	
कुल ठोस पदार्थ	१०	प्रतिशत	४	प्रतिशत
मांसतत्व	७.५	से ८	०	"
सामान्य लवण	०.८	"	१.२	"
यूरिया	०.०३	"	२.०	"
शर्करा	०.१५	"	०	"
मूत्राश्ल	०.००३	"	०.०५	"
हिप्पूरिक अश्ल	०	"	०.०७	"
क्रियेटिनीन	०.००१	"	०.०९	"

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि किसी द्रव पदार्थ की दो अन्य द्रव पदार्थों में, जिनका संघटन भिन्न है, बिना किसी बाह्य शक्ति के परिणत करना सम्भव नहीं। अन्य सावक प्रक्रियाओं के समान घृक् में यह शक्ति उसके कोषाणुओं तथा धमनीरक्त के दबाव से आती है। इस प्रकार मूत्राश्ल घृक् के कार्य का परिणाम है। शक्ति का उपयोग ज्वलन के द्वारा होता है और ज्वलन के लिए ओपजन की आवश्यकता होती है। अतः स्वस्थ घृक् के लिए ओपजन की उचित प्राप्ति अर्थात् रक्त का समुचित संवहन आवश्यक है। इसी लिए हृद्दोगों के उपद्रव स्वरूप भी घृक् रोगों की उत्पत्ति होती है। इन वैकृत अवस्थाओं में

वृक्क का कार्य भार कम करने के लिए त्वचा को श्वेदन के द्वारा उत्तेजित किया जाता है जिससे कुछ मलोत्सर्ग का कार्य त्वचा के द्वारा भी सम्पन्न होता है और वृक्क को थोड़ा विश्राम मिलता है ।

मूत्रनिर्माण की प्रक्रिया

इसके सम्बन्ध में तीन मुख्य सिद्धान्त प्रचलित हैं:—

- (१) लुडविग का भौतिक या यान्त्रिक सिद्धान्त ।
- (२) बोमेन या हिडेनहेन का शारीर या धातवीय सिद्धान्त ।
- (३) कुदानी का शोषण सिद्धान्त ।

(१) लुडविग का निःस्यन्दन सिद्धान्त—कार्ल लुडविग (१८४४) के भौतिक सिद्धान्त के अनुसार मूत्र के सभी अवयव यथा जल, सैन्द्रिय घटक तथा निरिन्द्रिय छवण मूत्रोत्सिका में निःस्यन्दन और प्रसरण की सामान्य भौतिक विधियों से उत्पन्न होते हैं । मूत्र के विविध उपादान मूत्रोत्सिका-पुटक के रक्त में पाये जाते हैं और प्रादुर्भूत मूत्र पहले आद्यन्त पतला होता है । इसके अनन्तर मूत्रवहस्रोतों में आगे बढ़ने पर उसके अनेक घटक तथा अधिकांश जल पुनः शोषित हो जाते हैं और इस प्रकार इन पदार्थों का प्रतिशत परिमाण बढ़ने से मूत्र गाढ़ा हो जाता है । दूसरे शब्दों में, स्नान मूत्रोत्सिका के कोषाणुओं का तथा शोषण मूत्रवहस्रोतों का कार्य है ।

मूत्रवहस्रोतों में पुनः शोषण के प्रमाण

इसमें रिचार्ड्स और वर्न की विधि द्वारा मूत्रोत्सिकासुत मूत्र जो मूत्रोत्सिकापुटक में संचित होता है प्राप्त किया जाता है और उसकी परीक्षा की जाती है । मूत्रोत्सिका पुटक में एक पिपेट को प्रविष्ट किया जाता है और वहाँ स्थित मूत्र को उसके द्वारा सौंच कर देखा जाता है ।

(१) यह देखा गया है कि एक भूरे रंग के सूत्राशय में सञ्चित मूत्र छोराइड से रहित या हल्क कि मूत्रोत्सिका में उपरक्त तथा उपर्युक्त विधि द्वारा प्राप्त मूत्र में छोराइड की वही मात्रा मिली जो रक्तमावतः रक्त में उपस्थित रहती है । इस प्रकार मूत्रवहस्रोतों के द्वारा पुनःशोषण सिद्ध हो चुका है ।

(२) यह भी देखा गया है कि मूत्रवहस्रोतों के कोषाणु पोटाशियम सापनाइड के सनु विलयन के प्रविष्ट करने से क्रियाहीन हो जाते हैं । इस

प्रकार मूत्रवह स्त्रोतों के कोषाणुओं को निष्क्रिय बना देने के बाद उसके यस्ति में एकत्रित मूत्र का संघटन मूत्रोत्सिका में निर्मित मूत्र के समान ही पाया गया।

(३) पोय्यूरीन का अन्तःक्षेप करने पर मूत्र का स्त्राव कम हो जाता है। इसका कारण यह बतलाया गया है कि पोय्यूरीन मूत्रवह स्त्रोतों के कोषाणुओं को उत्तेजित करता है जिससे जल का अधिक शोषण होने लगता है और इस लिए मूत्र गाढ़ा और मात्रा में कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्लोराइड तथा अन्य लवणों का शोषण कम होने लगता है जिससे मूत्र में अपेक्षाकृत क्लोराइड की अधिकता हो जाती है।

(२) योमेन-हिडेनहेन का सिद्धान्त—योमेन (१८४२) के शारीरसिद्धान्त के अनुसार जो बाद में हिडेनहेन के प्रायोगिक कार्यों में समर्थित हुआ था, निम्नांकित तथ्यों का अनुसन्धान हुआ:—

(१) मूत्रोत्सिका-पुटक में भौतिक तथा शारीर दोनों प्रक्रियाओं के सम्मिश्रण से मूत्र के अधिकांश निरिन्द्रिय लवण तथा जल परिष्कृत होते हैं। सारांशतः यहाँ पर भौतिक प्रक्रियायें मूत्रवह स्त्रोतों के कोषाणुओं की शारीरक्रियाओं से सहायक परिवर्तित हो जाती हैं अतः मूत्रनिर्माण में दोनों का सम्मिलित प्रभाव देखा जाता है।

(२) मूत्र के सभी सेन्द्रिय उपादान तथा कुछ निरिन्द्रिय उपादान मूत्रवह स्त्रोतों के कुण्डलाकार तथा पत्र भागों में परिष्कृत होते हैं जिसका कारण स्त्रोतों के इन भागों में स्थित कोषाणुओं की शारीर क्रियायें बतलाई जाती हैं।

अतः इस सिद्धान्त के अनुसार वृक्क में दो विभिन्न प्रक्रियायें होती हैं:—

(१) मूत्रोत्सिकापुटक में जल तथा निरिन्द्रिय लवणों का निस्पन्दन होता है।

(२) मूत्रवह स्त्रोतों में सेन्द्रिय उपादानों का स्त्राव होता है। इसके पक्ष में निम्नांकित प्रमाण दिये जाते हैं:—

(क) मेडक के वृक्कों में

(१) मेडक में घृक्कधमनी के अतिरिक्त घृक्कप्रतीहारिणी सिरा भी होती है जो केवल मूत्रवह स्त्रोतों के कुण्डलिका भागों में रक्त प्रदान करती है। नस-बौम (१८७८) नामक विद्वान् ने दिखाया कि यदि घृक्कधमनी को बांध दिया जाए तो मूत्रस्त्राव एकदम रुक जाता है यद्यपि कुण्डलिका भागों में घृक्कप्रतीहारिणी सिरा द्वारा रक्त पहुँचता रहता है।

(२) यदि घृणकधमनी को बाँधकर जल, लवणों, दूधरा या मांसतत्त्वसार का घृणकप्रतीहारिणी सिरा में अन्तःक्षेप किया जाय तो मूत्रवह नहीं होगा ।

(३) किन्तु यदि इसमें यूरिया, मूत्राम्ल या अन्य सेन्द्रिय उपादानों का अन्तःक्षेप किया जाय तो उसमें थोड़ा मूत्र का स्राव होता है जिसमें यूरिया आदि अन्तःक्षेप पदार्थों का आधिक्य देखा जाता है । इससे सिद्ध है कि यूरिया मूत्रवह स्रोतों के आधारक कोषाणुओं की क्रियाशीलता को उत्तेजित करता है ।

उपर्युक्त तीनों प्रयोगों से यह सिद्ध है कि—

(१) मूत्रोत्सिकापुटक में रक्तस्रावदन अवरोध हो जाने से जल का स्राव बिलकुल बन्द हो जाता है, और जल, लवणों, दूधरा तथा मांसतत्त्वसार का निर्वहण मूत्रोत्सिका द्वारा होता है ।

(२) यूरिया, मूत्राम्ल आदि सेन्द्रिय अवयव मूत्रवह स्रोत के कुण्डलिका भागों के कोषाणुओं से छुत होते हैं ।

(ख) पक्षी के घृक्क में:—

पक्षी के मूत्र में मूत्राम्ल अधिक परिमाण में होता है और गरीबियों को बाँध देने पर यूरेट केवल मूत्रवह स्रोत के कुण्डलिका भागों के स्तम्भाकार कोषाणुओं में पाये जाते हैं न कि मूत्रोत्सिका पुटक में ।

(ग) स्तनधारी जीवों के घृक्क में:—

यदि कोई रक्तक द्रव्य (सोडियम सल्फैन्डिगोटेट या इन्डिगोकार्मिन) स्तनधारी जीवों में प्रविष्ट किया जाय तो इसका उत्सर्ग घृणककोषाणुओं द्वारा होता है । हिटेनहेन के प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि यदि घृणक के एक भाग की सूक्ष्मदर्शक पन्त्र से परीक्षा की जाय तो ये रक्तक द्रव्य केवल कुण्डलिका भागों के स्तम्भाकार कोषाणुओं में देखे जाते हैं न कि मूत्रोत्सिका पुटक के चपटे कोषाणुओं में । मूत्रवह स्रोत की नलिका में भी मूत्रोत्सिका भाग का सावरंगहीन तथा कुण्डलिका भागों में रक्षित दिखाई देते हैं ।

मूत्रोत्सिका में नित्यन्दन के प्रमाण

मूत्रोत्सिका में स्राव नित्यन्दन विधि से होता है, यह निम्नांकित प्रमाणों से सिद्ध होता है:—

(१) मूत्रोत्सिका-पुटक की सूक्ष्म रचना इसके पक्ष में है क्योंकि उसमें स्थित चपटे कोषाणु नित्यन्दन की भौतिक प्रक्रिया के अत्यधिक उपयुक्त है ।

(२) यदि घृक्कनादियों को विच्छिन्न कर घृक्क की सूक्ष्म घमनियों का रक्तभार बढ़ा दिया जाय तो मूत्रनिर्माण अधिक होने लगता है ।

(३) यदि इनका रक्तभार कम कर दिया जाय तो मूत्र का स्राव कम हो जाता है ।

(४) शीत से रक्ता की रक्तवाहिनियों का संकोच हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप घृक्क की रक्तवाहिनियों में प्रसार एवं रक्तभार बढ़ जाता है, अतः मूत्र का निर्माण अधिक होने लगता है ।

(५) यदि रिंगर के द्रव का रक्तसंवहन में अन्तःक्षेप किया जाय तो मूत्र अत्यधिक परिमाण में निकलता है और उसका संघटन भावः उस द्रव के समान हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि अन्तःक्षिप्त द्रव का मूत्रोत्सिका में केवल निस्यन्दन होता है ।

१. मूत्रोत्सिका कोषाणुओं की घातवीय शारीरक्रियाओं के प्रमाण

मूत्रोत्सिका के कोषाणु अधिक वंश में भौतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसके निम्नांकित प्रमाण हैं:—

(१) घृक्कसिरा को बाँध देने से जब घृक्कगत केसिकाओं का द्रवाव अत्यधिक बढ़ जाता है तब निस्यन्दन के अनुकूल स्थिति रहने पर भी मूत्रस्राव बढ़ने के बदले घट जाता है ।

(२) यदि घृक्कघमनी को केवल १० सेकण्ड के लिए बाँध दिया जाय तब मूत्रस्राव उतने ही काल के लिए नहीं रुकता, बल्कि लगभग २ घण्टों तक रुका रहता है ।

उपर्युक्त प्रमाणों की व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि मूत्रस्राव रक्तभार पर निर्भर नहीं है, बल्कि रक्त के परिमाण फलतः रक्त में प्रवाहित ओपजन की मात्रा पर निर्भर है । घृक्कसिरा को बाँध देने से घृक्कों का रक्तप्रवाह रुक जाता है । अतः घृक्ककोषाणुओं का कार्य बन्द हो जाता है । दूसरी ओर, घृक्क-घमनी को केवल १० सेकण्ड के लिए भी बाँध देने से घृक्ककोषाणु इतने विकृत हो जाते हैं कि चतिर्पति में कुछ समय लग जाता है । अतः मूत्रस्राव लगभग २ घण्टों तक बन्द रह जाता है । इस प्रकार घृक्कों में अतिशीघ्र श्वासावरोध (ओपजनावपत्ता) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

(३) धृक्क अत्यधिक उत्तेजनाशील हैं ओपजन की कमी का सहन नहीं कर सकते । अतः धृक्कों में स्वल्प ओपजनयुक्त रक्त के प्रवाहित होने पर मूत्र की मात्रा कम हो जाती है या एकदम बन्द हो जाती है ।

(४) सीम धृक्कगोत्र में मूत्रोत्सिका कोषाणुओं के शोषयुक्त तथा जल होने पर अलव्युमिन तथा रक्तकोषाणु भी मूत्रोत्सिकापुटक में चले जाते हैं और मूत्र में पाये जाते हैं ।

(५) यदि रक्तसंवहन में सोडियम सल्फेट का अन्तःश्लेष किया जाय तो ओप-जन का शरीर में उपयोग अधिक होने से मूत्र का परिमाण बढ़ जाता है ।

(६) सोडियम सल्फेट के अन्तःश्लेष से मूत्र का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है तथा बलोराइट का उत्सर्ग कम होता है । दूसरा अर्थ यह है कि धृक्ककोषाणु विशिष्ट क्रिया से सल्फेट का छाव करते हैं तथा बलोराइट को रोक लेते हैं ।

(७) गवीनियों को कुछ संकुचित कर देने पर मूत्रवह छोटों का दबाव बढ़ जाता है फलतः मूत्र का छाव भी बढ़ जाता है । यदि एक गवीनी को बाँध दिया जाय और सोडियम सल्फेट का उसी समय अन्तःश्लेष किया जाय तो जिस ओर घनघन के कारण मूत्रवह छोटों में दबाव बढ़ा है उस ओर के धृक्क से मूत्र का छाव अधिक होता है । इसका कारण यह है कि कुछ बाधा होने पर शारीर क्रियाएँ बढ़ जाती हैं । यदि छाव केवल निस्पन्दन के कारण होता तो मूत्रवह छोटों में दबाव बढ़ जाने के कारण मूत्रछाव कम हो जाता ।

(८) मूत्र का व्यापनभार रक्त की अपेक्षा अत्यधिक है । इसका अर्थ यह है कि धृक्क के मूत्रनिर्माण कार्य में अवरण कुछ शक्ति नष्ट होती है और इस कार्य का परिमाण व्यापनभार के अन्दर से निश्चित किया जा सकता है । इससे स्पष्ट है कि मूत्रछाव एक विशुद्ध निस्पन्दन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कोषाणुओं की घातवीर्य क्रिया का परिणाम है ।

मूत्रवहछोटों के कोषाणुओं की घातवीर्य क्रिया

मूत्रवहछोटों में छाव केवल घातवीर्य शारीरक्रियाओं से उत्पन्न होता है । इसके पक्ष में निम्नांकित प्रमाण हैं:—

(१) मूत्रवहछोटों की सूक्ष्म रचना (स्थूल स्तम्भकार कोषाणु रेखांकित

ओजःसार से युक्त) निरयन्दन के लिए अनुकूल नहीं है, अपि तु घातवीय शारीर क्रियाओं के अनुकूल है।

(२) शक्ति के उपयोग में ओपजन अनिवार्यतः आवश्यक है और इस लिए शारीर क्रियाओं के बढ़ने से मूत्रवह स्रोतों की क्रिया भी बढ़ जाती है। जितना ही मूत्र का परिमाण अधिक होगा ओपजन का उतना ही उपयोग हुआ तथा कार्यन द्विओपिद् का उतनी ही उत्पत्ति हुई, यह समझना चाहिये।

वृक्षों के द्वारा ओपजन का उपयोग हृदय के समान ही अत्यधिक होता है। इसी लिए वृक्षों में रक्त भी अधिक मात्रा में पहुँचता रहता है। यह अनुमान किया गया है कि मनुष्य के वृक्षों में प्रतिदिन ५०० से १००० लिटर रक्त का आयात-निर्यात होता है।

(३) मूत्र के अम्लपदार्थ मूत्रवह स्रोतों के कुण्डलिका भागों में ही उत्पन्न होते हैं, अतः किसी अम्ल द्रव्य का अन्तःशेष करने पर यदि वृक्ष की परीवा की जाय तो उसके कुण्डलाकृति स्रोतों के कोषाणु रक्तवर्ण मिलते हैं तथा पुटक भाग वर्णहीन होता है। यह स्रोतों के कोषाणुओं की विशिष्ट सावक क्रिया का निदर्शक है।

(४) वृक्ष कोषाणुओं के द्वारा सेन्द्रिय कार्बोनों से हिप्पूरिक अम्ल, अमोनिया तथा एसिड सोडियम का निर्माण भी उनकी घातवीय क्रिया का प्रबल प्रमाण है।

कुशनी का शोषण सिद्धान्त

मूत्रोत्पत्ति के सम्बन्ध में एक आधुनिक सिद्धान्त कुशनी (१९१७) ने प्रचलित किया। यह सिद्धान्त लुडविग के भौतिक सिद्धान्त के समान ही है। किन्तु दोनों में अन्तर यही है कि कुशनी के मत में मूत्रवहस्रोतों में जो पुनः शोषण होता है वह सामान्य न होकर सापेक्ष या विशिष्ट (Differential or Selective) होता है, जिससे, मूत्र के कुछ अवयव अधिक तथा कुछ कम परिमाण में शोषित होते हैं। इस प्रकार यह केवल एक भौतिक सिद्धान्त ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा मूत्रवह स्रोतों के कोषाणुओं की घातवीय क्रिया भी सिद्ध होती है।

इस मत के अनुसार यूरिया या मूत्र के सभी अवयवों का साव मूत्रवह स्रोतों में नहीं होता, बल्कि मूत्र के सभी अवयव मूत्रोत्सिकापुटक में ही बनते

हैं और उनका परिमाण भी वही होता है जिस परिमाण में वे रक्तमस्तु में रहते हैं । इस प्रकार मूत्रोत्सिका से निस्पन्दित पदार्थ और कुछ नहीं होता वस्तुतः वह रक्तमस्तु ही है जिससे मांसतत्त्व का भाग पृथक् हो जाता है । इसकी प्रतिक्रिया भी रक्त के समान ही चारीय होती है न कि यहिर्निःसृत मूत्र के समान भ्रष्ट । जल का पुनः शोषण इतना अधिक हो जाता है कि मूत्रोत्सिका से निस्पन्दित द्रव का १०० ही बाहर मूत्र के रूप में निकलता है । मांसतत्त्व सामान्यतः निस्पन्दित नहीं होते, क्योंकि प्राकृत शुद्धकोषाणु पिच्छिल द्रव्यों यथा रक्तगत मांसतत्त्वों के लिए अप्रयेक्ष्य होते हैं । इसका प्रमाण यह भी है कि यदि अन्य पिच्छिल द्रव्य यथा खजूर की गोंद का शरीर में अन्तःश्लेष किया जाय तो वात्सर्ग मूत्र में नहीं होता ।

मूत्रोत्सिका में निर्मित मूत्र के अवयवों को कुशनी ने दो वर्गों में विभाजित कर दिया है:—

(१) उपादेय द्रव्य (Threshold substances)—ऐसे द्रव्य जो शरीर की क्रिया के लिए उपादेय हो यथा शर्करा, क्लोराइड आदि ।

(२) अनुपादेय द्रव्य (Non-threshold substances) :—ऐसे द्रव्य जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं, फलतः र्थाश्रय हैं, यथा यूरिया, सल्फेट आदि ।

मूत्रवहस्रोतों के कोषाणुओं की विशिष्ट या छातवीय क्रिया से मूत्र के विविध उपादानों का विभिन्नरूप से शोषण होता है । उपादेय द्रव्य जो रक्त के प्राकृत अवयव हैं पुनः शोषित होकर रक्त में लौट जाते हैं । उनका वात्सर्ग केवल उसी अवस्था में होता है जब रक्त में उनकी उपस्थिति प्राकृत परिमाण से अधिक होती है । यथा सरवशर्करा ०.१८ प्रतिशत से अधिक होने पर ही मूत्र में आने लगती है । उपादेय द्रव्यों का पुनः शोषण मूत्रवह स्रोत के प्रत्येक भाग में समान रूप से नहीं होता । सत्वशर्करा का पुनः शोषण मूत्रवहस्रोत के आद्य भाग में अधिक होता है तथा क्लोराइड का अन्य भाग में अधिक होता है । अनुपादेय द्रव्य शोषित नहीं होते, बल्कि पूर्णतः उत्सर्जित हो जाते हैं और मूत्रवह स्रोतों में कुछ जल का पुनः शोषण हो जाने के कारण ये अधिक सान्द्ररूप में उपस्थित होते हैं ।

यदि रक्त और मूत्र के विविध उपादानों की सान्द्रता की तुलना की जाय तो पता चलेगा कि उपादेय द्रव्यों यथा क्लोराइड, सोडियम, खटिक तथा मैगनीशियम प्रायः समान है और अनुपादेय द्रव्यों यथा यूरिया, क्रियेटिन, सल्फेट, फास्फेट आदि की सान्द्रता रक्त की अपेक्षा मूत्र में अधिक है। समान मात्रा के रक्त की अपेक्षा मूत्र में यूरिया ६० गुना, मूत्राण्ड २५ गुना, क्रियेटिनिन १०० गुना, फास्फेट ३० गुना तथा सल्फेट ६० गुना पाया जाता है। सान्द्रता की इस विभिन्नता से कुशनी इस निर्णय पर पहुँचे कि १ लिटर मूत्र की उत्पत्ति के लिए ९० लिटर रक्तमस्तु का निस्पन्दन मूत्रोत्सिका से होना चाहिये।

स्टार्लिंग और बने ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया है कि जब मूत्रवह छोटगत आवरक धातु की क्रिया सायनाइड बियों के द्वारा विकृत हो जाती है, तब मूत्र में यूरिया और सल्फेट का परिमाण कम तथा क्लोराइड का अधिक हो जाता है। इसका कारण यह है कि रूँकि विष के कारण मूत्रवह-स्रोतों के आवरक कोषाणुओं की सायक शक्ति कम हो जाती है, अतः यूरिया और सल्फेट का छाव कम हो जाता है तथा क्लोराइड का पुनः शोषण भी कम हो जाता है।

यह भी देखा गया है कि मूत्रवह स्रोतों पर शीत का प्रभाव भी विष के समान ही होता है। वृक्कों को १२ डिग्री सेण्टीग्रेड के नीचे तक ठंडा कर देने से रक्तप्रवाह कम होने पर भी मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में मूत्र का संघटन केवल मांसरस छोड़कर रक्त के समान ही होता है। इससे यह स्पष्ट है कि शीत के द्वारा मूत्रवह स्रोतों की क्रिया बाधित हो जाती है जिससे जल तथा उपादेय द्रव्यों का शोषण नहीं होने पाता।

वृक्कार्य का नियन्त्रण

यद्यपि इस विषय में अभी बहुत कम तथ्यों का पता लग सका है तथापि यह समझा जाता है कि वृक्कजन्य मूत्रछाव का नियन्त्रण नाडीसंस्थान के द्वारा होता है। वृक्क से सम्बद्ध नाड़ियाँ दोनों पार्श्वों में स्थित वृक्क नाडीचक्र से आती हैं। वृक्क नाडीचक्र में मेदस तथा अमेदस दोनों प्रकार के नाडीमूत्र होते हैं और गण्डकोषाणुओं के समूह भी पाये जाते हैं। इस

जाड़ीचक्र में ११ वीं, १२ वीं तथा १३ वीं धनीय नाडियों के पूर्वमूल से सृज भी आते हैं। ये रक्तवाहिनियों का सकोच और प्रसार करते हैं। प्राणदानाडी की शाखायें भी धृक्कनाडी चक्र में आती है। अभी तक वास्तविक छावक नाडियों का सम्बन्ध धृक्क में नहीं देखा गया है तथापि मूत्र के परिमाण पर, केशिकाओं के रक्तभार का कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि केवल रक्तभार की उच्चता पर ही मूत्र का परिमाण निर्भर नहीं है, बल्कि रक्त के प्रवाह पर भी निर्भर है। उदाहरणतः यदि धृक्कसिरा को बाँध दिया जाय तो रक्तभार तो बढ़ जायगा, किन्तु रक्तप्रवाह कम होने से मूत्रछाव बन्द हो जायगा। व्यायाम से मूत्र कम हो जाता है तथा उदर नाडियों की उत्तेजना से मूत्र का प्रवाह कम हो जाता है, इससे स्पष्ट है कि सांविदनिक नाडियों की उत्तेजना से धृक्क की क्रियायें कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जलांश के उत्सर्ग के लिए धृक्क और त्वचा का पारस्परिक नियन्त्रण अवश्य प्रतीत होता है, किन्तु यह कहाँ तक रक्त की सान्द्रता पर निर्भर है, यह कहना कठिन है।

धृक्क के छाव से पीयूषग्रन्थि का भी सम्बन्ध है, क्योंकि उसके पश्चिम अण्ड के स्राव का अन्तःक्षेप करने से मूत्रप्रवाह कम हो जाता है और इसीलिए इसका उदकमेह में औषध के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ विद्वानों ने यह भी बतलाया है कि पीयूषग्रन्थि बलोराइड के उत्सर्ग का नियन्त्रण करती है और इस प्रकार परोक्षरूप से मूत्रनिर्हरण पर प्रभाव डालती है।

धृक्क की कार्यक्षमता

धृक्क की कार्यक्षमता का निर्णय धुरिया के केन्द्रीकरण की शक्ति से किया जाता है। इसी प्रकार रक्तकद्रव्यों के निर्हरण की शक्ति से भी इसका अनुमान किया जाता है। रक्तकद्रव्य का सिरा में अन्तःक्षेप किया जाता है और उसका ७० प्रतिशत प्रायः दो घण्टों में बाहर निकल जाता है।

मूत्र का बस्ति में प्रवेश

जैसे जैसे मूत्र का छाव होता है, अवधर्ता मूत्र का त्याग धृक्कालिन्द की ओर बढ़ता जाता है। यहाँ से गव्दीनी के द्वारा वह बस्ति में पहुँचता है। मूत्र की गति का क्रम और प्रकार बस्तिदर्शक पन्त्र से देखा गया है। मूत्र किसी

निश्चित गति से वस्ति में प्रविष्ट नहीं होता और न दोनों गवीनियों में ही समान रूप से प्रवाह होने का नियम है। उपवासकाल में, प्रतिमिनट २ या ३ घूँद मूत्र वस्ति में आता है। प्रत्येक बिन्दु गवीनी द्वार से वस्ति में चला जाता है और उसके बाद द्वार सुरन्त बन्द हो जाता है। मूत्र की गति में गवीनियों के परिसरण संकोच से सहायता मिलती है और वह दीर्घ श्वास, प्रवाहण, व्यायाम तथा भोजन के बाद १५-२० मिनटों तक बढ़ जाती है। गवीनियों के वस्ति से विशिष्ट संबन्ध के कारण मूत्र पुनः गवीनी में नहीं लौट पाता।

मूत्रत्याग (Micturition)

मूत्रत्याग की प्रतिक्रिया नाडीजन्य होती है। नाडीसम्बन्ध के निम्नांकित भाग होते हैं:—

(१) संज्ञावह नाड़ियाँ—यह वस्ति से प्रारंभ होकर द्वितीय और तृतीय त्रिकनाडियों के पश्चिम मूलों के द्वारा सुषुम्नाकाण्ड में पहुँचती हैं।

(२) केन्द्र—यह निम्नकटिप्रदेश में स्थित है।

(३) दो चेष्टावह नाड़ियाँ—वस्तिसंकोचनी अधिवस्तिकी नाड़ी (Nervi erigens) तथा वस्तिप्रसारणी संवाहिनी नाड़ियाँ (Hypogastric nerves)

संज्ञावह नाड़ियाँ

(१) जब क्रमशः वस्ति मूत्र से पूर्ण हो जाता है तब उसकी पेशियाँ फैल जाती हैं और इस प्रसार से संज्ञावह नाड़ियों के द्वारा उत्तेजना बाहर जाती है। वस्तिगत मूत्र के दबाव में सहसा वृद्धि होने से क्रमिक वृद्धि की अपेक्षा केन्द्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। स्वभावतः वस्तिगत दबाव १६० मिलीमीटर (जल) के बराबर हो जाता है जब प्रबल उत्तेजना केन्द्र में जाती है और मूत्रत्याग होने लगता है।

(२) मूत्रप्रसेक में स्थित मूत्रबिन्दु या अन्य किसी कारण से मूत्रप्रसेकगत नाड़ियों की उत्तेजना होती है और वहाँ से वह केन्द्र में पहुँच जाती है। अतः एक बार जब मूत्रत्याग प्रारम्भ हो जाता है तब बिना पूर्ण हुये वह रुकता नहीं।

(३) कृमि आदि से अन्त्र की उत्तेजना से भी केन्द्र उत्तेजित हो जाता है।

• चेष्टावह नाड़ियों

वस्ति की चेष्टावह नाड़ियाँ सविदनिक और प्रसविदनिक दोनों संस्थानों से आती हैं ।

सविदनिक सूत्र ऊर्ध्वकटिमूलों से उत्पन्न होते हैं और अधः मध्यान्त्रिक गण्ड में समाप्त हो जाते हैं । वहाँ से दूसरा सूत्र उत्पन्न होकर संवाहिनी नाड़ियाँ (Hypogastric nerves) बनाते हैं जो वस्ति के आघार में स्थित एक नाड़ीचक्र में समाप्त हो जाती है । प्रसविदनिक सूत्र द्वितीय तथा तृतीय त्रिकमूलों में उत्पन्न होकर वस्ति की दीवाल में स्थित एक गण्ड में समाप्त हो जाते हैं । मूत्रप्रसेक की संकोचनी पेशियों का नियन्त्रण गुदोपस्थिका नाड़ी (Pudic nerve) के द्वारा होता है जिनका उद्गम द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ त्रिकमूलों से होता है ।

जब कभी अधिवस्तिकी (वस्ति संकोचनी) नाड़ियों के द्वारा चेष्टा का वेग वस्ति में आता है तब वस्ति की पेशियों का संकोच तथा मूत्र प्रसेक संकोचनी का प्रसार हो जाता है और मूत्र बाहर निकल जाता है । इसके विपरीत, वस्ति नाड़ियों के द्वारा वस्ति की पेशियों का प्रसार तथा मूत्र प्रसेक संकोचनी का संकोच हो जाता है जिससे मूत्र वस्ति में रुका रहता है ।

केन्द्र

वस्ति तथा मूत्र प्रसेक से उत्तेजना ग्रहण करने के अतिरिक्त यह केन्द्र उच्चतर केन्द्रों के परतन्त्र नियन्त्रण में रहता है । शिशुओं में यह केन्द्र उच्चतर केन्द्रों के नियन्त्रण में नहीं होता, अतः जब थोड़ा सा मूत्र वस्ति में संचित होता है तब उसके दबाव से संज्ञावह नाड़ियों के द्वारा केन्द्र में उत्तेजना पहुँचती है और केन्द्र वस्ति संकोचनी नाड़ियों द्वारा चेष्टावह वेग प्रेरित करता है जिससे मूत्रन्यास होने लगता है । इस प्रकार यह प्रत्यावर्तित क्रिया पूर्ण स्वतन्त्ररूप से होती है । युवा व्यक्तियों में यह प्रत्यावर्तित क्रिया परतन्त्र नियन्त्रण में रहती है अतः मूत्रन्यास के लिए केन्द्र में संज्ञावह नाड़ियों के द्वारा वेग पहुँचने पर भी वस्तिनाड़ियों की क्रिया से मूत्र प्रसेक का संकोच होने से मूत्र वस्ति में रुका रहता है । इसी समय मूलाधार की पेशियाँ सिकुड़ती हैं जो मूत्रप्रसेक को बन्द रखती हैं । केन्द्र का यह परतन्त्र नियन्त्रण केन्द्र के ऊपर सुपुम्नाकाण्ड का आघात या छेद होने से नष्ट हो जाता है ।

इस प्रकार मूत्रत्याग सिद्धान्ततः एक प्रत्यावर्तित क्रिया होने पर भी व्यवहारतः परतन्त्र-क्रिया है और चंद्र की परतन्त्र पेशियों वस्ति पर दबाव डाल कर उसके रिक्त होने में सहायता करती है। परतन्त्र मूत्रत्याग में निम्न-क्रिया होती है:—

मूत्र रोगा की इच्छा से उदरपेशियों का संकोच होता है और इस प्रकार वस्ति पर दबाव बढ़ जाने से प्रत्यावर्तित क्रिया होती है। यह भी संभव है कि मूत्रत्याग की इच्छा मात्र से वस्ति केन्द्र पर प्रभाव पड़ता हो और उसे उत्तेजित कर देता हो। इसके अतिरिक्त, मूत्रप्रसेक में मूत्रबिन्दु के प्रविष्ट होते ही मूत्रत्याग की इच्छा प्रयत्न हो जाती है।

यदि मूत्रत्याग अधिक बार हो तो उसके कारण निम्नांकित हो सकते हैं:—

(१) प्रान्तीय—वस्तिरोध में जब कि वस्ति अत्यन्त उत्तेजनाशील हो जाता है और मूत्र के दबाव का सहन नहीं कर सकता।

(२) केन्द्रीय:—यथा भय और आदेश में जब कि वस्ति केन्द्र की उत्तेजनीयता बढ़ जाती है।

बच्चों में जब कि केन्द्र का नियन्त्रण पूर्णतः विकसित नहीं होता अनेक बार तथा स्वतन्त्ररूप से मूत्रत्याग होता है।

मूत्र को बाहर निकालने की शक्ति में भी कभी कभी कमी दिखलाई देती है यथा पौष्ट्यग्रन्थि की वृद्धि या मूत्रप्रसेक के संकोच के कारण मूत्रमार्ग में बाधा होने से। इसका कारण वस्तिगत पेशियों की दुर्बलता, शक्तिहीनता तथा उसका नाक्षीजन्य आघात भी होता है।

गवीनी

गवीनी के ऊर्ध्वभाग का सम्बन्ध कोष्ठीय नाड़ियों तथा अधोभाग का सम्बन्ध वस्तिनाड़ियों से है और उसमें निरन्तर संकोचतरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। कोष्ठीय नाड़ियों की उत्तेजना से गवीनी का संकोच बढ़ जाता है। इन्हीं संकोचतरंगों के कारण घृक्कालिन्द खुला रहता है और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति जैसी भी हो मूत्र बराबर वस्ति में जाता रहता है।

मूत्र का सामान्य स्वरूप

मात्रा:—हृत्को का प्रधान कार्य शरीर के जलोंश को सन्तुलित रखना है अतः मूत्र की मात्रा शरीर में वर्तमान जल की कमी या अधिकता पर निर्भर

करती है । इसके अतिरिक्त भोजन तथा रहन-सहन के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताएँ भी पाई जाती हैं । यह—

युवा व्यक्तियों में १००० से १५०० सी. सी.
शिशुओं में ३०० सी. सी.

३ से ६ वर्ष के बालकों में ५०० सी. सी. होती है

मूत्र की मात्रा निम्नांकित अवस्थाओं में स्वभावतः बढ़ जाती है:—

- (१) शीत ऋतु (२) गुरु आहार (३) सात्मीकरण की वृद्धि
(४) वातिक प्रकृति (५) भागवेग की अवस्था में
(६) द्रव्य का अधिक पान (७) मांसतत्त्व बहुल भोजन

निम्नांकित अवस्थाओं में मूत्र की मात्रा में वैकृत वृद्धि हो जाती है:—

- (१) इक्षुमेह (२) उदरमेह (३) ज्वरोत्तर दौर्बल्य
(४) कुष्ठ घृक्कशोथ तथा जीर्ण घृक्कशोथ (५) नाडीसंस्थान के कुछ रोग
मूत्र की मात्रा स्वभावतः निम्नांकित अवस्थाओं में कम हो जाती है:—

- (१) उष्ण ऋतु में अत्यधिक स्वेदन से
(२) आहारसंयम (३) द्रवाहार की कमी
मूत्र की मात्रा में वैकृत कमी निम्नलिखित कारणों से होती है:—

- (१) तीव्र घृक्कशोथ (२) ज्वर
(३) तीव्र अतिसार या वमन (४) दृढोष्ण
(५) मूत्रविपमपता (६) स्तब्धता

विशिष्ट गुरुत्व

स्वस्थ व्यक्तियों में यह १००१० से १००२५ तक रहता है और मात्रा के विपर्यस्त अनुपात में होता है । विशिष्ट गुरुत्व निम्नांकित अवस्थाओं में स्वभावतः अधिक होता है:—

- (१) जलपान नहीं करने से १२ घण्टों के बाद
(२) अत्यधिक स्वेदन (३) मूत्र की मात्रा कम होने से
निम्नांकित वैकारिक अवस्थाओं में बढ़ जाता है:—

- (१) तीव्र घृक्कशोथ (२) इक्षुमेह (१००४० तक)

विशिष्ट गुरुत्व १०००२ तक कम हो सकता है । स्वभावतः निम्नांकित अवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व कम होता है:—

(१) अधिक जल पीने से (२) मूत्र की मात्रा अधिक होने से निम्नांकित वैकारिक अवस्थाओं में भी कमो हो जाती है।—

(१) जीर्ण दृक्कशोथ जब दृक्क की उत्सर्गशक्ति घट जाती है ।

वर्ण

प्राकृत मूत्र पुरोचिलिन, यूरोपरिग्रिन तथा मुख्यतः यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण लोहित-पीत वर्ण का होता है। इसके अतिरिक्त मूत्र में निम्नांकित वर्ण पाये जाते हैं।—

- | | |
|---|----------------|
| (१) वर्णहीन—अत्यधिक मात्रा में | |
| (२) सान्द्रपीत से कपित रक्त—सान्द्रमूत्र में | |
| (३) द्रवेताम और दुग्धाम—पूय या रनेहकणों की उपस्थिति में | |
| (४) धूमाम या कपित दूग्ध—रक्त की उपस्थिति में | |
| (५) सारंग वर्ण— | सैन्टोनीन |
| हरित, हरित-नील— | मेथिलिन ब्लू |
| हरित, कपित—रक्त— | कार्पोलिक अम्ल |

पारदर्शकता

प्राकृत मूत्र बिलकुल साफ और पारदर्शक होता है। कुछ देर रखने पर फास्फेट के अवशेष से गढ़ला हो जाता है जो अम्ल मिलाने पर दूर हो जाता है। घूरिया के विघटन से मूत्र से अमोनिया की गंध आती है और यह गन्दा होता है। मूत्र की भलिनता पूय तथा अन्य वैकारिक अवस्थाओं के कारण होती है।

प्रतिक्रिया

प्राकृत मूत्र की प्रतिक्रिया अम्ल होती है जिसका कारण मूत्र में अम्ललवणों विशेषतः एस्त्रिड सोडियम फास्फेट की उपस्थिति है।

मूत्र की प्रतिक्रिया में काल तथा भोजन के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। मांसाहार से यह अम्ल हो जाता है, इसका कारण यह है कि मांस के गन्धक और स्फुरक ओपजनीकरण से गन्धकाम्ल एवं स्फुरकाम्ल में परिणत हो जाते हैं। इसके विपरीत, शाकाहार से मूत्र की प्रतिक्रिया क्षारीय हो जाती है, उसका कारण यह है कि शाक के सेन्द्रिय लवण, स्ट्राइटेट, टारट्रेट आदि ओपजनीकरण से क्षारीय कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। मांसाहार के बाद अम्ल का अधिक

निर्हरण शरीर के लिए उपादेय है, क्योंकि यदि अम्ल शरीर में रह जाय, तो रक्त के चारकोप की समाप्ति हो सकती है ।

जब मूत्र में भूतिभवन की क्रिया होती है तब वह अत्यन्त चारीय हो जाता है और उसकी गन्ध अमोनिया के समान हो जाती है । इसका कारण पूरिया का विघटन, फलतः अमोनिया कार्बोनेट की उत्पत्ति है ।

मूत्र की अम्लता प्रातःकाल में सर्वाधिक होती है । भोजन के कुछ घण्टों के बाद मूत्र उदासीन या चारीय हो जाता है । इसका कारण यह है कि भोजन के अनन्तर पाचन के निमित्त आमाशयिक रस के उदहरिताम्ल के निर्माण के लिए अधिक अम्ल का उपयोग हो जाता है और रक्त के चारीय अंश मूत्र में आकर उसे चारीय या उदासीन बना देते हैं । इसे 'चारीयचुद्धि' (Alkaline tide) कहते हैं । इस प्रकार श्वेत रक्त को अपनी प्रतिक्रिया बनाये रखने में कुछ हद तक सहायता पहुँचाते हैं । यह कार्य दो प्रकार से सम्पन्न होता है :—

(१) अम्ल निर्हरण से तथा (२) चार धारण से

इस प्रतिक्रिया नियामक कार्य में मूत्रवह स्रोत भाग लेते हैं, इसके तिम्नाङ्कित प्रमाण हैं :—

(क) मूत्रोत्सिका में शुत मूत्र में सोडियम के अम्ल तथा चारीय फास्फेट रक्त के समान अनुपात में हो होते हैं, किन्तु मूत्रवह स्रोतों में जाने पर कुछ सोडियम मुक्त होने के कारण चारीय फास्फेट अम्ल फास्फेट में परिणत हो जाते हैं और मुक्त सोडियम मूत्रवह स्रोतों के कोषाणुओं द्वारा पुनः शोषित हो जाता है ।

(ख) प्रयोगों द्वारा भी यह देखा गया है कि डिक फास्फेट (Dibasic phosphate) का रक्त में अन्तःश्लेष करने से मूत्र की अम्लता बढ़ जाती है जिसका कारण चारीय फास्फेट की अम्ल फास्फेट में परिणति है ।

उदजन अणु केन्द्रीभवन

प्राकृत मूत्र का उदजन अणुकेन्द्रीभवन उद ६ है । अम्लता अधिक से अधिक उद ४.८ तथा चारीयता उद ७.५ तक हो सकती है ।

द्रवणाङ्क

किसी विलयन का द्रवणाङ्क उसमें विलीन दोस पदार्थ के अणुओं की कुल संख्या पर निर्भर होता है । प्राकृत मूत्र का द्रवणाङ्क— 1.3° से 2.4° सेण्टीग्रेड तक है । अधिक जल पीने के बाद यह 0.004° सेण्टीग्रेड तथा अत्यधिक स्वेदा-

राम या लघुगवहुल और अपरद्रव आहार की अवस्था में—५° सेण्टीग्रेड तक हो सकता है।

ठोस पदार्थ

मूत्र में कुल ठोस पदार्थों का माप निम्नांकित सूत्र से किया जाता है:—

२५° सेण्टीग्रेड पर मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व के अन्तिम दो अङ्कों में २.६ से गुणा करने पर प्रतिलिटर ठोस पदार्थ की मात्रा ग्राम में निकलती है। यथा—
यदि मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व २५° से० पर १.०२० है तो १००० सी० सी० में कुल ठोस पदार्थों की मात्रा $२० \times २.६ = ५२$ ग्राम हुई।

मूत्र का सामान्य संघटन

औसतन १२५ ग्राम मांसतत्व से युक्त भोजन लेने पर प्रतिदिन मूत्र का मात्रा १५०० सी० सी० होता है। इसमें कुल ठोस पदार्थ ६० ग्राम (३५ ग्राम सेन्द्रिय और २५ ग्राम निरिन्द्रिय) होते हैं जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है—

यूरिया	३२.० ग्राम	यूरिक अम्ल	०.७ ग्राम
क्रियेटिनीन	१.५ "	हिप्प्यूरिक अम्ल	०.८ "
आमियाम्ल आदि	२.१ "	सोडियम बलोराइड	१५.० "
पोटाशियम	३.२ "	गन्धक	२.५ "
स्फुरक	२.५ "	अमोनिया	०.५ "
मैग्नीशियम	०.५ "	खटिक	०.३ "

प्राकृत अवस्था में नत्रजन का अधिक अंश यूरिया में पाया जाता है। नत्र-जन का औसत उत्सर्ग निम्नांकित रूपों में होता है:—

यूरिया	८५ से ९२%	यूरिक अम्ल	१ से २.५%
अमोनिया	२ " ४%	अन्य पदार्थ	५ " ६%
क्रियेटिनीन	३ " ५%		

मूत्र के संघटन पर आहार का प्रभाव

भोजन में मांसतत्व की अधिकता होनेसे मूत्र में नत्रयुक्त द्रव्यों का अधिकत्व हो जाता है यथा यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि। उपवास करने पर प्रथम दिन तो नत्रजनयुक्त द्रव्य-समा सल्फेट कम हो जाते हैं क्योंकि उस


समय शरीरमें शर्करा से शक्ति का उत्पादन होता है । जब शर्करा का कोष भी समाप्त हो जाता है तब धातुओं का ही पाचन होने लगता है । अतः उपवास के चौथे दिन मूत्र में मग्नजानयुक्त द्रव्य पुनः बच जाते हैं । इसके अतिरिक्त स्नेह का अपूर्ण ओषजनीकरण होने से एसिडों की उत्पत्ति होने लगती है, अतः उस समय मूत्र में अमोनिया की अधिकता हो जाती है । धातुगत मांसतत्त्व के विश्लेषण से क्रियेटिनिन के अतिरिक्त क्रियेटिन भी पाया जाता है । निरिन्द्रिय लवणों में बलोराइट की कमी हो जाती है ।

यूरिया

मांसतत्त्व के सारमीकरण से उत्पन्न अन्तिम द्रव्यों में यह मुख्य है और इस रूप में मग्नजन का अधिक अंश (लगभग ८६ प्रतिशत) शरीर के बाहर निकलता है । पुवा व्यक्ति में लगभग ३२ ग्राम यूरिया २४ घण्टों में उत्सृष्ट होता है, किन्तु आहार में मांसतत्त्व अधिक लेने से उसकी मात्रा अधिक हो जाती है । यह मूत्रल के रूप में कार्य करता है और जिस प्रकार कार्बन द्विओपिद् श्वसनकेन्द्र को उत्तेजित करता है उसी प्रकार यह भी वृषक का प्राकृत उत्तेजक है । इस प्रकार मूत्र के उत्सर्ग पर इसका निरन्तर प्रभाव होता है, अतः यह एक प्रकार के अन्तःस्राव के समान ही कार्य करता है ।

यूरिया के चतुर्पार्श्विक या पट्पार्श्विक स्फटिक बनते हैं जो वर्णहीन और गन्धहीन होते हैं । यह जल में तीव्र विलेय है तथा मग्नसार एवं एसिडों में घुल जाता है, किन्तु ईथर या बलोरोफार्म में अविलेय है । यद्यपि इसका विलयन शारीर्य नहीं है, तथापि यह दुर्बल पीठ के रूप में कार्य करता है और अम्लों के साथ मिलकर स्फटिकाकार लवण बनाता है । यथा नम्रिकाम्ल के साथ संयुक्त होकर यह यूरिया नाइट्रेट में परिणत हो जाता है, और आक्जेलिक अम्ल के साथ मिलकर यूरिया आक्जेलेट बनाता है ।

यूरिया सोडाबीन तथा अन्य वानस्पतिक एवं ज्ञान्त्य धातुओं में उपस्थित 'यूरियेम' (Ureae) नामक किण्वतत्त्व के कारण विश्लेषित होकर अमोनियम कार्बोनेट में परिणत हो जाता है । तीव्र क्षनिज अम्लों तथा चारों के साथ गरम करने पर भी यह अमोनिया में विघटित हो जाता है । सोडियम हाइपोब्रोमाइट से भी यह विश्लेषित हो जाता है और इससे मग्नजन तथा कार्बन द्विओपिद् उपलब्ध होते हैं ।



एक ग्राम यूरिया से ३५४ सी.सी. नग्नजन उपलब्ध होता है, अतः नग्नजन के परिणाम से मूत्र में यूरिया की मात्रा भी ज्ञात हो जाती है और इसीलिए यह प्रतिक्रिया यूरिया की मात्रा नापने के लिए काम में लाई जाती है।

यूरिया की उत्पत्ति


इसकी उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है:—

(क) आहार के मांसतत्त्व से।


(ख) धातुगत मांसतत्त्व के अपचय से।


(ग) यूरिक अम्ल के कुछ भाग से।

(क) आहारगत मांसतत्त्व से:—आहारगत मांसतत्त्व पाचनसंस्थान में मांसतत्त्वविश्लेषक किण्वतत्त्वों की क्रिया से आमिषामलों के रूप में परिणत हो खाते हैं जो अन्त्र तलिका में शोषित होकर यकृत में पहुँचते हैं। यहाँ किण्वों के द्वारा निरामिषीकरण होने पर वह दो भागों में विभक्त हो जाता है, नग्नजनयुक्त (NH_3) तथा नग्नजनरहित। नग्नजनरहित भाग यकृत में शर्करा-जन तथा स्नेह में परिणत हो जाता है और शरीर के उपयोग में आता है। नग्नजनयुक्त भाग अमोनिया में परिणत हो जाता है जो कार्बोनिक अम्ल, दुग्धाम्ल तथा सक्सिनिक अम्ल के साथ मिलकर अमोनियम कार्बोनेट, लैक्टेट या सक्सिनेट बनता है। इन अमोनियालवणों, मुख्यतः कार्बोनेट पर यकृत के किण्वतत्त्वों की क्रिया होती है और उनसे यूरिया प्राप्त होता है। अमोनियम कार्बोनेट से जल के दो अणु शृङ्ख होने पर यूरिया बन जाता है:—



अमोनियम कार्बोनेट से जल का एक अणु शृङ्ख होने पर अमोनियम कार्बोनेट बनता है तथा पुनः दूसरा अणु शृङ्ख होने पर यूरिया बन जाता है:—





इस प्रकार उत्पन्न यूरिया को 'यदिर्जात यूरिया' (Exogenous urea) कहते हैं और इसकी मात्रा आहारगत मांसतत्त्व के ऊपर निर्भर होती है। स्वभावतः मूत्र में ८५% यूरिया यदिर्जात होता है।

यदिर्जात यूरिया के प्रमाणः—

(१) उपवासकाल में, मूत्र में यूरिया की मात्रा कम हो जाती है।

(२) उपवासकाल में, मांसतत्त्वयुक्त आहार देने पर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है।

(३) उपवासकाल में, अमोनियम कार्बोनेट, रैबेटेट या सॉलिसनेट या आमिपासलों का आहार देने पर भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है।

तथापि आमिपासलों से यूरिया की उत्पत्ति निर्जलीकरण की सामान्य प्रक्रिया से नहीं होती, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ऑर्निथिन (Ornithine) नामक द्रव्य प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है।

(४) धातुगत मांसतत्त्वों के अपचय से—यदि आहार में मांसतत्त्व न भी लिया जाए तो भी धातुगत मांसतत्त्वों के विघटन से शरीर में लगभग १५ प्रतिशत यूरिया का निर्माण होता है। धातुगत मांसतत्त्व पहले आमिपासलों में परिणत होते हैं, उसके बाद यकृत में यूरिया में बदल जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न यूरिया को 'अन्तर्जात' (Endogenous) कहते हैं। इसकी मात्रा शरीरगत मांसतत्त्व के अपचय पर निर्भर होता है, अतः यह अत्यधिक व्यायाम के बाद बढ़ जाती है।

(५) यूरिक अम्ल से—शरीर में उत्पन्न यूरिक अम्ल का प्रायः आधा भाग मूत्राग्लविश्लेषण किण्वतत्त्व के द्वारा यूरिया में परिणत हो जाता है।

यूरिया का उत्पत्तिस्थान

यूरिया प्रधानतः यकृत में तथा लगभग ५ प्रतिशत शरीर के अन्य धातुओं में बनता है। इसके निम्नांकित प्रमाण हैंः—

(६) यकृत—यूरिया आमिपासलों के द्वारा यकृत में बनता है न कि हृवकों में, यह निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध हैः—

(१) घृक्कों को निकाल देने से शरीर में यूरिया का सञ्चय होने लगता है। इसके अतिरिक्त घृक्कों की अकार्यक्षमता होने पर शरीर में मूत्र-विषमयता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।

(२) यकृत को पृथक् कर देने पर शरीर में यूरिया नहीं मिलता, बल्कि रक्त में आमिषाम्लों की प्रचुरता पाई जाती है।

(३) यदि प्रतिहारिणी सिरा का सीधा सम्बन्ध याकृती सिरा से कर दिया जाय तो मूत्र में यूरिया नहीं आता तथा उसमें अमोनियालवणों और आमिषाम्लों की वृद्धि हो जाती है।

(४) यकृत के तीव्र पीतवर्ण (जिसमें यकृत धातु का पूर्ण रूप हो जाता है) में मूत्र में यूरिया अनुपस्थित होती है।

(५) प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि मांसतत्त्व के आहार के बाद यदि किसी जन्तु का प्रतिहारिणी सिरामत रक्त किसी स्वरूप एवं पृथक्कृत यकृत में प्रविष्ट किया जाय तो यकृत से आने वाले द्रव में यूरिया अधिक मिलेगा।

(६) यदि उपवासकाल में इस प्रकार रक्त लेकर प्रविष्ट किया जाय तो यूरिया की उत्पत्ति नहीं होगी।

(७) यदि उपर्युक्त उपवासकालीन व्यक्ति के रक्त में अमोनिया के यौगिक मिलाने दिये जाय, विशेषतः अमोनिया कार्बोनेट, लैक्टेट या सक्सिनेट, तो यकृत से आने वाले रक्त में तीव्र ही यूरिया की मात्रा अधिक पाई जायगी। अमोनिया के सभी लवण यूरिया नहीं बनाते तथा अमोनियम क्लोराइड यूरिया में परिणत नहीं होता है।


इन प्रयोगों से यह सिद्ध है कि यूरिया दोषित मांसतत्त्व से उत्पन्न कुछ द्रव्यों मुख्यतः अमोनिया और आमिषाम्लों के द्वारा यकृत में बनता है।

(क) धातुः—यकृत के पृथक् कर देने पर भी लगभग ५ प्रतिशत यूरिया बनता है। इससे सिद्ध है, कि शरीर के अन्य धातु भी स्वल्प मात्रा में यूरिया बना सकते हैं।

यूरिया का मापन

मूत्र में सोडियम हाइपोमोमाइट मिलाने पर जो नम्रजन उत्पन्न होता है, उसी से उपस्थित यूरिया की मात्रा का निश्चय किया जाता है। इसके लिए जिस यन्त्र का उपयोग होता है उसे यूरिया मापक (Ureameter) कहते

हैं। यह यन्त्र अनेक रूपों में मिलता है, जिनमें हमें यूरिया-मापक अधिक उपयोगी है।



चित्र ४४ यूरियामापक यन्त्र
क-२५ सी. सी. हाइपोथोमाइट
विलयन से युक्त काचपात्र
ख-५ सी. सी. मूत्र से युक्त
काचनली

ग-मापकनलिका

घ-जलपूर्ण काचपात्र

एक बोतल में २५ सी० सी० हाइपोथोमाइट का विलयन रखा जाता है। एक परीक्षण नलिका में ५ सी० सी० मूत्र लेकर इस प्रकार रखा जाता है जिससे मूत्र गिरने न पावे। उधर बोतल से सम्बन्ध नलिका का दूसरे पात्र से सम्बन्ध रहता है जिसमें मापक चिह्न अंकित होते हैं। इस मापक नलिका में जल को शुष्क बंक पर स्थिर कर मूत्र को बोतल के हाइपोथोमाइट विलयन में मिला दिया जाता है। इसके बाद यूरिया का प्रतिशत देख लिया जाता है।

यूरिया की परीक्षा

(१) एक काच के टुकड़े पर यूरिया का विलयन १ बूँद रखकर थोदातुखा छें और उसमें नम्रिकाम्ल १ बूँद मिलावें। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से देखने पर वहाँ यूरिया नाइट्रेट के स्फटिक मिलेंगे।

(२) उपर्युक्त प्रकार से प्रस्तुत यूरिया विलयन में यदि १ बूँद सन्तृप्त आक्जेलिक अम्ल का विलयन मिलाया जाय तो यूरिया आक्जलेट के स्फटिक मिलेंगे।

(३) उसमें सोडियम हाइपोथोमाइट मिलाने से डेन्ड गैसों की उत्पत्ति होगी।

(४) परीक्षण नलिका में यूरिया के कुछ स्फटिक लेकर गरम करें। बाद उसमें सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तथा तुल्य का धनु विलयन मिलावें। उसमें धौगनी या गुलाबी रंग उत्पन्न हो जायगा।

यूरिक अम्ल

यूरिक अम्ल पक्षियों तथा सरीसृप जन्तुओं में मांसतत्त्व के सामीकरण का मुख्य अन्तिम द्रव्य है और मानव शरीर में यह केन्द्रक मांसतत्त्वों से उत्पन्न प्यूरिन पीठों का अन्तिम ओपजनीभूत द्रव्य है। सर्वप्रथम १७७६ ई० में शिली नामक विद्वान् ने मूत्राग्मरी में इसका प्रत्यक्ष किया था।

रासायनिक दृष्टि से यह त्रि-ओप-प्यूरिन (Tri-oxo-Purin) है।

(१) प्यूरिन $C_5 H_4 N_4$ है और प्यूरिन केन्द्र $C_6 N_4$ का उद्भूत षोणिक है। इनमें ओपजन के एक, दो या तीन परमाणुओं के मिलने से ओप-प्यूरिन बनते हैं यथा:—

(२) $C_5 H_4 N_4 O$ —एकौप्यूरिन (Monoxo-Purine or Hypoxanthine)

(३) $C_5 H_4 N_4 O_2$ —द्विओप्यूरिन (Dioxo-purine or Xanthine)

(४) $C_5 H_4 N_4 O_3$ —त्रिओप्यूरिन या यूरिक अम्ल

इनके अतिरिक्त दो अमिनप्यूरिन भी महत्त्व के हैं:—

(५) $C_5 H_5 N_4 NH_2$ —एडिनीन (Adenine or amino purine)

(६) $C_5 H_5 N_4 O. NH_2$ —ग्वेनीन (Guanine or amino-hypoxanthine)

दो मेथिलप्यूरिन भी होते हैं:—

(७) $C_5 H_4 N_2 (CH_3)_2 O_2$ —थियोब्रोमिन (Theobromine)

(८) $C_5 H_4 N (CH_3)_3 O_2$ —कैफ़ीन और थोने (Caffeine & theine) में मेथिल प्यूरिन चाय, कौशी तथा कोको में पाये जाते हैं।

शुद्ध रूप में यूरिक अम्ल एक सफ़ेद स्वादरहित चूर्ण या स्फटिकीय द्रव्य है। अशुद्ध होने पर स्फटिक रंगीन होते हैं तथा अनेक आकार के होते हैं। ये जल में अविलेय तथा सान्द्र गन्धकाम्ल और चार एवं चारीय कार्बोनेट में विलेय होते हैं। ये मघसार तथा ईश्वर में अविलेय होते हैं।

यूरिक अम्ल मूत्र में मुख्यतः यूरेट के रूप में रहता है और मूत्र के अम्ल होने पर स्फटिकाकार में एकत्रित हो जाता है। यह एक दुर्बल द्विपैठिक अम्ल के रूप में कार्य करता है तथा इससे उदासीन और अम्ल दो प्रकार के लवण बनते हैं। परमैंगनेट से इनका शीघ्र ओपजनीकरण हो जाता है, अतः परमैंगनेट की उपयुक्त मात्रा से यूरिक अम्ल का परिमाण निश्चित किया जाता है।

यूरिक अम्ल की उत्पत्ति

(१) बहिर्जात (Exogenous) :—यह आहार के केन्द्रक मांसतत्व तथा प्यूरिन द्रव्यों से उत्पन्न होता है :—

(क) जैन्थीन तथा हाइपोजैन्थीन नामक ओप्यूरिन मांसरस में अधिक पाये जाते हैं।

(ख) कैफीन और थीन ये मेथिलप्यूरिन चाय, कॉफी तथा कोको में पाये जाते हैं।

(ग) ऐडिनीन और खेनीन नामक आमिपप्यूरिन कोषाणुओं के केन्द्रकों से अधिक मात्रा में प्राप्त किये जाते हैं। आहार में जितने ही कोषाणु होते हैं, उतने ही केन्द्रक होते हैं, अतः यकृत, बालग्रैवेयकग्रन्थि आदि कोषाणु-प्रधान अंगों में प्यूरिन अधिकता से पाये जाते हैं।

(२) अन्तर्जात (Endogenous) :—यह धातुगत मांसतत्वों के केन्द्रकाम्ल से उत्पन्न होता है। उपवासकाल या प्यूरिन रहित आहार करने पर भी कुछ न कुछ यूरिक अम्ल का उत्सर्ग अवश्य होता है, अतः यह सिद्ध है कि शरीर धातुओं, विशेषतः खेनिकणों और पेशियों से यह अवश्य उत्पन्न होता है।

आहार में प्यूरिन नवजन का परिमाण

मांस, मछली	६० मिलीग्राम प्रति १०० ग्राम	
यकृत	१२० " "	" "
प्लीहा	१६० " "	" "
बालग्रैवेयक	४४० " "	" "
अग्न्याशय	१८० " "	" "
सेम, मटर	१९-२५ " "	" "

अण्डे, दूध तथा बन्धाकोबी, कोबी और फलों में प्रायः नहीं होता।
में अधिक मात्रा में पाया जाता है।

आहार के केन्द्रक मांससत्वों पर सर्वप्रथम मांससत्व विश्लेषक किण्वतत्वों की क्रिया होती है जिससे वे केन्द्रीय तथा मांससत्वसार में परिणत हो जाते हैं। केन्द्रीय पुनः केन्द्रिक अम्ल एवं मांससत्वसार में परिवर्तित हो जाता है। केन्द्रिक अम्ल एक जटिल स्फुरक युक्त सेन्द्रिय अम्ल है।

उत्पत्तिस्थान

पशुओं में यूरिक अम्ल की उत्पत्ति यकृत में होती है। प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि यकृत को निकाल देने पर यूरिक अम्ल का उत्सर्ग कम होने लगता है तथा मूत्र में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है।

यूरिक अम्ल की उत्पत्ति

केन्द्रक मांससत्वों पर अनेक किण्वतत्वों की क्रिया होने से यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होगा:—

	किण्वतत्व	क्रियाधारद्रव्य	उत्पन्न द्रव्य
१	पेप्सिन	केन्द्रकमांससत्व	आमिपाम्ल तथा केन्द्रकाम्ल
२	ट्रिप्सिन		
३	इरेप्सिन		
४	टेट्रान्यूक्लियोज	केन्द्रकाम्ल	प्यूरिन डाइन्यूक्लिओटाइड, साइटोसिन, यूरेकिल थाइमिन
५	फारफोन्यूक्लियोज या न्यूक्लिओटाइडेज	प्यूरिन डाइन्यूक्लिओटाइड	स्फुरकाम्ल, पेडिनीसिन और ग्वैनीसिन
६	न्यूक्लिओसाइडेज	पेडिनीसिन, ग्वैनीसिन	पेडिनीन और शर्करा ग्वैनीन और शर्करा
७	पेडिनेज	पेडिनीन	हाइपोजैन्थीन और अमोनिया
८	ग्वैनेज	ग्वैनीन	जैन्थीन और अमोनिया
९	जैन्थो औरिसडेज	हाइपोजैन्थीन जैन्थीन	जैन्थीन यूरिक अम्ल
१०	मूत्रविश्लेषक (Uricolytic)	यूरिक अम्ल	यूरिया
११	मूत्रपरिवर्तक (Uricase)	यूरिक अम्ल	अल्लेण्टोयिन (Allantoin)

एक व्यक्ति प्रतिदिन प्यूरिन विरहित आहार लेने पर भी लगभग ०.४ ग्राम यूरिक अम्ल का उत्सर्ग करता है। यह अन्तर्जात यूरिक अम्ल है जिसका निर्माण धातुओं के केन्द्रक मांसतत्त्व के समान होता है। यह अन्तर्जात यूरिक अम्ल यकृत में बनता है।

इस प्रकार उत्पन्न यूरिक अम्ल का पूर्णतः उत्सर्ग उसी रूप में नहीं होता, बल्कि उसका आधा भाग ओपजनीकरण के द्वारा यूरिया तथा अन्य द्रव्यों में परिणत हो जाता है। इस प्रकार यूरिया का निर्माण यकृत में मूत्रविश्लेषक किण्व के द्वारा होता है। कुछे आदि कुछ जन्तुओं में यूरिक अम्ल के ओपजनीकरण से यकृत में अलेण्ड्वायन नामक द्रव्य की उत्पत्ति होती है जिसका कारण मूत्रपरिवर्तक किण्वताव होता है। यह द्रव्य अत्यधिक घुलनशील है अतः इसका उत्सर्ग आसानी से होता है।

यूरिक अम्ल का भविष्य ।

इस प्रकार उत्पन्न यूरिक अम्ल का निहरण दो प्रकार से होता है:—

(१) उत्सर्ग के द्वारा—यूरिक अम्ल का उत्सर्ग मुख्यतः मूत्र के द्वारा होता है, किन्तु उसका कुछ अंश पाचनश्लिषा में आमाशयिक रस तथा पित्त के साथ भी उत्सृष्ट होता है जो पुरीष के साथ मिलकर बाहर निकल आता है या जीवाणुओं के द्वारा नष्ट हो जाता है।

मांसतत्त्वों से यूरिक अम्ल के उत्सर्ग में सहायता मिलती है। आहार में प्यूरिन विरहित मांसतत्त्व यथा अण्डे, दूध आदि अधिक लेने से मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये मांसतत्त्व यूरिक अम्ल की क्रिया को बढ़ा देते हैं। शाक्तत्वों का भी प्रभाव ऐसा ही होता है, किन्तु स्नेह द्रव्यों का विपरीत प्रभाव होता है और ये उसके उत्सर्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कुछ लोगों का मत है कि मांसतत्त्व अधिक लेने से यूरिक अम्ल की उत्पत्ति अधिक होती है, अतः उसका उत्सर्ग भी बढ़ जाता है।

(२) ओपजनीकरण के द्वारा यूरिया, अलेण्ड्वायन आदि द्रव्यों में परिणति—अनेक स्तनधारियों के शरीर में उत्पन्न यूरिक अम्ल का एक अंश यकृत में मूत्र परिवर्तक किण्वतत्त्व के द्वारा अलेण्ड्वायन में बदल जाता है जो अत्यधिक घुलनशील है और आसानी से बाहर निकल जाता है। मनुष्यों में मूत्र परिवर्तक

क्रियवत्ताव नहीं होता, अतः यूरिक अम्ल पर मूत्रविरलेपक क्रियवत्ताव की क्रिया होने से वह यूरिया में बदल जाता है।

उपवास का प्रभाव

उपवासकाल में स्वभावतः यूरिक अम्ल के उत्सर्ग में कमी हो जाती है जिससे दो तीन दिनों में अन्तर्जात यूरिक अम्ल की मात्रा आधी रह जाती है। उत्सर्ग में कमी होने से रक्त में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसका कारण यह है कि वृक्कों की क्रिया मन्द हो जाने से उसका उत्सर्ग कम होने लगता है और शरीर में सञ्चय होने लगता है। प्रायः १० दिनों के बाद यह पुनः अन्तर्जात की प्राकृत सीमा पर पहुँच जाता है जो पूरे उपवासकाल तक बना रहता है। अन्त में, अत्यधिक धातुस्रव के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है।

यूरिक अम्ल की परीक्षा

(१) Murexide test (म्यूरेक्साइड की परीक्षा) :—

एक पोर्सिलेन में थोड़ा यूरिक अम्ल लो और उसमें सान्द्र नम्रिकाम्ल की कुछ बूँदे मिलाओ तथा वाष्पीभवन के द्वारा उसे सुखाओ। इससे रक्तवर्ग या पीतरक्त अधःक्षेप मिलेगा जो अमोनिया का शक्तिशाली विलयन मिलाने से बैंगनी लाल तथा कार्बोस्टिक सोडा मिलाने से नीला बैंगनी हो जाता है।

(२) शिफ की परीक्षा (Schiff's test) :—

सोडियम कार्बोनेट में यूरिक अम्ल का विलयन बनाओ और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से आर्सेनिस्यन्दन पत्र पर उसे डालो। इससे पत्र पर एक काला दाग मिलेगा।

यूरिक अम्ल की मात्रा

स्वभावतः प्रतिदिन लगभग ०.७५ ग्राम यूरिक अम्ल का उत्सर्ग होता है, किन्तु विभिन्न व्यक्तियों में तथा आहार भिन्नता के कारण इसकी मात्रा में परिवर्तन भी आता है।

क्रियेटिनीन (Creatinine)

यह जल विरहित क्रियेटिन है जो मांसपेशियों में अधिकता से पाया जाता है। क्रियेटिन जब अम्लों के सम्पर्क में आता है, तब जल का एक अणु इससे एकत्र हो जाता है और क्रियेटिनीन बन जाता है :—



(क्रियेटिन) — (जल) = (क्रियेटिनीन)

क्रियेटिन का उत्सर्ग एक निश्चित मात्रा में होता है जिस पर आहार या व्यायाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । लगभग एक ग्राम प्रतिदिन बाहर निकलता है । यह मात्रा यद्यपि एक व्यक्ति में निश्चित होती है तथापि विभिन्न व्यक्तियों में शरीर मांस-धातु के अनुपात से इसमें विभिन्नता पाई जाती है । मनुष्य के शरीर में इसका उत्सर्ग सल्फेट के समान होता है । यह अवश्य है कि व्यायाम के समय मूत्र में क्रियेटिनीन की मात्रा बढ़ जाती है, किन्तु विश्राम के समय उसकी मात्रा में कमी हो जाती है, इस प्रकार दिन रात में उसकी कुल-मात्रा में कोई अन्तर नहीं आने पाता ।

फौलिन नामक विद्वान् के मत के अनुसार आहार गत मांससत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह धातुसात्मीकरण का ही परिणाम है अतः इसी का निदर्शक है । क्रियेटिन या क्रियेटिनीन रहित आहार लेने पर शरीर भार के प्रति किलोग्राम प्रति घण्टे उत्सृष्ट क्रियेटिनीन का परिमाण फौलिन का क्रियेटिनीन निदर्शक (Folin's Creatinine Co-efficient) कहलाता है ।

क्रियेटिनीन की उत्पत्ति

आधुनिक प्रयोगों से यह देखा गया है कि पेशियों में क्रियेटिन का सञ्चय करने का गुण है और वे एक प्रकार से उसके कोष का कार्य करती हैं । अतः क्रियेटिन की एक मात्रा देने पर भी पेशियों के द्वारा उसका शोषण हो जाता है । किन्तु यदि २-३ सप्ताह तक लगातार कई बार दिया जाय तो पेशियाँ सन्तुष्ट हो जाती हैं और मूत्र में उसी अनुपात से क्रियेटिनीन की मात्रा बढ़ जाती है । अतः अब ऐसा समझा जाता है कि पेशीगत क्रियेटिन से ही क्रियेटिनीन की उत्पत्ति होती है ।

क्रियेटिनीन के स्फटिक वर्ण-रहित सूच्याकार होते हैं और ११ भाग जल तथा मद्यसार में विलेय हैं, ईंधन में ये नहीं धुलते । भारी धातुओं से मिलकर ये दो छवण बनाते हैं ।

क्रियेटिन (Creatine)

क्रियेटिनीन के अतिरिक्त, बच्चों के मूत्र में क्रियेटिन भी स्वभावतः

युवावस्था के बाद मूत्र में यह नहीं मिलता, किन्तु कुछ युवती स्त्रियों में कभी कभी यह प्रकट हो जाता है। यह मांसपेशी के अत्यधिकश्रय की अवस्था में भी पाया जाता है यथा ज्वर, उपवास और गर्भावस्था के बाद गर्भाशय-सुकृती-भवन में।

धातुगत मांसतन्त्रों के अपचय से उत्पन्न पदार्थ रक्तप्रवाह के द्वारा यकृत में पहुँचते हैं और उन्हीं से यकृत कोषाणुओं के द्वारा क्रियेटिनीन बनता है। सम्भवतः इसके पहले ग्लाइसिन और आर्गिनिन नामक द्रव्य बनते हैं। इस प्रकार उत्पन्न क्रियेटिनीन पेशियों में जाकर क्रियेटिन के रूप में संचित होता है और अतिरिक्त भाग क्रियेटिनीन के रूप में बाहर निकल जाता है।

क्रियेटिन का क्रियेटिनीन में परिणाम क्रियेटेज नामक विषयत्व के द्वारा होता है जो रक्तमस्तु तथा यकृत में रहता है। क्रियेटिनीन का विनाश क्रियेटिनेज नामक विषयत्व के द्वारा होता है जो यकृत में ही रहता है। इसका प्रमाण यह है कि यकृत के विकारों में क्रियेटिनीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। रक्तक विष में भी क्रियेटिनीन के बदले क्रियेटिन की उपस्थिति अधिक मात्रा में होती है।

क्रियेटिनीन की परीक्षा

(१) जाफ की परीक्षा (Jaffe's test) :—५ सी० सी० मूत्र में पिक्निक अम्ल के सान्द्र जलीय विलयन की कुछ बूँदें डालो तथा उसमें कास्टिक सोडा के २० प्रतिशत विलयन की कुछ बूँदें डालो। क्रियेटिनीन पिक्नेट बनने से गहरा लाल रंग मिलेगा। इस परीक्षा में क्रियेटिन के द्वारा कोई वर्ण नहीं मिलता।

(२) वील की परीक्षा (Weyl's test) :—५ सी० सी० मूत्र में सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के ५ प्रतिशत विलयन की कुछ बूँदें डालो। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के ५ प्रतिशत विलयन की कुछ बूँदें मिलाओ। इससे लाल रंग उत्पन्न होगा जो गरम करने पर पीला हो जायगा। इसमें तीव्र सिर-काम्ल मिलाने से पीला विलयन हरा हो जाता है और नीचे नीले रंग का अवक्षेप हो जाता है।

इन परीक्षाओं के पूर्व मूत्र को अच्छी तरह उबाल लिया जाय जिससे यदि एसिडोन होगा तो दूर हो जायगा और परीक्षा के परिणाम सन्तोष जनक होंगे।

अमोनिया

मूत्र के नत्रजन युक्त त्याज्य पदार्थों में अमोनिया मुख्य है । और मूत्र के कुल नत्रजन का ३ से ५ प्रतिशत तक इसीसे बनता है । कुल नत्रजन की प्रतिशत रीति से अमोनिया की जो मात्रा होती है उसे अमोनिया निदर्शक कहते हैं । स्वभावतः मूत्र का अमोनिया निदर्शक ३ से ५ प्रतिशत होता है । अमोनिया का उत्सर्ग अमोनिया लवणों के रूप में होता है, जिससे स्थिर क्षार मिलाने पर स्वतन्त्र अमोनिया मुक्त हो जाता है ।

अमोनिया का उत्पत्ति स्थान

(१) यकृत—यकृत में पाचन गलिका के द्वारा शोषित आमिषांशों के बहुत बड़े वर्ग का निरामिषीकरण होता है जिससे उसके नत्रजनयुक्त (NH_3) तथा नत्रजन रहित ये दो भाग हो जाते हैं । नत्रजनयुक्त भाग यकृत में पूर्णतः अमोनिया में परिणत हो जाता है जिससे यहिजात यूरिया का निर्माण होता है । अमोनिया का कुछ भाग अपरिवर्तित रहता है और उसी रूप में रक्त के साथ शरीर में भ्रमण करता है ।

(२) कुछ अंश में अमोनिया अम्लों में आमिषांशों पर निरामिषीकरण किण्वताय की क्रिया से उत्पन्न होता है । इस प्रकार निर्मित अमोनिया के लवण शोषित हो कर यकृत में पहुँचते हैं ।

(३) कुछ लोगों का मत है कि अमोनिया की उत्पत्ति वृक्कों में ही होती है जिसके निम्नांकित प्रमाण हैं:—

(क) स्वभावतः वृक्क धमनी की अपेक्षा वृक्कसिरा में अमोनिया की अधिक मात्रा मिलती है जब कि शाखाओं की धमनी और सिरा के रक्त में अमोनिया समान मात्रा में ही मिलता है ।

(ख) वृक्कों के पृथक् कर देने पर रक्त में अमोनिया का सञ्चय नहीं होता ।

(ग) वृक्क के तनु आमिषांशों का अमोनिया तथा फटुअंशों में अधिक शीघ्रता से निरामिषीकरण करते हैं, किन्तु यकृत के तन्तुओं द्वारा इतनी शीघ्रता से नहीं होता ।

अमोनिया के कार्य

(१) अमोनिया के लवण शरीर में उत्पन्न अम्लों के प्रतिरक्षक का कार्य

करते हैं। अतः क्षतिज अम्लों के अत्यधिक आहरण तथा वृषक द्वारा अम्लों के अत्यधिक उत्सर्ग के बाद इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार अम्लों के उत्सर्ग के अनुपात से वृषकों में मूत्रगत अमोनिया की उत्पत्ति होती है।

शाकाहारियों में आहार से ही चार-पीठों की पर्याप्त उत्पत्ति हो जाती है जिससे शरीर में उत्पन्न अम्ल उदासीन हो जाते हैं अतः उनमें लगभग सारा अमोनिया यकृत में यूरिया में परिणत हो जाता है। इसके विपरीत, मांसाहारियों में भोजन के द्वारा अधिक अम्लों की उत्पत्ति होती है, अतः यदि अमोनिया अधिक मात्रा में न हो, तो शरीर को हानि पहुँच सकती है। इस प्रकार स्वतन्त्र अमोनिया अम्लों के साथ मिल कर अमोनिया के उत्पन्न बनाता है और शरीर की अत्यधिक अम्लता से रक्षा करता है। यदि रक्षक प्रबन्ध शरीर में न हो और पर्याप्त अमोनिया उत्पन्न न हो तो अम्लों के द्वारा शरीर के आवश्यक चारीय उपादान यथा सोडियम, पोटेशियम, शटिक, मैगनीशियम आदि पर विनाशक प्रभाव पड़ेगा।

(२) इस प्रकार अमोनिया शरीर धातुओं एवं रक्त के उद्भजन अणु केन्द्री-भवन को स्थिर रखता है, क्योंकि जिस प्रकार अम्लों के आहरण के बाद अमोनिया का उत्सर्ग बढ़ जाता है, वैसे प्रकार चारीयता वृद्धि की अवस्थाओं में वह कम हो जाता है।

स्वभावतः मूत्र की अम्लता के अनुपात से ही अमोनिया का उत्सर्ग होता है। यदि मूत्र में अम्लता अधिक हो तो उसमें अमोनिया की मात्रा भी अधिक होती है। वृन्कशोथ, जिसमें वृषकों की क्रिया विरुद्ध हो जाती है, पर्याप्त अमोनिया उत्पन्न न होने से अत्यधिक अम्लता वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार कुछ विकारों में रक्त में अमोनिया छवणों की वृद्धि के कारण मूत्र में अमोनिया छवणों का उत्सर्ग बढ़ जाता है। यथा ज्वराम के बाद दुग्धाम्लजन्य अम्लता वृद्धि तथा स्नेह का सम्यक् सामीकरण न होने से अम्लों की उत्पत्ति होने के कारण अमोनिया छवणों की मात्रा अधिक हो जाती है।

मिथिल आहार करने पर मूत्रमात्रा प्रतिदिन ०.७५ ग्राम अमोनिया का उत्सर्ग होता है, अतः अमोनिया निदर्शक ५ प्रतिशत अधिक होने पर निम्नांकित विचारों की सूचना मिलती है:—

(१) धातुगत मांसतत्वों का अत्यधिक लय।

(२) स्नेह का असम्यक् सारणीकरण ।

(३) अम्लतावृद्धि (अम्लविष)

२ ग्राम प्रतिदिन उत्सर्ग होने से कटुभवन तथा ५ ग्राम से अधिक होने पर गम्भीर विषमयता समझनी चाहिये ।

हिप्पूरिक अम्ल (Hippuric acid)

नत्रजन का कुछ अंश आमिपाग्लों के रूप में बाहर निकलता है जो कभी स्वतन्त्र और कभी दूसरे द्रव्यों के साथ संयुक्त हो जाता है । हिप्पूरिक अम्ल इसी प्रकार का एक संयुक्त आमिपाग्ल है । यह ग्लाइसिन (आमिपसिरकाम्ल Amino-acetic acid) तथा बेन्जोइक अम्ल (Benzoic acid) के संयोग से बनता है । इसका सूत्र $C_9H_9NO_3$ है जिसे बेन्जिल ग्लाइसिन कहते हैं ।

यदि बेन्जोइक अम्ल और इसके अम्ल किसी प्राणी को मुख द्वारा दिये जाय तो इसका बेन्जोइक अम्ल के रूप में निहरण बहुत थोड़ा होता है अधिक अंश हिप्पूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकलता है ।

इसके सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि यह इसी रूप में रक्त में विलीय नहीं रहता, बल्कि यह वृस्क की धातवीय क्रियाओं से उत्पन्न होता है । यदि प्रयत्नपूर्वक वृस्क में ग्लाइसिन और बेन्जोइक अम्ल प्रविष्ट किये जाय तो हिप्पूरिक अम्ल प्राप्त होगा । इसके विपरीत, वृस्कशून्य में इसका निर्माण कम हो जाता है । वृस्कों में 'हिप्पूरिकेज' (Hippuricase) नामक किण्वतत्व होता है जो हिप्पूरिक अम्ल का जलीय विरलेपण कर उसे बेन्जोइक अम्ल तथा ग्लाइसिन में परिणत कर देता है । ऐसा भी समझा जाता है कि यही किण्वतत्व विभिन्न दशाओं में उनका संयोग भी कराता है ।

यह घोड़े, गौ तथा अन्य शाकाहारी जन्तुओं के मूत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है क्यों कि शाकाहार में बेन्जोइक अम्ल के यौगिक रहते हैं । मनुष्य के मूत्र में यह बहुत थोड़ा रहता है, लगभग ०.०५ ग्राम प्रतिदिन निकलता है तथा शाकाहार की वृद्धि से थोड़ा बढ़ जाता है । हिप्पूरिक अम्ल के स्फटिक जल, भणसार तथा ईथर में विलेय हैं तथा बेन्जोइक में अधिक विलेय है ।

तीव्र नम्रिकाग्ल के साथ वाष्पीभवन करने पर इससे नाइट्रोबेन्जोइन बनता है जिसकी पहचान कटु बादाम तैल की गन्ध से होती है ।

इस प्रकार हिप्पूरिक अम्ल यहिर्जात पदार्थ है जिसकी मात्रा शाकाहार पर निर्भर रहती है। किन्तु उसका कुछ अंश अन्तर्जात भी होता है जो घातवीर्य सारमीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है क्योंकि विशुद्ध मांसाहार या उपवास की अवस्था में भी मूत्र में यह स्वरूप परिमाण में पाया जाता है।

शरीर क्रिया की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह वेन्जोइक अम्ल आदि द्रव्यों के निर्विषीकरण और उत्सर्ग का मुख्य साधन है। वेन्जोइक अम्ल आदि पदार्थ प्रधानतः फलों के द्वारा लिये जाते हैं जिनका शरीर में ओपजनी भवन होने पर हिप्पूरिक अम्ल उत्पन्न होता है।

‘मूत्र के निरिन्द्रिय लयण

क्लोराइडः—यह मुख्यतः सोडियम क्लोराइड और कुछ पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मूत्र में मिलते हैं तथा आहार में लिये गये क्लोराइड से उत्पन्न होते हैं। इसकी मात्रा प्रतिदिन १२ से १५ ग्राम होती है, किन्तु आहार में क्लोराइड की मात्रा के अनुसार इसमें विभिन्नता पाई जाती है। उपवासकाल में इनकी मात्रा में कमी हो जाती है तथा न्यूमोनिया में छाषों की उत्पत्ति के समय भी ये कम हो जाते हैं।

‘सल्फेटः’—ये मूत्र में दो रूपों में पाये जाते हैं—

(१) सोडियम और पोटेशियम के निरिन्द्रिय सल्फेट।

(२) सेन्द्रिय सल्फेट।

ये सल्फेट थोड़ी मात्रा में आहार के साथ लिये गये सल्फेट से उत्पन्न होते हैं और मुख्यतः मांसतत्त्वों के सारमीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इनका उत्सर्ग यहिर्जात मांसतत्त्व-सारमीकरण का सूचक है और यरिया के समान ही होता है। सामान्यतः ५ नवजन्म में १ गन्धक के अनुपात में इनका उत्सर्ग होता है।

।

मांसाहार के बाद अतिशीघ्र लगभग ३ घण्टे के भीतर ही पृष्कों के द्वारा इनका उत्सर्ग हो जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि गन्धकयुक्त अमियाम्ल अतिशीघ्र शोषित हो जाते हैं।

इनके उत्सर्ग की कुल मात्रा ३ ग्राम प्रतिदिन है। सेन्द्रिय सल्फेट कुल सल्फेट का दशमांश बनाते हैं। ये सेन्द्रिय सल्फेट पोटेशियम या सोडियम के

निरिन्द्रिय सलफेटों का इण्डोल, स्केटोल या फेनोल (जो अन्त्रों में मांसतत्वों के जीवाणुजन्य विघटन से उत्पन्न होते हैं) के साथ संयोग होने से बनते हैं ।

इण्डोल शोषित होकर ओपजनीभवन के बाद 'इण्डोक्सिल (Indoxyl) में परिणत हो जाता है जो पोटेशियम के निरिन्द्रिय सलफेट के साथ मिलकर 'पोटाशियम का इण्डोक्सिल सलफेट' (Indoxyl sulphate of potassium) बनाता है इसी को 'इण्डिकन' (Indican) कहते हैं । इसी प्रकार फेनोल और स्केटोल के साथ भी यौगिक बनते हैं ।

किण्वतत्वों की क्रिया मन्द होने से या शोषण, कम होने से जब मांसतत्व का जीवाणुज विघटन अधिक होने लगता है तब इण्डोल, स्केटोल और फेनोल भी अधिक बनने लगते हैं जो निरिन्द्रिय सलफेटों के साथ संयुक्त होकर उपर्युक्त यौगिक बनाते हैं । अतः इस अवस्था में मूत्र में सेन्द्रिय सलफेटों की मात्रा बढ़ जाती है ।

(३) उदासीन गन्धकः—कुछ अवस्थाओं में गन्धक उदासीन (अपूर्णतः ओपजनीभूत) रूप में निकलता है यथा सिसटिन (Cystine), टौरिन (Taurine), थायोसाइनेट्स (Thiocyanates), मेरकैप्टन (Mercaptans) तथा थायोसलफेट (Thiosulphates) । ये मुख्यतः अन्तर्जात हैं । क्रियेटिनीन के समान इसके उत्सर्ग की मात्रा भी आहारगत मांसतत्व के अधीन न होकर प्रायः स्थिर होती है । जब मांसतत्वों का सिसटिन विकृत सारमीकरण के कारण उपयुक्त नहीं होता तब मूत्र में अधिक मात्रा में आने लगता है इस अवस्था 'सिस्टिन्यूरिया' (Cystinuria) कहते हैं । इसकी विशेषता यह है कि यह अवस्था कुलज होती है और इसमें यद्यपि मांसतत्वों के साथ संयुक्त सिसटिन का उपयोग नहीं होता, तथापि स्वतन्त्र सिसटिन लेने पर उसका पूर्ण सारमीकरण हो जाता है ।

इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों में टाइरोसिन के अपूर्ण ओपजनीभवन से 'होमोजेन्टिसिक अम्ल' (Homogentisic acid) उत्पन्न होता है जिससे मूत्र पहले भूरे रंग का आता है जो थोड़ी देर में गहरा हो जाता है । इस अवस्था को चारमेड (Alkaptonuria) कहते हैं ।

सलफेट की परीक्षा

मूत्र में तनु उदहरिताम्ल की कुछ बूँदें डालो और उसमें बेरियम क्लोराइड

का विलयन थोड़ा सा मिलाओ। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप मिलेगा।

इण्डिकन की परीक्षा

(१) जाफ की परीक्षा (Jaffé's test) :—५ सी० सी० मूत्र लो, उसमें ५ सी० सी० सान्द्र उदहरिताम्ल मिलाओ। यह गन्धकाम्ल को विस्लेषित कर देता है और इण्डोक्सिल स्वतन्त्र हो जाता है। अब उसमें ३ सी० सी० क्लोरोफार्म मिलाओ और पोटेशियम बलोरेट के तनु विलयन को बूँद बूँद कर उसमें मिलाकर खूब जोर से हिलाओ। इससे इण्डोक्सिल का ओपनीभवन होने से नीलवर्ण उत्पन्न होगा। क्लोरोफार्म का स्तर नीलाम होगा और उसकी गहराई इण्डिकन की मात्रा के अनुसार होगी।

(२) ओवरमेयर की परीक्षा (Obermeyer's test) एक परीक्षण नलिका में १० सी० सी० ओवरमेयर का द्रव लेकर उसमें १० सी० सी० मूत्र तथा २ सी० सी० क्लोरोफार्म मिलाओ। सबको खूब मिलाकर थोड़ी देर छोड़ दो। क्लोरोफार्म के स्तर नीलवर्ण हो जाएंगे। नीलवर्ण की गहराई से इण्डिकन की मात्रा का अनुमान किया जा सकता है।

फास्फेट—ये मुख्यतः आहार से प्राप्त होते हैं और कुछ लेसिथिन, फास्फोप्रोटीन आदि स्फुरद्रव्य आहार द्रव्यों के ओपनीभवन से उत्पन्न होते हैं। ये दो रूपों में उपस्थित होते हैं :—

(१) चारीय धातुओं तथा अमोनिया के लवण यथा सोडियम और पोटेशियम के क्षारीय फास्फेट।

(२) चारीय पार्थिव लवण यथा स्रटिक और मैगनीशियम के पार्थिव फास्फेट। फास्फेट का मुख्यतः उत्सर्ग सोडियम और पोटेशियम के चारीय फास्फेटों के रूप में लगभग ३ ग्राम प्रतिदिन होता है। जब मूत्र का विघटन होता है, तब यूरिया अमोनिया में परिणत हो जाता है और पार्थिव फास्फेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। इसमें तनु सिरकाम्ल मिलाने से यह अवक्षेप दूर हो जाता है।

फास्फेट की परीक्षा

मूत्र में अमोनिया मिलाने पर पार्थिव फास्फेटों का सफेद रंग का अवक्षेप मिलता है।

नम्रिकाम्ल तथा अमोनियम भोलिबेट के साथ मूत्र को उबालने से पीतवर्ण के स्फटिक मिलते हैं ।

कार्बोनेट—ये आहारगत कार्बोनेट से प्राप्त होते हैं तथा शरीर में उपस्थित वानस्पतिक अम्लों के परिणाम से उत्पन्न होते हैं ।

ये क्षारीय मूत्र तथा शाकाहारी जन्तुओं के मूत्र में पाये जाते हैं । खटिक के कार्बोनेट सफेद पिण्डों के रूप में होते हैं जो दुर्गन्ध अम्लों के मिलाने पर फेन के साथ छुट हो जाते हैं ।

मूत्र के वैकृत अवयव अल्ब्यूमिन

यह निम्नांकित विकारों में निर्मोक (Casts) के सहित मूत्र में उपस्थित होता है :—

१. माइट के रोग के विभिन्न रूप (Bright's disease)
२. प्रसूतिसंघिषात (Eclampsia)
३. विसूचिका, मसूरिका, रोमान्तिका और न्यूमोनिया के उपद्रवरूप वृक्करोध ।

४. जीर्ण ऊर्ध्व वृक्करोध (Chronic ascending nephritis)
५. औषध—सारापोन, कैन्थराइडिस आदि ।
६. जीवाणुविष :—टाइफाइड, न्यूमोनिया, विसर्प और रोहिणी ।

सामान्यतः वृक्करोध मांसतन्वों के लिए अप्रवेश्य होते हैं, किन्तु वृक्क-रोगों में वे प्रवेश्य हो जाते हैं फलतः मूत्र में ये अल्ब्यूमिन के रूप में आने लगते हैं । इसे अङ्गविकारज अल्ब्यूमिनमेह (Organic albuminuria) कहते हैं । निम्नांकित रोगों में निर्मोक से रहित पाया जाता है :—

१. दग्ध घन (Burns & scalds)
२. जीर्ण मदाशय
३. यकृताल्युदर
४. इक्षुमेह
५. वहिनेत्रीयं गलगण्ड (Exophthalmic goitre)
६. सन्धिवात
७. शीत, पारद, स्फुरक और शङ्खविष

८. श्वेतकणवृद्धि, घातक रक्तालपता, मलेरिया, उपद्रव और यक्ष्मा के बाद गर्भीर रक्तालपता ।

९. हाजकिन का रोग (Hodgkin's disease)

१०. तीव्रज्वर

११. हृदोग

१२. प्राकृतः—(Physiological or functional)

(क) अतिव्यायाम

(ख) मांसतत्त्व का अधिक आहार

(ग) शीतस्नान के कारण कोष्ठ में रक्त आकर्षित हो जाने से ।

(घ) गर्भावस्था के अन्तिम दिनों में वृषकसिराओं पर गर्भाशय का दबाव पड़ने से ।

अलब्यूमिन की परीक्षा

(१) तापपरीक्षा (Heat test) :—परीक्षण नलिका का $\frac{3}{4}$ भाग मूत्र से भरो और उसका ऊपरी भाग गरम करो । नलिका के खाली भाग में गर्मी न पहुँचने पाये, नहीं तो नलिका टूट जायगी । यदि गरम करने पर मूत्र का ऊपरी भाग मलिन हो जाय तो फास्फेट, अलब्यूमिन या दोनों की उपस्थिति समझनी चाहिये । इसके बाद उसमें सिरकासल की कुछ धूँदें डालो । यदि मलिनता नष्ट हो जाय तो फास्फेट की स्थिति समझनी चाहिये । यदि मलिनता कुछ कम हो जाय तो फास्फेट और अलब्यूमिन दोनों की उपस्थिति समझनी चाहिये । यदि वह द्रव्यों की त्यों घनी रहे, तो अलब्यूमिन की उपस्थिति समझनी चाहिये ।

उपर्युक्त परीक्षा के लिए मूत्र स्वच्छ होना अत्यावश्यक है । अतः यदि मूत्र मलिन हो, तो पहले उसे निस्पन्दन के द्वारा स्वच्छ कर लेना चाहिये ।

(२) वृत्तपरीक्षा या हेलार की परीक्षा (Ring test or Heller's test) :—एक नलिका में एक इंच सान्द्र नत्रिकाम्ल (Strong Nitric acid) डो । उसके ऊपर १ इंच मूत्र पिपेट के द्वारा तिरछे डालो । अलब्यूमिन की उपस्थिति में दोनों द्रव्यों के सन्निवस्थान पर एक श्वेत, पारभासक वृत्त रेखा मिलेगी । यदि वह रेखा हरी या नीली हो, तो पित्त की उपस्थिति समझनी चाहिये । दूसरी रेखाओं का निदान में कोई महत्त्व नहीं ।

(३) रोबर्ट की रूपान्तरित हेलार की परीक्षा :—इसमें केवल नत्रिकाम्ल न डाल कर चार भाग मैग्नीशियम सल्फेट के सान्द्र विलयन में १ भाग सान्द्र

नविकाम्ल मिठा कर मूत्र में डालने हैं । अलब्यूमिन की उपस्थिति में दोनों के सन्निधस्थान पर श्वेतवर्ण उत्पन्न हो जाता है । यह अधिक विश्वसनीय है ।

(४) सैलिसिल सल्फोनिक अम्ल परीक्षा :—(Salicyl sulphonic acid test)—एक छोटी परीक्षण नलिका में लगभग ३० बूंद मूत्र लो और उसमें सैलिसिलसल्फोनिक अम्ल के सन्तृप्त विलयन की कुछ बूंदें डालो । अवक्षेप उत्पन्न होने पर अलब्यूमिन की उपस्थिति समझनी चाहिये । गरम करने पर भी यह अवक्षेप बना रहता है । यदि गरम करने पर नष्ट हो जाय तो मांस-तत्त्वज (Proteoses) की उपस्थिति समझनी चाहिये ।


(५) एसबैक की परीक्षा (Esbach's test) एक छोटी परीक्षण नलिका में थोड़ा मूत्र लो । उसमें एसबैक का द्रव मिलाओ । अलब्यूमिन रहने पर अवक्षेप उत्पन्न होगा ।

अलब्यूमिन की मात्रिक परीक्षा

अलब्यूमिन की प्रतिशत मात्रा निश्चित करने के लिए दो बातों पर ध्यान

देना आवश्यक है । पहली यह कि मूत्र की प्रतिक्रिया अम्ल होनी चाहिये और यदि अम्ल न हो तो सिरकाजल की कुछ बूंदें डाल कर उसे आम्लिक बना लेना चाहिये । दूसरी यह कि मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व १००८ या इससे कम ही होना चाहिये अथवा उसमें जल मिला कर उसका गुरुत्व कम कर देना चाहिये, क्योंकि अधिक गुरुत्व रहने पर मूत्र में अलब्यूमिन का अवक्षेप ऊपर तैरने लगता है और परिणाम ठीक नहीं निकटता ।

इसके लिए जो यन्त्र प्रयुक्त होता है उसे 'एसबैक का अलब्यूमिनोमीटर' (Esbach's albuminometer) कहते हैं ।



चित्र ४५

एसबैक का अलब्यू-
मिनोमीटर

इसमें क चिह्न तक मूत्र डालो और ४५ चिह्न तक एसबैक का द्रव (Esbach's reagent) मिलाओ । काग बन्द करके उसको खूब मिलाओ और २४ घण्टों के लिए उसे क्षान्त स्थान में रख दो जहाँ तब उममें अवक्षेप घने, घट घट नोट कर लो । यह १००० सी० सी० मूत्र में

शुष्क अलव्यूमिन की मात्रा प्रामां में बतलायगा। उदाहरणतः यदि अवशेष $\frac{1}{2}$ अङ्क तक हो, तो अलव्यूमिन की मात्रा ०.५ प्रतिशत है, ऐसा समझे। केन्द्रा-कर्षण यन्त्र का प्रयोग करने से यह परीक्षा अधिक शीघ्रता से निष्पन्न होती है।

शर्करा (Glucose)

सामान्यतः श्वेत की मूत्रोत्सिकाओं से इसका निस्त्यन्दन होता है, किन्तु उपादेय द्रव्य होने के कारण पुनः मूत्रवह सोतों के द्वारा इनका रक्त में शोषण हो जाता है। प्राकृत मूत्र में भी यह मिलती है, किन्तु इसकी मात्रा इतनी कम (०.००२ प्रतिशत) होती है कि रासायनिक परीक्षाओंका कोई परिणाम नहीं होता।

निम्नाङ्कित रोगों में यह पाई जाती है:—

१. इक्षुमेह।

२. आहारजन्य शर्करावृद्धि (Alimentary Glycosuria)।

३. अस्थायी मूत्रगत शर्करा (Temporary Glycosuria)।

(क) मस्तिष्क के आघात, रक्तप्रवाह और शर्करा।

(ख) मद्यारण्य।

(ग) बलौमरोग (Pancreatic diseases)।

(घ) संज्ञानाश के बाद।

(छ) गर्भावस्था।

४. श्वेतविकार के कारण मूत्रगत शर्करा (Renal Glycosuria)—

शर्करा की परीक्षा

(१) फेहलिंग की परीक्षा (Fehling's test)—एक नलिका में $\frac{1}{2}$ इंच फेहलिङ्ग विलयन नं. १ डालो। उसमें उतनाही फेहलिङ्ग विलयन नं. २ डालो। दूसरी नलिका में $\frac{1}{2}$ इंच मूत्र डालो। दोनों नलिकाओं को अलग-अलग गरम करो जब तक वह उबलने न लगें। उबलने पर मूत्र को फेहलिङ्ग विलयन वाली नलिका में डालो। यदि रक्तवर्ण अवशेष मिले तो शर्करा की उपस्थिति समझनी चाहिये। यदि वर्ण में कोई परिवर्तन न हो तो फिर गरम करो। अब यदि लाल अवशेष मिले तो शर्करा की उपस्थिति अरु मात्रा में समझनी चाहिये। इस पर भी यदि कोई परिवर्तन न हो तो अनुपस्थिति समझनी चाहिये।

इस परीक्षा में सावधानी से काम लेना चाहिये, क्योंकि मूत्र न डालने पर भी गरम करने से फेहलिंग विलयन लाल हो जाता है। ऐसा तभी होता है जब विलयन बहुत पुराना हो। इस लिए पुराने विलयन का परीक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिये। साथ ही यह भी देखना चाहिये कि विलयन में मूत्र डालने पर जो लाली पैदा होती है वह लाल अवक्षेप के कारण है या विलयन ही लाल हो जाता है और अवक्षेप सफेद रहता है। पहली स्थिति तो शर्करा की उपस्थिति सूचित करती है, किन्तु दूसरी मूत्र का विशिष्ट गुण अधिक होने से होती है। मूत्र को सुरक्षित रखने के लिए जब फार्मेलिन का उपयोग अधिक मात्रा में होता है तब भी विलयन लाल हो जाता है।

(२) बेनेडिक्ट की परीक्षा (Benedict's test) एक नलिका में बेनेडिक्ट का द्रव लो उसमें ८ या १० बूँद मूत्र डालो। इसे गरम करो और फिर ठंडा होने दो। एक अवक्षेप मिलेगा जिसका वर्ण शर्करा की मात्रा के अनुसार हरा या लाल होगा।


(३) हेन की परीक्षा—(Hain's test) एक नलिका में ४ सी० सी० हेन का विलयन लो। उसमें ८ बूँद मूत्र मिलाओ और गरम करो जिसमें उबलने न पावे। पीला या रक्त अवक्षेप मिलेगा।

(४) फेनिल हाइड्रेजिन परीक्षा (Phenyl hydrazin's test) २ ग्राम मूत्र में थोड़ा फेनिल हाइड्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड और उसका दूना सोडियम एसिटेट मिलाओ। नलिका को जल में रख कर आध घण्टे तक उबालो। ठंडा करने पर ग्लूकोसेजोन (Glucosazone) तथा लैक्टोसेजोन (Lactosazone) के रफ्टिक मिलेंगे।

शर्करा की मात्रिक परीक्षा

(१) कार्वरडाइन का सकारोमीटर (Carwardyne's saccharometer) शर्करा की प्रतिशत मात्रा नापने के लिए इस यन्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो परिमापक पात्र तथा एक परीक्षण-नलिका होती है।

छोटे पात्र में क चिह्न तक फेहलिंग विलयन नं० १ भरें और ख चिह्न तक फेहलिंग विलयन नं० २ भरें। ग चिह्न तक उसमें साधारण जल मिलाओ और सारे द्रव को परीक्षणनलिका में उबेल दो। अब बड़े पात्र के च चिह्न तक मूत्र भरें और छ चिह्न तक जल ढालो। पूरे द्रव को अच्छी तरह मिला लो। परीक्षणनलिका



चित्र ४६—कार्थरदाइन का शर्करा मीटर (शर्करा मापक)

को गरम करो और उसमें बड़े पात्र के द्रव को धीरे-धीरे ढालते जाओ जब तक कि उसमें नीला रङ्ग अच्छी तरह न आ जाय। अब बड़े पात्र में अशुद्धि चिह्न को देख लो। यह शर्करा की प्रतिशत मात्रा बतलायगा।

(२) पेची की विधि (Pavy's method)—पेची का द्रव रङ्गीन होता है जो शर्करा के द्वारा रङ्गरहित हो जाता है। १० सी. सी. विलयन को रङ्गरहित बनाने के लिए ०.००५ ग्राम शर्करा की आवश्यकता होती है। इसी रासायनिक परिवर्तन के आधार पर शर्करा की मात्रा निर्धारित की जाती है।

एसिटोन (Acetone)

यह स्नेह के अपूर्ण ओपवनीकरण से उत्पन्न होता है और मूत्र में पाया जाता है। यह निम्नाशुद्ध विकारों में मूत्र में उपस्थित होता है:—

१. इन्फुमेड

२. शाकतरव के सात्मीकरण में बाधाजनक विकारः—

आमाशयव्रण, आमाशय का कैंसर, अन्ननलिका-सङ्कोच, अन्त्ररोध, शोथ-
क्षय, घातक रोग, विषम ज्वर, उपदंश गर्भावस्था का सन्तत घमन, बालवृद्धि,
शैशवातिसार ।

३. मूत्र विषमयता (Uraemia)

४. अर्धाविमेदक ५. प्रसूतिसन्निपात ६. ह्योरोफार्मविष

परीक्षा

(१) रोथरा की परीक्षा (Rothera's test)—एक नलिका में एक इंच ताजा मूत्र लो और उसमें अमोनियम सल्फेट का एक टुकड़ा डालो और दोनों को अच्छी तरह मिलाओ । यदि नली में कुछ भी न बैठे तो फिर थोड़ा मिलाओ । इस प्रकार उस विलयन को सन्तृत बना लो । यदि मूत्र की प्रतिक्रिया अम्ल हो तो उसमें १ या २ बूँद लाइकर अमोनिया फोर्ट मिलाओ । अब एक दूसरी नलिका लो और उसमें सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड का विलयन बनाओ । १ इंच पानी में मटर के बराबर सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड मिलाकर विलयन बनाना चाहिये । इस विलयन को पहली नलिका में मिलाओ । एसिटोन रहने पर पोटेशियम परमैंगनेट की तरह गहरा रंगीन रङ्ग मिलेगा ।

द्विसिरकाम्ल (Diacetic acid) होने पर निम्नांकित परीक्षा की जाती हैः—

(२) गारहट्ट की परीक्षा (Gerhardt's test)ः—एक नलिका में २ इंच ताजा मूत्र लो । इसमें बूँद बूँद कर लाइकर फेरी परक्लोराइड डालो, जब तक अवशेष न आ जाय । थोड़ा और द्रव मिलाने पर अवशेष घिलीन हो जाता है । द्विसिरकाम्ल की उद्गरिपति में जम्बूमट्टा वर्ण उत्पन्न होगा जो गरम करने पर नष्ट हो जायगा ।

पित्त

यह निम्नांकित विकारों में पाया जाता हैः—

१. अवरोधजन्य विषजकामला (Obstructive & Toxic Jaundice)

२. पीतज्वर (Yellow fever)

परीक्षा


(१) हे की परीक्षा (Hay's test)—पित्तलवणों के लिए एक नलिका में २ इंच मूत्र लो। उसमें थोड़ा गन्धक का चूर्ण डालो। यदि गन्धक के कण नीचे बैठने लगे तो पित्त की उपस्थिति समझनी चाहिये।

(२) गेलिन की परीक्षा (Gmelin's test)—पित्तलवणों के लिए एक नलिका में सान्द्र नम्रिकाम्ल १-२ सी. सी. लो और उसमें बगल से समान मात्रा में मूत्र मिलाओ। दोनों के सन्निष्पन्न पर हरी या नीली धृत्तरेखा मिलेगी।



मूत्रगत प्रक्षेप द्रव्य (Urinary deposits or Sediments)

स्वभावतः मूत्र का कोई भी अवयव दृष्टिगोचर नहीं होता। अधिक सान्द्र मूत्र में कंघल यूरेट दिखलाई पड़ते हैं। परीक्षा में सुविधा की दृष्टि से प्रक्षेपद्रव्य का निम्नांकित वर्गीकरण किया गया है:—

१. वर्ण की दृष्टि से:—



२. रचना की दृष्टि से:—



प्रचेपद्रव्यों की अणुवीक्षण यन्त्र से जो परीक्षा की जाती है वह सर्वोत्तम होती है। तथापि सामान्यतः निम्नांकित परीक्षाओं से, उनका निर्धारण किया जाता है:—

(१) मूत्र को उस पात्र से दूसरे पात्र में ढाल दो, केवल प्रचेपद्रव्य को उसमें रहने दो। इस प्रचेपद्रव्य के तीन भाग करके तीनों को पृथक् पृथक् नलिका में रखो। इनमें से एक में सिरकागल की कुछ बूँदें ढालो। यदि प्रचेपद्रव्य पूर्णतः नष्ट हो जाय तो फास्फेट (केवल) और यदि अंशतः नष्ट हो तो फास्फेट (कुछ अन्य वस्तुओं के साथ) समझना चाहिये।

(२) अब दूसरी परीक्षण नलिका लो और उसमें थोड़ा लाइकर पोटाश ढालो। यदि रज्जुसदृश अवचेप या जिलेटिन सदृश वस्तु मिले तो पूय और यदि प्रचेप घुल जाय तो श्लेष्मा की उपस्थिति समझनी चाहिये। तीसरी नलिका तुलना के लिए रखी जाती है।

(३) एक परीक्षणनलिका में उसके दूँ भाग तक मूत्र लो जिसमें कपित्थ-रक्त प्रचेप उपस्थित हों। मूत्र का ऊपरी भाग स्विटि लैम्प से गरम करो। यदि मलिनता दूर हो जाय तो यूरेंट की उपस्थिति समझनी चाहिये।

(४) एक नलिका में थोड़ा प्रचेप लो। उसमें तीव्र उदहरिताम्ल ढालो। यदि प्रचेप घुल जाय और उसमें अमोनिया का विलयन डालने पर रफटिक बन जाय तो कैल्सियम आक्जलेट समझना चाहिये।

रक्त

मूत्र में रक्त निम्नांकित विकारों में मिलता है:—

(क) शुक्कसंयन्धी कारण:—

१. सामान्य तथा घातक अर्बुद, २. आवात, ३. अशमरी,
४. यक्ष्मा, ५. तीव्र शुक्कशोथ।

(ख) मूत्राशयसम्बन्धी कारण:—

१. अकुराबुद (Papilloma), २. कैंसर, ३. अशमरी,
४. तीव्र मूत्राशय शोथ, ५. आवात।

(ग) मूत्रमार्गसम्बन्धी कारण:—

१. पूयमेह, २. आवात, ३. अशमरी।

(घ) कुछ सामान्य रोगः—

१. कृष्णजल ज्वर (Black water fever)
२. मूत्रगत रक्तजलक (Haemoglobinuria)
३. विषम ज्वर ।
४. कुलज रक्तघ्राव (Haemophilia)
५. नीलिमा (Purpura haemorrhagica)
६. रक्घी । ७. अत्यधिक दग्धघ्रण ।
८. शिलीन्ग्रविष (Mushroom poisoning)
९. सर्पविष और पोटाशियम क्लोरेट का विष ।

परीक्षाएँ

(१) ग्वैकम परीक्षा (Guaiacum test) :—यदि मूत्र शरीर हो तो पहले उसे सिरकाम्ल के द्वारा आम्लिक बना लो । इस मूत्र को नलिका में २ इंच तक लो । इसमें ताजे टिंक्चर ग्वैकम (Tincture Guaiacum) की कुछ बूँदें डालो और दोनों को अच्छी तरह मिलाओ । एक दूसरी नलिका लो और उसमें ३ इंच तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालो । उसके बराबर ही उसमें ईथर सल्फ (Ether Sulph) मिलाओ और खूब अच्छी तरह दोनों को मिला लो । इसको पहली नलिका में धीरे-धीरे डालो । यदि दोनों द्रवों के सम्बन्ध-स्थान पर हरा रङ्ग उत्पन्न हो जाय तो रक्त की उपस्थिति समझनी चाहिये ।

(२) बेन्जिडिन परीक्षा (Benzidin test) :—एक नलिका में सान्द्र सिरकाम्ल में बेन्जिडिन का सन्तुलित विलयन बनाओ । उसमें उसके बराबर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाओ । अब उतना ही मूत्र धीरे-धीरे उसमें मिलाओ । रक्त की उपस्थिति में उसका रङ्ग नीला हो जायगा ।

पूय

निम्नाङ्कित विकारों में पूय मूत्र में आता हैः—

(क) वृक्कसम्यन्धी कारणः—

१. वृक्कवस्तिशोथ, ऊर्ध्व वृक्कवस्तिशोथ (Pyelitis & Ascending Pyelitis or Pyelo-Nephritis)

२. यक्ष्मा, ३. अरमरी ।

(ख) मूत्राशयसंबन्धी कारणः—

१. मूत्राशयशोथ, २. यक्ष्मा, ३. अरमरी,
४. घण, ५. अर्बुद ।

(ग) मूत्रमार्गसंबन्धी कारणः—

१. पूयमेह ।
२. सामान्य मूत्रमार्गशोथ (Urethritis)
३. मूत्रमार्ग संकोच (Gleet)

परीक्षाएँ

(१) एक नलिका में २ इंच मूत्र लो । उसमें टिंचर रूबैकम की कुछ घूँदें डालो और दोनों को खूब मिलाओ । पूय की उपस्थिति में यह नीला हो जायगा, पर गरम करने से यह नीलापन नष्ट हो जायगा ।

(२) नलिका में १ या २ इंच मूत्र लो जिसमें प्रवेपद्रव्य भी मिले हों । इसका आधा छाड़कर पोरता मिलाओ । यदि यह रज्जु या जिडेतिन की तरह हो जाय तो पूय की उपस्थिति समझनी चाहिये ।

—*—

चतुर्दश अध्याय

अन्तःस्राव ग्रन्थियाँ

(Endocrine organs or ductless glands)

शरीर के अङ्गों की कार्य क्षमता के लिए उनका पारस्परिक सहयोग नितान्त आवश्यक है । सहयोग निम्नाह्वित कारणों से स्थापित होता है :—

(१) नाड़ी संस्थान—जो पेशी की चेष्टाओं में साम्य उत्पन्न करता है ।

(२) रक्त के खनिज लवण—यथा सोडियम, पोटेशियम तथा ग्रेटिक के अणु हस्तप्रतीक्षा का नियमन करते हैं ।

(३) पाचननलिका में उत्पन्न कुछ पदार्थ जो शोषित हो कर रासायनिक परिवर्तन में कारण होते हैं यथा आमाशयीन और खानीन की उत्पत्ति और पाचक रसों पर उनकी क्रिया ।

(४) धातुओं के सारणीकरण से उत्पन्न भूत पदार्थ—यथा कार्बन द्विओ-
पिदू का श्वसनसंस्थापन पर प्रभाव ।

(५) धातुचय के कारण उत्पन्न भूत पदार्थ—यथा हिस्टेमोन का रक्तवा-
हिनियों और पाचनसंस्थान पर प्रभाव ।

(६) निःस्रोत ग्रन्थियों के अन्तःस्राव जो रासायनिक कार्यों में सहायक
होते हैं और सीधे लसीका और रक्त में पहुँचते हैं ।

ऐसे अङ्ग जो अन्तःस्राव उत्पन्न करते हैं अन्तःस्राव ग्रन्थियाँ कहलाते हैं ।
ये स्राव किसी स्रोत में न जा कर सीधे रक्त या लसीका में पहुँचते हैं । स्रोत न
रहने के कारण इन्हें निःस्रोत ग्रन्थियाँ भी कहते हैं ।

ये ग्रन्थियाँ दो प्रकार की होती हैं:—

(१) जो केवल अन्तःस्राव उत्पन्न करती हैं और कोई अन्य कार्य नहीं
करती—यथा अवटु, पोषणक ग्रन्थि तथा अधिप्लूक ग्रन्थि ।

(२) जिनके कोषाण अन्तःस्राव उत्पन्न करते हैं किन्तु उनके अभिष्टानभूत
ग्रन्थि से यहिःस्राव भी होता है—यथा अग्न्याशय आदि ।

कार्य

अन्तःस्राव ग्रन्थियों के निम्नाङ्कित कार्य हैं:—

(१) शरीर के विकास का नियमन ।

(२) शरीर के सारणीकरण का नियमन ।

(३) सहकारी यौनभावों के विकास का नियमन ।

(४) स्वतन्त्र नाडीमण्डल की क्रिया को प्रभावित करना ।

ये सभी ग्रन्थियाँ एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, अतः एक की क्रिया में
विकृति होने से अन्य ग्रन्थियों पर भी विकारक प्रभाव होते हैं ।

इन ग्रन्थियों के विशिष्ट कार्यों का निरूपण निम्नाङ्कित पद्धतियों से होता है:—

(१) नैदानिक तथा चैकारिक पद्धति (Clinical & pathological
method) इसमें ग्रन्थियों के विकार द्वारा उत्पन्न लक्षणों का अध्ययन किया
जाता है ।

(२) शारीर पद्धति (Physiological method)—इसमें प्रयोग
के रूप में आंशिक या पूर्ण ग्रन्थियों को शरीर से शून्य कर तत्जन्य स्रव के लक्षणों
को देखा जाता है ।

(३) नैदानिक पद्धति (Clinical method)—इसमें ग्रन्थियों के पृथक् करने पर उत्पन्न लक्षणों में उनके अन्तःस्रावों का अन्तःक्षेप कर उसके प्रभाव का निरीक्षण किया जाता है ।

(४) औषधविज्ञान एवं जीवरसायनविज्ञान सम्बन्धी पद्धति (Pharmacological & Biochemical method)—ग्रन्थिवस्तु के अंश को दूसरे प्राणी में स्थापित करके तथा स्वस्थ पुरुषों में अन्तःस्रावों का अन्तःक्षेप करके उनका प्रभाव देखा जाता है ।

अन्तःस्राव (Hormones)

अन्तःस्राव ग्रन्थियों के अन्तःस्रावों की निम्नाङ्कित संज्ञायें हैं :—

(१) उत्तेजक अन्तःस्राव (Hormones)—ये शरीर पर विशिष्ट रासायनिक या शारीर प्रभाव डालते हैं और सामीकरण को उत्तेजित कर देते हैं—यथा अध्रिनिडीन, पिट्यूटरीन आदि ।

(२) अवसादक अन्तःस्राव (Chalons)—ये सामीकरण की क्रियाओं पर अवसादक प्रभाव डालते हैं । यथा अपरा का सत्व स्तन्य के स्राव को कम कर देता है ।

(३) औषधरूप अन्तःस्राव—(Autacoids)—इनका शरीर पर औषध के समान प्रभाव होता है, अतः ये प्राकृत औषध-द्रव्य के रूप में कार्य करते हैं । इनका शरीर के विभिन्न अङ्गों पर उत्तेजक या अवसादक प्रभाव पड़ता है ।

अन्तःस्रावों का स्वरूप

(१) ये प्रतिजन नहीं हैं—अर्थात् शरीर रक्त में अन्तःक्षेप करने पर वे प्रतियोगी पदार्थ उत्पन्न नहीं करते ।

(२) इनका रासायनिक संघटन अपेक्षाकृत सरल होता है ।

(३) स्वरूपकाल तक उबालने से ये नष्ट नहीं होते हैं ।

(४) अधिक काल तक उबालने से क्रियाहीन हो जाते हैं ।

(५) आसानी से प्रसरणशील होते हैं ।

(६) रक्तप्रवाह में वे क्षीघ्र नष्ट हो जाते हैं जिससे उनका प्रभाव चिर-स्थायी नहीं होता ।

(७) इसने अस्थिर होते हैं कि मुख के द्वारा देने पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता । इसका अपवाद केवल थाइरो आयरडिन है ।

(८) शरीर से इनका वस्त्रगं नहीं होता—(थाइरो आयरडिन छोड़ कर)

अन्तःस्रावों की क्रिया का स्वरूप

अन्तःस्रावों की क्रिया दो प्रकार से होती है:—

(१) उनका औषध के समान दीर्घ प्रभाव होता है जिससे वे धातुओं को दीर्घ उल्लेखित या अवसन्न कर देते हैं ।

(२) जीवनीय द्रव्यों के समान शरीर के विकास तथा सामीकरण पर मन्द प्रभाव होता है ।

अधिवृक्क ग्रन्थि (Suprarenal Glands)

यह वृषक के शिखर पर त्रिकोणाकार या टोपी के आकार की होती है । बाहर की ओर यह एक सौत्रिककोष से आवृत रहती है । इसके दो भाग होते हैं:—

(१) बहिर्वस्तु (Cortex) (२) अन्तर्वस्तु (Medulla)

बहिर्वस्तु:—यह गर्भ के मध्यस्तर से विकसित होते हैं । इनके कोषाण अनेकाकार होते हैं और उनके ओजःपार में स्नेह कणों की प्रचुरता होती है । इनके केन्द्रक अतिस्पष्ट होते हैं । ये कोषाण अनेक रूपों में व्यवस्थित होते हैं और इसके अनुसार बहिर्वस्तु तीन स्तरों में विभक्त होता है:—

(१) पुटक क्षेत्र (Zona glomerulosa)—इनमें कोषाण गोलाकार व्यवस्थित रहते हैं ।

(२) स्तम्भाकार क्षेत्र (Zona fasciculata)—इनके कोषाण स्तम्भाकार व्यवस्थित होते हैं ।

(३) जालक क्षेत्र (Zona reticularis)—इनके कोषाण जालकरूप में व्यवस्थित होते हैं ।

अन्तर्वस्तु—यह गर्भ के बाह्यस्तर से विकसित होता है और बहिर्वस्तु की अपेक्षा कम होता है । इसके कोषाण अनियमित आकार के होते हैं ।

इस ग्रन्थि में रक्तवाहिनियों की अधिकता होती है जो बहिर्वस्तु में स्तम्भाकार कोषाणों के बीच-बीच में रहती है तथा जालक क्षेत्र और अन्तर्वस्तु में केशिकायें फैलकर बड़े बड़े छोटों का रूप धारण करती है ।

अन्तर्वस्तु में असंख्य अमेइस नाडियाँ रहती हैं जो परस्पर मिलकर जालक बनाती हैं । इन नाडियों की उत्तेजना से अद्रिनिलीन का स्राव होता है । अन्तर्वस्तु के कोषाणु वस्तुतः सांवेदनिक नाडी-गण्डों के समान हैं और परिवर्तित नाडी कोषाणुओं से बने हुये हैं । इसके निम्नांकित प्रमाण हैं :—

(१) अन्तर्वस्तु के कोषाणुओं में क्रोमोफिल नामक रक्षक कण होते हैं जो सांवेदनिक नाडीसंस्थान के गण्डों में भी होते हैं ।

(२) विकास की दृष्टि से भी दोनों समान हैं ।

(३) सांवेदनिक नाडीसंस्थान के नाडीसूत्र अंशों में पहुंचने के पूर्व गण्ड-कोषाणु से सम्बन्ध रहते हैं, किन्तु अन्तर्वस्तु में आने वाले नाडीसूत्रों के मार्ग में कोई गण्डकोषाणु नहीं होता ।

(४) अद्रिनिलीन का प्रभाव सांवेदनिक नाडियों के समान ही होता है ।

(५) निम्नांकित कारणों से अधिष्टक ग्रन्थियों भी उत्तेजित होकर अधिक स्राव उत्पन्न करती हैं :—

(क) सांवेदनिक नाडियों की उत्तेजना ।

(ख) भय, क्रोध के आवेश ।

(ग) पीडा ।

ग्रन्थि के केशों का अध्ययन निम्नांकित तीन अवस्थाओं में छद्मों को देखकर किया गया है :—

१. ग्रन्थि के विकार ।

२. स्वस्थ पुरुष की दोनों ग्रन्थियों का प्रत्यक्षकरण ।

३. अद्रिनिलीन का अन्तःक्षेप ।

अन्तर्वस्तु का कार्य

पहले कुछ विद्वानों ने यह दिखलाया था कि अन्तर्वस्तु में एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न होता है जो रक्तभार को बनाये रखता है । बाद में टैकेमिन (Takamine) नामक विद्वान् ने उसको प्रत्यक्ष कर उसका रूप निर्धारित किया ।

अद्रिनिलीन टाइरोसिन से प्राप्त किया जाता है और सोमसाय (Ephedrine) से अधिक सादृश्य रखता है । यह एक श्वेतवर्ण का स्फटिकीय द्रव्य है जो घायु और प्रकाश में शीघ्र नष्ट हो जाता है । प्राकृत अद्रिनिलीन वामा-

वर्तक है। शरीर पर इसकी क्रिया सांवेदनिक नाड़ियों की उत्तेजना के समान होती है। इसका प्रभाव सांवेदनिक नाड़ियों के अप्रमाण या नाड़ी-सन्धियों पर होता है।

अद्रिनिलीन के निम्नांकित मुख्य कार्य हैं:—

(१) स्वतन्त्र पेशियों पर प्रभाव डालना और सूक्ष्म धमनियों के स्वाभाविक संकोच को घटाये रखना जिससे रक्तभार प्राकृत सीमा पर रहे।

(२) यकृत में शर्कराजन के परिणाम को नियन्त्रित कर रक्तगत शर्करा का परिमाण स्थिर रखना।

इस प्रकार यह इन्सुलीन के विरुद्ध कार्य करता है। इन्सुलीन शर्कराजन की उत्पत्ति में सहायक होता है और अद्रिनिलीन उसकी शर्करा में परिणत करने में सहायक होता है।

विश्रामकाल में इसका स्राव बहुत कम होता है, किन्तु कुछ आत्यधिक अवस्थाओं में, जहाँ सांवेदनिक सस्यान की सहायता की आवश्यकता होती है, इसका स्राव बहुत बढ़ जाता है। इसके कारण रक्तभार बढ़ जाता है और शर्कराजन के अधिक परिणाम से रक्तगत शर्करा की मात्रा भी बढ़ जाती है। इस प्रकार इसका स्राव क्रियाशील अवस्थाओं (यथा घूमना, दौड़ना आदि), मानसिक भावावेश तथा शीत में बढ़ जाता है।

अद्रिनिलीन का प्रभाव

इसका अन्तःक्षेप करने पर मुख्यतः निम्नांकित संस्थानों पर प्रभाव देखने में आता है:—

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (१) रक्तवह स्रोत । | (२) हृदय । |
| (३) पाचननलिका । | (४) आसनलिका की पेशियाँ । |
| (५) वस्ति । | (६) गर्भाशय । |
| (७) सामीकरण । | (८) रक्त । |
| (९) स्वतन्त्र पेशियाँ । | |

स्वेदप्रणियों को छोड़ कर सांवेदनिक सस्यान से संबद्ध सभी अंगों पर इसका प्रभाव होता है।

(१) रक्तवाहस्रोत

इससे सभी रक्तवाह स्रोतों का संकोच हो जाता है, केवल हार्दिक रक्तवाहिनियों का प्रसार हो जाता है । इस प्रकार इसके कारण शीघ्र रक्तभार बढ़ जाता है । प्राणदा नाड़ी को विच्छिन्न कर देने पर यह प्रभाव और अधिक दृष्टि-गोचर होता है क्योंकि प्राणदा के मन्दक प्रभाव के कारण इसकी क्रिया में अवरोध होता है । अद्रिनिलीन का प्रभाव नाड़ी के अग्रभागों या सूक्ष्म धमनियों की पेशियों पर न होकर पेशीनाड़ी-सन्धि पर होता है । इसका प्रमाण यह है कि यदि एपोकोडीन (Apocodeine), जो नाड़ी के अग्रभागों को विपाक कर देता है, पहले शरीर में प्रविष्ट कर दिया जाय तो अद्रिनिलीन का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, यद्यपि वेरियम लवण, जो रक्तवाहिनियों की पेशियों पर सीधे प्रभाव डालते हैं, संकोच उत्पन्न करते हैं ।

पाचननलिका की रक्तवाहिनियों में संकोचक नाड़ियों की बहुलता के कारण उन पर अद्रिनिलीन का प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है, जब कि शिर और फुफ्फुस की रक्तवाहिनियों (जिनमें सांनिदिक नाड़ीसूत्र बहुत कम हैं) पर इसका प्रभाव अत्यन्त कम होता है । पहले से प्रसारित धमनियों पर इसका प्रभाव अधिक होता है । हार्दिक धमनियों का प्रसार होने के कारण रक्तभार बढ़ने पर भी हृदय की कार्यक्षमता बनी रहती है ।

(२) हृदय

अद्रिनिलीन का हृदय के अलिन्दों और निलयों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे हृदय की गति बढ़ जाती है और संकोच का वेग भी बढ़ जाता है, फलतः हृदय के निर्यात में वृद्धि हो जाती है । प्राणदा को विच्छिन्न कर देने पर यह प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है ।

(३) पाचननलिका

आमाशय, क्षुद्राशय एवं वृहदन्त्र की पेशियाँ प्रसारित हो जाती हैं तथा आमाशय और अन्त्र की गति मन्द हो जाती है । मुद्रिका एवं उष्णकुह्वार की संकोचनी पेशियों का संकोच हो जाता है । संक्षेप में, इसका प्रभाव सांनिदिक नाड़ियों के समान होता है जिससे अन्त्र की परिसरण गति तथा पाचन क्रियाएँ मन्द पड़ जाती हैं । लालास्राव भी कम हो जाता है ।

(४) श्वासनलिकीय पेशियाँ

इससे श्वासनलिका की पेशियों का प्रसार होता है और इसलिए श्वासरोग में इसका उपयोग किया जाता है ।

(५) वृक्क

वृक्क के रक्तवह स्रोतों का संकोच हो आने के कारण वृक्क में रक्त कम हो जाता, फलतः मूत्रस्राव कम हो जाता है ।

(६) वस्ति

वस्ति की पेशियों का प्रसार तथा मूत्रप्रसेक-संकोचनी का संकोच हो जाता है ।

(७) गर्भाशय

गर्भाशय में यह गर्भाशय को उन्नेवित करता है, किन्तु सामान्यतः इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता ।

(८) यकृत

यकृत की सांवेनिक नादियों के उन्नेवित होने से शर्कराजन का विश्लेषण होता है जिससे यकृत में संचित शर्कराजन शर्करा में परिणत होकर रक्त में पहुँचता है और वहाँ रक्तगत शर्करा की मात्रा बढ़ा देता है । इससे मूत्र में भी शर्करा आने लगती है । शर्करा अधिक मिलने से धातुओं को अधिक शक्ति प्राप्त होती है जिसे वेनीधर्म कम हो जाता है या नहीं होता ।

तीव्र भावावेश की अवस्थाओं से अड्रिनिलीन का स्राव बढ़ जाता है जिससे मूत्र में शर्करा आने लगती है । आसक्ति शोक और चिन्ता से ग्रन्थि पर अवसादक प्रभाव पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता नष्ट हो जाती है । अड्रिनिलीन से पित्ताशय की दीवाल का संकोच भी होता है ।

(९) प्लीहा

इससे प्लीहा का कोष संकुचित हो जाता है ।

(१०) रक्तस्कन्दन

इसकी थोड़ी मात्रा से रक्त का रक्तन्दन काल कम हो जाता है, किन्तु अधिक मात्रा देने पर विपरीत प्रभाव होता है ।

(११) स्वतन्त्र पेशियाँ

सांवेदनिक नाडियों से असंबद्ध धातुओं पर भी इसका प्रभाव होता है । चेष्टावह नाडियों को उत्तेजित करके यह स्वतन्त्र पेशियों के संकोच को बढ़ा देता है और श्म को भी शीघ्र निवृत्त करता है ।

(१२) श्वसन

इसके प्रभाव से श्वसनक्रम घट जाता है ।

(१३) सांवेदनिक संस्थान

प्राग्भीय रक्तवाहिनियों के संकोच से रक्ता श्वेत वर्ण हो जाती है । स्वेद-ग्रन्थियों से संबद्ध पेशियों का संकोच होता है किन्तु स्वेद के छाव में वृद्धि नहीं होती । सारमीकरण बढ़ जाता है ।

यह देखा गया है कि अद्रिनिलीन का सम्बन्ध ग्रैवेयक के अन्तःछाव से होता है । यदि पहले ग्रैवेयक की नाडियाँ उत्तेजित कर दी जाँय या ग्रैवेयक के स्राव का अन्तःक्षेप शरीर में किया जाय तो उसके बाद अद्रिनिलीन प्रविष्ट करने से रक्तभार में अधिक वृद्धि होती है ।

बहिर्वस्तु के कार्य

इसका प्रभाव अस्थियों के विकास और वृद्धि पर होता है । अतः बहिर्वस्तु के विकारों में अस्थिवृद्धता उत्पन्न हो जाती है । इसका यौनग्रन्थियों से भी सम्बन्ध होता है । गर्भावस्था के समय इसकी वृद्धि हो जाती है । बहिर्वस्तु में अर्बुद या वृद्धि हो जाने से यौनग्रन्थियाँ भी उत्तेजित हो जाती हैं जिससे ७-१० वर्ष । बालिकाओं में भी पूर्ण युवती के लक्षण मिलते हैं । यही अवस्था यदि युवती स्त्रियों में हो तो मासिक बन्द हो जाता है और पुंस्रव के लक्षण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं ।

अधिवृक्क ग्रन्थि विशेषतः बहिर्वस्तु के चिरकालीन चय से ऐडिसन का रोग उत्पन्न हो जाता है जिसमें रक्ता में साम्रधर्म, वमन, कम्प, आर्सेप, काल्पता, कृशता रक्तभार की कमी और सारमीकरण में हास ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ।

यदि बहिर्वस्तु को पृथक् कर दिया जाय तो निम्नांकित लक्षण उत्पन्न होते हैं—
(१) रक्त में यूरिया, क्रिपेटिनीन आदि की वृद्धि ।

- (२) शरीर के जलशोष का रुय ।
 (३) चारकोप में कमी ।
 (४) रक्त में सोडियम लवणों की कमी तथा पोटाशियम लवणों की वृद्धि ।
 (५) अत्यधिक दौर्वल्य । (६) कृशता ।
 (७) रक्तमार में कमी । (८) रक्तगत शर्करा में कमी ।
 (९) मन्द नाड़ी । (१०) पाचन के विकार ।
 (११) श्वास कष्ट ।

इसके बाद ४-५ दिनों में मृत्यु हो जाती है ।

यदि एक ही ग्रन्थि निकाल दी जाय तो कोई प्रभाव नहीं दीखता, क्योंकि दूसरी ग्रन्थि बढ़ कर उसका कार्य ले लेती है । दोनों ग्रन्थियों को निकाल देने पर भी यदि यहिर्वस्तु का सार शरीर में प्रविष्ट किया जाय तो उसकी आधुना आती है । इससे सिद्ध है कि यहिर्वस्तु जीवन के लिए आवश्यक है । यहिर्वस्तु का सार 'कौर्टिन' (Cortin) कहलाता है जो मुख के द्वारा देने पर भी कार्य कर होता है । यहिर्वस्तु से एक और सार होता है जिसे 'न्यूमीन' (Pneummin) कहते हैं । यह पहले रक्तवहसंस्थान में प्रविष्ट होता है और फिर रक्त संवहन में प्रविष्ट होता है । इसका श्वसनकेंद्र पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है । इसका प्रमाण यह है कि यदि अधिवृक्क से 'सम्बन्धित रसायनियों' को काट दिया जाय तो श्वसनक्रिया बन्द हो जाती है और इस स्थिति में यदि यहिर्वस्तु का सार प्रविष्ट किया जाय तो श्वसनक्रिया पुनः लौट आती है ।

कौर्टिन और न्यूमीन के अतिरिक्त दो और पदार्थ यहिर्वस्तु में पाये गये हैं:- कार्टिलैक्टिन (Cartilactin) और कार्डियसिन (Cardiasin) । पहला पदार्थ स्तन्य बढ़ाता है और दूसरा हृदय को उत्तेजित करता है । इस प्रकार यहिर्वस्तु में कुल चार प्रकार के सार उत्पन्न होते हैं:-

- (१) जीवन रक्षक (Cortin) ।
 (२) श्वासोत्तेजक (Pneummin) ।
 (३) स्तन्यवर्धक (Cartilactin) ।
 (४) हृदयोत्तेजक (Cardiasin) ।

यहिर्वस्तु में जीवनीय द्रव्य सी० सी प्रचुर परिमाण में पाया जाता है ।

पोषणक ग्रन्थि (Pituitary body)

पोषणकग्रन्थि मस्तिष्कतल में दृष्टिनादीयोजिका के पीछे अतृकास्थि के पोषणकग्रन्थि-स्नात में स्थित है ।

इसके तीन भाग होते हैं—अग्रिम भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग । ये भाग रचना की दृष्टि से यद्यपि समान हैं तथापि उत्पत्ति और क्रिया की दृष्टि से इनमें परस्पर महान् अन्तर है ।

अग्रिम भाग (Anterior lobe)

यह मुख के बाहरस्तर से विकसित होता है और इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोषाणुओं से होता है जिनका निर्देश निम्नलिखित है :—

(१) कणरहित कोषाणु (Chromophobe cells)—ये अधिक संख्या में लगभग ५२ प्रतिशत होते हैं । इनका भोजन-सार कणरहित होता है ।

(२) कणयुक्त कोषाणु (Chromophil cells)—इनका भोजन-सार कणयुक्त होता है और ये आसानी से रजित होते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं :—

(क) अम्लेच्छु (Acidophil)—ये २० प्रतिशत होते हैं और इनसे मुख्यतः वृद्धिजनक पदार्थों का स्राव होता है ।

(ख) पीठरङ्गेशु (Basophilic)—ये ११ प्रतिशत होते हैं और केवल पैथिक रङ्गों तथा मेथिलिनब्लू आदि से रजित होते हैं । इनसे यौन अन्तःस्रावों की उत्पत्ति होती है ।

इस ग्रन्थि में रक्तवाहिनियाँ प्रसृत और बड़े स्त्रोतों के रूप में होती हैं ।

अग्रिम भाग में अनेक प्रकार के अन्तःस्राव होते हैं जो नीचे दिये जाते हैं ।

(१) वृद्धिजनक अन्तःस्राव (Growth promoting hormones)—इनसे शरीर, विशेषतः अस्थियों और संयोजक तन्तुओं के विकास में सहायता मिलती है । अतः प्राणियों के आहार में इसके मिलाने से वृद्धि का क्रम बढ़ जाता है ।

(२) यौन विकासक (Gonadotropin)—ये यौनप्रणियों के विकास में सहायक होते हैं ।

स्त्रियों में ये अन्तःस्राव दो प्रकार के होते हैं :—

(क) प्रोलैन् ए (Prolan A)—जो स्त्रीबीज की उत्पत्ति को उत्तेजित करता है ।

(ख) प्रोलैन् बी (Prolan B)—जो चीजकिण्ड के निर्माण में सहायता करता है।

यह प्रोलैन् अन्तःस्राव गर्भिणी स्त्रियों के मूत्र में गर्भधारण के लगभग तीन सप्ताह बाद अत्यधिक परिणाम में बाहर निकलता है। इसी आधार पर ओन्डक नामक विद्वान् ने गर्भ की निदान-विधि निश्चित की है।

पुरुषों में भी यह दो प्रकार का होता है। एक शुक्रकीटों की उत्पत्ति में सहायक होता है तथा दूसरा घृणप्रस्थ के अन्तःस्राव का नियन्त्रण करता है।

(३) स्तन्यजनन (Prolactin)—इनसे गर्भावस्था में स्तन्यप्रस्थियों की वृद्धि तथा बाद में स्तन्य की उत्पत्ति होती है।

(४) अग्न्याशयिक (Pancretropic)—इसकी अधिकतासे इक्षुमेह उत्पन्न होता है।

(५) मधुमेहजनक तथा कटुजनक (Diabetogenic & ketogenic)—इनका स्नेह तथा शाक्तत्व के सारमीकरण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इनकी कमी से मधुमेह तथा अधिकता से कटुभवन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे मूत्र में एसिटोन आने लगता है।

(६) ग्रैवेयकीय (Thyrotropic)—यह ग्रैवेयक ग्रन्थि को उत्तेजित करता है। पोषणग्रन्थि के अग्रिम भाग को अलग कर देने पर ग्रैवेयक ग्रन्थि का क्षय तथा सारमीकरण में कमी हो जाती है।

(७) अधिपृक्कीय (Adrenotropic)—यह अधिपृक्क के बहिर्वर्त को उत्तेजित करता है।

(८) परिग्रैवेयकीय (Parathyroid hormone)—यह परिग्रैवेयक की क्रिया को बढ़ा देता है, फलतः रक्त में खटिक की मात्रा बढ़ जाती है।

(९) रक्तकणनिर्माणक (Erythropoietic)—यह रक्तकणों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं।

(१०) स्नेहसाधमीकरण (Fat metabolism hormone)—यह दो प्रकार का होता है:—

(क) कटुजनक (Ketogenic)—यह रक्त में कटु पदार्थों को बढ़ा देता है।

(ख) लेडिन (Lipotrin)—यह अल्प मात्रा में प्रयुक्त होने पर स्नेह को वृद्ध में सञ्चित होने में सहायता करता है। अधिक मात्रा में देने पर इसका विपरीत प्रभाव होता है।

(११) नत्रजन सात्मीकरण (Nitrogen metabolism hormone)—यह मांसतन्त्र के पाचन और सात्मीकरण में सहायक होता है।

(१२) ब्रोमिक (Bromic hormone)—ग्रन्थि के क्रियाकाल में इसके द्वारा ब्रोमिन की उत्पत्ति होती है जो निद्राकाल में लुप्त हो जाता है।

(१३) यकृत (Hepatogenic)—यह यकृत के आकार एवं उसकी अनेक क्रियाओं पर प्रभाव डालता है।

(१४) रञ्जक (Melanophoric)—इसकी क्रिया रञ्जक कणों पर होती है, विशेषतः अधिवृक्क के बहिर्वस्तु के विकारों में उत्पन्न विवर्णता पर इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है।

अग्रिम पोषणक ग्रन्थि का अस्थिसंस्थान से सम्बन्ध

निम्नांकित प्रयोगों से यह सिद्ध है कि पोषणक ग्रन्थि के अग्रिम भाग का शरीर की अस्थियों के विकास एवं वृद्धि से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

प्रायोगिक प्रमाणः—

(१) ग्रन्थि के पृथक्करण या आंशिक हृय से अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है।

(२) चूहों के उदरावरण के भीतर इसके सरस का अन्तःक्षेप करने से विशाल आकृति के चूहे उत्पन्न होते हैं।

नैदानिक प्रमाणः—

(१) इस ग्रन्थि में अर्बुद होने से पोषणकवृद्धि (Hyperpituitarism) की अवस्था उत्पन्न होती है।

(२) पोषणक ग्रन्थि के हृय से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और मनुष्य वामन हो जाता है।

ग्रन्थि का यौन अंगों से सम्बन्ध

पुरुषों में—यह धृयणग्रन्थि के विकास तथा शुक्र-कीटोत्पत्ति को नियन्त्रित करता है और इससे एक ऐसा स्राव उत्पन्न होता है जो सन्तानोत्पत्ति के सहायक अंगों तथा अन्य यौन लक्षणों को नियमित करता है।

स्त्रियों में—(क) ग्रन्थि के आग्लिक कोषाणुओं से एक स्राव होता है जिसकी प्राप्ति अग्रिम पोषणक का आग्लिक स्राव तैयार करने से होती है। इसी को प्रोलन ए कहते हैं। इसको शरीर में प्रविष्ट करने से गुरुकोष (Graffian follicles) का शीघ्र परिपक्व होता है। इस प्रकार प्रोलन ए बीबीज की उत्पत्ति में सहायक होता है।

(ख) पीठरगेन्द्र कोषाणुओं से भी एक अन्तःस्राव निकलता है। ग्रन्थि का शरीर स्राव बना कर इसे प्राप्त करते हैं। यह प्रोलन भी कहलाता है। इसका सम्बन्ध यीजकिणपुट की उत्पत्ति, विकास और स्थिति से होता है।

(ग) अग्रिम पोषणक को छोटी चुट्टियों में प्रस्थापित कर देने पर उनके बीजकोष की क्रिया बढ़ जाती है। गुरुकोष समय से पूर्व ही विकसित हो जाते हैं और योनि तथा गर्भाशय में तदनुकूल परिवर्तन हो जाते हैं।

पोषणक वृद्धि (Hyperpituitarism)

अग्रिम पोषणक की घृहीत वृद्धि से किशोरावस्था में दानवास्थि (Gigantism) रोग होता है। इसमें अस्थियाँ निरन्तर बढ़ती जाती हैं और धीरे-धीरे शरीर की आकृति बढ़ते-बढ़ते दानव के आकार में आ जाती है। इसी विकार



से प्रौढ़ावस्था में अस्थिवृद्धि (Acromegaly) नामक रोग होता है। इसमें विशेष कर छाती अस्थियाँ तथा हाथ और पैर की तथा मुखमण्डल की बढ़ जाती हैं। उन स्थानों के स्तम्भिक तन्तु की भी वृद्धि हो जाती है। दृष्टिनादीयोजक पर दबाव पड़ने के कारण दृष्टिशक्तिका नाश क्रमशः तथा अन्धता उत्पन्न हो जाती है। साथ ही अधिष्टक के बहिर्वर्त पर प्रभाव पड़ने के कारण यौन क्रिया का ह्रास हो जाता है।

चित्र ४७—अस्थिवृद्धि

पोषणक ग्रन्थिलक्ष्य (Hypopituitarism)

ग्रन्थि का विकास रुक जाने या उसका आंशिक पृथक्करण करने से यह अवस्था उत्पन्न होती है। इसके कारण युवा व्यक्तियों में यौन अंगों का वृद्ध होने लगता है तथा बच्चों में यौवनोचित विकास नहीं होने पाता। शरीर में

शर्करा का अत्यधिक संचय होने लगता है । शरीर का विकास रुक जाता और मेद की वृद्धि होने लगती है । सारणीकरण कम हो जाता और मूत्र की राशि बढ़ जाती है । ग्रन्थि की पूर्णतः निकाल देने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ।

पोषणक ग्रन्थि का पश्चिम भाग (Posterior lobe)

इसका मस्तिष्क की तृतीय गुहा के तल से सम्बन्ध रहता है । यह मुख्यतः नाड़ी कोषाणुओं से बना है । इसके पृष्ठकरण का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

पोषणक ग्रन्थि का मध्यभाग (Pars intermedia)

यह पश्चिम भाग से बिल्कुल मिला रहता है । यह स्वच्छ कोषाणुओं से निर्मित है जिनसे पिट्यूटरीन (पीयूष रस) का स्राव होता है ।

पीयूष रस (Pituitrin)

ग्रन्थि के पश्चिमार्ध के स्राव का नाम पीयूष रस दिया गया है । इसमें अनेक कार्पिकारी तत्व होते हैं जिनमें दो मुख्य हैं:—

(१) धमनीसंकोचक (Pitressin or Vasopressin)—यह सूक्ष्म धमनियों को संकुचित करता और रक्तभार बढ़ाता है । कुछ स्वतन्त्र पेशियों तथा श्वास नलिका, वरिष्ठ और अन्त्र को संकुचित करता है । कम मात्रा में देने पर मूत्रल है, किन्तु अधिक मात्रा में मूत्र को कम कर देता है ।

(२) पेशीसंकोचक (Pitocin or oxytocin)—यह अनेक आशयों की स्वतन्त्र पेशियों को उत्तेजित करता है । विशेषतः गर्भाशय की पेशियों पर इसका प्रभाव देखा जाता है । इस प्रकार अन्त्र गति को बढ़ाने तथा प्रसव में सहायता देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है । कुमारी स्त्रियों के गर्भाशय पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, किन्तु गर्भवतुक्त गर्भाशय पर विशेष कर प्रसव की द्वितीय अवस्था में इसका स्पष्ट प्रभाव होता है । उस समय देने से गर्भाशय का संकोच बढ़ा देता है और गर्भ एवं अपरा के निष्कासन में सहायक होता है ।

पीयूषरस की क्रिया

(१) रक्तवह संस्थान (२) हृदय—यह हृत्पेशी को उत्तेजित करता है, किन्तु साथ ही हार्दिक धमनियों को संकुचित करने से उसके पोषण में बाधा भी उत्पन्न करता है । अतः इसका कोई दूरय प्रभाव नहीं होता और हृदयोत्तेजक रूप में भी इसका कोई महत्व नहीं ।

(१) सूक्ष्म घमनियाँ—पीयूष रस के अन्तःक्षेप से सूक्ष्म घमनियों का संकोच होता है और रक्तभार बढ़ जाता है। स्वतन्त्र पेशियों पर क्रिया होने से शरीर की सभी रक्तवाहिनियों पर समान रूप से इसका प्रभाव पड़ता है।

(२) मूत्रवह संस्थान—(क) यूक्—पीयूष रस के अन्तःक्षेप से मूत्र का स्राव कम हो जाता है क्योंकि इससे मूत्रवह स्त्रोतों की आवरणकला उत्तेजित हो जाती है अतः अधिक जल का शोषण कर लेती है। ग्रन्थि के पश्चिमार्ध के पत या विकार से बहुमूत्र रोग उत्पन्न हो जाता है अतः इस स्थिति में पीयूष रस अत्यधिक लाभ करता है। ऐसा भी समझा जाता है कि यह प्रभाव एक विशिष्ट कार्यकारी तन्त्र के कारण है।

(ख) बस्ति—पीयूषरस बस्ति की पेशियों को उत्तेजित कर मूत्र के निहरण में सहायक होता है।

(३) गर्भाशय—गर्भरहित गर्भाशय पर इसका क्या प्रभाव होता है यह कहना कठिन है, किन्तु सगर्भ गर्भाशय पर इसका निश्चित रूप से उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव गर्भावस्था के अन्तिम दिनों में अधिक स्पष्ट हो जाता है।

(४) पाचन संस्थान—यह पाचन संस्थान की पेशियों को उत्तेजित कर उनका संकोच बढ़ा देता है। आमाशयिक रस की उत्पत्ति कम होने लगती है।


(५) स्तन्य ग्रन्थियाँ—यह स्तन्य नलिकाओं से सम्बद्ध स्वतन्त्र पेशियों को संकुचित करता है जिससे स्तन्य ग्रन्थियों में संचित स्तन्य का प्रवाह बढ़ जाता है। सगर्भ प्राणियों में भी इसे प्रविष्ट करने पर स्तन्य का स्राव होने लगता है।

(६) शाकतत्त्व का सात्मीकरण—यह इन्सुलिन उत्पन्न करता है तथा रक्तगत शर्करा को भी बढ़ा देता है। इस प्रकार इसका प्रभाव इन्सुलीन के विपरीत होता है। अतः इन्सुलीन के अत्यधिक प्रयोग से जब रक्त शर्करा कम हो जाती है तब इसका उपयोग करते हैं।

त्रैवेयक ग्रन्थि (Thyroid gland)

त्रैवेयक ग्रन्थि दो अण्डाकार अवयवों के रूप में स्वरयन्त्र तथा श्वास नलिका के पार्श्वभागों में अवस्थित है। ये दोनों अवयव मध्य में स्थित एक योजक भाग (Isthmus) से जुड़े रहते हैं। इसका बाहरी रूप फटे हुये अक्षरोद फल के समान है और संयोजक घातु से बना हुआ है। भीतर की रचना मधुचक्रवत् होती है और ग्रन्थि पृष्ठीय कोषों में विभक्त है जो भीतर की

और घनाकार आवरक तन्तु से आवृत रहते हैं । इन कोशों के भीतर पीले गोंद के समान वस्तु रहती है जिसे थायडो-थाइरोग्लोब्यूलिन या थाइरोक्सिन (Iodo-Thyroglobulin or Thyroxin) कहते हैं । इसमें सेन्द्रिय समूह के रूप में थायडिन ६६ प्रतिशत होता है । कृत्रिम रूप से भी इसका निर्माण निम्नांकित सूत्र के अनुसार किया जाता है :—



यह पदार्थ ग्रन्थि के विग्राम काल में सञ्चित होता है और कार्यकाल में कम हो जाता है । इसके साथ साथ कुछ आवरक कोषाण तथा रक्त और श्वेत-कण भी पाये जाते हैं । ग्रन्थि का विकास गर्भ की पाचननलिका के आधभाग से होता है, किन्तु प्रसव के पूर्व ही उससे इसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है । इस ग्रन्थि में आकार के अनुपात से बहुत अधिक रक्तवाहिनियाँ होती हैं ।

ग्रन्थि के कार्यों का अध्ययन निम्नांकित प्रकार से किया गया है :—

(१) युवावस्था में ग्रन्थि के क्षय से उत्पन्न लक्षणों को देख कर (Myxoedema) या उसकी वृद्धि से उत्पन्न लक्षणों के द्वारा (Exophthalmic goitre)

(२) वाय्वावस्था में ग्रन्थिक्षयजन्य लक्षणों से (Cretinism) ।

(३) ग्रन्थिसूत्र के रक्षण पुरुषों तथा ग्रन्थिक्षय-पीडित स्त्रियों में प्रविष्ट कर उसके परिणाम को देखने से ।

प्रैवेयक ग्रन्थिक्षय (Hypothyroidism)

यह दो प्रकार का होता है :—

(१) मुख्य (Primary)—यह ग्रन्थि के रोगों के कारण तथा धातु की कमी से होता है जिसके कारण ग्रन्थि का अन्तःस्राव कम

है। पोषणक ग्रन्थि के पूर्वार्ध से उत्पन्न ग्रैवेयकीय स्राव की कमी से भी होता है जिससे ग्रैवेयक ग्रन्थि की उत्तेजना कम हो जाती है।

(२) गौण (Secondary)—यह क्षयरोग, उपवास तथा यौन ग्रन्थियों के रोगों के कारण होता है जिससे अन्तःस्राव की उत्पत्ति और शोषण में बाधा होती है। ग्रैवेयक के प्रतिकूल अन्तःस्राव की अधिक उत्पत्ति से भी ऐसा होता है।

ग्रैवेयक ग्रन्थिद्वय में शरीर की सभी क्रियायें मन्द पड़ जाती हैं। पेशियों की क्रिया कम हो जाती है और मस्तिष्क भी मन्द हो जाता है।

ग्रैवेयक ग्रन्थि वृद्धि (Hyperthyroidism)

इस विकार में शरीर की सभी क्रियायें अधिक बढ़ जाती हैं तथा स्वतन्त्र नादीमण्डल का सन्तुलन नष्ट हो जाता है जिससे हृदय की गति तीव्र हो जाती है, मानस उद्वेग, बेचैनी, कम, चोम रक्तमाराधिक्य तथा व्यापक रक्तमार की कमी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं।

श्लैष्मिक शोथ (Myxoedema tetany)

ग्रन्थि का क्षय होने पर युवा व्यक्तियों में दो प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं:—



चित्र ४८—श्लैष्मिक शोथ

(१) वातिक लक्षण:—मानसिक शक्ति का ह्रास, मस्तिष्क केन्द्रों का

विलम्ब से विकास, शक्तिहीन, मूढ़ता, व्यवहार वैषम्य, रुचिवैषम्य ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । पेशियों में आर्सेप भी आते हैं ।

(२) सात्मीकरणसम्बन्धी लक्षण.—मन्द नाड़ी, तापक्रम प्राकृत से भी कम, भोजन की कमी, यूरिया तथा अन्य मलपदार्थों के उत्सर्ग में कमी ये लक्षण होते हैं । सारांश यह कि शरीर की सामान्य सात्मीकरण क्रिया में अत्यधिक हास हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त, अधस्वक् स्थूल हो जाती है । पहले ऐसा समझा जाता था कि त्वचा के नीचे रलेन्मा का संचय हो जाता है और ठसी आधार पर इसका नाम रलेन्मिक शोथ (Myxoedema = mucous oedema) रखा गया था, किन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं होती । त्वचा शुष्क, चुरीदार तथा नख भंगुर हो जाते हैं । यौन क्रियायें विकृत हो जाती हैं और स्त्रियों में रजोरोध हो जाता है । त्वचा पीली और मोम के समान हो जाती है और बाल झड़ जाते हैं ।

ऐसी अवस्था में ग्रैवेयक ग्रन्थि सत्र ३ से २ ग्रैन प्रतिदिन देने से रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति में अत्यधिक लाभ होता है । सात्मीकरण भी बढ़ जाता है और धीरे धीरे रोग शान्त हो जाता है ।

अस्थिच्छय (Cretinism)

जब ग्रैवेयक का स्त्राव जन्म ही से कम हो, बचपन में ही ग्रन्थि का क्षय हो जाय या शिशुवावस्था में ही ग्रन्थि को निकाल दिया जाय तो यह रोग उत्पन्न होता है । इसके निम्नोक्त लक्षण हैं —

(१) अस्थिविकास का बन्द होना । अस्थियों की लम्बाई बहुत कम रह जाती है, यद्यपि वे मोटाई में बढ़ती हैं और इस प्रकार शरीर अष्टाक्षक के समान कुरूप हो जाता है ।

(२) मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता और युवावस्था में भी पौशव की ही बुद्धि रहती है । रोगी वामन, जड़ और मूढ़ होता है और १६ वर्ष की आयु में भी २-३ वर्ष के बच्चों के समान ही उसकी बुद्धि होती है । दूसरे शब्दों में, शारीरिक आयु अधिक होने पर मानसिक आयु बहुत कम होती है ।

इस स्थिति में, रोगी को ग्रैवेयक ग्रन्थि का साव देने से अत्यधिक लाभ होता है और उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति पुनः विकसित हो जाती है।

बहिर्नेत्रिक गलगण्ड (Exophthalmic goitre)

यह रोग ग्रैवेयक ग्रन्थि की वृद्धि से होता है। इससे शरीर पर एक प्रकार का विपाक प्रभाव पड़ता है जिससे नेत्र बाहर की ओर निकल आते हैं, नादी-संस्थान अस्थिर हो जाता है तथा कम्प, हृदयगति की तीव्रता और सारमीकरण की वृद्धि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है जिसका अनुपात १:१ है।



चित्र ४९—बहिर्नेत्रिक गलगण्ड

ग्रैवेयक के इस विकार के निम्नाङ्कित कारण हो सकते हैं:—

- (१) वंशगत
- (२) अन्य अन्तःस्राव ग्रन्थियों के विकार विशेषतः पोषणक ग्रन्थि के ग्रैवेयकीय अन्तःस्राव का विकार
- (३) अतिम्यायाम
- (४) मानसिक आघात
- (५) ग्रैवेयक के अन्तःस्राव के प्रतियोगी पदार्थ की कमी

इस रोग के निम्नाङ्कित लक्षण होते हैं:—

(१) चिन्तित मुखमुद्रा तथा मुखमण्डल रवेद्युक्त

(२) नेत्र बाहर की ओर निकले

(३) ग्रीवा में ग्रन्थि का स्पष्ट उभार

(४) हृदयगति की तीव्रता और श्वासरुष्ट

(५) अग्नि ठीक, किन्तु शरीर भार में कमी । गम्भीर अवस्थाओं में वमन, अतिसार और हृत्तास

(६) सामान्यतः सात्मीकरण बढ़ जाता है

(७) बहुमूत्रता, सामान्य अलम्बूमिनमेह तथा इक्षुमेह

स्थानविशेष में यह रोग अधिक होता है । ग्रन्थि के घड़े हुये अंश को निकाल देने से लक्षण शान्त हो जाते हैं । प्रारम्भिक अवस्थाओं में आयोडाइड देने से भी लाभ होता है ।

प्रैवेयक-सत्त्व के अन्तःक्षेप का प्रभाव

प्रैवेयक सत्त्व का अन्तःक्षेप करने या मुख द्वारा देने से निम्नाङ्कित लक्षण उत्पन्न होते हैं:—

१. अतितीव्र हृद्द्वय

२. नाडी की तीव्रता

३. शरीर के सात्मीकरण में वृद्धि:—

नवजनयुक्त पदार्थों के अधिक निःसर्जन, अधिक भोजन, क्षुधावृद्धि अपस्वक् मेद की कमी, रक्तशर्करा की वृद्धि, इक्षुमेह

प्रैवेयक का क्रियाकारी तत्त्व

केण्डल नामक विद्वान् ने इस तत्त्व को पृथक् किया था । इसे थाइरोक्सिन या थायडोयाइरिन (Thyroxin or iodothyryn) कहते हैं । यह वर्णरहित, गन्धरहित स्फटिकीय पदार्थ है तथा इसका द्रवणांक २३१° सेंटीग्रेड है । इसमें आयोडीन ६.५ प्रतिशत रहता है, फिर भी इसकी मात्रा आहार के साथ लिये गये आयोडिन की राशि पर निर्भर होती है । आयोडिन की उपस्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के अनुपात से ग्रन्थिसत्त्व का शारीर प्रभाव होता है । रासायनिक दृष्टि से यह थाइरोक्सिन के समान है । अत्यल्प मात्रा में

भी इसका प्रभाव होता है क्योंकि यह अत्यन्त सक्रिय पदार्थ है। मनुष्य में ग्रैवेयक ग्रन्थि प्रतिदिन १ मिलीग्राम थाइरोक्सिन उत्पन्न करती है।

परिग्रैवेयक (Parathyroid)

ये संख्या में ४ या ६ हैं तथा ग्रैवेयक ग्रन्थि के दोनों पिण्डों के पीछे सटी हुई और ग्रन्थि-वस्तुभाग से सम्बद्ध रहती हैं। इस ग्रन्थि में दो प्रकार के कोषाण होते हैं:—

(१) मुख्य कोषाण (Chief cells)—ये आकार में अनेककोणीय होते हैं और इनमें रक्तवाहिनियों की अधिकता होती है।

(२) आम्लिक कोषाण (Oxyphil cells)—इन कोषाणों में आम्लिक कण होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पिच्छिल-द्रव्य-पूर्ण कोषाण भी जहाँ-तहाँ मिलते हैं किन्तु इस पिच्छिल पदार्थ में आयोडिन नहीं होता।

इन ग्रन्थियों से एक अन्तःछाव उत्पन्न होता है जो खटिक एवं तिरिन्द्रिय फास्फेट के सात्मीकरण को नियमित करता है। यह एक प्रकार का मांसतत्व है जिसकी क्रिया अन्त्र की दीवारों पर होता है जिससे जीवाणुज क्षिणीकरण के द्वारा उत्पन्न विषों की प्रवेश्यता में अन्तर आ जाता है।

इन ग्रन्थियों को निकाल कर इनके फायों का अध्ययन किया गया है। इनके निकाल देने पर अतितीव्र मांसपृथ, विकास में अवरोध, इक्षुमेह और मृत्यु हो जाती है। रक्त में खटिक की प्राकृत मात्रा (१० मिलीग्राम प्रति १०० सी० सी०) घट कर ६ मिलीग्राम प्रति १०० सी० सी० तक हो जाती है जिससे दाँतों और अस्थियों का खटिकीमयन ठीक ठीक नहीं हो पाता। खटिक देने पर ये लक्षण शान्त हो जाते हैं। रक्त में खटिक की कमी होने से स्वतन्त्र पेशियों में स्तम्भ तथा नाडीजन्य विकार भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि स्वभावतः खटिक नाडीसंस्थान की उत्तेजना को नियन्त्रित करता है।

परिग्रैवेयक के अन्तःछाव का रासायनिक स्वरूप अभी तक अज्ञात है। ऐसा समझा जाता है कि यह मांसतत्व के वर्ग का एक पदार्थ है, किन्तु अभी तक इसे शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं किया गया है।

पदि केवल ग्रैवेयक ग्रन्थि शरीरसे छुट्क कर दी जाय और परिग्रैवेयक ग्रन्थि को रहने दिया जाय तो केवल शैथिलिक शोथ के सात्मीकरणसम्बन्धी लक्षण

उत्पन्न होते हैं और नाडीसंस्थान के छवण, पेशियों में स्तम्भ आदि नहीं मिलते और रोगी मरता भी नहीं ।

पीयूषग्रन्थि (Pineal gland)

यह ग्रन्थि मस्तिष्क-मूलपिण्ड के पीछे रहती है । यह छोटी, गोलाकार तथा गुलाबी रंग की होती है । यह भावरक कोषाणुओं से बनी है जो नलिकाओं और कोषों के रूप में व्यवस्थित हैं और जिनके बीच-बीच में नाड़ी कोषाणु भी होते हैं । इसमें रक्तवाहिनियों तथा नाड़ियों की बहुलता होती है तथा इसमें बहुत से छोटे छोटे बाल के समान कटिकीय द्रव्य पाये जाते हैं जिन्हें 'मस्तिष्कसंक्रता' (Brain sand) कहते हैं । इस ग्रन्थि में एक अवसादक तत्व होता है ।

यह यौनग्रन्थियों से सम्बन्धित होता है और उनके प्राक्कालिक विकास को रोकता है । इस ग्रन्थि की वृद्धि होने से यौन अङ्गों का समय से पूर्व ही विकास हो जाता है, शरीर बढ़ जाता है, बाल बढ़ जाते हैं और विविध मानसिक भावों का उदय हो जाता है ।

पुत्रावस्था के बाद ग्रन्थि में चयापचय परिवर्तन होते हैं और अन्त में ग्रन्थि केवल सौत्रिक तन्तु का समूह रह जाता है ।

बालप्रैवेयक (Thymus)

यह ग्रन्थि बाल्यावस्था में उरःकण्ठ के पीछे और महाधमनी के धोरणांश के ऊपर रहा करती है । इसका शिखर गले में श्वास नलिका के सामने कुछ दूर तक फैला हुआ है । जन्म के समय इसका भार लगभग ३ औंस होता है, किन्तु धीरे-धीरे यह आकार और भार में बढ़ती जाती है और दो वर्ष की आयु में यह पूर्ण विकसित हो जाती है, किन्तु पुत्रावस्था के प्रारम्भ में यह धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है और पूरी जवानी में इसका कोई चिह्न अवशिष्ट नहीं रहता ।

यह लसीका घातु से बनी है जो कोषों के रूप में व्यवस्थित है । ये कोष परस्पर सौत्रिकतन्तु से सम्बद्ध रहते हैं । प्रत्येक कोष बहिर्वस्तु और अन्तर्वस्तु इन दो भागों में विभक्त रहता है । अन्य लसीका घातु के समान इसमें भी लसीका कोषाणु होते हैं जो बालप्रैवेयक कोषाणु (Thymocyte) कहलाते

हैं। ये कोषाणु बहिर्वस्तु में अधिक पाये जाते हैं और इनके अतिरिक्त यहाँ कुछ कणयुक्त कोषाणु भी होते हैं। अन्तर्वस्तु में आवरक कोषाणुओं के कुछ समूह होते हैं।

कार्य

(१) लसीका धातु से संवर्धित होने के कारण यह स्वेत कणों के निर्माण में भाग लेती है।

(२) स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में प्रजनन यन्त्रों की पृष्टि के साथ इसका छाप हो जाता है। बाल्यावस्था में निरण्ड किये हुये मनुष्य और पशु में यह ग्रन्थि यावज्जीवन रहा करती है। यह भी देखा गया है कि यदि यह ग्रन्थि बाल्यावस्था में ही निकाल दी जाय तो उसी समय यौवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अतः इस ग्रन्थि का कार्य जब तक शरीर सुदृढ न हो जाय तब तक यौवनोच्चित प्रजनन यन्त्रों की पृष्टि को रोक रखना है। यह भी समझा जाता है कि स्वभावतः परिपक्व प्रजनन यन्त्रों से उत्पन्न अन्तःस्राव ही इस ग्रन्थि को युवावस्था में क्षीण करने लगता है।

(३) इसका अन्तःस्राव स्त्रिफ के सार्वभौमिकरण में भी योग देता है क्योंकि यहाँ में यह ग्रन्थि निकाल देने से स्त्रिफ का उत्सर्ग अधिक होने लगता है और अस्थिवृद्धता उत्पन्न हो जाती है। यह बालक शिथिल और मन्द हो जाता है तथा पेशियों में आर्चेप भी आने लगते हैं। विद्वानों का मत है कि ग्रन्थि का यह प्रभाव उसमें विद्यमान ग्लुटाथियोन (Glutathione) नामक पदार्थ के कारण होता है।

जीवनीय द्रव्य धी० की कमी के कारण भी बच्चों में इस ग्रन्थि का क्षय देखा जाता है। कहीं कहीं पर युवावस्था में भी इसका क्षय न होकर इसकी वृद्धि होने लगती है। इन अवस्थाओं में शरीर की पेशियाँ दुर्बल और शिथिल हो जाती हैं और हृदय भी दुर्बल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति स्वस्थारण, क्षत या संक्रमण से ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। सन्तानाशक औषधों का भी प्रभाव इन पर बहुत बुरा होता है। थोड़ा ईधर या छोरोफार्म देने पर ही रोगी में आर्चेप आने लगते हैं और वह मर जाता है।

प्लीहा

यह शरीर में सबसे बड़ी निःस्रोत ग्रन्थि है । इसका शरीर संयोजक तन्तु तथा स्वतन्त्र पेशियों से बना है, जिनके भीतर प्लैहिक वस्तु भी रहती है । प्लैहिक वस्तु सूक्ष्म सौत्रिक जालों की बनी होती है जिसके भीतर बड़े बड़े प्लैहिक कोषाण, अनेक केन्द्रक सहित बृहत् कोषाण तथा जालक बनाने वाले जालककोषाण रहते हैं । इनके अतिरिक्त, उसीका कोषाण तथा रक्तकण भी मिलते हैं । प्लैहिक कोषाणों में रक्तकण के विघटन की अनेक अवस्थाएँ देखी जाती हैं । ये कोषाण जालक कोषाणों के साथ रक्तनियमिक सन्धान के अगमूत हैं । प्लीहा बाहर की ओर सौत्रिक तथा पेशीतन्तु से बने हुये कोष से ढँका है ।

जिस प्रकार उसीका साक्षात् रूप से उसीका ग्रन्थियों में बहती हुई धातुओं के सम्पर्क में आती है उसी प्रकार प्लीहा में रक्त प्लैहिक कोषाणों के साक्षात् सम्पर्क में आता है क्योंकि यहाँ पर केशिकाओं का मुख खुला रहता है । प्लैहिक सिरायें धमनियों की अपेक्षा बड़ी होती हैं और उनका प्रारम्भ इन्हीं खुले स्थानों से होता है, अतः रक्तप्रवाह में कुछ उसीकाकरण भी चले जाते हैं । सूक्ष्म प्लैहिक धमनियों के द्वारा आवाण पर उसीका धातु की छोटी छोटी ग्रन्थियाँ पाई जाती हैं ।

कार्य

(१) गर्भ की प्रारम्भिक अवस्था में यह रक्तकणों तथा श्वेतकणों (विशेषतः बृहत् एक केन्द्री कणों) का निर्माण करता है, किन्तु बाद में जब मज्जा के द्वारा यह कार्य होने लगता है तब यह मुख्यतः एक कोष के रूप में रहता है जहाँ रक्तकण सञ्चित होते हैं और यहाँ से रक्तसंवहन में जाते हैं ।

(२) यहाँ रक्तकणों का विघटन भी होता है, इसलिए 'प्लैहिक वस्तु में लौह की मात्रा अधिक मिलती है, किन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ रक्तकणों का विघटन नहीं होता, केवल अन्य स्थानों से प्राप्त लौह का यहाँ भ्रूयुक्त होता है, क्योंकि प्लैहिक सिरायें शुद्ध रक्तजल द्रव्य अधिक परिमाण में नहीं मिलता ।

(३) यह नवजन के सात्विकरण में, विशेषतः यूरिक अम्ल के निर्माण में योग देता है, क्योंकि यहाँ केन्द्रक परिवर्तक किण्वसत्त्व अधिक मात्रा में होता है जो केन्द्रकाल का विश्लेषण करता है ।

(४) यह पित्तरक्तकों का निर्माण करता है । रक्तकण शरीर में निरन्तर नष्ट होते रहते हैं और इस प्रकार अन्मुख रक्तरक्षक प्लीहा में आकर निस्यन्दित होते हैं तथा पित्तरक्तकों में परिणत हो जाते हैं । इनका स्रसर्ग यकृत के द्वारा होता है ।

(५) यह पाचननलिका विशेषतः आमाशय की रक्तवाहिनियों के कोप का कार्य करती है क्योंकि यह भोजन के पाचनकाल में आकार में छोटी हो जाती है । इसका कारण प्लीहा में स्पतन्त्र पेशियों की उपस्थिति है जिससे वह सङ्कुचित होकर रक्त को बाहर भेज देती है । प्लीहा का सङ्कोच नियमित रूप से भी होता रहता है ।

(६) इससे एक अन्तःस्राव निकलता है जो आमाशयिक ग्रन्थियों को उत्तेजित करता है ।

(७) यह रक्तनिस्यन्दक के रूप में भी कार्य करता है जिससे रक्त में प्रविष्ट जीवाणु छन कर यहाँ पृथक् हो जाते हैं और श्वेतकणों द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं ।

यौन ग्रन्थियाँ (Glands)

पुरुष और स्त्री यौन ग्रन्थियों (वृषणग्रन्थि और बीजकोप) का भी अन्तर्भाव अन्तःस्राव ग्रन्थियों में किया गया है, क्योंकि उनसे दो प्रकार का स्राव होता है, एक बाह्य और दूसरा अन्तः । बाह्य 'घ्राव' शुक्र और रज हैं जिनसे सन्तानोत्पत्ति का कार्य होता है । अन्तःस्राव सीधे रक्तप्रवाह में प्रविष्ट होते हैं और इनसे अन्य यौन भावों का विकास होता है ।

अन्य अन्तःस्राव ग्रन्थियों से इनमें अन्तर यही है कि इनकी क्रियाएं धक्कत कालनियत होती हैं और इनके अन्तःस्राव यौन क्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं में स्वरूप एवं मात्रा में भिन्न होते हैं ।

वृषणग्रन्थि

इससे 'प्राविनन' (Proviron) नामक अन्तःस्राव उत्पन्न होता है जो बाह्य पुंसव्यञ्जक चिह्नों के प्रादुर्भाव का कारणमूल माना गया है । यह अन्तःस्राव शुक्रजनक धातु से उत्पन्न न होकर उनके मध्यवर्ती धातु से निकलता है । वृषण ग्रन्थियों के सहज विकारों तथा बाह्यवातस्या में ही निरुद्ध किये हुये व्यक्तियों में

पुंस्त्वव्यञ्जक चिह्न विकसित नहीं होते; दाढ़ी, मूँछ नहीं निकलती, स्वरयन्त्र छोटा रह जाता है और मेद का सञ्चय होने लगता है जिसे निरपेक्षमेदस्वित्ता (Castration obesity) कहते हैं। इसके अतिरिक्त अस्थियों के प्रान्तभागों का मात्रों से संयोग विलम्ब से होता है जिससे शरीर की लम्बाई बहुत अधिक हो जाती है।

वृषणग्रन्थि के स्तब्धों को युद्ध व्यक्तियों में प्रविष्ट कर उनके प्रभाव का अध्ययन किया गया है। युद्ध व्यक्तियों में चिमपैन्जी की वृषणग्रन्थि के अंश को प्रस्थापित करने से उनमें पुनर्यौवन के चिह्न उत्पन्न हुये हैं। इसी प्रकार के परिणाम शुक्राहिनी को बाँध देने से भी हुये हैं जिसका कारण शुक्रजनक धातु का लय तथा तदन्तर्वर्ती धातु की वृद्धि घटलाया जाता है।

बीजकोप

बीजकोप या बीजग्रन्थि से मासिक रजःस्राव-चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में तीन भिन्न-भिन्न अन्तःस्राव उत्पन्न होते हैं:—

(१) गर्भापादक (Oestrin)—यह बीजकोप से मासिक तार के एक सप्ताह पूर्व उत्पन्न होता है। इससे स्तन्य ग्रन्थियों की स्वल्प तात्कालिक वृद्धि हो जाती है तथा गर्भाशय में भी परिवर्तन होने लगते हैं। यह गर्भाधान में सहायक होता है, अतः बन्ध्या रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्त्रीत्वव्यञ्जक अन्य याह्य चिह्नों के विकास में भी कारण होता है। स्तन्यग्रन्थियों के विकास पर नियन्त्रण रखता है। यह केवल बीजकोप में ही नहीं पाया जाता, बल्कि गर्भिणी स्त्रियों के मूत्र में (Oestrone or Theelin) तथा अपरा में (Oestriol or Theelol) भी अधिक परिमाण में पाया जाता है।

(२) गर्भधारक (Progesterin or Corpus luteum hormone)—यह बीजकिणपुट से उत्पन्न होता है। यह बीजकोप के स्राव को रोक कर गर्भाधान में सहायक होता है तथा गर्भकला के विकास में सहायता प्रदान कर एवं गर्भाशय की, श्लेष्मलकला में स्त्री बीज को स्थिर कर गर्भधारण में सहयोग देता है। यह देखा गया है कि यदि गर्भावस्था में बीजकिणपुट को हटा दिया जाय तो गर्भपात हो जायगा। अतः इसका प्रयोग चिकित्सा में भी

हैं। दोनों पक्षों के सन्धि कोण के ऊर्ध्व भाग में अधिजिह्विका-मूल से मिलने के लिए त्रिकोण खात है। इसकी ऊर्ध्वधारा स्नायुबलामयी स्नायुघटिका के द्वारा कण्ठिकास्थि से मिलती है। इसकी अधोधारा इसी प्रकार की स्नायु के द्वारा कृकाटक नाम की तरणास्थि से मिलती है।

प्रत्येक पक्ष के बाह्यदृष्ट में तीन पेशियाँ लगती हैं, उरोऽवटुका, अवटुकण्डिका और कण्ठसंकोचनी अधरा। दोनों पक्षों के भीतर पाँच रचनायें लगी हुई हैं। यथा मध्य में स्नायु बन्धनियों से युक्त अधिजिह्विका, दोनों ओर अर्गल की माँति सामने से पीछे की ओर बँधी हुई दो मुख्य स्वरतन्त्री और दो गौण स्वरतन्त्री। यहाँ पर एक एक ओर तीन तीन पेशियाँ हैं—अवटुघाटिका, अवटुगोजिह्विका और अनुतन्त्रिका।

कृकाटक (Cricoid Cartilage)

यह स्वरयन्त्र के नीचे की अवयवभूत तरणास्थि है और इसका आकार अंगूठी के समान होता है। इसके दो भाग हैं—सामुख भाग पतला और गोल है तथा पश्चिम भाग स्तूल और चौड़ा है। सामुख भाग में ऊपर की ओर अवटुक की अधोधारा और नीचे की ओर आसनलिका की ऊर्ध्वधारा बला के द्वारा जुड़ी हुई है। पश्चिम भाग ढेड़ अंगुल चौड़ा है और इसके पीछे मध्यरेखा में अन्ननलिका का सामुख भाग बँधा है। इसके दोनों ओर कृकाटघाटिका पश्चिमा नाम की पेशी है और इसके बाहर के दोनों स्थालक अवटुपत्र के अधःशृंगों से मिले हैं। इसकी ऊर्ध्वधारा में घाटिका नामक दो तरणास्थियाँ बँधती हैं।

घाटिका (Arytenoid cartilages)

ये त्रिकोणाकार युग्म तरणास्थियाँ कृकाटिका के पश्चिमार्ध शिखर में बँधी हुई हैं। इनकी दोनों चूड़ायें आगे से अकुस की माँति फैली है। प्रत्येक अंकुश के पीछे दो स्वरतन्त्री जुड़ती है जिनमें एक मुख्य है और दूसरी गौण। दोनों को सन्यूहन करने वाली एक ही पेशी दोनों चूड़ाओं के मूल में पीछे की ओर अनुप्रस्थ दिशा में स्थित है जिसका नाम घाटान्तरीया है। दूसरी पेशी स्वस्तिकाकार मांससूत्रों द्वारा दोनों का पीछे से सन्यूहन करती है जिसका नाम स्वस्तिक घाटान्तरीया है। प्रत्येक घाटिका के पीछे दोनों ओर दो पेशी हैं—कृकाटकघाटिका पश्चिमा और पार्श्वजा।

कोणिका (Cuneiform) और कर्णिका (Corniculate)

ये दो पतली तरुणास्थियाँ घाटिकाओं की दोनों चूड़ाओं को मिलाने वाली स्नायुसूत्रिका के भीतर उसको दृढ़ बनाने के लिए रहती हैं। इनमें प्रथम दोनों छोटी, आगे से वर्तुल और वक्रदण्ड के आकार की होती हैं तथा पार्श्व में रहती हैं। अन्तिम दोनों छोटे पुष्प के मुकुल के समान हैं और मध्यरेखा के दोनों ओर रहती हैं। इनको धारण करने वाली स्नायुसूत्रिका अर्धचन्द्राकार होकर अधिजिह्विका के पार्श्वों में मिळती है।

तरुणास्थिसंघात से थने हुये स्वरयन्त्र के भीतर की गुहा का नाम स्वरयन्त्रोदर है। इसकी अन्तः परिधि पतली श्लेष्मलकला द्वारा सर्वत्र आवृत है। इसका ऊर्ध्वद्वार गलविल से मिला है, यह ऊर्ध्वमुखी अधिजिह्विका द्वारा सदा सुरक्षित रहता है। यह अन्न आदि के निगलने के समय स्वयमेव स्वरतन्त्र को पूर्णरूप से धन्द कर लेती है। स्वरतन्त्र का अधोद्वार घासनलिका से मिला है।

स्वरतन्त्री (Vocal Cords)

चार स्वरतन्त्रियाँ या स्वररज्जु स्वरयन्त्र के भीतर सामने से पीछे की ओर फैली हैं। ये शरीरी आवरण तन्तु से आवृत सौत्रिक रचना है जिसमें अनेक स्थितिस्थापक सूत्र भी होते हैं। देखने में ये उम्ली तथा चमकीली मालूम होती हैं। इनमें ऊपर की दोनों तन्त्रियाँ गौण तथा नीचे की दोनों मुख्य कहलाती हैं। इन चारों का संयोग सामने की ओर अवदुशिखर में स्थित कोण में और पीछे घाटिकाओं के दोनों अंशुवत् शिखरों के पृष्ठदेश में ऊर्ध्व और अधः क्रम से होता है। इनके बीच के त्रिकोण अवकाश का नाम तन्त्रोद्वार (Glottis) है।

तन्त्रियों के विकास और मुद्रण धर्मोंत् गुलने और धन्द होने से नाना प्रकार के विचित्र स्वर उत्पन्न होते हैं। विकास और मुद्रण घाटिकास्थियों के आकर्षण और अपकर्षण से पेशियों द्वारा होते हैं।

पेशियाँ

इन पेशियों का नाम स्वरतन्त्री पेशियाँ हैं। ये संख्या में ८ होती हैं। यथा—

अवदुघाटिका	२
अवदुकृकाटिका	२
अवदुगोजिह्विका	२
अनुतन्त्रिका	२

८

इनकी सहायता करने वाली आसमायंद्वारिणी नाम की नौ पेशियाँ हैं:—

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| १. कृकाटकघाटिका पश्चिमा | २. कृकाटकघाटिका पार्श्वजा |
| ३. स्वस्तिकघाटिका | ४. गोजिह्वाघाटिका |
| ५. घाटान्तरीया | ६. कृकाटकघाटिका पश्चिमा |
| ७. कृकाटकघाटिका पश्चिमा | ८. स्वस्तिकघाटिका |
| ९. गोजिह्वाघाटिका | |

पेशियों के कार्य

स्वरतन्त्रियों का आकर्षण और विकर्षण तथा तन्त्रीद्वार का विकास और मुद्रण इन पेशियों का कार्य है।

आकर्षण विकर्षण करने वाली छः पेशियाँ हैं। यथा—

अवदुकृकाटिका	२
अवदुघाटिका	२
अनुतन्त्रिका	२
	<hr/>
	६

तन्त्री द्वार के विकास और मुद्रण के लिए शेष ११ पेशियाँ हैं।

नादियाँ

प्राणदा नाड़ी की दो शाखायें इसमें आती हैं:—

- (१) स्वरयन्त्रारोहिणी
- (२) उत्तररवरिणी

प्राणदा नाड़ी के क्रियाघात से स्वरतन्त्रियाँ निरचेष्ट हो जाती हैं और स्वर भारी या बिलकुल नष्ट हो जाता है। द्वितीय नाड़ी के आघात से स्वरतन्त्रियों का आकर्षण नहीं हो पाता जिससे स्वर भारी हो जाता है और उच्च स्वर नहीं निकल पाते।

इसका केन्द्र सुषुम्नाशीर्षक में है। इसको उत्तेजित करने से स्वरतन्त्रियाँ विकर्षित हो जाती हैं। इस केन्द्र का नियन्त्रण मस्तिष्क के बाह्य भाग में स्थित कर्णिका (Broca's convolution) से होता है। केन्द्र को उत्तेजित

करने से तंत्रियों का विकर्षण होता है तथा उसके नष्ट हो जाने पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता ।

स्वरतन्त्री की गतियाँ

श्वसनकाल में—सामान्य श्वसन के समय तन्त्री द्वारा खुला रहता है और चौड़ा तथा त्रिकोणाकार होता है । उसमें भी प्रधासकाल में कुछ अधिक चौड़ा तथा निःश्वासकाल में कुछ संकीर्ण हो जाता है । दीर्घ प्रधास के समय यह अत्यन्त विस्तृत और चतुष्कोणाकार हो जाता है ।

वाक्काल में :—बोलने के समय तन्त्रियाँ आकर्षित होकर परस्पर सन्निकट आ जाती हैं और उनका द्वार अत्यन्त संकीर्ण हो जाता है । जितना ही स्वर उच्च होता है उतना ही तंत्रियों में आकर्षण अधिक होता है और द्वार भी उतना ही संकीर्ण हो जाता है ।



स्वरतन्त्र की वृद्धि के साथ साथ स्वरतन्त्रियाँ भी लम्बाई में बढ़ती हैं और युवावस्था में स्वरतन्त्र बढ़ा हो जाता है । स्वरतन्त्रियों लियों की अपेक्षा पुरुषों में लम्बी होती हैं ।

वाक् का विकास (Formation of speech)

वाक् या शब्द भावों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है । यह निम्नांकित तीन क्रियाओं पर निर्भर होता है :—

(१) ग्रहणारम्भक क्रिया (Receptor mechanism) :—इसमें सभी प्रकार की संज्ञाओं का अन्तर्भाव होता है, यद्यपि विशेष उपयोग दर्शन और श्रवण का इसके विकास में होता है । इन संज्ञाओं के बाह्यमस्तिष्क-स्थित केन्द्रों के सन्निकट

चित्र ५१-विभिन्न अवस्थाओं संयोजन केन्द्र होते हैं जहाँ इनकी स्मृति सञ्चित में स्वरतन्त्र की स्थिति रहती है तथा द्वितीय और तृतीय शरीर मस्तिष्क क-गाने के समय । ख-सामान्य पिण्ड में वस्तुओं के नाम सञ्चित रहते हैं और उस श्वसन में । ग-दीर्घश्वसन में । भाग के विकार में ये नष्ट हो जाते हैं ।

(२) सयोजनात्मक क्रिया (Association mechanism) :—संज्ञाओं को अभिव्यञ्जना-केंद्रों तक पहुँचाने के लिए बीच में सयोजक केंद्र होते हैं। ग्रीष्म का वाक्केंद्र भी एक सयोजन केंद्र है जो वाक्चालक क्रिया के अत्यन्त निकट संपर्क में रहता है।

(३) चालनात्मक क्रिया (Effector mechanism) :—सयोजन केंद्र से यह संज्ञा उपयुक्त चालक रयान तक पहुँचती है जो वाक्पत्रों से सम्बन्धित होता है। अवस्थानुसार इसमें भेद हो सकता है क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति में सिर हिलाना या मुख पर अंगुली रखना आदि संकेतों का कभी कभी शब्द से अधिक महत्व होता है।

विद्वानों का यह मत है कि शब्द के बिना हम अधिक दूर तक सोच भी नहीं सकते क्योंकि शब्द के सहारे ही प्राणी की मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। अतः वाक्पत्र में कहीं पर आघात लगने से मानसिक शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि दृष्टिकेंद्र को वाक्पत्रचालक केंद्र से मिलाने वाले सयोजकसूत्रों में विकृति हो जाय तो वह व्यक्ति शब्दान्ध (Word blind) हो जायगा अर्थात् वह किसी लिखित अक्षर को जोर से पढ़ नहीं सकेगा यद्यपि वह मौखिक प्रश्नों का उत्तर ठीक-ठीक दे सकेगा।

वाक् की उत्पत्ति (Voice Production)

निःश्वसित वायु के वेग से स्वरतन्त्रियों का जड़ कंपन होता है तब शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ शब्द एक ही प्रकार का उत्पन्न होता है किन्तु आगे चल कर तालु, जिह्वा, दन्त और ओष्ठ आदि अवयवों के सम्पर्क से उसमें परिवर्तन आ जाता है।

वाक् का स्वरूप

स्वरतन्त्रियों के कंपन से उत्पन्न वाक् का स्वरूप निम्नाङ्कित तीन बातों पर निर्भर होता है :—

(१) तीव्रता (Loudness) :—यह कंपनतरङ्गों की उच्चता के अनुसार होती है। तरङ्गों की जितनी ऊँचाई होगी, शब्द भी उतना ही तीव्र होगा। यह तीव्रता निम्नाङ्कित कारणों पर निर्भर है :—

(क) स्वरयन्त्र का आकार

- (ख) स्वरतन्त्रियों की कम्पनतरङ्गों की ऊँचाई
 (ग) स्वरतन्त्रियों पर प्रभाव डालने वाली वायु की शक्ति और आयतन
 (२) गम्भीरता (Pitch)—यह कम्पनतरङ्गों की संख्या के अनुसार होती है और स्वरतन्त्री की लम्बाई और आकर्षण पर निर्भर है । स्वरतन्त्री की जितनी लम्बाई होगी तथा जितना खिंचाव होगा, स्वर भी उतना ही गम्भीर होगा । पुरुषों में स्वरतन्त्री अधिक लम्बी होती है, अतः उनका स्वर गम्भीर होता है ।
 (३) स्वरूप (Quality)—यह गुणवत्शील अवकाशों के आकार के अनुसार बदलता रहता है और कम्पनतरङ्गों के स्वरूप पर निर्भर होता है । स्वरतन्त्रियों में फनी अतिरिक्त कम्पन या कम्पन में भी अतिरिक्त तरङ्ग की उपस्थिति होती है । इनसे स्वर के स्वरूप में अन्तर आ जाता है । इसी के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बोली में अन्तर मालूम पड़ता है अथवा एक वाद्य से दूसरे वाद्य के स्वर की पहचान की जाती है ।

शब्द (Speech)

स्वरमन्त्र में उत्पन्न कम्पनतरङ्गों के मुखविवर में आने पर तत्रस्थ अवयवों के द्वारा उसमें जो परिवर्तन होता है उसीसे शब्द का अन्तिम रूप निष्पन्न होता है । यही नहीं, उन्हीं परिवर्तनों के अनुसार शब्द के वर्णों की विभिन्न वर्णों में विभक्त किया गया है ।

कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वरमन्त्रद्वारा सङ्कोच रहता है और कुछ के उच्चारण में प्रसारित रहता है । श्वास की प्रसक्ति अवस्था में श्वसनवायु बाहर निकलती है, तब उसे 'श्वास' कहते हैं और जब द्वार सङ्कुचित रहता है तब श्वसनवायु के द्वारा स्वरतन्त्रियों का कम्पन होने से शब्द उत्पन्न होता है, इसे 'माद' कहते हैं । श्वास कठिन व्यञ्जन वर्णों का उपादान कारण है तथा माद कोमल व्यञ्जनों तथा स्वरवर्णों का उपादान कारण है । जब माद बाहर निकलता है और उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं होती तब स्वरों का उच्चारण होता है और जब श्वास और माद दोनों में मुख के विभिन्न अवयवों से बाधा उत्पन्न होती है तब व्यञ्जनवर्णों का उच्चारण होता है । इसीलिए व्यञ्जनवर्णों का बिना स्वर की सहायता के स्वतः उच्चारण नहीं हो सकता । जब मुख के अवयव पृथक् हो जाते हैं और किसी स्वर के स्थान से वायु बाहर निकलती है तब उनका उच्चारण होता है ।

जब नाद वृत्ताकार ओष्ठों से होकर बाहर निकलता है, तब 'व' का उच्चारण होता है और जब अधरोष्ठ कुछ आगे बढ़ जाता है, तब 'ओ' हो जाता है। जब दोनों ओष्ठ पूर्णतया परस्पर मिले हों और श्वासवायु के मार्ग में बाधा हो, तो 'य' होता है और वायु का वेग अधिक होने से 'भ' हो जाता है और जब वायु का कुछ अंश नासा में प्रविष्ट हो जाता है तब 'म' का उच्चारण होता है। 'य' और 'भ' के उच्चारणकाल में जो स्थिति नाद की होती है वही स्थिति यदि श्वास की हो तो ण और ण का उच्चारण होता है। जब जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दाँतों के मूलभाग से पूर्णतः मिल जाता है और इससे श्वास और नाद दोनों में अवरोध हो जाता है तब 'त थ द ध न' का उच्चारण होता है। दाँतों के सम्पर्क से उत्पन्न होने के कारण ये दन्त्य कहलाते हैं। जब जिह्वा का सम्पर्क और ऊपर मूर्धा से होता है और जिह्वा का पूर्वोक्त कुछ ऊपर की ओर मुड़ जाता है तब 'ट ठ ड ढ ण' का उच्चारण होता है। इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जब जिह्वा का मध्यभाग तालु के निकट पहुँच जाता है और नाद उनके बीच से होकर निकलता है तब 'इ' का उच्चारण होता है और जब जिह्वा थोड़ी अलग हो जाती तथा मुँह अधिक खुल जाता है तब 'ए' का उच्चारण होता है। जब तालु से पूर्ण सम्पर्क हो जाता है तब श्वास और नाद दोनों के द्वारा 'च छ ज झ ञ' की उत्पत्ति होती है। इन्हें तालव्य कहते हैं। जब जिह्वामूल तालु के निम्न भाग का स्पर्श करता है तब कण्ठ से 'क ख ग घ ङ' का उच्चारण होता है। इन्हें कण्ठ्य कहते हैं। मुख की स्वभाविक स्थिति में जब ओष्ठ खुले हों और उनसे नादवायु बाहर निकले तो 'अ' तथा अधिक वेग से ह की उत्पत्ति होती है। श्र और ल के उच्चारण में मुख का समस्त निम्न भाग ऊर्ध्व भाग से मिल जाता है। शा के उच्चारण में, इसके विपरीत, दोनों भाग अलग हो जाते हैं। व का उच्चारण दाँतों और ओष्ठों के निकट सम्पर्क में आने से होता है। य का उच्चारण ह के समान ही होता है, केवल जिह्वा और तालु का सम्पर्क अधिक होता है। ल का दाँतों के कुछ ऊपर तथा र का मूर्धा के कुछ नीचे स्थान है। श प स का उच्चारण जिह्वा के मध्यभाग तथा तालु, मूर्धा एवं दन्त के बीच से श्वासवायु के निकलने से होता है।

इस विषय का विस्तृत विवेचन भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में देखना चाहिये।



पोडरा अध्याय

नाडीसंस्थान

नाडीसंस्थान मुख्यतः नाडीकोषाणु तथा उनसे निकले हुये प्रवर्धनों से बना है। इसके दो भाग होते हैं:—

(१) मस्तिष्क-सौपुम्निक संस्थान (Cerebrospinal System)

(२) सांवेदनिक संस्थान (Sympathetic System)

मस्तिष्क-सौपुम्निक संस्थान में सुपुम्नाकाण्ड, मस्तिष्क और उनसे संबद्ध नाडियों तथा नाडीगण्डों का समावेश होता है। इसके भी पुनः दो विभाग किये गये हैं:—

(१) केन्द्रीय नाडीसंस्थान (Central Nervous System)
इसमें मस्तिष्क और सुपुम्ना आते हैं।

(२) प्रान्तीय नाडीसंस्थान (Peripheral nervous system)—
इसमें मस्तिष्कीय तथा सौपुम्निक नाडियों तथा उनके मार्ग में स्थित नाडी-गण्डों का समावेश होता है।

नाडी संस्थान का मुख्य कार्य शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को सहयोगिता के आधार पर नियन्त्रित और सञ्चालित करना है। शरीर में दो प्रकार की क्रियाएँ होती हैं—परिसरीय (Somatic) और आन्तरिक (Splanchnic)। परिसरीय क्रियाओं के द्वारा प्राणी वाद्य वातावरण के सम्पर्क में रहता है और उसके अनुकूल अपने को बनाये रखने में समर्थ होता है। यह कार्य खचा, पेशियों, सन्धियों और कण्डराओं में स्थित संज्ञावह प्रान्तभागों के द्वारा सम्पन्न होता है। इन क्रियाओं का नियमन मस्तिष्क सौपुम्निक संस्थान से होता है। आन्तरिक क्रिया में शरीर की जीवनीय क्रियाएँ यथा रक्तसंचलन, श्वसन, पाचन तथा मलौत्सर्ग से सम्बन्धित होती है। इन क्रियाओं का नियमन सांवेदनिक संस्थान से होता है।

केन्द्रीय नाडीमण्डल का निर्माण

मस्तिष्क और सुपुम्ना का निर्माण दो प्रकार की वस्तुओं से हुआ है जिन्हें शुभ्रवस्तु (White matter) और धूसर वस्तु (Grey matter) कहते हैं।

श्वेत वस्तु सुपुम्ना के बाहरी भाग में तथा मस्तिष्क के भीतरी भाग में रहती है। इसमें सूक्ष्म मेदस नाडीसूत्र होते हैं जिनके साथ साथ कुछ सामान्य संयोजक तन्तु भी होता है। धूसर वस्तु में नाडीकोषाणु होते

मस्तिष्क के बाह्य भाग तथा सुपुम्ना के आन्त्यन्तर भाग में रहती है।

सुपुम्नाकाण्ड (Spinal cord)

यह स्थूल कमलनाल क आकार का लम्बा और गोला सुपुम्नाशीपंक से प्रारम्भ होकर ३ करोड़ नलिका में रहता है। यह लगभग १८ इंच लम्बा है और इसकी चौल २३ तोला है। यह सामने और पीछे की ओर चपटा (सामने की ओर अधिक चपटा) होता है। यह ऊपर की ओर करोटि के महाविवर से निकल कर द्वितीय कटिक्शेरुका तक जाता है जहाँ यह कोणाकार प्रान्तभाग में समाप्त हो जाता है, इसे सुपुम्नामूलिका (Conus medullaris) कहते हैं। यहाँ से एक पतला सूत्रवत् भाग निकल कर अनुग्रिक तक जाता है जिसे मूलसूत्रिका (Filum Terminale) कहते हैं। यह २० सेण्टीमीटर लम्बा होता है और अनेक नाडी-गुच्छों से घिरा होने के कारण घोड़े की पूंज के समान दिखाई देता है। इसे तुरंगपुच्छिका (Cauda equina) कहते हैं। द्वितीय त्रिकशेरुका तक मूलसूत्रिका वराशिका (Dura mater) नामक सुपुम्नावरण के भीतर रहती है और उसके बाद अनुग्रिक तक आवरण रहित होकर अस्थि-वरण से लगी रहती है। ऊपरी भाग को उपरामूलसूत्रिका (Internal filum) और निचले भाग को अधरामूलसूत्रिका (external filum) कहते हैं।

घीरा तथा कटि प्रदेश में यह कुछ स्थूल हो जाता है। इसे क्रमशः अनु-ग्रीविका स्फीति (Cervical enlargement) तथा अनुकटिका स्फीति (Lumbar enlargement) कहते हैं। प्रथम स्फीति तृतीय ग्रैवेयक से द्वितीय वक्षीय कशेरुक तक तथा द्वितीय स्फीति ९ वीं वक्षीय कशेरुक से सुपुम्नामूलिका तक होती है।

गर्भावस्था में सुपुम्नाकाण्ड समस्त कशेरु नलिका में होता है, किन्तु क्रमशः नलिका की वृद्धि होने से वह ऊपर की ओर खिंच जाता है। इसके कारण उससे निकलने वाले नाडीसूत्रों की दिशा में अन्तर आजाता है। ग्रैवेयक प्रदेश में नाडीसूत्रों की दिशा अनुप्रस्थ होती है, किन्तु वक्षप्रदेश में तिर्यक् तथा त्रिकप्रदेश में नीचे की ओर हो जाती है। त्रिक प्रदेश में तुरंग पुच्छिका घटने का यही कारण है।

सुपुम्नाकाण्ड के आवरण

सुपुम्नाकाण्ड को चारों ओर से ढँकने वाले तीन आवरण होते हैं—बाह्य, मध्यम और आन्त्यन्तर। इन्हें क्रमशः वराशिका (Dura mater) नीसारिका

(Arachnoid) और चीनांशुक (Pia mater) कहते हैं । ये आवरण रिक्त स्थानों के द्वारा एक दूसरे से युक्त रहने हैं । पृष्ठवंश और वराशिका के बीच का अवकाश परिवराशिक (Epidural space) कहलाता है । इसमें सिराजाल और मेद भरा रहता है । इसी प्रकार वराशिका और नीशारिका के बीच का अवकाश अन्तर्वराशिक (Subdural Space) कहलाता है । इसमें लसीका भरी रहती है । नीशारिका और चीनांशुक के मध्य का अवकाश मज्जोदकुवय (Subarachnoid Cavity) कहलाता है जिसमें मज्जवारि (Cerebro-spinal Fluid) रहता है । इसी अवकाश के बीच में सुपुम्नाकाण्ड अवस्थित होती है । चीनांशुक पतला और सुपुम्नाकाण्ड से बिल्कुल सदा हुआ रहता है ।

बाह्य रचना

सुपुम्नाकाण्ड अग्रिमाम्तरा (Anteromedian) तथा पश्चिमाम्तरा (Posteromedian) नामक दो सीताओं के द्वारा दो पिण्डार्धों में विभक्त है । इनमें अग्रिमाम्तरा सीता अधिक गहरी और स्पष्ट होती है । ये दोनों पिण्डार्ध बीच में सेतुभाग से मिले रहते हैं । सेतुभाग आगे की ओर नादीसूत्रों तथा पीछे की ओर धूसर वस्तु से बना होता है (Anterior & Posterior or White & Grey Commissures) । प्रत्येक पिण्डार्ध दो लम्बी सीताओं, जिन्हे पार्वपश्चिमाम्तरा (Posterolateral) तथा पार्व अग्रिमाम्तरा (Anterolateral) कहते हैं, के द्वारा पूर्व, पश्चिम तथा पार्व तीन भागों में विभक्त होता है । पूर्व और पार्व भागों के बीच से सौपुम्निक नादियों के पूर्वमूल तथा पश्चिम और पार्व भागों के बीच से पश्चिम मूल निकलते हैं । ऊर्ध्ववक्षीय और अग्रवक्षीय प्रदेश में एक और दलकी सीता होती है जिसे पश्चिम-मुच्छान्तरिया (Postero-intermediate Fissure) कहते हैं । इसके द्वारा पश्चिम भाग बाह्य और आन्तर्यन्तर दो विभागों में बँट जाता है ।

आन्तर्यन्तर रचना

सुपुम्नाकाण्ड धूसर और शुद्धवस्तु से बना है । धूसर वस्तु भीतर की ओर दो अर्धचन्द्राकार भागों में व्यवस्थित है जो परस्पर शृंगसेतु के द्वारा मिले रहते हैं । उनमें मध्य में एक नलिका होती है जिसे मज्जामार्ग (Central canal) कहते हैं । इसमें मज्जवारि रहता है और यह बिन्निणी (Substantia gela-

tinosa centralis) नामक दूसर वस्तुमय भाग से आवृत रहता है। यह अर्ध मार्ग समस्त सुपुष्पाकाण्ड में व्याप्त है और ऊपर की ओर सुपुष्पाशीर्षक में स्थित प्राणमुहा में खुलता है।

अर्ध चन्द्राकार दूसर वस्तु के परस्पर मिलने से दो भागों की ओर तथा दो पीछे की ओर शृंगवत् भाग दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रमशः अग्रिम शृंग (*Anterior cornu or horns*) तथा पश्चिम शृंग (*Posterior horns*) कहते हैं। इन दोनों को मिलाने वाला दूसरवस्तु का भाग जो ब्रह्ममार्ग के पीछे की ओर होता है पश्चिम शृंग सेतु (*Posterior grey commissure*) तथा जो आगे की ओर होता है अग्रिम शृंगसेतु (*Anterior grey commissure*) कहलाता है। अग्रिम शृंगों को मिलाने वाला शुभ्रवस्तु का भाग 'सितसेतु' (*Anterior white commissure*) कहलाता है। इनमें अग्रिमशृंग विशेषकर चेष्टाबद् तथा पश्चिमशृंग सञ्ज्ञाबद् नादियों का उद्गम स्थान है।

शुभ्रवस्तु

यह शुभ्रवस्तु से परिष्कृत अनुलम्ब नादीसूत्रों से बना है। ये नादीसूत्र अनेक गुच्छों में विभक्त रहते हैं जिन्हें नादीतन्त्रिका (*Tracts or columns*) कहते हैं। सुपुष्पाकाण्ड के विभिन्न विभागों में निम्नोक्त नादीतन्त्रिकाएँ होती हैं:—

पूर्वभाग

१. सरला मुकुलतन्त्रिका (*Direct Pyramidal tract*)
२. विषाणिका तन्त्रिका (*Vestibulo-spinal tract*)
३. अग्रिम दीर्घगुच्छ (*Anterior ground bundle*)
४. अग्रिम आशाभिगा तन्त्रिका (*Anterior spinothalamic tract*)
५. सीतापारिका तन्त्रिका (*Sulcomarginal tract*)

पार्श्वभाग

६. कुटिला मुकुलतन्त्रिका (*Crossed Pyramidal tract*)
७. रुग्णजा तन्त्रिका (*Rubrospinal tract*)
८. पार्श्वपूर्वा तन्त्रिका (*Tectospinal tract*)
९. हवेली सौपुग्निकी तन्त्रिका (*Bundle of helweg*)

१०. पार्श्वान्तिका तन्त्रिका (Dorsal spino-cerebellar tract)
 ११. पार्श्वमध्या तन्त्रिका (Ventral spino-cerebellar tract)
 १२. आज्ञामिगा तन्त्रिका (Lateral spinothalamic tract)
 १३. पृष्ठपार्श्विकी तन्त्रिका (Dorsilateral tract)
 १४. पूर्वपार्श्विकी तन्त्रिका (Spinotectal tract)
 १५. पार्श्विक दीर्घगुच्छ (Lateral ground bundle)
- पश्चिम भाग
१६. पश्चिमपार्श्विकी तन्त्रिका (Column of Goll or Fasciculus gracilis)
 १७. पश्चिमान्तिका तन्त्रिका (Column of Burdach or Fasciculus cuneatus)
 १८. अक्षतन्त्रिका (Comma tract)
 १९. पटलाधारिका तन्त्रिका (Septomarginal bundle)
 २०. अनुवृत्त गुच्छ (Oval bundle)
 २१. पश्चिम दीर्घगुच्छ (Posterior ground bundle)

इन तन्त्रिकाओं को दिशा के अनुसार दो वर्गों में विभाजित किया गया है :—

(क) आरोही (Tracts of ascending degeneration)

(ख) अवरोही (Tracts of descending degeneration)

निम्नांकित तन्त्रिकाएँ अवरोही होती हैं :—

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| १. पश्चिमपार्श्विकी तन्त्रिका | २. पश्चिमान्तिका तन्त्रिका |
| ३. आज्ञामिगा तन्त्रिका (पूर्वा) | ४. आज्ञामिगा तन्त्रिका (पार्श्वीया) |
| ५. पूर्वपार्श्विकी तन्त्रिका | ६. अनुवृत्त गुच्छ |
| ७. पटलाधारिका तन्त्रिका | ८. पृष्ठपार्श्विकी तन्त्रिका |
| ९. पार्श्वान्तिका तन्त्रिका | १०. पार्श्वमध्या तन्त्रिका |

निम्नलिखित तन्त्रिकाएँ अवरोही होती हैं :—

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| १. सरला मुकुटतन्त्रिका | २. कुटिला मुकुटतन्त्रिका | ३. विपाणिका तन्त्रिका |
| ४. लवलीसीधुमिकतन्त्रिका | ५. क्षोणका तन्त्रिका | ६. पारवंपूर्वा तन्त्रिका |
| ७. अक्षतन्त्रिका | ८. पटलाधारिकातन्त्रिका | ९. अनुवृत्त गुच्छ |

निम्नांकित तालिका से सुपुष्पाकण्ड की नाड़ीतन्त्रिकाओं की स्थिति, उत्पत्ति तथा क्रियाओं का स्पष्ट परिचय मिलेगा :—

आरोही नाडीतन्त्रिकायें

नाम	स्थिति	व्युत्पत्ति	मार्ग और अन्त	कार्य
१. पश्चिमपाश्चिकी तन्त्रिका	पश्चिमान्तरा सीता के पार्श्व में	ग्रिफ, कटि तथा निम्न-यष्ट्रप्रदेश के पश्चिम मूलों के गण्ड-कोषाणुओं से	पहले सम्पूर्ण पश्चिम भाग में रहती है किन्तु ऊपर आने पर कुछ पार्श्व में हट जाती है। इसका अन्त सुपुम्नाशीर्षक की दयाकन्दिका (Nucleus gracilis) में होता है।	स्पर्शनिर्णय तथा पेसी-संज्ञाओं, पीड़ा तथा ताप की संज्ञाओं का शरीर के अधोभाग से मस्तिष्क तक पहुँचाना
२. पश्चिमान्तरिका तन्त्रिका	पश्चिमपाश्चिकी तन्त्रिका के याहुर की ओर	ऊर्ध्वचक्षु तथा ग्रैवेयक प्रदेश के पश्चिम मूलों के गण्डकोषाणुओं से	सुपुम्नाशीर्षक की कोण-कन्दिका (Nucleus cupreus) में समाप्त होती है।	शरीर के ऊपरी भाग से स्पर्शनिर्णय, पेसीसंज्ञा पीड़ा एवं ताप की संज्ञाओं का मस्तिष्क तक पहुँचाना
३. आज्ञाभिगा तन्त्रिकाएँ तथा सुपुष्पाकण्डिका तन्त्रिका	पार्श्वमध्य तन्त्रिका के भीतर की ओर	विपरीत पार्श्व के पश्चिम मध्य के कोषाणुओं से	ऊपर की ओर जाकर आज्ञारुन्द तथा कण्डिका-अनुष्ठान में समाप्त होती हैं।	विपरीत पार्श्व की रज्ज्वा से पीटा, शीत, उष्ण तथा स्पर्श संज्ञाओं का पहुँचाना

४. पारवर्तिका तन्त्रिका	कुटिला सुखल तन्त्रिका के बाहर की ओर प्रत्येक की वधीयमंदर में	उसी पारवर्त की कन्टिका से	अपरवर्तिका में प्रविष्ट होकर धम्मिष्ठक में समाप्त होती है ।	संज्ञारहित उच्छेदनाओं की स्वभा और पेशियों से धम्मिष्ठक तक ले जाना ।
५. पारवर्तिका तन्त्रिका	प्रत्येक तथा चण प्रदेश में पूर्व भाग की धारा के पास एक गुच्छ के रूप में	दोती पावों की एष्ट कन्टिका से	(क) कुछ सूत्र उत्तर- वृत्तिका में होकर उसी पारवर्त के धम्मिष्ठक में समाप्त होती हैं । (ख) कुछ सूत्र माध्य- वृत्तिका से होकर विपरीत पारवर्त के धम्मिष्ठक में समाप्त होती हैं ।	
६. दृष्टपात्रिका तन्त्रिका	पश्चिमशृङ्ग के अग्र भाग पर छोटे पृष्ठ गुच्छ के रूप में	पश्चिम मूलों के गण्ड कोषाणुओं से होकर शालाभा के रूप में	पश्चिम शृङ्ग के कोषाणुओं में समाप्त होती हैं ।	प्रत्येकवर्तिका किया
७. पटलाधारिका तन्त्रिका और अनुवृत्त गुच्छ	पश्चिमान्तरा सीला के निकट	सुषुम्ना के दूसरे पक्ष के कोषाणुओं से	सुषुम्ना काण्ड के दूसरे पक्ष के कोषाणुओं के चारों ओर (ऊर्ध्व या बाधःस्तर में)	सुषुम्ना काण्ड के विभिन्न स्तरों का संयोजन

अवरोही नाडीतन्त्रिकायें

नाम	स्थिति	व्युत्पत्ति	मार्ग और अन्त	कार्य
१. कुटिला सुकुल- तन्त्रिका	पश्चिम शृङ्ग के बाहर पार्श्वभाग में	(क) विपरीत पार्श्व के मस्तिष्क के चेष्टाक्षेत्र के सुकुल कोषाणुओं से। (ख) कुछ सूत्र उसी पार्श्व के सुकुल कोषा- णुओं से	पूर्व शृङ्ग के कोषाणुओं में	इन सूत्रों से ऊर्ध्व चेष्टा वह मार्ग बनता है जिससे रेस्पिरक चेष्टा के वेग पूर्व शृङ्ग के कोषाणुओं तक पहुँचते हैं।
२. सरला सुकुल- तन्त्रिका	पूर्व भाग में अग्रिमा तरा सीता के पार्श्व में	उसी पार्श्व के चेष्टावह सुकुल कोषाणुओं से	पूर्व शृङ्गसेतु के द्वारा पूर्व- शृङ्ग कोषाणुओं में पहुँच कर समाप्त।	"
३. विषाणिका तन्त्रिका	अग्रिमातरा सीता के पार्श्व में पूर्व तथा पार्श्वभाग के किनारे तक	हीटर की कन्दिका (Deiters nucleus) से।	पूर्व शृङ्गीय कोषाणुओं में	सौषुम्निक चेष्टावह कोषा- णुओं का रुम्बिकी कन्दिका से कार्यमूलक संयोजन तथा घनिष्ठक के माधी- यैनी को पूर्व शृङ्गीय कोषा- णुओं तक पहुँचाना।

तन्त्रिका	के सामने	वपरात पारय की उत्तकलायिका से	पूर्व श्रुतीय कोषाणुओं में	दृष्टिसम्बन्धी प्रत्यावर्तित क्रियाओं का चेष्टावहन।
५. शोणजातन्त्रिका	कुटिला मकुल-तन्त्रिका के आगे	विपरीत पारय के मध्य-मस्तिष्क की शोण-कन्दिका से	पूर्वश्रुतीय कोषाणुओं में	उसी पारय के धर्मिलुक तथा राखिलपिण्ड से पूर्व श्रुतीय कोषाणुओं तक चेष्टावेग का वहन
६. रवलीसौपुष्पिक तन्त्रिका	ग्रीवाप्रदेश के पारवभाग में त्रिकोणाकार	(क) अघरलवली कन्दिका के कोषाणुओं से (ख) सुषुम्ना के धूसर वस्तु के कोषाणुओं से	(क) छवली सूत्र नीचे की ओर आकर सुषुम्ना की धूसर वस्तु में समाप्त (ख) सौपुष्पिक सूत्र ऊपर जाकर छवलीकन्दिकाओं में समाप्त	सौपुष्पिक धर्मिलुक नावी-देगों के छिपु माध्यम सूत्र
७. अर्धुश-तन्त्रिका	पश्चिमपार्श्विकी तथा पश्चिमान्तिका तन्त्रिकाओं के बीच में अण्डाकार गुरुछ	सौपुष्पिक नावियों के पश्चिम मूलों के नावी-गण्डों से	नीचे की ओर उतर कर पश्चिम श्रुतीय कोषाणुओं में समाप्त	प्रत्यावर्तित क्रिया
८. पटलाधारिका तन्त्रिका तथा	पश्चिमान्तरासीता के निकट	सुषुम्ना की धूसर वस्तु के कोषाणु से	सुषुम्ना के धूसर वस्तु के कोषाणुओं से ऊपर या नीचे प्रदेश में	सुषुम्ना के विभिन्न खण्डों का संयोजन
९. अर्धुश-गुरुछ				

धूसर वस्तु

सुपुम्नाकाण्ड की धूसरवस्तु मुख्यतः नाड़ीकोषाणुओं तथा उनके अक्षतन्तुओं और दन्द्वाँ से बनी होती है। अधिकांश नाड़ीकोषाणु विभिन्न समूहों में व्यवस्थित होते हैं जिनमें निम्नोक्त मुख्य है :—

१. अग्रिमशृंग कोषाणु (Anterior horn cells)—ये पूर्व और पश्चिम दो समूहों में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें अग्रिमान्तरीय और पश्चिमाम्तरीय कहते हैं।

२. शृङ्खलिका (Dorsal nucleosorolark's column cells)—यह सप्तम प्रवेयक से द्वितीय कटिबद्धक के प्रदेश में पाई जाती है।

३. पार्श्विककोषाणु (Intermedio-lateral group)—ये कोषाणु अग्रिम शृंगकोषाणुओं की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं और पार्श्विक भाग की धूसरवस्तु में बाहर की ओर रहते हैं। ये समस्त वक्षप्रदेश तथा कुछ प्रवेयक प्रदेश में भी पाये जाते हैं।

४. मध्यदेशीय कोषाणु (Middle column cells)—ये धूसरवस्तु के मध्यभाग में रहते हैं।

५. पश्चिम-शृंग कोषाणु (Posterior horn cells)—ये विभिन्न आकार के कोषाणु समस्त पश्चिम शृंग में बिखरे हुये हैं।

६. संयोजक कोषाणु (Golgi type II cells)—ये पश्चिम शृंग की धूसरवस्तु में पाये जाते हैं और सुपुम्ना के विभिन्न भागों को मिलाने का कार्य करते हैं।

सौपुम्निक नाड़ियों

सुपुम्नाकाण्ड के अग्रिम और पश्चिम भाग से नाड़ीमूल निकटते हैं। ये ही सौपुम्निक नाड़ियों के मूलभाग हैं। पश्चिम नाड़ीमूल में प्रणि के समान फूला हुआ भाग होता है जिसे नाड़ीगण्ड (Ganglion) कहते हैं। इसके धागे जाकर अग्रिम और पश्चिम मूल परस्पर मिल जाते हैं जिससे सौपुम्निक नाड़ी बनती है। ये नाड़ियाँ कुल ३१ जोड़ी होती हैं। यथा मीवा में ८, शृष्ट में १२, कटि में ५, त्रिक में ५ और अनुत्रिक में १।

मज्जाचारि (Cerebro-spinal fluid)

यह सुपुम्ना के नीतारिका और चीनांशुक नामक आवरणों के मध्य अन्तःकाश में भर रहता है और सुपुम्नाकाण्ड को चारों ओर से घेरे रहता है। इसका स्नायु मस्तिष्क की गुहाओं में वहाँ की रक्तसहिनियों को ढँकने वाली आवरणकक्षा से होता है।

यह एक वर्ण-गन्धरहित पारदर्शक द्रव है । यह हल्का क्षारीय तथा इसका विशिष्ट गुरुत्व १.००७ (१.००६ से १.००९ तक) है । इसका रासायनिक संघटन इस प्रकार है :—

जल ९८.७ प्रतिशत
कोलेस्टरीन ०.२ „
खनिज लवण
(मुख्यतः सोडियम और पोटेशियम फ्लोराइड) १.० प्रतिशत
शर्करा ०.०५ से ०.०८ प्रतिशत तक
प्रोटीन और यूरिया ०.०२ प्रतिशत
उष्ण एसीफाणु

ब्रह्मवारी तथा रक्तमत्तु के रासायनिक ब्यपदानों का तुलनात्मक कोष्ठक

	रक्तमत्तु	ब्रह्मवारी
	मिलीग्राम प्रति १०० सी. सी.	मिलीग्राम प्रति १०० सी. सी.
प्रोटीन	६३००-८५००	१६-३८
सामिपाम्ल	४२-५	१.५-३
क्रियेटिनीन	०.७-१.०	०.४५-२.२०
यूरिक अम्ल	२.५-६.५	०.५-२.८
कोलेस्टरील	१००-१५०	अनुपस्थित
यूरिया	२०-४२	५-३२
शर्करा	७०-१२०	४५-८०
फ्लोराइड (सोडियम फ्लोराइड)	५६०-६२०	७२०-७५०
निरिन्द्रिय फास्फेट	२-५	१.२५-२.०
पाइसायनेट	४०-६०	४०-६०
उदजन अणु	७.३५-७.४०	७.३५-७.४०
सोडियम	३२५	३२५
पोटेशियम	२०	१५-१७
मैगनीशियम	१-३	३-३.५
क्लोरिक	९.०-११.५	४.०-७.०
दुग्धम्ल	१०-३२	४-२७

ब्रह्मवारि के कार्य

(१) यह मस्तिष्क और सुषुम्नाकाण्ड पर समान दबाव रखता है और उनकी कोमल रचनाओं की रक्षा करता है।

(२) यह नाड़ीतन्तु का पोषण करता है।

(३) यह करोटि के अन्तर्गत वस्तुओं का नियमन करता है अर्थात् जय रक्त का आयतन बढ़ जाता है तब इसकी मात्रा कम हो जाती तथा जय रक्त की मात्रा कम हो जाती है तब इसकी मात्रा बढ़ जाती है।

निर्माण

मञ्जरिका (Choroid plexus) का पृष्ठ अर्धप्रवेश्य कला का कार्य करता है और ब्रह्मवारि का निर्माण इसी के द्वारा प्रसरण की भौतिक प्रक्रिया से होता है। इसका व्यापन भार तथा उद्वजन अणुकेन्द्रीमवन रक्तमस्तु के समान ही हैं।

ब्रह्मवारि का दबाव लेटी हुई स्थिति में १०० से १५० मि० मी० (जलका) होता है तथा घैठने पर २५० मि० मी० तक हो जाता है। इसकी मात्रा युवावस्था में १०० से १५० सी० सी० होती है। गुहाओं में इसका सबहन होता है और इसका १/३ भाग मस्तिष्क में चला जाता तथा २/३ भाग सुषुम्नाकाण्ड में रहता है। स्वभावतः ब्रह्मवारि का सिरासरिताओं के रक्तप्रवाह में शोषण हो जाता है, किन्तु जब इसमें अल्यूमिन होता है तो इस शोषण में बाधा होती है जिससे द्रव संचित होने लगता है और उसका दबाव बढ़ जाता है। ऐसा मस्तिष्कावरणशोथ में होता है।


मस्तुलुंगपिण्ड (Brain)

मस्तुलुंगपिण्ड के तीन विभाग किये गये हैं:—

१. अग्रिम मस्तुलुंग (Fore-brain)—इसमें आज्ञाकन्द (Thalamus), राजिलपिण्ड (Corpus Striatum) तथा मस्तिष्क (Cerebrum) सम्मिलित हैं।

२. मध्यम मस्तुलुंग (Mid-brain)—इसमें कलायिका-चतुष्टय (Corpora Quadrigemina) तथा मस्तिष्क मृणालक (Cerebral peduncles) होते हैं।

मस्तुङ्ग-पिण्ड



चित्र ५२

३. पश्चिम मस्तुलंग (Hind brain)—इसमें सुपुन्नाशीर्षक (Medulla oblongata), उष्णीषक (Pons) तथा धम्मिलक (Cerebellum) आते हैं ।

चित्र ५२

पश्चिम मस्तुलंग

सुपुन्नाशीर्षक :—यह लगभग १ इंच लम्बा और मुकुटाकार है जो ऊपर की ओर अधिक चौड़ा होता है । अग्रिमन्तरा और पश्चिमन्तरा सीता के द्वारा सुपुन्नाकाण्ड के समान दो अर्धभागों में विभक्त है । प्रत्येक अर्धभाग पुनः दो सीताओं के द्वारा तीन विभागों में बँटा है । पूर्वभाग, जिसे मुकुलिका (Pyramid) कहते हैं, अग्रिमन्तरा और अग्रिमपार्श्वगा सीताओं के बीच में रहता है । पार्श्वभाग अग्रिमपार्श्वगा तथा पश्चितपार्श्वगा सीताओं के बीच में स्थित है जहाँ से कण्डरासनी, प्राग्दा तथा घोवाष्ट्रगा नादियों निकलती हैं । इसके ऊपरी भाग में एक अण्डाकार उठा हुआ भाग है जिसे लवणिका (Olivary body) कहते हैं । पश्चिम भाग ९ बी, १० बी तथा ११ बी शीर्षण्य नादियों के सूत्रों तथा पश्चिमन्तरा सीता के बीच में रहता है । यह सीता ऊपर की ओर दो में विभक्त होकर प्राणगुहा के अचराध की सीमा बनाती है । पश्चिम भाग के निचले हिस्से में पश्चिमाम्बिका और पश्चिमपार्थिकी नामक दो नाबी तन्त्रिकाएँ होती हैं जो ऊपर जाकर दो उत्सेधों में समाप्त हो जाती हैं । इन्हें क्रमशः दशाचूडिका (Clava) और कोणचूडिका (Coneate tubercle) कहते हैं । यह उत्सेध उसके भीतर रहने वाले भूसरवस्तुसमूह के कारण होते हैं जिन्हें क्रमशः दशाकन्दिका और कोणकन्दिका कहते हैं । यहाँ पर उपर्युक्त दोनों उत्सेधों के अतिरिक्त एक तृतीय उत्सेध होता है जिसे पोषक वृन्तिका (Tuberculum cinerium) कहते हैं । यहाँ पश्चिम शीर्षण्य नाड़ी के संज्ञाबह सूत्र समाप्त होते हैं । पश्चिम भाग का ऊपरी हिस्सा अधरवृन्तिका (Restiform body) बनाता है जो प्राणगुहा के तल तथा कण्डरासनी और प्राग्दा नादियों के मूलों के बीच में रहती है । आगे चल कर यह धम्मिलक में प्रविष्ट हो जाती है और उसकी अधरवृन्तिका बनाती है ।

शुभवस्तु

इसकी शुभवस्तु में निम्नलिखित नाड़ी तन्त्रिकायें पाई जाती हैं:—

(क) पूर्वभाग:—

१. सुकुलिका

(ख) पार्श्वभाग:—

१. पार्श्वमध्या तन्त्रिका । २. आश्लभिगा तन्त्रिका ।

३. पार्श्वान्तिका तन्त्रिका । ४. रोगजा तन्त्रिका ।

५. पश्चिम अनुलम्ब्य गुच्छ ।

(ग) पश्चिमभाग:—

१. पश्चिमान्तिका तन्त्रिका । २. पश्चिमपार्श्वकी तन्त्रिका ।

धूसरवस्तु

इसमें कोणकन्दिका तथा दशाकन्दिका और दन्तुरकन्दिका ये तीन कन्दिकायें मुख्य होती हैं। साथ ही इसमें प्रत्यावर्तित क्रिया के अनेक केन्द्र होते हैं जिनका जीवन की रक्षा के लिए अपेक्षित महत्व है—यथा प्रत्यावर्तित क्रियाओं में छालाछात्र, चूपण, घर्बण, निगलना, घमन, कास, छोंकना, निमेष तथा कनीनिका की गतिपों के केन्द्र हैं तथा स्वतः जात क्रियाओं में हृदयमण्डक, रक्तवहसंचालक, श्वसन तथा श्लेष्माव के केन्द्र हैं। इन केन्द्रों की उपस्थिति के कारण सुषुम्ना-शीर्षक श्वसन, भाषण, हृदयक्रिया, निषरण, पाचन तथा सात्मीकरण की क्रियाओं पर नियन्त्रण करता है।

उष्णीषक (Pons)

यह पश्चिम मस्तिष्क का वह भाग है जो घम्मिलक के आगे और सुषुम्ना-शीर्षक तथा मस्तिष्कमृणालकों के बीच में रहता है। बाहर की ओर यह उष्णीष-कन्दिकाओं से उत्पन्न अनुप्रस्थ नाड़ीसूत्रों से बना है। प्रत्येक पार्श्व में ये सूत्र गुच्छ के रूप में होकर उसी पार्श्व के घम्मिलक में प्रविष्ट होते हैं। ये गुच्छ घम्मिलक की मध्यवृत्तिका कहलाते हैं। इन सूत्रों के द्वारा मस्तिष्क के बहिर्वस्तु के विभिन्न भागों से नाड़ीवेग आते हैं जिससे घम्मिलक मस्तिष्क के नियन्त्रण में रहता है। इन उत्तानसूत्रों के नीचे गम्भीरसूत्र होते हैं।

इनके अतिरिक्त उष्णीषक की धूसरवस्तु में निम्नलिखित शीर्षणनाड़ी कन्दिकायें होती हैं:—

१. पञ्चमी नाडीकन्दिका—१
२. षष्ठ नाडीकन्दिकायें—२
३. सप्तमी नाडीकन्दिका—१
४. धृतिनाडी की शम्बूकशाखा की कन्दिकायें—२
५. धृतिनाडी की तुम्बिका शाखा की कन्दिकायें—३

लघुमस्तिष्क या घग्मिलक (Cerebellum)

यह करोटि के पश्चिम महाखात में पश्चिम पिण्डिका के नीचे तथा सुपुम्ना-शीर्षक के पीछे रहता है। इसके तीन भाग होते हैं—दो पार्श्व भाग और एक मध्यभाग। पार्श्वभाग पक्षिण्ड (Hemispheres) तथा मध्यभाग शलमिका (Vermis) कहलाता है। इसका भीतरी भाग प्राणगुहा की छत बनाता है। उत्तर, मध्यम तथा अधर धृन्तिकाओं (Superior, middle and inferior peduncles) के द्वारा यह मस्तिष्क, उष्णीषक तथा सुपुम्नाशीर्षक में सम्बद्ध रहता है। इसकी रचना मस्तिष्क के समान ही होती है। बाहर के धूपरवस्तु, भीतर शुभ्रवस्तु तथा चार कन्दिकायें होती हैं। ये कन्दिकायें दो वर्गों में विभक्त हैं—आन्तरिक तथा पार्श्विक। आन्तरिक वर्ग में निम्नाङ्कित तीन कन्दिकायें हैं :—

१. द्वारकन्दिका (Nucleus emboliformis)
२. वल्लुकन्दिका (Nucleus globosus)
३. पटलकन्दिका (Nucleus fastigii)

पार्श्विक वर्ग में एक ही कन्दिका होती है जिसे दन्तुरकन्दिका (Dentate nucleus) कहते हैं। यह चारों कन्दिकाओं में सबसे बड़ी है और आकार में सुपुम्नाशीर्षक की लवणिका के समान है। इसमें एक अलिन्दभाग होता है जिसमें होकर नाडीसूत्र प्रविष्ट होते तथा बाहर निरलते हैं।

केन्द्रीय शुभ्रवस्तुसमूह के अतिरिक्त शुभ्रवस्तु नाडीसूत्रों से बना है जो तीनों धृन्तिकाओं के द्वारा बाहर से संबन्ध रखते हैं।—ऊपर की ओर घग्मिलक जवनिका नामक कला से आवृत है।

मस्तिष्क के समान इसकी बहिर्वस्तु में भी तीन स्तर होते हैं—गद्दा, मध्य और आभ्यन्तर। विशेषता केवल इतनी है कि घग्मिलक के प्रत्येक क्षेत्र में ये

समान रूप से होते हैं, किन्तु मस्तिष्क के विभिन्न भागों में इनके वितरण में विभिन्नता होती है।

(क) बाह्यस्तर:—इसमें निम्नांकित रचनाएँ होती हैं:—

१. प्रक्रियुक्त कोषाणुओं के दण्ड
२. कणयुक्त कोषाणुओं के अक्षतन्तु
३. आरोहीसूत्र
४. मञ्जूपाकोषाणु (Basket cells)
५. क्षेत्रवस्तु कोषाणु

(ख) मध्यस्तर:—इसमें प्रक्रियुक्त कोषाणु एवं स्तर में व्यवस्थित होते हैं।

(ग) आन्तरिक स्तर:—इसमें निम्नांकित रचनाएँ होती हैं:—

१. कणयुक्त कोषाणु
२. स्याञ्जक कोषाणु (Cells of Golgi type. II)
३. क्षेत्रवस्तु कोषाणु

धम्मिलक के कार्य

यदि कधूतर में धम्मिलक को निकाल दिया जाय तो वह खड़ा नहीं रह सकता और न चल ही सकता है। इसका कारण यह है कि शरीर के सन्तुलन से संबद्ध विभिन्न पेशियों का संकोच समुचित रीति से सहयोगिता के आधार पर नहीं हो पाता। अतः धम्मिलक का संबन्ध शरीरसन्तुलन से स्पष्टतः प्रतीत होता है। इसके कार्य के विषय में विद्वान् व्यक्तियों में चार मत प्रचलित हैं:—

१. धम्मिलक ऐच्छिक चेष्टाओं का सहयोगमूलक सामान्य केन्द्र है जो उनके समय और शक्ति का नियमन करता है। यह फ्लोरेन नामक विद्वान् का मत है (Flouren's theory)।

२. वीर मिचेल नामक विद्वान् ने बतलाया कि धम्मिलक को पृथक् कर देने से जो शरीर सन्तुलन नष्ट हो जाता है वह धीरे-धीरे ठीक हो जाता है, किन्तु पेशियाँ दुर्बल रह जाती हैं जिससे उनमें श्रम शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पर उनका मत है कि धम्मिलक पेशियों में बल और शक्ति प्रदान करता है। (Weir mitchell's theory)।

३. लुसियानी नामक विद्वान् ने बतलाया कि धम्मिल्लक के पृथक् करने से जो गतिसंबन्धी विकार होते हैं वे क्षणिक होते हैं, केवल निम्नांकित तीन विकार स्थायी हो जाते हैं:—

१. पेशीदौर्बल्य (Asthenia)
२. पेशी के प्राकृत संकोच का नाश (Atonia)
३. असम्यक् (Astasia) तथा तन्मय कम्पन ।

अतः इस आधार पर उसने धम्मिल्लक के तीन कार्य बतलाये हैं:—

१. पेशी संकोच को बनाये रखना (Tonic function)
२. कार्य के समय पेशी को दृढ़ रखना (Static function)
३. कार्यकाल में पेशी को शक्तिशाली बनाये रखना (Sthenic function)
४. शरीर की विभिन्न पेशियों में सहयोगिता के आधार पर गति उत्पन्न करना जिससे शारीरिक उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता हो । (Theory of Synergic control)

मध्यम मस्तिष्क (Mid-brain)

अग्रिम तथा पश्चिम मस्तिष्कपिण्ड को मिलाने वाला यह सबसे छोटा भाग है । इसके दोनों पाशों से तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी नाड़ियाँ निकलती हैं । इसके तीन मुख्य भाग हैं:—

१. पुरःपार्श्विक भाग—जिसमें दोनों मस्तिष्क-मृणालक होते हैं ।
२. पश्चिम भाग—जिसमें कलायिका-चतुष्टय होते हैं ।
३. आन्त्यन्तर भाग—इसमें मलद्वारसुरगा (Aqueduct of sylvius) होती है ।

मस्तिष्कमृणालक:—इसके तीन भाग होते हैं:—

(क) अग्रिमांस—यह रवेत सूत्रों के समूह से बना होता है । इसे विसवितान (Crusta or pes) कहते हैं ।

(ख) मध्यमांस—यह श्यामवर्ण होता है । इसे श्यामपत्रिका (Substantia nigra) कहते हैं । यह ऊपर की ओर आज्ञाकन्द के मूल तक फैला हुआ है ।

कलायिका-चतुष्टय (Corpora quadrigemina)

यह मध्यम मस्तुलङ्ग पिण्ड के पश्चिम भाग में रहती हैं। ये छोटी और चतुर्लुकाकार होती हैं तथा परस्पर स्वस्तिकाकार सीता से विभक्त हैं। इनमें उत्तरकलायिकायें दर्शनेन्द्रिय तथा अधरकलायिकायें श्रवणेन्द्रिय से सम्बन्धित हैं। इनसे बाहर की ओर नाड़ीमृत्र गुच्छ निकलते हैं जिन्हें उत्तरालिका (Superior brachium) तथा अधरालिका (Inferior brachium) कहते हैं। इनके प्रांत भाग में दो वल्लेय होते हैं जिन्हें क्रमशः उत्तरा अधिपीठिका (External geniculate body) तथा अधरा अधिपीठिका (Internal geniculate body) कहते हैं।

अग्रिम मस्तुलङ्गपिण्ड या मस्तिष्क (Cerebrum)

धर्मान की सुविधा के लिए मस्तिष्क के दो भाग किये गये हैं:—

१. मस्तिष्क गोलार्ध (Cerebral hemispheres)
२. मस्तिष्क मूलपिण्ड (Basal ganglia)

मस्तिष्कमूलपिण्ड:—

(क) आह्लाकन्द (Thalamus)

यह मस्तिष्कमूलपिण्ड का प्रधान अवयव है। यह दो क्री संख्या में ब्रह्मगुदा के दोनों ओर रहते हैं। इनका आकार पत्ती के अण्डे के समान है। विकास की दृष्टि से ये मस्तिष्क के परिसरीय भाग से अतिप्राचीन हैं तथा निम्न वर्ग के प्राणियों में उच्च संज्ञाधिष्ठान केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं। इसके दो भाग होते हैं:—

१. पार्श्विकभाग (केन्द्राकरभूमि) (Lateral part)—इनमें दो कन्दिकाये होती हैं:—

(क) पश्चिमपार्श्विक कन्दिका (Pulvinar)—

यहाँ दृष्टि-नाड़ी के सूत्र आते हैं और इसके अद्यतन्तु मस्तिष्क की पश्चिम पिण्डिका में जाते हैं।

(ख) पार्श्विककन्दिका (Lateral nucleus)—

यह चक्षिका के सूत्रों से संबद्ध है तथा त्वचा से, एवं गम्भीर संज्ञाओं का ग्रहण करता है।

(२) अग्रिमान्त्रीय भाग (संवेदनभूमि) (Anteromedial part) —

इसमें भी दो कन्दियाँ होती हैं :—

(क) अग्रिम कन्दिका—इसके अक्षतन्तु राजिलपिण्ड की शफरीकन्दिका तक जाते हैं ।

आन्तरी कन्दिका—यह घ्राण-नाड़ी के सूत्रों का ग्रहण करता है और इसके अक्षतन्तु शफरीकन्दिका और कन्दाधरिक भाग में जाते हैं ।

आज्ञाकन्द के कार्य

१. पार्थिक कन्दिका शरीर के विभिन्न सूत्रों के मार्ग में स्टेशन का कार्य करती है और पश्चिमपार्थिक कन्दिका दृष्टिनाड़ी के मार्ग में सहायक का कार्य करती है । ये सभी संज्ञायें मस्तिष्क के परिसरीय भाग में अपने-अपने केन्द्रों तक पहुँचने के पूर्व यहाँ व्यवस्थित हो जाती है ।

२. ये प्राथमिक संज्ञाधिष्ठान केन्द्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसीलिए मस्तिष्क के परिसरीय भाग में स्थित संज्ञाकेन्द्रों का विकार होने पर भी ये संज्ञायें पूर्णतः भ्रष्ट नहीं होती, किन्तु आज्ञाकन्दों के विकार में ये पूर्णतः भ्रष्ट हो जाती हैं ।

३. संज्ञाओं में सुखदुःख की प्रतीति इन्हीं से होती है ।

४. यह भावावेशों की अभिव्यञ्जना का प्राथमिक केन्द्र है ।

५. चूँकि ये एक पार्श्व के घग्मिलक को दूसरे पार्श्व के मस्तिष्क से सम्बन्धित करते हैं, इसलिये इनके द्वारा मस्तिष्क के परिसरीय भाग की ऐच्छिक चेष्टाओं का नियन्त्रण करते हैं ।

राजिलपिण्ड (Corpus striatum)

यह भी मस्तिष्क मूलपिण्ड का ही एक भाग है और इसके कोषाणु मस्तिष्क के परिसरीय भाग के कोषाणुओं के समान होते हैं । इस प्रकार विकास और कार्य की दृष्टि से यह मस्तिष्क गोलाघों का भाग हो जाता है ।

यह एक बड़ा पिण्डाकार भाग है जिसमें दो भूसरवस्तु के समूह पाये जाते हैं :— भीतर की ओर शफरीकन्द (Caudate nucleus) तथा बाहर की ओर शक्तिकन्द (Lenticular nucleus) । ये दोनों भाग शुभ्रसूत्रों के एक गुच्छ से

विभक्त हैं जिसे आन्तरकूर्चवह्निका (Internal capsule) कहते हैं तथा जो मस्तिष्क के एक पार्श्व को शरीर के विपरीत पार्श्व से सम्बन्धित करता है । शुक्तिरुन्द के दो भाग होते हैं, बड़ा भाग शुक्तिरीठ (Putamen) तथा छोटा भाग शुक्तिगर्भ (Globus pallidus) कहलाता है ।

राजिलपिण्ड के कार्य

- (१) मस्तिष्क के परिसरीय चेटासेत्रों से मिल कर यह ऐच्छिक पेशियों की गति का नियन्त्रण करता है ।
- (२) पेशियों को सहयोगिता के आधार पर कार्य करने के लिए प्रस्तुत रखता है ।
- (३) शुक्तिरुन्द नादीवेगों को ऐच्छिक पेशियों तक पहुँचाता है जिससे स्वयं जात संबन्ध क्रियायें होती है यथा घूमना दौड़ना इत्यादि ।
- (४) शरीर ताप का नियमन करता है ।

आन्तरकूर्चवह्निका (Internal capsule)

यह श्वेत मेदसनादी सूत्रों का एक गुच्छ है जो शुक्तिरुन्द (बाहर की ओर) तथा बाफरीकन्द और आशाकन्द (भीतर की ओर) के बीच में स्थित रहता है । इसका आकार अर्धचन्द्र के समान है जिसका नतोदर भाग बाहर की ओर शुक्तिरुन्द के सामने है । इसके तीन भाग होते हैं:—

१. अग्रिम भाग (Frontal part)
२. कोणभाग (Genu)
३. पश्चिम भाग (Occipital part)

धमनीकाठिन्य आदि के कारण रक्तभाराधिक्य होने पर यहाँ की धमनियों फट जाती है जिससे सन्ध्यास, पक्षाघात रोग हो जाते हैं । विपरीत पार्श्व की पेशियों का पक्षाघात होता है । वामभाग में रक्तस्राव होने पर बाक्शक्ति का लोप भी होता है ।

बाह्यकूर्चवह्निका (External capsule)

यह शुभ्र सूत्रों का एक गुच्छ है जो शुक्तिरुन्द के बाह्यपार्श्व में रहती है और मस्तिष्क के अनुप्रस्थ परिच्छेद में शुक्तिरुन्द और कन्दपत्रिका के बीच में देखी जाती

(२) अग्रिमन्तरीय भाग (संवेदनमूभि) (Anteromedial part) — इसमें भी दो कन्दियाँ होती हैं :—

(क) अग्रिम कन्दिका—इसके अक्षतन्तु राजिलपिण्ड की शफरीकन्दिका तक जाते हैं ।

आन्तरी कन्दिका—यह माण-नाड़ी के सूत्रों का ग्रहण करता है और इसके अक्षतन्तु शफरीकन्दिका और कन्दाधरिक भाग में जाते हैं ।

आज्ञाकन्द के कार्य

१. पार्श्विक कन्दिका शरीर के विभिन्न सूत्रों के मार्ग में स्टेशन का कार्य करती है और पश्चिमपार्श्विक कन्दिका दृष्टिनाड़ी के मार्ग में सहायक का कार्य करती है । ये सभी संज्ञायें मस्तिष्क के परिसरीय भाग में अपने-अपने केन्द्रों तक पहुँचने के पूर्व यहाँ व्यवस्थित हो जाती है ।

२. ये प्राथमिक संज्ञाधिष्ठान केन्द्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसीलिए मस्तिष्क के परिसरीय भाग में स्थित संज्ञाकेन्द्रों का विकार होने पर भी ये संज्ञायें पूर्णतः नष्ट नहीं होती, किन्तु आज्ञाकन्दों के विकार में ये पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं ।

३. संज्ञाओं में सुखदुःख की प्रतीति इन्हीं से होती है ।

४. यह भावावेशों की अभिव्यञ्जना का प्राथमिक केन्द्र है ।

५. चूँकि ये एक पार्श्व के धम्मिलक को दूसरे पार्श्व के मस्तिष्क से सम्बन्धित करते हैं, इसलिये इनके द्वारा मस्तिष्क के परिसरीय भाग की ऐच्छिक चेष्टाओं का नियन्त्रण करते हैं ।

राजिलपिण्ड (Corpus striatum)

यह भी मस्तिष्क मूलपिण्ड का ही एक भाग है और इसके कोषाणु मस्तिष्क के परिसरीय भाग के कोषाणुओं के समान होते हैं । इस प्रकार विकास और कार्य की दृष्टि से यह मस्तिष्क गोलार्धों का भाग हो जाता है ।

यह एक बड़ा पिण्डाकार भाग है जिसमें दो धूलरवस्तु के समूह पाये जाते हैं :— भीतर की ओर शफरीकन्द (Caudate nucleus) तथा बाहर की ओर शक्तिकन्द (Lenticular nucleus) । ये दोनों भाग शुभ्रसूत्रों के एक गुच्छ से

विभक्त हैं जिसे आन्तरकूर्चवह्निका (Internal capsule) कहते हैं तथा जो मस्तिष्क के एक पार्श्व को शरीर के विपरीत पार्श्व से सम्बन्धित करता है । शुक्तिरुन्द के दो भाग होते हैं, बड़ा भाग शुक्तिनीठ (Putamen) तथा छोटा भाग शुक्तिगर्भ (Globus pallidus) कहलाता है ।

राजित्वापिण्ड के कार्य

- (१) मस्तिष्क के परिसरीय चंटावेष्टों से मिल कर यह ऐच्छिक पेशियों की गति का नियन्त्रण करता है ।
- (२) पेशियों को सहयोगिता के आधार पर कार्य करने के लिए प्रस्तुत रखता है ।
- (३) शुक्तिरुन्द नाड़ीवेगों को ऐच्छिक पेशियों तक पहुँचाता है जिससे स्वयं जात संबद्ध क्रियायें होती हैं यथा घूमना दौड़ना इत्यादि ।
- (४) शरीर ताप का नियमन करता है ।

आन्तरकूर्चवह्निका (Internal capsule)

यह श्वेत मेदसनादी सूत्रों का एक गुच्छ है जो शुक्तिरुन्द (बाहर की ओर) तथा शफरीकन्द और आज्ञाकन्द (भीतर की ओर) के बीच में स्थित रहता है । इसका आकार अर्धचन्द्र के समान है जिसका नतोदर भाग बाहर की ओर शुक्तिरुन्द के सामने है । इसके तीन भाग होते हैं:—

१. अग्रिम भाग (Frontal part)
२. कोणभाग (Genu)
३. पश्चिम भाग (Occipital part)

धमनीकाठिन्य आदि के कारण रक्तभाराधिन्य होने पर यहाँ की धमनियों फट जाती है जिससे सन्ध्यास, पचाघात रोग हो जाते हैं । विपरीत पार्श्व की पेशियों का पचाघात होता है । वामभाग में रक्तस्राव होने पर वाक्शक्ति का लोप भी होता है ।

बाह्यकूर्चवह्निका (External capsule)

यह शुभ्र सूत्रों का एक गुच्छ है जो शुक्तिरुन्द के बाह्यपार्श्व में रहती है और मस्तिष्क के अनुप्रस्य परिच्छेद में शुक्तिरुन्द और कन्दपत्रिका के बीच में देखी जाती

है। यह शुक्तिकन्द के पीछे और नीचे की ओर आन्तरकूर्चवह्निका से मिली रहती है। इसके सूत्र प्रायः आज्ञाकन्द से उत्पन्न होते हैं।

मस्तिष्क गोलार्ध (Cerebral hemispheres)

मस्तिष्क अनुदीर्घा महासीता (Deep longitudinal fissure) के द्वारा दो गोलार्धों में विभक्त होता है और ये दोनों गोलार्ध मस्तिष्कसेतु (Corpus callosum) नामक अनुप्रस्थ सेतुसूत्रों के गुच्छ के द्वारा परस्पर संबद्ध रहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध के भीतर एक महागुहा है जिसे त्रिपथगुहा (Lateral ventricle) कहते हैं। ये गुहायें ग्रहगुहा में खुलती हैं।

प्रत्येक मस्तिष्क-गोलार्ध में भीतर की ओर शुभ्रवस्तु होती है जिसमें सूत्र होते हैं तथा बाहर की ओर धूसरवस्तु होती है जिसे मस्तिष्क-परिसर (Cerebral cortex) कहते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न पृष्ठों में इसके परिमाण में अन्तर होता है। मस्तिष्कमूल में धूसरवस्तु के तीन महत्वपूर्ण संघात होते हैं जिन्हें आज्ञाकन्द, राजिलपिण्ड तथा कलायिराचतुष्टय कहते हैं।

मस्तिष्क के पिण्ड

मस्तिष्क का बहिर्भाग अनेक सीताओं के द्वारा अनेक पिण्डों में विभक्त है। इन पिण्डों का पृष्ठभाग समतल न होकर ऊँचा नीचा और टेढ़ा मेढ़ा होता है जिससे मस्तिष्क-परिसर की धूसरवस्तु अधिक परिमाण में करोटिगुहा में आसके। निम्नवर्ग के प्राणियों में यह बिलडुल समताप तथा इसकी रचना नितान्त साधारण होती है, किन्तु क्रमशः आगे बढ़ने पर इसकी रचना जटिल होती जाती है। मनुष्य में भी गर्भावस्था में मस्तिष्क की रचना साधारण ही होती है, किन्तु विकासक्रम से उसमें सीतार्य प्रगट होने लगती हैं और उसका पृष्ठभाग जटिल होने लगता है तथा युवावस्था में पहुँचने पर वह पूर्ण विकसित हो जाता है। निम्नश्रेणी के बन्दरों और नवजात शिशु का मस्तिष्क प्रायः सट्टा होता है।

मस्तिष्क का बहिर्भाग गहरी रेखाओं के द्वारा अनेक भागों में विभक्त है। इन रेखाओं को ही सीता (Primary fissures or sulci) तथा इन विभागों को पिण्ड (Lobes) कहते हैं। छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा इन पिण्डों के

भी कई उपविभाग हो जाते हैं । इन छोटी रेखाओं को सीतिका (Secondary fissures or sulci) तथा इन उपविभागों को कर्णिका (Gyrus or convolutions) कहते हैं ।

मस्तिष्क गोलार्ध के तीन पृष्ठ होते हैं, बाह्य, आन्तर और अधर । इन पृष्ठों के क्रम से सीताओं का उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(क) बाह्यपृष्ठ :—

१. शंस्रपार्वान्तरा (Lateral cerebral fissure or fissure of Sylvius)

२. मध्यान्तरा (Central fissure or fissure of Rolando)

३. पार्श्वपश्चिमान्तरा बाह्या (External parieto-occipital fissure)

(ख) अधरपृष्ठ :—

१. प्रच्छन्न धानुपी (Circular sulcus)

(ग) आन्तरपृष्ठ :—

१. अधिसेतुका (Callosal fissure)

२. चक्रान्तरा (Calcarine fissure)

३. अन्धश्रृङ्खला (Subparietal sulcus)

४. सरलान्तरा (Collateral fissure)

५. पार्श्वपश्चिमान्तरा आन्तरा (Internal parieto-occipital fissure)

इन सीताओं के द्वारा मस्तिष्क निम्नांकित पाँच पिण्डों में विभक्त होता है:—

१. अग्रिमपिण्ड (Frontal lobe)—मध्यान्तरा सीता के सामने ।

२. पार्श्विकपिण्ड (Parietal lobe)—मध्यान्तरा सीता और पार्श्वपश्चिमान्तरा सीता के बाह्यभाग के बीच में ।

३. पश्चिमपिण्ड (Occipital lobe)—पार्श्वपश्चिमान्तरा सीता के पीछे ।

४. शंखिक पिण्ड (Temporal lobe)—शंस्रपार्वान्तरा सीता के नीचे ।

५. प्रच्छन्नपिण्डिका (Island of reil or insula)—मस्तिष्कपार्श्व में भीतर की ओर स्थित और प्रच्छन्नधानुपी सीता से संवेष्टित । अग्रिम, पार्श्विक और शंखिक पिण्डों के कर्णकों के हटाने से दिखाई देती है ।

६. गर्भपिण्डिका (Limbic lobe)—यह मस्तिष्क सेतुभाग को आवेष्टित

रहता है ।

करनेवाली दो पिण्डकार्यें हैं जो ऊपर की ओर अधिसेतुकर्णिका तथा नीचे की ओर उपधान पिण्डिका से बनती है। यह कुत्ते आदि तीक्ष्ण गन्ध शक्तियुक्त प्राणियों में अधिक विकसित होती है। इसके आगे की ओर अंकुशकर्णिका तथा पीछे की ओर योजनकर्णिका रहती है।

मस्तिष्कपरिसर (Cerebral cortex) की सूक्ष्म रचना

धूसरवस्तु:—मस्तिष्क का परिसरभाग चैत्र तथा आयु के अनुसार २ से ४ मि० मी० मोटा होता है। इसकी धूसरवस्तु पाँच स्तरों से निर्मित है:—जो बाहर से भीतर की ओर निम्नांकित प्रकार से हैं:—

१. बाह्य तन्तुस्तर (Outer fibre layer)—सूत्रजाल बहुल
२. बाह्य कोषाणुस्तर (Outer cell layer)—करीराकृति त्रिकोण-कोषाणु बहुल
३. ताराणुक स्तर (Middle cell layer)—तारकाकृति कोषाणु बहुल
४. आन्ध्यन्तर तन्तुस्तर (Inner fibre layer)—करीराकृति घुड़क-कोषाणुबहुल।
५. आन्ध्यन्तर कोषाणुस्तर (Inner cell layer)—नानाविधाकृति सूक्ष्मकोषाणुबहुल।

इन स्तरों के कार्य

१. बाह्यतन्तुस्तर—इससे स्मृति की क्रिया सम्पादित होती है तथा व्यक्ति की बुद्धि के अनुसार इसकी स्थूलता होती है। इसके विकार से बुद्धिमान्द्य, बुद्धि-वैयम्य आदि रोग हो जाते हैं।

२. बाह्यकोषाणुस्तर—यह मानसभावों के संयोजन से सम्बन्ध रखता है, अतः मानस या सयुज क्षेत्रों में विशेष स्पष्ट होता है।

३. ताराणुकस्तर—यह संज्ञाधिष्ठान क्षेत्रों में विशेष स्पष्ट होता है। अतः इसका सम्बन्ध संज्ञा से होता है।

४. आन्ध्यन्तर तन्तुस्तर—यह चेष्टाधिष्ठान क्षेत्रों में विशेष स्पष्ट होता है।

५. आन्ध्यन्तर कोषाणुस्तर—इसका सम्बन्ध शारीरिक तथा अन्तर्जात क्रियाओं से होता है।

शुभ्रवस्तु

शुभ्रवस्तु नाडीसूत्रों से बनी हुई है । ये सूत्र क्रिया अनुसार तीन वर्गों में विभाजित किये गये हैं :—

१. सेतुसूत्र (Commisural fibres)
२. सयुजसूत्र (Association fibres)
३. विसारिसूत्र (Projection fibres)

१. सेतुसूत्र :—ये मस्तिष्क के गोलार्धों को परस्पर मिलाने हैं यथा—

(क) मस्तिष्कसेतु

(ख) शंखिकण्ठों को मिलाने वाला अग्रिम सेतु

(ग) उपधानसेतु (Hippocampal commissure)

२. सयुजसूत्र :—ये सूत्र उसी पार्श्व के विभिन्न भागों को परस्पर मिलाने हैं । ये ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के होते हैं । ह्रस्व सूत्र निकटवर्ती कर्णिकाओं को मिलाने हैं और दीर्घ सूत्र दूरस्थ कर्णिकाओं को । दीर्घ सूत्र निम्नांकित हैं :—

(क) ऊर्ध्व अनुदीर्घगुच्छ (Superior longitudinal bundle)—
ये अग्रिम, शंखिक तथा पश्चिम पिण्डों को मिलाने हैं ।

(ख) अधर अनुदीर्घ गुच्छ (Inferior longitudinal bundle)
ये शंखिक तथा पश्चिम पिण्डों को मिलाने हैं ।

(ग) पश्चिमगुच्छ (Occipito bundle)

(घ) अंकुशगुच्छ (Uncinate bundle)

(च) धनुर्वक्रगुच्छ (Cingulum)

३. विसारिसूत्र :—ये सूत्र मस्तिष्क परिसर और अनुमस्तिष्क को मस्तिष्क के दूसरे भागों तथा सुषुम्नाकाण्ड से मिलाने हैं । गति के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं :—आरोही (Ascending) और अवरोही (Descending) ।

आरोही सूत्र

ये प्रायः संज्ञाबह होते हैं और अधिकांश बाह्यकन्द तक जाते हैं । इनमें निम्नांकित तन्त्रिकाएँ होती हैं :—

१. ऊर्ध्ववह्निकासूत्र (Main or upper lemniscus)

(२) नैदानिक और वैचारिक विधि (Clinical and Pathological methods)—जीवनकाल में उत्पन्न क्रियासम्वन्धी विकारों की मृत्युत्तर परीक्षा के परिणामों से तुलना कर निश्चय किया जाता है।

(३) रचना-शारीरविधि (Anatomical method)—स्थूलरूप से तथा सूक्ष्मदर्शकयन्त्र से मस्तिष्क परिसर भाग की रचना का निरीक्षण किया जाता है। चेष्टाक्षेत्रों में बृहत् कोषाणु, सयुजक्षेत्रों में लघुकोशिकाकृति कोषाणु तथा संज्ञाक्षेत्रों में तारकाकृति कोषाणु होते हैं।

(४) गर्भविज्ञानविधि (Embryological method)—इसमें मस्तिष्क परिसर के विभिन्न भागों में जाने वाले नाडीसूत्रों की शुभ्रवस्तु के विकास का अध्ययन किया जाता है। यह देखा गया है कि संज्ञाक्षेत्रों में जाने वाले सूत्र सर्वप्रथम मेदसपिधानयुक्त होते हैं, तत्पश्चात् चेष्टाक्षेत्रों में जाने वाले सूत्रों का पिधानीकरण होता है। सबके अन्त में, सयुज क्षेत्रों के सूत्र पिधानयुक्त होते हैं।

(५) विकृत शारीरविधि (Pathologico-anatomical method)—इसमें रोग या आघात के कारण अपकर्षयुक्त नाडीसूत्रों से सम्बद्ध मस्तिष्क परिसरीय क्षेत्रों का निरूपण किया जाता है।

(६) तुलनात्मक शारीरविधि (Method of comparative anatomy)—विभिन्न प्राणियों में परिसर के स्तरों का अध्ययन किया जाता है। अन्तर्जात क्रियाओं से संबद्ध अन्तिम दो स्तर निम्न वर्ग के प्राणियों में अधिक स्पष्ट होते हैं तथा उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से संबद्ध ऊपरी दो स्तर मनुष्य में अधिक विकसित होते हैं।

मस्तिष्क के क्षेत्र

उपर्युक्त विधियों के द्वारा मस्तिष्क में तीन प्रकार के क्षेत्र निश्चित किये गये हैं:—

१. चेष्टाक्षेत्र (Motor or excitable areas)—यहाँ से ऐच्छिक वेगों का प्रारम्भ होता है।

२. संज्ञाक्षेत्र (Sensory or receptive areas)—इनका सम्बन्ध संज्ञाओं के ग्रहण से है।

३. सयुजक्षेत्र (Association areas)—ये उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के अधिष्ठान हैं।

रचना के अनुसार एक अन्य विद्वान् ने परिसर क्षेत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया है:—

१. तारक-कोषाणयुक्त (Granulous type) ये संज्ञाक्षेत्रों में पाये जाते हैं ।
२. करीरकोषाणयुक्त (Angular type)—ये चेष्टा तथा संयुज क्षेत्रों में पाये जाते हैं ।

चेष्टाक्षेत्र

मस्तिष्क में तीन चेष्टाक्षेत्र निर्धारित किये गये हैं:—

१. मध्यान्तरा अभिमूर्णिका (Precentral gyrus or rolandic area) ।

यह कर्णिका पूर्णतः चेष्टा का अधिष्ठान है । कुछ चेष्टाक्षेत्र इसके अन्तःपृष्ठ में भी हैं । इस कर्णिका में ऊर्ध्वशाखा, अधःशाखा, मध्यकाय तथा शिर इनके लिए पृथक्-पृथक् केन्द्र हैं । अधःशाखा का केन्द्र सबसे ऊपर की ओर तथा कुछ दूर तक अन्तःपृष्ठ पर भी रहता है । इसके नीचे मध्यकाय का केन्द्र होता है । ये दोनों केन्द्र मिलकर कर्णिका का $\frac{2}{3}$ भाग घेरते हैं । इनके नीचे दूसरे $\frac{1}{3}$ भाग में ऊर्ध्वशाखा का केन्द्र स्थित है । सबसे नीचे $\frac{1}{3}$ भाग में शिर और ग्रीवा का केन्द्र है । इन केन्द्रों में पुनः सभी उपांगों के लिए केन्द्र होते हैं यथा अधःशाखा केन्द्र में अंगुष्ठ, गुल्फ, जानु, नितम्ब आदि ।

इन क्षेत्रों का विस्तार पेशियों की संख्या के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी गति की जटिलता के अनुसार होता है । जिन अंगों की गति जटिल होती है उनके क्षेत्र विस्तृत होते हैं । ऐसा अनुमान है कि परिसरीय पृष्ठत् करीराकृति कोषाणुओं की संख्या सुषुम्नाकाण्ड के पूर्व शृंगीय कोषाणुओं की संख्या के $\frac{1}{2}$ होती है । इस प्रकार एक करीर कोषाणु दस पूर्व शृंगकोषाणुओं की क्रिया का नियन्त्रण करता है । यह क्षेत्र अभ्यासजन्य क्रियाओं का भी संचालन करता है । साथ ही इसके द्वारा पेशियों के स्वाभाविक संकोच पर निरोधक प्रभाव पड़ता है । अन्य संज्ञाक्षेत्रों की संयुक्त क्रिया से अभ्यासजन्य कार्यों के चेष्टासूत्र निर्मित होते हैं जो वामपार्श्व में मध्यान्तरा अभिमूर्णिका में सञ्चित रहते हैं और समय पर इस चेष्टाक्षेत्र से सञ्चालित होते हैं । इसकी विकृति होने पर मनुष्य अभ्यासजन्य क्रियाओं का सम्पादन नहीं कर सकता । इसे अम्यस्त क्रियानाश (Apraxia) कहते हैं ।

२. अग्रिम दृष्टिक्षेत्र (Frontal eye area)

यह क्षेत्र गोलकों की गति का केन्द्र है और इसका अधिष्ठान मध्यमा अग्रपिण्ड-कर्णिका (Middle frontal convolution) है। यह तृतीय, चतुर्थ तथा पट्टी दीर्घपथ नाड़ियों की कन्दिकाओं में उत्तेजना पहुंचाता है जिससे सहयोगिता के आधार पर इनका कार्य होकर नेत्रगोलकों की समुचित गति होती है।

३. वाक्क्षेत्र (Motor speech area).


यह अधरा अग्रपिण्ड कर्णिका के पश्चिम प्रान्त में शंखपाशान्तरा सीता की अग्रिम शाखा के पास स्थित है। प्रोका नामक विद्वान् ने इसका अनुसन्धान किया था, अतः इसे 'प्रोका का क्षेत्र' (Broca's convolution) या वाक्मय-पिण्डिका भी कहते हैं। यह केवल वाम भाग में होता है। इस क्षेत्र के विकृत हो जाने पर वाक् से संबद्ध पेशियाँ निश्चेष्ट नहीं होतीं बल्कि उनका उपयोग चर्वण या निगरण में होता है। यह क्षेत्र वाणी की स्पष्टता के लिए आवश्यक विभिन्न अंगों यथा जिह्वा, ओष्ठ तथा स्वरयंत्र की विविध गतियों का नियंत्रण एवं सहयोगमूलक संचालन करता है। इस क्षेत्र के विकारों में वाक्शून्य (Motor aphasia) नामक रोग हो जाता है जिसमें रोगी बोल नहीं सकता।

संज्ञाक्षेत्र

इन क्षेत्रों का निरूपण उत्तेजना या पृथक्करण के द्वारा होता है। इन क्षेत्रों को उत्तेजित करने पर यद्यपि कोई गति नहीं होती तथापि उस विषय की अनुभूति तथा तत्जन्य प्रत्यावर्तित क्रिया होती है यथा श्रुतिक्षेत्र को उत्तेजित करने से कर्णों में सूचीवेधनवत् वेदना तथा सनसनाहट होने लगती है। संज्ञाक्षेत्र को पृथक् करने से तत्सम्बद्ध संज्ञा का नाश हो जाता है।

पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के लिए पृथक्-पृथक् क्षेत्र निर्धारित हैं जिनमें प्रायः शरीर के विपरीत पार्श्व से संज्ञायें आती हैं। इन संज्ञाक्षेत्रों के पुनः दो विभाग हो जाते हैं—संज्ञादानभूमि (Sensory receptive areas) तथा संज्ञाविवेकभूमि (Sensory psychic area)। प्रथम विभाग में सामान्य संज्ञाओं का ग्रहण होता है तथा द्वितीय विभाग में उनके विशिष्ट प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन होता है।

मास्तिष्क के क्षेत्र



चित्र ५२ (क)

- (क) अग्रिमदृष्टिक्षेत्र (ख) वाक्क्षेत्र (चालक) (ग) स्वाद और घ्राणकेन्द्र
 (घ) बाह्यक दृष्टिकेन्द्र (ङ) दृष्टिशब्दकेन्द्र (च) मानस दृष्टिकेन्द्र (छ) बाह्यक दृष्टिकेन्द्र
 (ज) दृष्टिशब्दकेन्द्र (झ) मानस दृष्टिकेन्द्र (ञ) संज्ञाक्षेत्र (ट) चेष्टाक्षेत्र

(१) स्पर्शसंज्ञाक्षेत्र (Tactile or body-sense area)

यह मध्यान्तरा पश्चिमकर्णिका (Posterior central gyrus) में स्थित है । फोर्स्टर नामक विद्वान् के मत में यह क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है किन्तु कुछ पीछे की ओर अनुमध्यान्तरा कर्णिका (Superior parietal convolution) तक फैला है । पश्चिम कर्णिका के पूर्वार्ध में आदान-भूमि तथा पश्चिमार्ध में विवेक-भूमि है जहाँ शीतोष्ण, रुचिग्रिष्ण आदि स्पर्श के विशिष्ट प्रकारों विवेचन होता है । जिस प्रकार अग्रिम कर्णिका में चेष्टाक्षेत्र का अङ्गों के अनुसार क्रमशः विभाग है, उसी प्रकार पश्चिम कर्णिका में भी ऊपर की ओर अधः-शाखा, मध्य में मध्यकाय और घाँहू तथा नीचे की ओर शिर और ग्रीवा का संज्ञाक्षेत्र होता है ।

(' २ ') शब्दसंज्ञाक्षेत्र (Auditory area)

यह उत्तर शङ्खिककर्णिका (Superior temporal gyrus) तथा पारवर्ती प्रष्टन्नपिण्डिका की अनुप्रस्थ शङ्खिककर्णिका (Transverse temporal gyrus) में स्थित है । उत्तरशङ्खिक कर्णिका के मध्यभाग में आदान भूमि तथा पश्चिम तृतीयांश और (Supramarginal gyrus) के निकटवर्ती भाग में विवेकभूमि (Auditopsychic area or sensory speech area) होती है । इसे 'वनिक का क्षेत्र (Wernick's area) भी कहते हैं । यहाँ पर सुने और बोले गये शब्दों के स्मृति चित्र सञ्चित रहते हैं । भोका के क्षेत्र के समान यह भी वाम पार्श्व में ही होता है । इस विवेकभूमि के विकृत होने से मानसबाधिर्य (Mind deafness or psychic deafness) नामक रोग उत्पन्न होता है इसमें सामान्य शब्दसंज्ञा का ग्रहण तो होता है, किन्तु उसके विशिष्ट प्रकारों को पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है ।

उत्तरशङ्खिक कर्णिका के मध्य में एक और विकसित केन्द्र होता है जिसे शब्द चित्र क्षेत्र (Audito-word area) कहते हैं । यहाँ उच्चारित शब्दों तथा वर्णों की स्मृति, जिसे शब्द चित्र (Sound pictures) कहते हैं, सञ्चित रहती है । इस क्षेत्र में आघात होने से 'अर्थबाधिर्य (Word deafness or auditory aphasia) नामक रोग उत्पन्न होता है । इसमें शब्दों का श्रवण तो होता है, किन्तु उनके अर्थ की प्रतीति नहीं होती ।

३-४ रस-गन्ध संज्ञाक्षेत्र (Taste & Smell area)

यह उपधानकर्णिका (Hippocampal gyrus), विशेषतः अङ्गुल-कर्णिका (Uncus) में स्थित होता है। यह कुत्ते आदि तीक्ष्णगन्धयुक्त प्राणियों में अधिक विकसित होता है। इसके ठीक पीछे जुधा और तृष्णा संज्ञा के क्षेत्र हैं जिनके विकृत होने से जुधा और तृष्णा सम्बन्धी विकार उत्पन्न होते हैं।

५. रूपसंज्ञाक्षेत्र—(Visual area)

यह मस्तिष्क के पश्चिम पिण्ड के अन्तः पृष्ठ में चक्रान्तरा सीता के दोनों ओर विशेषतः त्रिकोणपिण्डिका (Cuneus) स्थित है। यह रूप संज्ञादानभूमि (Visuo-sensory area) है। इसी के पार्श्व में मुख्यतः पश्चिमपिण्ड के बाह्य पृष्ठ पर रूपसंज्ञाविवेक भूमि (Visuo-psychic area) स्थित है। इस भूमिकेन्द्र के विकृत होने से 'मानस आन्ध्य' (Mind-blindness or psychic blindness) उत्पन्न होता है जिससे रोगी वस्तुओं को देखता तो है किन्तु उन्हें पहचान नहीं सकता।

त्रिकोण पिण्डिका तथा सन्निकट पश्चिम पिण्ड के एक भाग में 'शब्ददर्शन क्षेत्र' (Visuo-word centre) होता है जिसमें लिखित या मुद्रित वर्णों के स्मृतिचित्र अंकित रहते हैं। इस केन्द्र के विकृत होने से लिखित या मुद्रित वर्णों को पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसे 'वर्णान्ध' (Visual Aphasia or word blindness) कहते हैं।

संयुज क्षेत्र (Association areas)

उपर्युक्त संज्ञाधिष्ठान और चेष्टाधिष्ठान क्षेत्र मस्तिष्कपरिसर के बहुत थोड़े भाग में सीमित हैं। इनके चारों ओर ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जिनकी उत्तेजना से कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं होती, किन्तु उनके विकार से शारीरक्रियाओं के जटिल विकार उत्पन्न होते हैं। ये क्षेत्र सूत्रों और नाड़ीकोषाणुओं के समूह से धने हैं। सूत्रों को संयुज सूत्र तथा कोषाणुसमूह को संयुज केन्द्र कहते हैं। सूत्रों का कार्य विभिन्न केन्द्रों को मिलाना तथा केन्द्रों का कार्य अनुभूत विषयों को स्मृति के रूप में सञ्चित रखना है।

इन क्षेत्रों में ध्यान, आलोचन, स्मरण आदि उच्चतर मानसिक क्रियाएँ होती

हैं । प्राणियों में बुद्धि का विकास ज्यों-ज्यों होता है त्यों-त्यों इन क्षेत्रों का विस्तार बढ़ता जाता है । मनुष्य के मस्तिष्क में क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं ।

ये क्षेत्र तीन भागों में विभक्त हैं:—

(१) अग्रिम सयुज क्षेत्र—ये अग्रिम पिण्ड के पूर्वभाग में होते हैं ।

(२) मध्यम सयुज क्षेत्र—ये प्रच्छन्न पिण्डिका में हैं ।

(३) पश्चिम सयुज क्षेत्र—ये पार्श्विक तथा पश्चिम पिण्ड के पिछले भाग में स्थित हैं ।

इन क्षेत्रों के विकृत होने से संज्ञा या चेष्टा का कोई विशिष्ट विकार नहीं होता किन्तु व्यक्ति की मानसिक स्थिति तथा उसके व्यवहार में महान् अन्तर आजाता है ।

सुपुम्नाकाण्ड के कार्य

सुपुम्नाकाण्ड के दो कार्य हैं:—

१. संज्ञा तथा चेष्टा के वेगों का संवहन—यह कार्य सुपुम्ना की शुभ्रवस्तु से सम्पन्न होता है ।

२. प्रत्यावर्तितक्रियाओं का सम्पादन—यह कार्य उसकी धूसर वस्तु से होता है ।

संज्ञा के वेग (*Afferent impulses*)—

सुपुम्ना में आनेवाले संज्ञा के वेग तीन प्रकार के होते हैं:—

(क) बाह्य (*Exteroceptive*)—ये पोषा, ताप, शीत तथा स्पर्श से संबद्ध होते हैं और त्वचा के पृष्ठभाग पर संज्ञावह नाड़ियों के प्रान्त भाग में उत्पन्न होते हैं । ये स्थूल (*Protopathic*) तथा सूक्ष्म (*epicritic*) दो प्रकार के होते हैं ।

(ख) गम्भीर (*Proprioceptive*)—ये गत्यात्मक (*Motorial or kinaesthetic*) संज्ञाओं से सम्बन्धित हैं और पेशियों, कण्ठराओं तथा सन्धियों में स्थित प्रान्तभागों में उत्पन्न होते हैं ।

(ग) आन्तरिक (*Enteroceptive*)—ये आंतियों में उत्पन्न संज्ञाओं से सम्बन्धित रहते हैं ।

वेगों का संवहन

संज्ञावेगों को लानेवाले सूत्र पश्चिम मूलों के द्वारा सुपुम्ना में प्रविष्ट होकर

सौपुग्निक नाडियों से एकदम मिल जाते हैं। इसलिये सौपुग्निक नाड़ी के विकार में उससे संबद्ध अवयव की संज्ञा का नाश हो जाता है। इन वेगों की पुनः व्यवस्था सुषुम्ना में होती है जिससे उसकी विभिन्न तन्त्रिकाओं के द्वारा वे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उनमें कुछ उसी पार्श्व में तथा कुछ वेणीग्रन्थक्रम से दूसरे पार्श्व में चले जाते हैं।

वेगों के संवहन की दृष्टि से संज्ञावह सूत्र तीन प्रकार के होते हैं :—

(१) ह्रस्व सूत्र—ये सुषुम्ना के पश्चिम शृङ्गकोणश्रोत्रों के पास जाकर समाप्त हो जाते हैं। वहाँ से नये अक्षतन्तु निकल कर आशाकन्द पहुँचते हैं और वहाँ से पुनः नये तन्तु उन वेगों को मस्तिष्कपरिसर में पहुँचाते हैं। ये सूत्र उत्तान एवं गम्भीर पीड़ा तथा ताप और शीत की शूल संज्ञा का संवहन करते हैं।

(२) दीर्घसूत्रः—ये पश्चिमान्तिका एवं पश्चिम पारिवर्ती तन्त्रिका के द्वारा सुषुम्ना की सम्पूर्ण लम्बाई तक जाते हैं और सुषुम्नाशीर्षक में दशा एवं कोणकन्दिका के पास समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से नये सूत्र (आन्तर धातुक सूत्र) निकल कर वह्निका के द्वारा आशाकन्द में पहुँचते हैं। ये सूत्र गम्भीर गत्यात्मक संज्ञाओं तथा सूक्ष्म स्पर्श संज्ञा का संवहन करते हैं।

(३) मिश्रसूत्र—ये सुषुम्ना की शृङ्गकन्दिका में समाप्त होते हैं। वहाँ से नये अक्षतन्तु निकल कर सुषुम्ना काण्ड के उसी पार्श्व में आगे की ओर जाकर धम्मिलक में समाप्त हो जाते हैं। इन सूत्रों के द्वारा स्पर्श एवं गम्भीर गत्यात्मक संज्ञाओं का संवहन होता है जिससे शरीर की स्थिति को बनाये रखने तथा पेशियों के सहयोगमूलक कार्यों के सञ्चालन में सहायता मिलती है।

संज्ञासंवहन का मार्ग

विभिन्न संज्ञाओं का संवहन विभिन्न मार्ग से होता है जिनका संक्षेप में नीचे निर्देश किया जाता है :—

गत्यात्मक तथा ताप, पीड़ा और स्पर्श की सूक्ष्म संज्ञाओं का मार्ग

(१) स्पर्शग्राही प्रान्तभाग।

(२) पश्चिम सौपुग्निक मूल।

(३) पश्चिमान्तिकाया पश्चिमपार्श्विकी तन्त्रिका। (४) दशाकन्दिका और कोणकन्दिका।

(५) आन्तर धातुक सूत्र।

(६) जालक सूत्र।

- (७) वह्निका वेणीबन्ध । (८) वह्निका ।
 (९) ऊर्ध्ववह्निका । (१०) मध्यमस्तिष्क का कुथवितान ।
 (११) मस्तिष्कमृणालक का कुथवितान । (१२) आज्ञाकन्द ।
 (१३) आन्तरकूर्चवह्निका । (१४) पश्चिमकर्णिका के स्पर्शसंज्ञाधिष्ठानकोषाणु ।

पीड़ा, ताप और शीत की स्थूल संज्ञा का मार्ग

- (१) संज्ञाग्राही प्रान्त भाग । (२) पश्चिम सौपुग्निक मूल ।
 (३) पश्चिम शृङ्गकोषाणु । (४) निम्न सौपुग्निक वेणीबन्ध ।
 (५) आज्ञाभिगा तन्त्रिका । (६) ऊर्ध्ववह्निका ।
 (७) आज्ञाकन्द । (८) आन्तरकूर्च वह्निका ।
 (९) पश्चिम कर्णिका ।

स्पर्श और दबाव की स्थूल संज्ञा का मार्ग

- (१) संज्ञाग्राही प्रान्तभाग । (२) पश्चिम सौपुग्निक मूल ।
 (३) पश्चिम शृङ्गकोषाणु । (४) निम्न सौपुग्निक वेणीबन्ध ।
 (५) आज्ञाभिगा तन्त्रिका । (६) ऊर्ध्व वह्निका ।
 (७) आज्ञाकन्द । (८) आन्तर कूर्च वह्निका ।
 (९) पश्चिम कर्णिका ।

उपर्युक्त मार्गों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न संज्ञायें अनेक नाडीकोषाणुओं के माध्यम से मस्तिष्क परिसर तक पहुँचती हैं । इन माध्यमस्वरूप नाडीकोषाणुओं के निम्नांकित तीन वर्ग हैं :—

१. निम्नतम सज्ञाकोषाणु (Lowest sensory neurons) :—ये पश्चिम नाडीमूलगण्ड के कोषाणु होते हैं ।

२. मध्यम सज्ञाकोषाणु (Intermediate sensory neurons) :—इनमें पश्चिम शृङ्ग के कोषाणु आते हैं जिनके अक्षतन्तु अज्ञाभिगा तन्त्रिका बनाकर पीड़ा, ताप, शीत तथा स्पर्श संज्ञाओं को आज्ञाकन्द तक पहुँचाते हैं । इसके अतिरिक्त, इसमें दक्षा एवं कोणकन्दिका के कोषाणुओं का भी समावेद होता है । जिनके

अक्षतन्तु (आन्तर धानुष सूत्र) वृद्धिका तन्त्रिका बनाकर गत्यात्मक एवं स्पर्श की सूक्ष्म संज्ञाओं को आशाकन्द तक पहुँचाते हैं ।

३. उच्चतम संज्ञाकोषाणु (Highest sensory nerons)—
इनमें आशाकन्द के कोषाणु आते हैं । इनके अक्षतन्तु, आशापरिसरीयसूत्र संज्ञा-वेगों को मस्तिष्कपरिसर में पहुँचाते हैं ।

चेष्टा के वेग (Efferent or Motor impulses)

चेष्टावेगों का संवहन करके सुषुम्नाकाण्ड शरीर की मांसपेशियों एवं आशयों की क्रियाओं का नियमन एवं नियन्त्रण करता है । मस्तिष्क के परिसरीय या आभ्यन्तर भाग तथा धम्मिल्लक में उत्पन्न कुछ वेगों का संवहन सुषुम्ना के द्वारा होता है । मस्तिष्क परिसर में उत्पन्न वेग सरला और कुटिला मुकुलतन्त्रिका के द्वारा नीचे आते हैं । मस्तिष्क के आभ्यन्तर भाग और धम्मिल्लक में उत्पन्न वेग अन्य मार्गों यथा पारवर्षपूर्वा, शोणजा और विषाणिका तन्त्रिकाओं से नीचे जाते हैं । ये चेष्टावेग अन्ततः सुषुम्ना के अग्रिम शृङ्खलाकोषाणुओं में पहुँचते हैं ।

ऐच्छिक चेष्टावेग का मार्ग

- | | |
|--|---------------------------------|
| (१) बृहत् करीराकृति कोषाणु | (२) विसारिसूत्र |
| (३) आन्तर वृच्चवृद्धिका | (४) मस्तिष्कमृणालक का विसवितान |
| (५) मध्यमस्तिष्क का विसवितान | (६) उष्णीषक के करीराकृति कोषाणु |
| (७) सुषुम्नाशीर्षक के करीराकृति कोषाणु | (८) कुटिला मुकुलतन्त्रिका |
| (९) सरला मुकुलतन्त्रिका | (१०) अग्रिम शृङ्गकोषाणु |
| (११) चेष्टावह नाड़ी | |
| (१२) ऐच्छिक पेशियों से संबद्ध चेष्टावह नाड़ियों के प्रान्त भाग । | |

इसके अतिरिक्त चेष्टा वेगों का संवहन पार्वर्षपूर्वा, शोणजा एवं विषाणिका तन्त्रिकाओं के द्वारा भी होता है । यह मार्ग मुकुलेतर मार्ग (Extra-pyramidal path) कहते हैं । इस मार्ग में निम्नांकित कन्दिकापे होती हैं :—

१. शोणकन्दिका २. राजिलपिण्ड का शुक्तिगर्भ जिससे सूत्र निकलकर निम्नांकित स्थानों में जाते हैं:—

(क) शोणकन्दिका (ख) श्यामपत्रिका (ग) कन्दाधरिक प्रदेश
पेशियों का नियन्त्रण

शरीर की पेशियों पर अनेक कारणों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है जिससे उनका कार्य सहयोगिता के आधार पर हो पाता है । ये कारण निम्नलिखित हैं:—

१. पोषणात्मक नियन्त्रण (Idiodynamic control)—यह नियन्त्रण सुषुम्ना के अग्रिमशृंगकोषाणुओं से होता है ।

२. प्रत्यावर्तनात्मक नियन्त्रण (Reflex control)—सुषुम्ना के पश्चिम मूल के कोषाणुओं का अग्रिमशृंगकोषाणुओं पर प्रभाव पड़ता है जिससे प्रत्यावर्तन क्रिया के द्वारा पेशियों में सदैव संकोच बना रहता है ।

३. सन्तुलनात्मक नियन्त्रण (Vestibulo-equilibratory control)—शुण्डिकाओं तथा शुम्बिकाधार से अग्रिमशृंगकोषाणुओं में वेग आते रहते हैं जिससे शरीर का सन्तुलन बना रहता है ।

४. सहयोगात्मक नियन्त्रण (Synergic or cerebellar control)—धम्मिलक से अग्रिमशृंगकोषाणुओं में वेग आते हैं जिससे सहयोगिता के आधार पर पेशियों की क्रिया का नियमन होता है ।

५. संयुक्त स्वयंजात नियन्त्रण (Associated automatic control)—राजिलपिण्ड से वेग उत्पन्न होकर अग्रिमशृंगकोषाणुओं में पहुँचते हैं जिससे घूमना दौड़ना आदि जटिल गतियों में विविध पेशियों की क्रिया का नियन्त्रण होता है ।

६. वैच्छिक नियन्त्रण (Volitional control)—इच्छा के अधीन खेलन आदि जटिल क्रियाओं का सम्पादन होता है । इच्छा के वेग अग्रिम कर्णिका में उत्पन्न होते हैं और मुकुलतन्त्रिका के द्वारा अग्रिमशृंगकोषाणुओं में पहुँचते हैं । इससे इच्छा के अनुसार पेशियों में आवश्यक संकोच होता है । इस नियन्त्रण में बाधा होने से निरोधक प्रभाव पड़ हो जाता है और पेशियाँ आवश्यकता से अधिक संकुचित फलतः कड़ी हो जाती हैं ।

संज्ञावह नाड़ियों को उत्तेजित करने से जब चेष्टा का प्रारम्भ हो तो उस क्रम में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रत्यावर्तित क्रिया कहते हैं । दूसरे शब्दों में, अन्तर्मुख नाड़ीवेग का केन्द्रीय कोषाणुसमूह के द्वारा बहिर्मुख नाड़ीवेग में अनैच्छिक रूपान्तरण प्रत्यावर्तित क्रिया कहलाती है ।

प्रत्यावर्तित क्रिया की मौलिक विशेषता यह है कि मस्तिष्क परिसर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । अतः यह संज्ञावह नाड़ियों की उत्तेजना से अनैच्छिक रूप में उत्पन्न होता है । यद्यपि यह क्रिया अनैच्छिक होती है तथापि क्रिया के समय या बाद में इसकी प्रतिक्रिया चेतना में होती है ।

• प्रत्यावर्तित क्रिया का रूप

यान्त्रिक दृष्टि से प्रत्यावर्तित क्रिया के तीन भाग होते हैं :—

(१) संज्ञावह भाग (सुपुम्नाकाण्ड तक)

(क) संज्ञाग्राहक प्रान्तभाग जिसको उत्तेजना से वेग उत्पन्न होता है ।

(ख) संज्ञावह नाड़ी जो उत्तेजना को केन्द्रभाग तक पहुँचाता है ।

(२) केन्द्र—यह सुपुम्ना की धूसर वस्तु या केन्द्रीय नाडीमण्डल के किसी भाग में होता है जहाँ अन्तर्मुख वेग बहिर्मुख में परिणत होते हैं ।

(३) चेष्टावह भाग (चेष्टोत्पादक अंग तक)

(क) चेष्टावह नाड़ी ।

(ख) चेष्टोत्पादक अंग—पेशीसूत्र ।

इन तीनों भागों को मिलाकर 'प्रत्यावर्तन वक्र' (Reflex arc) कहते हैं । प्रायः संज्ञावह तथा चेष्टावह भागों का केन्द्र से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होकर उनके बीच में एक या दो नाड़ीकोषाणु माध्यमभूत होते हैं । उन्हें माध्यम नाड़ीकोषाणु (Internuocials or intercalated neurons) कहते हैं ।

वर्गीकरण

(क) यान्त्रिक दृष्टि से—प्रत्यावर्तन चार प्रकार का होता है :—

१. सामान्य प्रत्यावर्तन—(Simple reflex)—इसमें दो ही नाड़ी कोषाणु होते हैं । संज्ञावह नाड़ीकोषाणु पश्चिम मूल में तथा चेष्टावह कोषाणु अग्रिमशृंग में होते हैं ।

२. सयुक्त प्रत्यावर्तन (Intercalated reflex) इसमें संज्ञावह तथा चेष्टावह कोषाणुओं के बीच में एक और सयोजक कोषाणु होता है ।

३. वेणीयन्ध प्रत्यावर्तन (Crossed reflex)—इसमें माध्यमभूत संयोजक कोषाणु दूसरे पार्श्व के चेष्टावह कोषाणु से संबद्ध होता है । कभी कभी चेष्टावह कोषाणु ही विपरीत पार्श्व के चेष्टावह कोषाणु से संबद्ध होता है ।

४. जटिल प्रत्यावर्तन (Complex reflex)—इसमें संज्ञावह कोषाणु का अचतन्तु समस्त सुषुम्नाकाण्ड से होकर सुषुम्नाशीर्षक में समाप्त हो जाता है तथा मार्ग में उसकी कुछ शाखाएँ निकल कर सौषुम्निक चेष्टावह कोषाणुओं से संबद्ध होती है ।

(ख) चेष्टोत्पादक अंग की दृष्टि से :—प्रत्यावर्तित क्रिया तीन प्रकार की होती है :—

१. एकाकी (Simple)—जिममें केवल एक ही पेशी भाग लेती है यथा निमेष में केवल नेत्रनिमीलनी पेशी का ही संकोच होता है ।

२. सहयुक्त (Co-ordinated)—इसमें अनेक पेशियाँ कार्य करती हैं । किन्तु उनका संकोच क्रमबद्ध और नियमित होता है जिससे सोद्देश्य गतियाँ होती हैं ।

३. साक्षेप (Convulsive)—इसमें भी अनेक पेशियाँ भाग लेती हैं, किन्तु उनका संकोच क्रमहीन और अनियमित होता है जिससे अनियमित और निरुद्देश्य गतियाँ होती हैं ।

(ग) संज्ञाग्राही प्रान्तभाग की दृष्टि से :—तीन प्रकार के होते हैं :—

१. बाह्य (Exteroceptive)—बाह्य उत्तेजक कारणों यथा ताप, शीत, पीड़ा, स्पर्श, रूप, शब्द आदि से प्रान्तभागों के उत्तेजित होने पर ये उत्पन्न होती हैं ।

२. गम्भीर (Proprioceptive)—ये शरीरस्थ गम्भीर प्रान्तभागों के उत्तेजित होने पर उत्पन्न होती हैं यथा गत्यात्मक संज्ञाएँ ।

३. आशयिक (Enteroceptive)—विविध आशयों में स्थित प्रान्त भागों की उत्तेजना से ये उत्पन्न होते हैं ।

(घ) अवधि की दृष्टि से:—दो प्रकार के होते हैं:—

(१) अल्पावधिक (Phasic)—इनकी अवधि अल्प होती है यथा बाह्य प्रत्यावर्तित क्रियाओं से शक्ति संकोच होता है ।

(२) चिरावधिक (Tonic or postural)—यह अधिक देर तक रहती है यथा गम्भीर प्रत्यावर्तित क्रियाओं से उत्पन्न संकोच ।

(च) अधिष्ठान की दृष्टि से:—चार प्रकार के होते हैं:—

(१) उच्चान (Superficial)—यह वास्तविक प्रत्यावर्तित क्रिया है और इसमें त्वचा में स्थित संज्ञाबहु नादियों की उत्तेजना से पेशी संकोच उत्पन्न होते हैं ।

(२) गम्भीर (Deep or tendon reflex)—ये वास्तविक प्रत्यावर्तित क्रियाएँ नहीं हैं और इनका प्रारम्भ किंचित् प्रसारित पेशी की कण्डरा पर आघात करने से होता है ।

(३) ओशयिक (Visceral or organic)—इसमें निगरग, मूत्र-रसाग, पुरीपोत्सर्ग आदि आन्तरिक क्रियाएँ सम्मिलित हैं ।

(४) उच्चतर (Higher reflex)—इसका अधिष्ठान सुषुम्ना के ऊपर मस्तिष्क के अन्यभाग, सुषुम्नाशीर्षक, उज्जीपक और मध्यमस्तिष्क है ।

(छ) उत्तेजक की दृष्टि से:—

(१) प्राकृत (Normal or functional)—जीवन की आवश्यक क्रियाएँ इसमें सम्मिलित हैं ।

(२) वैकृत (Abnormal or Nociceptive)—शरीर के लिये हानिकारक उत्तेजकों से इनका प्रारम्भ होता है ।

प्रत्यावर्तित क्रियाओं के गुणधर्म

प्रत्यावर्तित क्रिया का स्वरूप उत्तेजक के स्वरूप, तीव्रता, उत्तेजना का स्थान, केन्द्रों की स्थिति तथा निकटवर्ती केन्द्रों की स्थिति पर निर्भर होता है । संज्ञाहर द्रव्यों का प्रयोग करने पर ये क्रियाएँ नष्ट या मन्द हो जाती हैं तथा कुचला से बढ़

जाती हैं। सौपुम्निक केन्द्रों की क्रिया मुख्यतः श्वसन और रक्त संवहन पर निर्भर है। रक्ताल्पता और श्वासावरोध से प्रत्यावर्तित क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं।

विश्रामकाल—(Refractory phase)—अन्य पेशी—क्रियाओं के समान इनमें भी विश्रामकाल होता है जिसमें इनका प्रादुर्भाव नहीं होता।

प्रत्यावर्तनकाल—(Reflex time)—उत्तेजना देने और क्रिया प्रारम्भ होने में जो समय लगता है उसे प्रत्यावर्तनकाल कहते हैं।

(क) पूर्ण प्रत्यावर्तनकाल (Total reflex time)—समस्त प्रत्यावर्तन में जो समय लगता है उसे पूर्ण प्रत्यावर्तनकाल कहते हैं।

(ख) प्रान्तीय प्रत्यावर्तन काल—(Pripheral reflex time)—केन्द्र से प्रान्तीय नादी के द्वारा पेशी तक वेग के पहुँचने में जो समय लगता है उसे प्रान्तीय प्रत्यावर्तनकाल कहते हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यावर्तनकाल (Central reflex time)—पूर्ण प्रत्यावर्तनकाल से प्रान्तीय प्रत्यावर्तनकाल को निकाल देने पर जो शेष बचे वह केन्द्रीय प्रत्यावर्तनकाल कहलाता है।

(घ) अवशिष्ट प्रत्यावर्तनकाल (Reduced reflex time)—नादी-केन्द्रों में जो समय लगता है उसे कहते हैं। संज्ञाबह और चेष्टाबह नादियों के द्वारा संवहन में जो समय लगता है उसे पूर्ण प्रत्यावर्तनकाल में से घटा देने पर यह निकलता है।

प्रत्यावर्तित क्रियाओं का निरोध

(१) मस्तिष्कजन्य निरोध (Cerebral inhibition)—स्वभावतः सौपुम्निक प्रत्यावर्तित क्रियाओं पर मस्तिष्क का निरोधक प्रभाव पड़ता रहता है।

(२) रासायनिक निरोध (Chemical inhibition)—

कुछ रासायनिक द्रव्यों यथा सोडियम क्लोराइड आदि से भी इनका निरोध होता है।

(३) ऐच्छिक निरोध (Voluntary inhibition)—

इच्छाशक्ति से भी उनका निरोध किया जा सकता है:—

यथा—

(क) गुदगुदाने के समय इच्छाशक्ति से पेशीचेष्टाओं का नियंत्रण किया जा सकता है ।

(ख) छाँक को भी इच्छा से रोका जा सकता है ।

(ग) मूत्रोत्सर्ग केन्द्र की क्रिया पर भी ऐच्छिक नियंत्रण होता है ।

(घ) इतिहास में बलिदान के ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें प्राणयात्रिक प्रत्यावर्तित क्रियाओं पर विजय पाई गई है ।

(४) समसामयिक उत्तेजनाजन्य निरोध (Inhibition by simultaneous inhibition)

खरचा के दो विभिन्न भागों को उत्तेजित करने से तीव्र उत्तेजक दुर्बल को दबा देता है तथा वैकृत उत्तेजक प्राकृत को दबा देता है ।

प्रत्यावर्तित क्रियाओं की वृद्धि और सुविधान

कभी कभी समसामयिक उत्तेजना से प्रत्यावर्तित क्रिया का निरोध न होकर उसकी वृद्धि हो जाती है (Augmentation) । ऐसा समझा जाता है कि यदि दो उत्तेजनार्थ एक संश्लेषण मार्ग में मिलें तो निरोध और यदि एक ही चेष्टावह मार्ग में मिलें तो वृद्धि होगी ।

किसी उत्तेजना के द्वारा प्रत्यावर्तित क्रिया होने पर दूसरी चार जय वही उत्तेजना दी जाती है तो क्रिया तीव्र और तीव्र होती है । इसे सुविधान (Facilitation) कहते हैं । इसका कारण यह समझा जाता है कि उत्तेजनाओं की पुनरावृत्ति से भावीसन्धियों का प्रतिरोध दूर हो जाता है और मार्ग प्रशस्त हो जाता है जिससे क्रिया समुचित रूप से हो पाती है । इसके अतिरिक्त, एक मार्ग से जय उत्तेजना का येग जाता है तो उसी मार्ग से बराबर जाने की प्रवृत्ति हो जाती है और बराबर जाने से वह मार्ग आसान भी हो जाता है । इससे अभ्यास का निर्माण होता है ।

श्रम

जिस प्रकार पेशियों में श्रम उत्पन्न होता है उसी प्रकार प्रत्यावर्तित क्रियाओं का भी श्रम होता है। यदि उत्तेजकों का निरन्तर अधिक देर तक प्रयोग किया जाय या ओपजन की कमी हो तो श्रम उत्पन्न हो जायगा और क्रिया बन्द हो जायगी। इस श्रम का अधिष्ठान संज्ञावह मार्ग की नाडीसन्धि है, अतः श्रम की अवस्था में भी सीधे चेष्टावह नाडी को उत्तेजित कर क्रिया उत्पन्न की जा सकती है।

मिथ्याप्रत्यावर्तन (Pseudo reflex or axon reflexes)

कभी कभी स्वतंत्र नाडीमण्डल की ग्रंथियों से भी प्रत्यावर्तित क्रिया होती है। इसे मिथ्याप्रत्यावर्तन कहते हैं। यह क्रिया शरीर के कुछ भागों विशेषतः त्वचा के रक्तसंवहन के लिए विशेष उपयोगी है। त्वचा पर कोई क्षोभक पदार्थ लगाने पर जो छाली होती है उसका कारण यही है। इससे वहाँ का रक्तसंवहन बढ़ जाता है जिससे शरीर की रक्षा होती है। ऐसा समझा जाता है कि त्वचा पर क्षोभक पदार्थों के सम्पर्क से बहिस्त्वक् के कोषाणुओं द्वारा हिस्टेमिन के समान एक रासायनिक द्रव्य उत्पन्न होता है, जिसका प्रभाव सांवेदनिक नाडीमण्डल पर होकर यह क्रिया होती है।

उत्तान प्रत्यावर्तित क्रियायें

व्यक्ति और वायु के अनुसार इनमें भिन्नता पाई जाती है। बच्चों तथा स्त्रियों में अधिक आसानी से उत्पन्न होती है। यदि दुर्घटना या रोग के कारण सुषुम्ना का कोई भाग विकृत हो जाय, तो उस भाग से सम्बन्धित क्रियायें नष्ट हो जाती हैं, किन्तु उसके ऊपर के भागों से सम्बन्धित क्रियायें प्राकृत रहती हैं। यही नहीं, उसके नीचे के केन्द्रों से होने वाली क्रियायें भी नष्ट हो जाती हैं, इसका कारण यह है कि इन क्रियाओं का संबंध मस्तिष्क से होता है, अतः उससे सम्बन्ध विच्छिन्न होने पर ये नष्ट हो जाती हैं। निम्नांकित तालिका में उत्तान प्रत्यावर्तित क्रियाओं का स्पष्ट निर्देश दिया जाता है :—

(८)

प्रत्यावर्तित क्रिये तथा का उत्तेजित भाग	परिणाम	केन्द्र	
१. गुदीय (Anal)	मूलाधार प्रदेश	गुदसंकोचनी का संकोच	पश्चिम त्रिक-प्रदेश
२. पादतलीय (Plantar)	पादतल	अंगुष्ठों का संकोच और पैर को खींचना	१-२ त्रिक-प्रदेश
३. करतलीय (Palmar)	करतल	अङ्गुलियों का संकोच	८ ग्रैवेयक और १ वल
४. नितम्बीय (Gluteal)	नितम्ब	नितम्ब पिंडका पेशियों का संकोच	४-५ कटि
५. घृष्णीय (Cremasteric)	ऊरु का अन्तःपार्श्व	घृष्णों का संकोच	१-२ कटि
६. उदर्य (Abdominal)	उदर का पार्श्वभाग	उदर्य पेशियों का संकोच	८-१२ वल
७. हृदयाधरिकीय (Epigastric)	५ और ६ पशुका-न्तराल पर वल का पार्श्वभाग	हृदयाधरिक प्रदेश का संकोच	४-६ वल
८. स्कन्धीय (Scapular)	अन्तःस्कन्धीय प्रदेश	स्कन्धपेशियों का संकोच	५ ग्रैवेयक से १ वल
९. निमेष (Corneal or wink)	नेत्र का स्वच्छ भाग तथा नेत्रवर्ध	नेत्रनिमीलनी का संकोच	५ तथा ७ वर्षी दीर्घप्यनादी की कन्दिकायें
१०. कनीनिकीय (Pupillary)	प्रीवा	कनीनक का प्रसार	चाक्षुपसीधु-ग्निककेन्द्र (Oculospinal centre)

गम्भीर प्रत्यावर्तित क्रियायें

कण्ठराजों को थोड़ा प्रसारित अवस्था में रख कर उन पर हल्का आह्वान करने से पेशियों का जो सहसा संकोच होता है उसी को गम्भीर प्रत्यावर्तित क्रिया कहते हैं।

ये शरीर की स्वाभाविक स्थिति को बनाये रखने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करनेवाली पेशियों में यह स्पष्टतः पाई जाती है। अतः इन्हें स्थित्यात्मक प्रत्यावर्तित क्रिया (Postural reflex) भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं:—

१. गतिकालीन (Stato-kinetic)—शरीर में गति होने के समय ये उत्पन्न होती हैं।

२. विधाम कालीन (Static)—ये विधाम के समय होती हैं। यह पुनः दो भागों में विभक्त की गई हैं:—

(क) रचनात्मक (Stance)—इसमें शरीर एक विशिष्ट स्थिति में आ जाता है।

(ख) संशोधनात्मक (Righting reflex)—शरीर की स्थिति विकृत हो जाने पर इनके द्वारा पुनः स्रोधित हो जाती है। ये प्रत्यावर्तित क्रियायें निम्नांकित अङ्गों में उत्पन्न होती हैं:—

(१) कान्तारक—(कान्तारकीय संशोधनात्मक प्रत्यावर्तन)

(२) नेत्र—(ध्राष्ट्र संशोधनात्मक प्रत्यावर्तन)

(३) त्वचा—(शरीर संशोधनात्मक प्रत्यावर्तन)

इन स्थित्यात्मक प्रत्यावर्तित क्रियाओं के केन्द्र सुपुम्ना के ऊर्ध्व ग्रैवेयक भाग, सुपुम्ना शीर्षक तथा मध्यमस्तिष्क में स्थित हैं।

रोग विज्ञान की दृष्टि से भी गम्भीर प्रत्यावर्तित क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। इससे यह पता चलता है कि विकृति ऊर्ध्व चेष्टावह कोषाणुओं में है या अधर चेष्टावह कोषाणुओं में। ऊर्ध्व चेष्टावह कोषाणुओं की विकृति में ये क्रियायें बढ़ जाती हैं और अधर कोषाणुओं की विकृति में घट जाती हैं। इससे यह भी मालूम होता है कि सुपुम्ना का कौन सा भाग विकृत है।

गम्भीर प्रत्यावर्तित क्रियाओं का स्पष्ट स्वरूप निम्नांकित तालिका से ज्ञात होगा:—

प्रत्यावर्तित क्रिया	आहत कण्डरा	परिणाम	सुपुम्नाकेन्द्र
१. जान्वीय (Knee jerk)	जान्वीय कण्डरा	चतुःशिरष्का प्रसारिणी पेशी का संकोच, जंघा का प्रसार	२-३-४ कटि- प्रदेश
२. गुल्फीय (Ankle jerk)	पिण्डिका कण्डरा	जंघापिण्डिका का संकोच, पाद का प्रसार	१-२ त्रिक
३. द्विशिरस्कीय (Biceps reflex)	द्विशिरस्का कण्डरा	द्विशिरस्का का संकोच, अग्रबाहु का संकोच	५-६ प्रवेयक
४. त्रिशिरस्कीय (Triceps reflex)	त्रिशिरस्का कण्डरा	त्रिशिरस्का का संकोच, अग्रबाहु का प्रसार	६-७ प्रवेयक



चित्र ५४-जान्वीय प्रत्यावर्तन

जान्वीय प्रत्यावर्तित क्रिया निम्नांकित अवस्थाओं में यद् जाती है:—

१. ऊर्ध्व चेष्टावद् नाडी कोषाणुओं के सभी विकारों में ।
२. उच्च केन्द्रों का निरोधक प्रभाव प्रकृत होने पर—यथा अपतन्त्रक ।
३. प्रत्यावर्तन वक्र की क्षोभ्यता यद् जाने से—यथा हनुस्तम्भ और कुचला विष में ।

४. किसी शारीरिक रोग में । ५. भावायेदा की अवस्था में ।

प्रत्यावर्तित क्रिया निम्नांकित अवस्थाओं में कम हो जाती है :—

१. चेष्टाचह कोषाणु के विकार में यथा—शैशव पक्षाघात ।

२. पश्चिम मूलों के विकार में ।

३. द्वितीय कटिप्रदेश में स्थित सुषुम्ना के स्थायी विकार ।

४. विषमयता—सहित औपसर्गिक रोग ।

५. मानसिक विक्षाम यथा निद्रा ।

६. निद्रानाश या धम की अवस्था ।

७. न्यूमोनिया ।

८. अपस्मार के आक्रमण के बाद ।


९. मूत्र विषमयता—जन्य सन्यास ।

१०. अहिफेन विष ।

इस प्रकार ज्ञान्वीय प्रत्यावर्तित क्रिया संपूर्ण नाडी संस्थान, विशेषतः सुषुम्ना-काण्ड की स्थिति की निर्देशिका है ।

पिण्डिकाकुञ्चन (Ankle clonus)

कण्डरा को सहसा फैलाने पर पेशी में जो नियमित संकोच होते हैं उसे आकुञ्चन कहते हैं । जब तक कण्डरा पर दबाव रहता है तब तक संकोच होता रहता है ।



पाद को ऊपर की ओर मोड़ लो और पादतल को हाथ से दबाओ जिससे पिण्डिका-कण्डरा दबाव के कारण खिंच जाय तो पिण्डिका-पेशी में संकोच होने लगेगा । यह संकोच नियमित रूप से लगभग ८ प्रतिसेकण्ड होता है । स्वभावतः यह स्वस्थ व्यक्तियों में नहीं मिलता, किन्तु कुछ विकारों में, जिनमें ज्ञान्वीय प्रत्यावर्तन बढ़ जाता है, यह देखा जाता है ।

चित्र ५५—पिण्डिकाकुञ्चन

आशयिक प्रत्यावर्तित क्रियायें

इन क्रियाओं में मूत्रोत्सर्ग तथा पुरीषोत्सर्ग की क्रिया व्यवहारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

मूत्रोत्सर्ग का केन्द्र द्वितीय त्रिकप्रदेश में स्थित है। जय मूत्राशय में मूत्रसंचित होकर वहां दबाव उत्पन्न करता है तो यहां से संज्ञा के वेग केन्द्र में पहुंचते हैं। साधारणतः यह दबाव कम से कम १६० मि. मी. (जल का) होना चाहिये। चेष्टा-वह नाड़ियां दो हैं:—

(१) अधिचरितकी नाड़ी (*Nervi eregens*) जिसकी उत्तेजना से मूत्राशय का संकोच और मूत्रमार्गसंकोचनी का प्रसार होता है।

(२) सबाहिनी नाड़ी (*Hypogastric Nerves*)—इसकी उत्तेजना से मूत्राशय का प्रसार तथा मूत्रमार्गसंकोचनी का संकोच होता है।

घर्चों में पर्याप्त दबाव के कारण यह क्रिया अनैच्छिक; रूप से होती है, किन्तु चयस्कों में यह क्रिया ऐच्छिक है और इसका विरोध इच्छानुसार किया जा सकता है। जय मूत्राशय में पर्याप्त दबाव हो जाता है तो इसकी संज्ञासुपुम्नास्थित केन्द्र तकही नहीं रहती, बरिक् और ऊपर तक जाती है, जिससे मूत्रत्याग की इच्छा होती है। मस्तिष्क से वेग आकर सुपुम्ना केन्द्र को प्रभावित करते हैं और तब यह क्रिया होती है। इस प्रकार स्वभावतः यह क्रिया मस्तिष्क के नियन्त्रण में होती है। जय आघात के कारण मस्तिष्क का प्रभाव निरुद्ध हो जाता है तो इच्छा के बिना ही स्वतन्त्र रूप से मूत्रत्याग होता रहता है।

पुरीपोत्सर्ग की क्रिया भी इसी प्रकार होती है जिसका घर्जन पाचनसंस्थान में किया गया है।

उच्चतर प्रत्यावर्तित क्रियायें

इन क्रियाओं के केन्द्र सुपुम्नाशीर्षक, उष्णीषरू तथा मध्यमस्तिष्क में होते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख नीचे किया जाता है।

सुपुम्नाशीर्षक की प्रत्यावर्तित क्रियायें

(१) कास—प्रसनिका, स्वरपन्त्र, श्वासनलिका और श्वासप्रणालिका की रलेन्मल कला तथा कर्णकुहर की उत्तेजना से उत्पन्न होता है।

संज्ञावह नाड़ी—प्राणदा।

केन्द्र—प्राणदा की शृष्टकन्दिका और यहां से श्वासनकेन्द्र तक।

(२) निगरण—प्रसनिका की दीवाल की उत्तेजना से उत्पन्न होता है ।

संज्ञावह नाडी—प्राणदा तथा कण्ठरासनी नाडी की शाखायें ।

केन्द्र—प्राणदा और कण्ठरासनी की कन्दिका ।

(३) वमन—आमाशय, अन्त्रनलिका, प्रसनिका तथा अन्तःकर्ण की वृद्ध उत्तेजना से उत्पन्न होता है ।

संज्ञावह नाडी—प्राणदा और कण्ठरासनी नाडियाँ ।

केन्द्र—प्राणदा की पृष्ठकन्दिका में स्थित वमनकेन्द्र ।

चेष्टावह—प्राणदा की आमाशयिक शाखायें, प्राचीरिका नाडी तथा उदर-पेशियों की चेष्टावह नाडियाँ ।

(४) छालास्राव—मुखगुहा की रलेष्मल कला के उत्तेजित होने से उत्पन्न ।

संज्ञावह नाडियाँ—रसमाही नाडियाँ ।

केन्द्र—छालाकेन्द्र ।

(५) चबयु—नासा की रलेष्मल कला की उत्तेजना से उत्पन्न ।

संज्ञावह नाडी—त्रिधारा ।

केन्द्र—श्वसनकेन्द्र ।

(६) घूपण—मुख की रलेष्मल कला की उत्तेजना से उत्पन्न ।

संज्ञावह नाडी—त्रिधारा और कण्ठरासनी नाडियाँ ।

केन्द्र—श्वसनकेन्द्र ।

चेष्टावह—अधोजिह्विका, कण्ठरासनी और मौखिकी नाडियाँ ।

उष्णीषक की प्रत्यावर्तित क्रियायें

(१) अधोहन्वीय प्रत्यावर्तन (Mandibular reflex)—चिबुक पर आह्वान करने से अधोहनु का उन्नमन ।

संज्ञावह नाडी—त्रिधारा ।

केन्द्र—चर्वणकेन्द्र ।

चेष्टावह नाडी—त्रिधारा का चेष्टावह विभाग ।

(२) गण्डीय प्रत्यावर्तन (Zygomatic reflex)—गण्डस्थल पर आह्वन करने से अधोदन्त का उसी पार्श्व में बाहर की ओर गति ।

संज्ञावह नाडी—त्रिधारा ।

केन्द्र—चर्वणकेन्द्र ।

चेष्टावह नाडी—द्विदन्तकपर्णी और श्लिख पेशियों से संबद्ध त्रिधारा की चेष्टावह शाखायें ।

(३) नासा-प्रत्यावर्तन (Nasal reflex of Bechterew)—नासा की श्लेष्मलकला को पंख या कागज से छूने पर उसी पार्श्व की मौखिकी पेशियों का संकोच ।

संज्ञावह नाडी—त्रिधारा ।

केन्द्र—मौखिकी कन्दिका ।

चेष्टावह नाडी—मौखिकी नाडी की शाखायें ।

(४) भ्रूतोरणिक प्रत्यावर्तन (Supra-orbital reflex)—भ्रूतोरणिका पर आह्वन करने से उसी पार्श्व की पलक का गिरना ।

संज्ञावह नाडी—त्रिधारा ।

केन्द्र—मौखिकी कन्दिका ।

चेष्टावह नाडी—नेत्रनिमीलनी पेशी से संबद्ध मौखिकी नाडी की शाखायें ।

(५) नेत्रवर्त्तीय-प्रत्यावर्तन—(Conjunctival reflex)—

स्वच्छसण्डल के ऊपर नेत्रवर्त्त को छूने से नेत्र पलक का वन्द हो जाना ।

संज्ञावहनाडी—त्रिधारा

केन्द्र—मौखिकी कन्दिका

चेष्टावहनाडी—नेत्रनिमीलनी से संबद्ध मौखिकी नाडी की शाखायें ।

(६) आश्रयी प्रत्यावर्तन—(Lachrymal reflex)—

स्वच्छसण्डल के ऊपर नेत्रवर्त्त को छूने से अश्रुस्राव होना ।

संज्ञावहनाडी—त्रिधारा

चेष्टावहनाडी—त्रिधारा के चाक्षुषविभाग की आश्रयी शाखायें

(७) नेत्रवर्त्मधोहन्दीय प्रत्यावर्तन (Conjunctivo-mandibular Reflex)—

स्वच्छमण्डल के ऊपर नेत्रवर्त्म को टूटने से अधोहनु का उसी ओर कर्पण ।

संज्ञावहनादी—त्रिधारा

केन्द्र—चर्वणकेन्द्र

चेष्टावहनादी—त्रिधारा का चेष्टावह विभाग ।

(८) श्रोत्रोद्य प्रत्यावर्तन (Auditory reflex)—

आकस्मिक शब्द से पलकों का क्षणिक निमीलन ।

संज्ञावहनादी—श्रुतिनादी की शम्यकशाखा

केन्द्र—सप्तमी नाडी कन्दिका

चेष्टावहनादी—नेत्रनिमीलनी से संबद्ध मौखिकी नाडी की शाखा ।

(९) श्रोत्रनेत्रीय प्रत्यावर्तन (Audito-oculogyrio reflex)—

आकस्मिक कोलाहलो से दोनों नेत्रों का उसी दिशा में घूमना ।

संज्ञावहनादी—श्रुतिनादी की शम्यकशाखा

केन्द्र—षष्ठी नाडी कन्दिका

चेष्टावहनादी—बहिर्दर्शिनी नेत्रपेदी से सम्बद्ध षष्ठी नाडी की शाखायें तथा विपरीत पार्श्व की अन्तर्दर्शिनी से सम्बद्ध तृतीय नाडी की शाखायें ।

मध्यमस्तिष्क की प्रत्यावर्तित क्रियायें

ये सब नेत्र से सम्बद्ध हैं, अतः उनका विशिष्ट वर्णन चक्षु के प्रसंग में किया जायगा । इनमें निम्नलिखित हैं :—

१. प्रकारा प्रत्यावर्तन (Light reflex)

२. द्विपार्श्विक प्रकाश प्रत्यावर्तन (Consensual light reflex)

३. आश्चर्यिक प्रकाश प्रत्यावर्तन (Emergency light reflex)

४. वेन्द्रीकरण प्रत्यावर्तन (Accomodation reflex)

स्वतन्त्र नाडीमण्डल

यह नाडीसंस्थान का वह भाग है जो सभी स्वतन्त्र पेशियों और स्नायुओं का

नियन्त्रण करता है । शरीर की क्रियाओं में कुछ ऐसी होती हैं जो प्राणयात्रा के लिए आवश्यक हैं यथा हृदय का नियमित संकोच । इन्हीं क्रियाओं पर स्वतन्त्र नाडीमण्डल का नियन्त्रण होता है । इस संस्थान से संबद्ध शरीर के निम्नलिखित अंग हैं:—

१. हृदय तथा रक्तवाहिनियाँ ।

२. पाचनलिका, यकृत और प्लीहा ।

३. श्वसनलिका ।

४. प्रजनन और मूत्रमार्ग ।

५. नेत्र के कुछ भाग—कनीनक, सन्धानमण्डल, अंशुग्रन्थि आदि ।

६. सभी स्वतन्त्र पेशियाँ और स्नायु ग्रन्थियाँ ।

स्वतन्त्र नाडीमण्डल के दो भाग होते हैं:—

१. सांवेदनिक (Sympathetic)

२. परसांवेदनिक (Para Sympathetic)—इसके पुनः दो भाग हैं:—

(क) शीर्षिक (Cranial)—(मध्यमस्तिष्क और सुषुम्नाशीर्षक से)

(ख) त्रिद्वितीय (Sacral)

सांवेदनिक भाग वक्ष तथा कटिप्रदेश में स्थित है और परसांवेदनिक से अनु-श्रीविका और अनुकटिका स्फीति के द्वारा प्रयुक्त रहता है ।

सांवेदनिक संस्थान

इस संस्थान में तीन भाग हैं:—

(१) संज्ञावह नाडियाँ ।

(२) चेष्टावह नाडियाँ ।

(३) नाडीगण्ड (Ganglia)

नाडीगण्ड तीन प्रकार के हैं:—

(क) पार्श्विक (Lateral)—ये सुषुम्नागण्ड के पार्श्व में दोनों ओर स्थित हैं । प्रवेद्यक भाग में तीन गण्ड हैं—उत्तर, मध्यम और अधर । उत्तर नाडीगण्ड प्रथम चार प्रवेद्यक गण्डों के मिलने से बना है । इसी प्रकार पञ्चम और षष्ठ गण्डों के मिलने से मध्यम तथा सप्तम और अष्टम प्रवेद्यक गण्डों के

नाडीगण्ड बनता है। वक्षीय भाग में १० या ११, कटि और त्रिक भाग में ४ या ५ गण्ड प्रत्येक पार्श्व में हैं। वक्षीय भाग में प्रथम और द्वितीय गण्ड अधर ग्रैवेयक गण्ड के साथ मिलकर तारक गण्ड (Stellate ganglion) बनाते हैं।

ये गण्ड अग्रिम सौपुग्निक नाडियों से शुभ्र और धूसर संयोजक सूत्रों के द्वारा मिले रहते हैं। इन पार्श्विक गण्डों से सूत्र निकल कर सीधा अङ्गों में समाप्त हो जाते हैं या दूसरे गण्डों से सम्बन्धित होते हैं।

(ख) परिपार्श्विक (Collateral) ये सुपुम्ना से कुछ दूरी पर होते हैं—यथा अर्धचन्द्र गण्ड, उत्तर मध्यान्त्रिक गण्ड और अधर मध्यान्त्रिक गण्ड। ये उदर्य आशयों से सम्बद्ध हैं और महाधमनी के सामने रहते हैं या अन्य गण्डों से सम्बन्धित होते हैं।

(ग) अन्त्य (Terminal)—ये सम्बन्धित अंगों की दीवाल में स्थित होते हैं।

ये तीन प्रकार के नाडीगण्ड सांवेदनिक और परसांवेदनिक (त्रिकीय) से संबद्ध रहते हैं। इनके अतिरिक्त, शीर्षण्य परसांवेदनिक से सम्बन्धित अन्य गण्ड भी होते हैं यथा संधानगण्ड और जतुकताक्षीय गण्ड।

संज्ञावह नाडी—इनके द्वारा संज्ञा के वेगों का वहन होता है और इनकी संख्या चेष्टावह नाडियों की अपेक्षा बहुत कम है। ये विशेषतः वक्षीय और कटिप्रदेशीय आशयों से संबद्ध शुभ्र संयोजक सूत्र के द्वारा सुपुम्नागण्ड में प्रविष्ट होते हैं।

चेष्टावह नाडी—ये सुपुम्ना की धूसरवस्तु के पार्व्य ऋंग में स्थित पार्व्यान्तरीय कोषाणुओं से उत्पन्न होते हैं। ये माध्यम कोषाणु कहलाते हैं। इनके अक्ष-संयोजक या पूर्वगण्डीय सूत्र (Preganglionic fibres) कहलाते हैं और अग्रिम सौपुग्निक मूलों के द्वस्व असेदस सूत्रों के रूप में सुपुम्ना के बाहर निकलते हैं। ये सौपुग्निक मूलों से धृक् होकर शुभ्र संयोजक सूत्र बनाते हैं और उसी भाग के पार्श्विक नाडीगण्ड में समाप्त हो जाते हैं। इन गण्डों के कोषाणु चेष्टाकोषाणु कहलाते हैं और उनके अक्षतन्तुओं को गण्डोत्तरिक सूत्र (Post-

ganglionic fibres) कहते हैं। ये घूसर संयोजक सूत्र बनाते हैं और पूर्व सौपुनिक नाडियों से मिलकर इनके सूत्रों के साथ स्वतन्त्र पेशियों और स्नायु ग्रन्थियों में पहुँचते हैं। कुछ सूत्र उसी भाग के गण्डों में समाप्त न होकर ऊपर या नीचे के गण्डों में समाप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ सूत्र पारिविक गण्डों में समाप्त न होकर और आगे जाते हैं और परिपार्श्विक तथा अन्य नाडी गण्डों में समाप्त होते हैं।

सांवेदनिक संस्थान तीन भागों में विभक्त किया गया है:—ग्रैवेयक, वक्षीय तथा उदर्य भाग।

ग्रैवेयक सांवेदनिक (Cervical sympathetic)

इस भाग में उत्तर, मध्यम और अधर तीन गण्ड होते हैं। इस भाग के लिए पूर्व गण्डीय सूत्र सुपुम्नाकाण्ड से प्रथम से पञ्चम वक्षीय अग्रिम मूलों के साथ निकलते हैं। इसकी शाखाओं का वितरण निम्नांकित रूप से होता है:—

(१) चेष्टावह सूत्र—स्वतन्त्र पेशियों में।

(२) रक्तसञ्चालक सूत्र—शिरा, ग्रीवा और कुछ ऊर्ध्वशाखा की रक्तवाहिनियों में।

(३) स्नायु सूत्र—लालाग्रन्थि में।

(४) रोमाञ्चक सूत्र—शिर और ग्रीवा की त्वचा में।

(५) हृदयचालक सूत्र।

(६) फुफुसों में चेष्टावह सूत्र।

(७) ग्रैवेयक ग्रन्थि में सूत्र।

(८) अध्रुग्रन्थि में सूत्र।

वक्षीय सांवेदनिक (Thoracic sympathetic)

इसमें १० या ११ वक्षीय पार्श्विक नाडीगण्ड होते हैं जो शुभ्र संयोजक सूत्रों के द्वारा वक्षीय सौपुनिक नाडियों से सम्बद्ध रहते हैं। इनकी शाखाओं का वितरण निम्नांकित प्रकार से होता है:—

- (१) वर्यक सूत्र—हृदय में ।
- (२) रक्तसञ्चालक सूत्र—ऊर्ध्व शाखा में ।
- (३) स्नायक सूत्र—स्वेद ग्रन्थियों में ।
- (४) रोमाञ्चक सूत्र—ऊर्ध्व शाखाओं में ।
- (५) रक्तसञ्चालक सूत्र—उदर्य महाधमनी और इसकी शाखाओं में ।
- (६) निरोधक सूत्र—आमाशय की पेशियों में ।
- (७) स्नायक सूत्र—आमाशय, यकृत, अग्न्याशय और अधिवृक्क ग्रन्थियों में ।
- (८) निरोधक सूत्र—वृहदान्त्र तथा वृहदन्त्र के प्रथम अंश में (उत्तर मध्यान्त्रिक गण्ड के द्वारा) ।
- (९) निरोधक सूत्र—वृहदन्त्र के अवरोही भाग और गुद भाग में (अधर मध्यान्त्रिक गण्ड के द्वारा) ।
- (१०) निरोधक सूत्र—वृक्क, गवीनी, वस्ति तथा प्रजनन अङ्गों में ।
- (११) रक्तसञ्चालक, रोमाञ्चक तथा स्नायक सूत्र—अधःशाखाओं की स्वेद ग्रन्थियों में ।

उदर्य सांवेदनिक (Abdominal sympathetic)

यह वक्षीय भाग के निचले अंश तथा प्रथम और द्वितीय कटि सौपुनिक नाडियों से बनता है । इसके सूत्र महाधमनिक चक्र को चल-प्रदान करते हैं ।

त्रिकीय परसांवेदनिक (Sacral parasympathetic)

ये सूत्र श्रोणिगुहागत आशयों से संवद नाडियों के साथ जाते हैं और अधिवस्तिकीय नाडी (Nervi erigens) कहलाते हैं । गण्ड अधिवस्तिक चक्र (जो वस्ति के मूलभाग में स्थित है) में रहते हैं । इसकी शाखायें निम्नांकित प्रकार से वितरित हैं :—

१. प्रसारक—प्रजनन अंगों की रक्तवाहिनियों में ।
२. चेष्टावह—वस्ति, वृहदन्त्र और मलाशय में ।
३. निरोधक—वस्तिसंकोचनी में ।

शीर्षण्य परसांवेदनिक (Cranial Parasympathetic)

(१) नाडीसूत्र मध्यमस्तिष्क से तृतीय नाडी के साथ निकल कर सन्धान-गण्ड में समाप्त होते हैं । इस गण्ड से गण्डोत्तरिक सूत्र ह्रस्व संधानिका नाडियों बनाते हैं जो कर्निक संकोचनी और सन्धानपेशिकाओं से सम्बद्ध हैं ।

(२) पञ्चम नाडी के साथ आने वाले सूत्र जतुकताखीय गण्ड में समाप्त होते हैं । इससे गण्डोत्तरिक सूत्र निकल कर अपने छावक और रक्तवाहिनी प्रसारक भागों के द्वारा नासा, कोमल तालु और प्रसनिना के ऊपरी भाग की श्लेष्मलकला से सम्बन्ध रखते हैं ।

(३) मौखिकी नाडी के साथ सूत्र निकल कर उससे पृथक् हो जाते हैं और ह्रन्वघरीय गण्ड तथा लांगलीगण्ड (Langley's ganglion) में समाप्त होते हैं । यहाँ से गण्डोत्तरिक सूत्र निकल कर अपने रक्तवाहिनी प्रसारक भागों के द्वारा जिह्वा, ह्रन्वघरीय और जिह्वाघरिक प्रदेशों की रक्तवाहिनियों में जाते हैं ।

(४) शृङ्ग सूत्र नवमी नाडी के साथ निकल कर कर्णिकगण्ड (Otio ganglion) में समाप्त होते हैं । यहाँ से गण्डोत्तरिक सूत्र निकलते हैं जिनके रक्तवाहिनीप्रसारक भाग कर्णमूलिक प्रदेश तथा जिह्वा के शृङ्ग भाग में और छावक भाग कर्णमूलिक ग्रन्थि में जाते हैं ।

(५) प्राणदा तथा प्रीवापृष्ठगा नाडियों के साथ सूत्र निकल कर अनुमन्याक-गण्ड तथा दशम गण्ड (Jugular ganglion and ganglion Trunci vagi) में जाते हैं । यहाँ से गण्डोत्तरिक सूत्र निकल कर निम्न प्रकार से वितरित हैं:—

(क) चेष्टावह सूत्र—अन्ननलिका, आमाशय और अन्न

(ख) निरोधक सूत्र—हृदय

(ग) चेष्टावह सूत्र—वासप्रणालिकीय पेशियों में

(घ) छावक सूत्र—आमाशयिक ग्रन्थियों और आन्त्राशय

सांवेदनिक संस्थान का मार्ग और कार्य

अङ्ग	उत्पत्तिस्थान	गण्ड	कार्य
शिर और ग्रीवा	१-५ वक्षीय	ऊर्ध्व ग्रैवेयक	(१) रक्तवह संकोचक— (रक्तवाहिनियों में) (२) कर्तनक प्रसारक (३) काला तथा स्वेद- सावक (४) ओष्ठ तथा प्रसनिक्ता में रक्तवह-प्रसारण ।
वक्षीय आशय	१-५ वक्षीय-	सारक	(१) हृदयतीव्रक (२) हृदयवर्धक
ऊर्ध्वशाखा	४-१० वक्षीय	सारक	(१) रक्तवाहिनी संकोचक और प्रसारक (२) स्वेदसावक
उदर्य आशय	६-१२ वक्षीय	अर्ध चन्द्र और उत्तर मध्यान्त्रिक	(१) उदर्य आशयों में रक्तवाहिनी-संकोचक और प्रसारक (२) आमाशय और क्षुद्रान्त्र का निरोधक । (३) सन्दंशकपाटिका का चालक (४) यकृत, अग्न्याशय और अधिप्लव अग्नियों का सावक
	९ वक्षीय से ३ कटि	अधर मध्यान्त्रिक	(१) श्रोणिगुहागत आशयों में रक्तवाहिनी-संकोचक (२) यस्ति, बृहदन्त्र और मलाशय का निरोधक
अधःशाखा	११ वक्षीय से ३ कटि	६, ७ कटि और प्रथम त्रिकीय	(१) रक्तवाहिनियों के लिप्-संकोचक और प्रसारक (२) स्वेदसावक

अङ्ग	उत्पत्तिस्थान	गण्ड	कार्य
नेत्र	नेत्रचेष्टनी नाडी	सन्धानगण्ड	कनीनक सङ्कोचन और सन्धान—पेशिकासङ्कोचन
नासा-तालु- प्रदेश	त्रिधारा नाडी	ऊर्ध्वतालवीय	रक्तवाहिनी प्रसारक तथा नासा, कोमल तालु और प्रसन्निका के ऊपरी भाग की स्लेन्मलफला का स्त्रावक
लाला- ग्रन्थियाँ	रसप्रदा कर्णान्तिका नाडी	हृन्वधरीय और लाङ्गुलीगण्ड	जिह्वा के अधिम ३ भाग में रक्तवाहिनी-प्रसारक और हृन्वधरीय तथा जिह्वाधरीय ग्रन्थियों का स्त्रावक और रक्तवाहिनी प्रसारक ।
कर्णमूलिक प्रदेश	कण्ठासनी नाडी	कर्णिक	कर्णमूलिक ग्रन्थि का स्त्रावक, कर्णमूलिक तथा जिह्वा के पश्चिम ३ भाग का रक्तवाहिनी-प्रसारक ।
हृदय, फुफ्फुस तथा पाचन- मण्डिका	प्राणदा तथा प्रीवाष्टृष्णा नादियाँ	अनुमन्याक (उत्तर) और दशम गण्ड (Jugular and nodosum)	हृदय का निरोधक, रवास- प्रणालिकाय पेशियों का चालक, भ्रमनलिका, आमाशय, शुद्रान्त्र का चालक और आमाशयिक ग्रन्थियों का स्त्रावक ।

त्रिकीय परसांवेदनिक का मार्ग और कार्य

अङ्ग	उत्पत्तिस्थान	गण्ड	कार्य
प्रजनन अङ्ग, यस्ति और मलाशय	अधियस्ति- की नाडी	यस्ति के आधार पर अधियस्तिक चक्र पर स्थित गण्ड	(१) श्रोणिगुहागत आशयों की रक्तवाहिनियों का प्रसारक (२) यस्ति, बृहदन्त्र और शुद्र का सङ्कोचक (३) यस्तिसङ्कोचनी का निरोधक (४) शिक्षप्रहर्षणी का निरोधक

निद्रा (Sleep)

निद्रा शरीर का एक स्वाभाविक धर्म है जिससे शरीर के प्रत्येक यन्त्र को अधिक से अधिक विश्राम मिलता है। जाग्रतकाल में शरीर की शक्ति का जो खप होता है उसकी पूर्ति निद्राकाल में होती है। निद्रा स्वभावतः आती है, किन्तु कुछ कारण उसमें सहायक होते हैं यथा संज्ञाबहू मार्गों से नाडीसंस्थान में पहुँचने वाले वेगों की संख्या कम होने से नींद आने में सहायता मिलती है। इसी लिए शान्त कमरे में आँखें बन्द कर लेट रहने से नींद जल्दी आती है। श्रम से भी नींद जल्दी आती है क्योंकि इसके कारण केन्द्रीय नाडीमण्डल उत्तेजनाओं का ग्रहण नहीं कर सकता।

सोने के बाद प्रथम दो घण्टों तक निद्रा गम्भीर होती है, उसके बाद हल्की हो जाती है और स्वल्प उत्तेजना से भी निद्रित व्यक्ति जगाया जा सकता है। निद्रा से सुषुम्नाकाण्ड की अपेक्षा मस्तिष्क अधिक प्रभावित होता है और मस्तिष्क भी हल्की निद्रा होने पर स्वप्नों का शिकार बन जाता है। नींद आने पर शब्दसंज्ञा सबसे अन्त में छुट होती है और जागते समय सर्वप्रथम प्रकट होती है।

निद्रा का कारण

निद्रा क्यों आती है और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके सम्बन्ध में अनेक अनुसंधानों के बाद भी निश्चित ज्ञान नहीं हो सका है। मस्तिष्क के तल के दूसरे भाग में और कन्दाधरिक भाग में निद्रा से सम्बन्ध रखने वाला केन्द्र होता है जिसकी विकृति से निद्रा और तन्द्रा बढ़ती है। निद्रा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नांकित मत प्रचलित हैं:—

(१) होवेल नामक अमेरिकन शास्त्रज्ञ का मत है कि मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा अन्य अंगों में रक्त का आधिक्य होने से निद्रा उत्पन्न होती है। भोजन के बाद रक्तसंस्थान में रक्तधियाँ हो जाने से मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है। इसी से भोजन के बाद निद्रा या तन्द्रा प्रतीत होती है। जागे के दिनों में पर्याप्त गरम कपड़ा न होने से नींद नहीं आती, क्योंकि त्वचा की रक्तवाहिनियाँ सिकुड़ जाने से मस्तिष्क में रक्तधियाँ हो जाता है।

(२) कुछ शास्त्रज्ञों का यह मत है कि जाग्रत अवस्था में शरीर में ऐसे रासायनिक द्रव्य उत्पन्न होते हैं जो पर्याप्त मात्रा में संचित होकर मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं जिससे निद्रा आती है। इसी प्रकार निद्रावस्था में ऐसे द्रव्य उत्पन्न होते हैं जिससे नींद खुल जाती है।

(३) तीसरा मत यह है कि जाग्रत अवस्था में मस्तिष्कगत नाडीकोषाणुओं के अचतन्तु आपस में भलीभांति मिले रहते हैं जिससे नाडीवेगों के संवहन के परिणामस्वरूप संज्ञा होती है। निद्रितावस्था में ये अचतन्तु सिकुड़ जाते हैं जिससे इनका पारस्परिक संपर्क विच्छिन्न हो जाता है जिससे वेगों का संवहन नहीं हो पाता। इसी के परिणामस्वरूप संज्ञानाश उत्पन्न होता है जिसे निद्रा कहते हैं।

(४) पैरलोय नामक वैज्ञानिक का मत है कि निद्रा सांकेतिक निरोध का परिणाम है। प्राणियों के शरीर में अनेक सहज प्रत्यावर्तन क्रियाएँ होती हैं जिनका सांकेतिक रूप से निरोध भी होता है। रात्रि के समय विस्तरा आदि निद्रानुकूल संकेतों का निरोधक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने से प्राणी को स्वयं नींद आ जाती है।

सप्तदश अध्याय

संज्ञा (Sensation)

जब शरीर के किसी भाग में उत्तेजना पहुँचाई जाती है तो उसका कुछ प्रभाव अवश्य होता है। यही प्रभाव जब चैतन्य में प्रतिबिम्बित होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की उत्पत्ति के लिए निम्नांकित तीन रचनाओं की आवश्यकता होती है:—

१. संज्ञाग्राहक प्रान्तभाग २. नाडी ३. परिसरकेन्द्र

संज्ञाग्राही भाग उत्तानरूप में शरीर के आवरक तन्तु तथा गम्भीररूप में संयोजक तथा पेशीतन्तु में पाये जाते हैं।

संज्ञा का वर्गीकरण

संज्ञायें अनेक प्रकार की होती हैं जिनका वर्गीकरण अनेक दृष्टिकोणों से किया गया है, यथा:—

(क) गम्भीरता की दृष्टि से—दो प्रकार की होती है:—

(१) त्वाची (Cutaneous)—ये त्वचा में उत्पन्न होती हैं यथा शीघोष्ण आदि ।

(२) गम्भीर (Deep)—यह पेशीसन्धि आदि शरीर के गम्भीर अङ्गों में उत्पन्न होती हैं ।

(ख) अधिष्ठान की दृष्टि से—

(१) बाह्य (External)—इनमें शरीर के बाहर से आनेवाली सञ्ज्ञाओं यथा रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श का समावेश होता है ।

(२) आन्तरिक (Internal)—इसमें शरीर के भीतर उत्पन्न होनेवाली गम्भीर और आशयिक सञ्ज्ञाओं का अन्तर्भाव होता है ।

(ग) उत्तेजना की दृष्टि से:—

(१) बाह्य (Exteroceptive)—यह त्वचा में या उसके निकटवर्ती-प्रान्त भागों की उत्तेजना से उत्पन्न होती है ।

(२) गम्भीर (Proprioceptive)—यह पेशी, कण्ठ तथा सन्धियों में स्थित प्रान्त भागों की उत्तेजना से उत्पन्न होती है ।

(३) आशयिक (Enteroceptive)—ये आशयों तथा रक्तवाहिनियों में उत्पन्न होती हैं ।

संज्ञा के गुणधर्म

१. स्वरूप—यथा ताप और शब्द में भेद ।

२. प्रकार—यथा नील और पीत में भेद ।

३. तीव्रता ४. आयाम ५. स्थानीयता ६. अवधि

७. मानस प्रभाव—सुख-दुःख आदि ।

प्रत्येक संज्ञा का विचार करते समय इन गुणधर्मों का ध्यान रखना होता है ।

संज्ञा के गुणधर्म को प्रभावित करने वाले कारण

१. उत्तेजक की तीव्रता ।

२. उत्तेजक के कम्पन ।

३. उत्तेजक की अवधि ।

४. संज्ञाग्राही यन्त्र की स्थिति ।

५. निकटवर्ती संज्ञायन्त्रों की स्थिति ।

६. मानस स्थिति ।

आशायिक संज्ञायें

क्षुधा:—यह संज्ञा आमाशय में स्थित प्रान्तभागों की उत्तेजना से उत्पन्न होती है । क्षुधा (Hunger) और बुभुक्षा (Appetite) भिन्न संज्ञायें हैं । क्षुधा की संज्ञा कष्टदायक होती है और आमाशय के सङ्कोच के कारण उसके पेशी-स्तर में स्थित प्रान्त भागों की उत्तेजना से उत्पन्न होती है । बुभुक्षा उसका मृदु रूप है और आमाशयिक श्लेष्मल कला में स्थित संज्ञाग्राही प्रान्तभागों की उत्तेजना से उत्पन्न होता है । यह संज्ञा अनुकूल होती है और अनुभूत रस और गन्धयुक्त भोजन की स्मृति से सम्यन्वित होती है । अतः इसमें मानसभावों का महत्वपूर्ण भाग होता है । इसीलिए आमाशयिक श्लेष्मल कला के विकारों में बुभुक्षा की कमी हो जाती है ।

यह उत्तेजना किस प्रकार होती है, यह पूर्णतः ज्ञात नहीं है । कुछ लोगों का अनुमान है आमाशय के रिक्त होने से उत्तेजना होती है और कुछ का विचार है कि आमाशयिक पेशियों के संकोच से संज्ञा उत्पन्न होती है । ऐसा भी समझा जाता है कि शरीर में सामीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कुछ रासायनिक पदार्थ प्रान्तभागों को उत्तेजित करते हैं । ओपजनीमयन के कारण ये पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसी लिए व्यायाम के बाद भूख लग जाती है तथा इन्सुमेड में भी बुभुक्षा अधिक लगती है ।

रुचिकर या अरुचिकर भोज्यपदार्थों या जल से आमाशय भर लेने पर भूख शान्त हो जाती है । इसके विपरीत, ज्वर में शक्त्युत्पादक द्रव्यों की शरीर में कमी होने पर भी भूख नहीं लगती । इससे स्पष्ट है कि यह संज्ञा स्थायी है न कि शक्त्युत्पादक द्रव्यों की कमी होने के कारण साधारण धातुओं में उत्पन्न । फिर भी साधारणतः धातुओं में शक्त्युत्पादक द्रव्यों की कमी होने के पहले ही भूख लग जाती है जिससे शरीर में चय नहीं होने पाता ।

कुछ विद्वान् मानते हैं कि भूख एक सामान्य संज्ञा है जो शरीर के सभी भागों में उत्पन्न होती है किन्तु आमाशय में प्रतीत होती है । उनका मत है कि शरीर में जब आहार का पाचन और दोषण हो जाता है तो रक्त में पोषकपदार्थों की कमी हो जाती है और उसका प्रभाव धातुओं पर पड़ता है जिससे क्षुधा की संज्ञा उत्पन्न


होती है; किन्तु यह प्रमाणित नहीं होती क्योंकि अनशनकाल में घुघा बदन के बदले ममशः घटती जाती है और अन्त में विलकुल लुप्त हो जाती है।

तृष्णा (Thirst):—स्वभावतः यह संज्ञा ग्रसनिका के पृष्ठभाग पर प्रतीत होती है और वहाँ स्थित कण्ठरासनी नाड़ी के प्रान्त भागों की उत्तेजना से उत्पन्न होती है। इसी लिए ग्रसनिका की श्लेष्मलकला के स्पर्शमात्र से तृष्णा शान्त हो जाती है। लवण या शुष्क पदार्थों के खाने से श्लेष्मल कला सूख जाने के कारण भी तृष्णा उत्पन्न होती। इसे स्थानीय तृष्णा (Pharyngeal thirst) कहते हैं। किन्तु शरीर में जलांश की कमी होने के कारण जो प्यास लगती है, वह केवल स्थानीय संज्ञा नहीं है, बल्कि अनेक धातुओं के संज्ञाग्राहक प्रांतभागों तथा अनेक संज्ञावह नाड़ियों की उत्तेजना से उत्पन्न होती है। इसी लिए प्यास के साथ-साथ पीडा और तीव्र शरीर और मानस कष्ट होता है। अधिक देर तक जल नहीं लेने से धातुओं में जलांश की कमी हो जाती है जिससे मुँह और गला सूखना, त्वचा शुष्क, रक्तदाय्या का सिक्कना और मूत्रप्लाव की कमी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं।

कुछ लोग तृष्णा की उत्पत्ति गले में मानते हैं और कुछ लोग गला सूखना एक लक्षणमात्र मानते हैं तथा इसे एक सामान्य संज्ञा मानते हैं जो शरीर में जलांश की कमी होने से उत्पन्न होती है। इसी लिए जल या लवण विलयन का अन्तःश्लेष करने से शान्ति हो जाती है।

घुघा के समान तृष्णा भी शरीर की आवश्यकता की सूचक है और शरीर को चय से बचाती है। शरीर से पुष्पुसों, त्वचा तथा पृष्कों के द्वारा निरन्तर जल का चय होता रहता है। इसका प्रभाव सीधे रक्त पर पड़ता है जो इस चय की पूर्ति के लिए धातुओं से जल को शोषित कर लेता है। जब हम जल पीते हैं तब ये धातु पुनः सन्तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार तृष्णा की संज्ञा के द्वारा धातुओं में जल का परिमाण सन्तुलित और नियमित रहता है।





चित्र ५९

- १ अधिजिह्विका २ रसना का गलीय भाग ३ रसनाधिजिह्विकीय स्तर
 ४ तालुगलीय तौरण ५ उपजिह्विका ६ तालुजिह्वीय तौरण ७ छिद्र ८ परिखा
 ९ रसनास्तर १० स्वादकोरक ११ रसना का मौखिक भाग १२ स्वादाङ्कुर

अष्टादश अध्याय

रसना

रसना या जिह्वा स्वादग्रहण, चर्वण, निग्रहण तथा भाषण कार्य का साधक अङ्ग है, तथापि इसका मुख्य कार्य रसज्ञान का ग्रहण करना है, अतः रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान होने के कारण इसे रसना कहते हैं।

चित्र ५६

यह प्रधानतः मांसपेशियों से बनी है और पतली श्लेष्मलकला से आवृत रहती है। इसके दो पृष्ठ होते हैं, ऊर्ध्व और अधः। ऊर्ध्वपृष्ठ रसनापृष्ठ कहलाता है जिसमें स्वादाङ्कुर प्रचुर संख्या में पाये जाते हैं। अधःपृष्ठ में हृन्वधरीय तथा जिह्वाधरीय छोटा ग्रन्थियों एवं तनुजलक्तावी ग्रन्थियों का मुख खुलता है। इसकी वाम और दक्षिण दो धारायें होती हैं जो आगे की ओर मिल कर रसनाग्र बनाती है। रसनाग्र में स्वादाङ्कुर अधिक संख्या में हैं तथा यह विशेष कर रस और स्पर्श संज्ञा का ग्रहण करता है। रसना में स्वादाङ्कुरों के अतिरिक्त श्लेष्मग्रन्थियाँ तथा लसीका पिण्ड भी पाये जाते हैं।

स्वादाङ्कुर (Lingual papillae)

ये अङ्कुराकार रसग्रहण के साधन हैं जो रसना के ऊर्ध्व तल और परिधिभाग में अत्यधिक संख्या में स्थित होते हैं। इन्हीं के कारण जिह्वा में स्वाभाविक रूखापन होता है। स्वादाङ्कुर तीन प्रकार के होते हैं।

(१) कूर्चाकार (Conical and filiform) :—ये सबसे अधिक संख्या में होते हैं और रसना के समस्त ऊर्ध्वपृष्ठ में विशेषतः मध्यभाग में पाये जाते हैं। इनमें कुछ कूर्चाकार और कुछ गोणुच्छाकार पाये जाते हैं। ये स्थूल आवरक कला से आवृत होते हैं जो कभी-कभी कठिन प्रवर्धनों तथा मांसाहारी जन्तुओं में कण्टकाकार भागों के रूप में जिह्वा के पृष्ठभाग में निकली रहती है।

(२) शिलीन्ध्राकार (Fungiform) :—ये छत्राक के समान ऊपर की ओर फैले तथा नीचे की ओर सङ्कुचित होते हैं। ये मुख्यतः रसना के अग्रभाग तथा दोनों पाशों में पाये जाते हैं।

(३) द्वीपाकार (Circumvallate) :—ये स्तूभ परिखावेष्टित दुर्ग के समान रसना-गुह के पश्चिम तृतीयांश में स्थित हैं। ये संख्या में ८ या १० होती हैं और जिह्वामूल में V के आकार में व्यवस्थित हैं। इनके केन्द्र में गढ़ा होता है और बाह्य वेष्टन में छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ (Glands of Ebner) खुलती हैं जिससे तनु जलीय स्राव होता है। इनमें भी स्वादकोरकों का प्राचुर्य होता है।

नाडियाँ

रसना में अनेक नाडियाँ जाती हैं। इसके प्रत्येक अर्धभाग में निम्नांकित नाडियाँ हैं:—

(क) रसप्राप्ती नाडियाँ:—

(१) सप्तमी नाडी की रसपहा फर्णान्तिका (Chorda tympani) नामक शाखा जो रसना के अपिम $\frac{1}{3}$ भाग में फैली रहती है और अपनी सूक्ष्म शाखाओं के द्वारा स्वादाङ्कुरों में प्रविष्ट होती है।

(२) नवमी नाडी रसनाभिगा शाखा (Lingual branch of glossopharyngeal nerve), जो रसना के पश्चिम $\frac{2}{3}$ भाग में फैली है और स्वादाङ्कुरों में अपने सूक्ष्म प्रदानों के द्वारा प्रविष्ट होती है।

(३) प्राणदा नाडी—जो अधिजिह्विक, स्वरयन्त्र की रलेप्पलकला और स्वर-तन्त्रियों से सम्बद्ध है।

(ख) स्पर्शप्राप्ती नाडी रासनी (Lingual nerve) नाम की है जो जिह्वा में सर्वत्र सामान्य रूप से फैली हुई है। यह पञ्चमी नाडी की अधोहानम्या भाग की शाखा है।

(ग) प्रवेष्टनी नाडी—द्वादशी नाडी रसनापेशियों के प्रवेष्टन का कार्य करती है।

स्वादकोरक (Taste buds)

स्वादकोरकों के द्वारा ही रस का ग्रहण होता है। ये अण्डाकार होते हैं और एक विशेष प्रकार के कोषाणुओं से घिरे रहते हैं। इनके भीतर दो प्रकार के कोषाणु होते हैं:—

(१) धारक कोषाणु (Supporting cells)—ये स्वादकोरक की परिधि में ठोस स्तर बनाते हैं ।

(२) रसग्राहक कोषाणु (Gustatory cells)—ये पूर्वोक्त कोषाणुओं की अपेक्षा अधिक पतले और कोमल होते हैं । इन कोषाणुओं के अन्तिम भाग में एक रोम-सदृश प्रवर्धन होता है जिसे रसर रोम (Taste hair) कहते हैं और जो स्वादकोरक के रसरन्ध्र (Gustatory pore) से बाहर निकला रहता है । रसग्राही नाड़ियों के सूत्र इन कोषाणुओं के दूसरे प्रान्त में शाखा प्रशाखाओं के द्वारा परस्पर मिलकर समाप्त हो जाते हैं ।

ये स्वादकोरक द्वीपाकार एवं शिलीन्ध्राकार स्वादाङ्कुरों, कोमलतालु, अधिजिह्वा, स्वरतन्त्री, स्वरयन्त्र, ग्रसनिका के पश्चिम भाग तथा कपोल के अन्तःपृष्ठ पर पाये जाते हैं ।

युवा व्यक्तियों की अपेक्षा बच्चों में ये स्वादकोरक अधिक क्षेत्र में फैले रहते हैं ।

रस का ग्रहण

जिह्वा पर रखे हुये पदार्थ जब द्रव अवस्था में होते हैं या छाला में उनका विलयन हो जाता है सभी उनसे रस का ज्ञान होता है । ये द्रवीभूत पदार्थ स्वादकोरकों में स्थित रसग्राही कोषाणुओं के रसरोमों के अग्रभागों को उतेजित करते हैं और वहाँ से रस का ग्रहण होकर नाड़ियों की शाखाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है ।

स्वादकोरकों के द्वारा ही रस का ग्रहण होता है, इसके पक्ष में निम्नांकित प्रमाण हैं:—

(१) जिह्वा की श्लैष्मिक कला के उन भागों में जहाँ इनकी संख्या कम होती है, वहाँ रसज्ञान कम तथा जहाँ ये अनुपस्थित होते हैं, वहाँ रसज्ञान का अभाव होता है ।

(२) जहाँ ये अधिक संख्या में होते हैं वहाँ स्वाद का ज्ञान अधिक तीव्र होता है ।

(३) कण्ठरासनी नाडी को काट देने पर जिह्वा के मूल में स्थित स्वादकोरक नष्ट हो जाते हैं ।

रस का संवहन

रसज्ञान तथा गन्धज्ञान का अधिष्ठान मस्तिष्कगत अङ्गुशकर्णिका तथा उपधान पिण्डिका माना जाता है। उस अधिष्ठान केन्द्र तक निम्नांकित क्रम से रसज्ञान का संवहन होता है:—

(क) जिह्वा के अग्रिम ३ भाग से:—सरस पदार्थ स्वादकोरकों के भीतर स्थित।

(१) रसग्राही कोषाणुओं के रसरोमों को उत्तेजित करते हैं। यह उत्तेजना

(२) जिह्वानाडी—में पहुँचती है और फिर रससंवाहक सूत्रों द्वारा

(३) रसग्रहा कर्णान्तिका नाडी—में पहुँचती है जो पञ्चमी नाडी से पृथक् होकर मौखिकी नाडी में मिल जाती है और

(४) जानुकैंगण्ड (Geniculate ganglion) में समाप्त हो जाती है। यहाँ से उत्तेजना का धारा सप्तम शीर्षण्यनाडी की

(५) मध्यमी नाडी (Nervous intermedius of wisberg) के द्वारा आगे बढ़ती है और

(६) मौखिकी नाडी के संज्ञाधिष्ठान केन्द्र तक पहुँचती है। इसका संबन्ध—

(७) अङ्गुशकर्णिका—से होता है जहाँ रससंज्ञा पहुँच कर रसज्ञान में परिणत हो जाती है।

(ख) जिह्वा के पश्चिम ३ भाग से

जिह्वा के पश्चिम ३ भाग से रससंज्ञा का संवहन निम्नांकित क्रम से होता है:—
सरस पदार्थ स्वादकोरकों के भीतर स्थित

(१) रसग्राही कोषाणुओं—के रसरोमों को उत्तेजित करते हैं। यह उत्तेजना

(२) कण्ठरासनी नाडी—के द्वारा

(३) अधर अनुमन्याक गण्ड (Peterous ganglion)—तक पहुँचती है। यहाँ से

(४) कण्ठरासनी नाडी के केन्द्रकों—में जाती है, जिनका सम्बन्ध

(५) अङ्गुशकर्णिका—से होता है। यही रससंज्ञा रसज्ञान में परिणत होती है।

कुछ विद्वानों के मत में रससंवाहक सूत्र पंचमी नाडी से उत्पन्न होते हैं और वहाँ से अर्धचन्द्रगण्ड (Semilunar ganglion) से होते हुये अङ्गुल-कर्णिका तक पहुँचते हैं ।

रसों का वर्गीकरण

मधुर, अम्ल, लवण और तिक्त ये चार रस प्राथमिक माने गये हैं । अन्य रस इन्हीं के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न होते हैं । कुछ विद्वान् पहले घातवीय और चारीय रसों की भी पृथक् गणना करते थे, किन्तु अब ये प्राथमिक रस नहीं माने जाते । ये वस्तुतः रस, गन्ध और पेशी संज्ञा के संयुक्त रूप से प्रादुर्भूत होते हैं । तीक्ष्ण, कषाय आदि का ज्ञान मुख की श्लेष्मलकला की सामान्य संवेदना के कारण होता है । ये द्रव, जिनमें लाला की अपेक्षा लवण की मात्रा कम होती है, स्वाद-रहित मालूम होते हैं । मिर्च आदि कटु पदार्थों का स्वाद गन्धज्ञान तथा सामान्य संज्ञावह सूत्रों की उत्तेजना से प्रतीत होता है ।

रससंज्ञा का वितरण

सभी रसों का ज्ञान जिह्वा पर सर्वत्र समानरूप से नहीं होता । सामान्यतः जिह्वा के मूल भाग में तिक्त, जिह्वा के अग्रभाग में मधुर और लवण और जिह्वा की धाराओं और अग्रभाग को छोड़ कर समस्त पृष्ठ भाग में अम्ल रस की प्रतीति होती है ।

विभिन्न रसों की प्राथमिकता भी भिन्न होती है । जिह्वाग्र पर सर्वप्रथम लवण तब मधुर, तब अम्ल और अन्त में तिक्त रस का ज्ञान होता है । इस आधार पर यह समझा जाता है कि प्रत्येक रस के लिये पृथक् पृथक्-माहक भाग होते हैं जिनकी उत्तेजना से एक विशिष्ट नाडी-शक्ति के द्वारा विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है । इसके निम्नांकित प्रमाण हैं:—

१. जिह्वा में ऐसे संवेदनाशील बिन्दु हैं जो एक प्रकार के रस से उत्तेजित होते हैं, दूसरे से नहीं ।

२. कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका रसना के विभिन्न भागों से सम्पर्क होने पर भिन्न भिन्न रस उत्पन्न होते हैं यथा ग्लायबर का लवण (Glauber's

जिह्वा में छवण तथा जिह्वामूल में तिक्त प्रतीत होता है। सैकरीन (Saccharin) जिह्वा में मधुर और जिह्वामूल में फट्टु लगता है।

३. जिम्नेमिक अम्ल (Gymnemic acid) का प्रयोग करने से मधुर और तिक्त रसों की संज्ञा नष्ट हो जाती है क्योंकि इस द्रव्य का उन्हीं रसों की संज्ञा पर विशिष्ट प्रभाव होता है।

४. जिह्वा पर कोकेन लगाने से सर्वप्रथम स्पर्श और पीडा की संज्ञा नष्ट होती है, फिर तिक्त, मधुर और अम्ल रसों की संज्ञा नष्ट हो जाती है। छवण का स्वाद नष्ट नहीं होता।

रससंज्ञा का संमिश्रण

रससंज्ञा अन्य अनेक संज्ञाओं के साथ मिल कर मिश्र रूप में परिणत हो जाती है। पदार्थों के स्वाद में सूक्ष्म अवान्तर भेदों का यही कारण है। उद्गनशील पदार्थों का स्वाद उसकी गन्ध के कारण होता है। फलों एवं मसूरों का स्वाद रस और गन्ध के संमिश्रण से ही विशिष्ट प्रकार का होता है। इसीलिए तर्दी होने पर जब गन्धसंज्ञा में अवरोध होता है, तब भोजन में स्वाद भी कम मालूम होता है। यदि गन्धसंज्ञा बिल्कुल नष्ट हो जाय, तो आलू, सेब और प्याज का स्वाद लगभग एक ही समान प्रतीत होगा। नाक बन्द कर कौफी और फीनीन एक समान तिक्त मालूम होगा। परण्ड सैल आदि अनेक पदार्थों का अरुचिकर स्वाद अग्रिय गन्ध के कारण होता है। ऐसे पदार्थों को नाक बन्द कर आसानी से पी लिया जा सकता है।

रसों का मिश्रण अन्ननलिका की अंगसंज्ञाओं से भी होता है जिससे भोजन में रुचि और अरुचि का अनुभव होता है। उष्ण और शीत पदार्थों के रसास्वादन में रससंज्ञा स्पर्शसंज्ञा से मिली रहती है। इसीलिए गरम चाय और ठंडी चाय के स्वाद में अन्तर मालूम होता है।

रस और रासायनिक संघटन

विभिन्न द्रव्यों का रस उसके रासायनिक संघटन पर निर्भर होता है। यथा उद्गन अणुओं की उपस्थिति से एम्लरस तथा उद्गनौष (OH) अणुओं की

उपस्थिति से क्षारीय स्वाद होता है। सभी आमिषाम्ल मधुर होते हैं। इनके संयोग से उत्पन्न बहुपाचित मांसतत्त्व (Pdyptide) तथा मांसतत्त्व के जलीय विश्लेषण से उत्पन्न मांसतत्त्वसार में तिक्तरस होता है। अनेक मद्यसार तथा शर्करा मधुर होते हैं, किन्तु इनके घातवीय उत्पन्न द्रव्य तिक्त होते हैं। तथापि इसके सम्बन्ध में किसी निश्चित नियम का ज्ञान अभी तक नहीं हो सका है।

रसोत्तेजना का स्वरूप

इस प्रकार रस एक रासायनिक संज्ञा है जिसमें द्रवरूप या लाल में विलेय कोई रासायनिक द्रव्य उत्तेजक होता है। रसप्राप्तापदार्थ का तापक्रम १०° और ३३° सेण्टीग्रेड के बीच होना चाहिये। अत्यल्प तापक्रम संवेदनीयता को नष्ट कर देता है। पीछे बतलाया गया है कि अविलेय, द्रव्य स्वादरहित होते हैं, इस लिए स्वादकोरकों के निरुद्ध अनेक स्नेहिक और शैलमिक ग्रन्थियाँ हैं जिनके स्राव पदार्थों को विलीन करने में सहायक होते हैं। जिस प्रकार जिह्वा के शृष्ठ भाग पर किसी द्रव्य को रसने से स्वाद का ज्ञान होता है, उसी प्रकार शक्तिप्रवाह में स्थित द्रव्य भी स्वादकोरकों को उत्तेजित करते हैं—यथा इष्टमेह में रक्त में शर्करा अधिक मात्रा होने से मुख में माधुर्य प्रतीत होता है तथा कामला में रक्त में पित्त की उपस्थिति से तिक्तरस मुख में अनुभव किया जाता है।

रसों का आन्तरिक प्रयोग

एक रस के बाद दूसरे रस का प्रयोग करने से उसकी अनुभूति में अन्तर आ जाता है। यथा शन्धकाम्ल के बाद परिष्कृत जल भी पीने से खट्टा मालूम होता है। थोड़ा नमक खाने के बाद मीठा खाने पर मिठास अधिक मालूम होती है।

रसनेन्द्रिय का महत्त्व

ज्ञानसाधन की दृष्टि से रसनेन्द्रिय कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती तथापि अनुभूति की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्त्व है। इसके द्वारा अनुकूल वस्तुओं से सुख तथा प्रतिकूल वस्तुओं से दुःख का अनुभव होता है।

एकोनविंश अध्याय

घ्राण

चित्र ५७

अन्य स्तनधारी जन्तुओं की अपेक्षा मनुष्य में घ्राणेन्द्रिय कम विकसित होती है। गन्धसंज्ञा का ग्रहण घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता है। गन्धादानयन्त्रिका मनुष्य में ऊर्ध्वशुक्तिका को आवृत करने वाली श्लेष्मल कला तथा नासाग्राचीर के कुछ भाग में सीमित है। इसका क्षेत्र २४५ वर्ग मिलीमीटर है। गन्ध का ग्रहण घ्राणकोषाणुओं से होता है। ये कोषाणु लम्बे आवरक कोषाणु के समान होते हैं। इनके एक प्रान्त में रोमसदृश प्रवर्धन होते हैं और दूसरे प्रान्त से नादीसूत्र निकलते हैं, जो दृक्षरास्थि के चालनोपटल से होते हुये करीराकृतिकोषाणुओं से सन्धि स्थापित कर घ्राणपिण्ड में समाप्त हो जाते हैं। ये कोषाणु धारक कोषाणुओं के बीच में रहते हैं। ये वस्तुतः नादीकोषाणु हैं और इस प्रकार नेत्र के अन्तोपटल में स्थित शंकु और शालाकाओं से इनकी तुलना की जा सकती है। अनेक घ्राणकोषाणु एक करीराकृतिकोषाणु से संबद्ध रहते हैं।

गन्धादानयन्त्रिका विशिष्ट कोषाणुओं के चार स्तरों से घनी हुई है:—


चित्र ५८

१. प्रथम स्तर में श्लेष्मल कला के स्तम्भाकार कोषाणुओं के बीच में घ्राणकोषाणु स्थित हैं जिनके अप्रमाण पर रोमिकाएँ रहती हैं। गन्धयुक्त वस्तुओं के कणों से इन्हीं का संपर्क होता है। ये कण श्लेष्मा में विलीन होकर गन्धसंज्ञा उत्पन्न करते हैं। अतः बिलकुल सूखी या प्रतिरसाय आदि में श्लेष्माघिष्य होने पर श्लेष्मलकला के द्वारा गन्धज्ञान नहीं होता।


२. द्वितीय स्तर में घ्राणकोषाणुओं के लम्बे असतन्तु होते हैं।

३. तृतीय स्तर में इन तन्तुओं की सूक्ष्म शाखाएँ करीराकृति-कोषाणुओं के दण्डों से मिलकर शुद्ध बनाती हैं।

४. इस स्तर में करीराकृति चतुर्भुज कन्दाणुक होते हैं।



चित्र ५३
नासा की श्लेष्मल कला



चित्र ५४
(क) भावकेतन्तु (ख) नासाग्रन्थिर्वा (ग) नाडीयुग्म

इन कन्दाणुओं के लम्बे अक्षतन्तु परस्पर मिलकर गुच्छरूप में प्रायः २० की संख्या में होते हैं जो घ्राण नाड़ी की शाखायें कहलाती हैं और ऊपर की ओर शरीरास्थि के चालनीपटल के द्वारा मस्तिष्क में प्रविष्ट होती हैं ।

गन्धसंज्ञा का आदान

गन्धयुक्त पदार्थों के कण वायु के रूप में बाहर निकलते हैं और श्लेष्मलकला की आर्द्रता में विलीन होकर घ्राणकोषाणुओं की उत्तेजनाशील रोमिकाओं पर रासायनिक प्रभाव डालते हैं । ये कण घ्राणकोषाणुओं तक पूर्व नासारंध्रों या पश्चिम नासारंध्रों से पहुँचते हैं । श्वसित वायु ऊर्ध्वशुक्तिका की पूर्वाधोधारा के ऊपर नहीं पहुँचती, अतः घ्राणप्रदेश से उसका साक्षात् संपर्क नहीं होता यह शरीर के लिए अत्यन्त हितकर होता है, क्योंकि—

(१) शीत श्वसित वायु के साक्षात् संपर्क न होने से घ्राणप्रदेश में कोई चर्ति नहीं होने पाती ।

(२) वायुवाहित जीवाणु या अन्य हानिकर वस्तुओं के कण वहाँ स्थित नहीं होने पाते ।

(३) शुष्क वायु के वेग से घ्राणगत आवरकतन्तु शुष्क नहीं होने पाती ।

(४) दूषित या विपाक्त घाण्ड उसके साक्षात् संपर्क में न आने से वहाँ कोई स्थायी विकार उत्पन्न नहीं कर पाते ।

श्वसित वायु का घ्राणप्रदेश की स्थिर वायु से मिश्रण होने पर गन्धसंज्ञा उत्पन्न होती है । इसी लिए गन्धज्ञान में कुछ विलम्ब होता है । नस्य लेने पर वायु का घ्राणप्रदेश से साक्षात् संपर्क होता है, जिससे गन्धकण अधिक सरया में घ्राणकला में पहुँचते हैं । अधिक परमाणुमार होने तथा घाण्डप्रमाण की गति मन्द होने से गन्ध कम प्रतीत होती है । घ्राणेन्द्रिय वायुवाहित गतिशील कणों से अत्यधिक उत्तेजित होती है । जब हम नस्य लेते हैं तब घ्राणयन्त्र में स्थित वायु ऊपर खिंच जाती है और गन्धग्राहक वायु वेग से भीतर की ओर प्रविष्ट होकर घ्राण पृष्ठ के संपर्क में आ जाती है । जितने घ्राणकोषाणु गन्धकणों के द्वारा प्रभावित होते हैं, गन्ध की तीव्रता उतनी ही होती है ।

गन्धसंज्ञा का संवहन

गन्धयुक्त पदार्थ रासायनिक रीति से:—

- (१) घ्राणकोषाणुओं—की रोमराजि को उत्तेजित करते हैं। यह उत्तेजना
- (२) घ्राणनाडीसूत्रों—के द्वारा आगे बढ़कर
- (३) घ्राणपिण्ड—में पहुँचती है। वहाँ पर वह
- (४) घ्राणनाडीगुच्छ—में समाप्त हो जाती है। वहाँ से वह उत्तेजना
- (५) करीराकृति कोषाणुओं—से गृहीत होकर उनके अक्षतन्तुओं के द्वारा आगे बढ़ती है। ये अक्षतन्तु

- (६) घ्राणनाडीतन्त्रिका—बनाते हैं। इनके सूत्र तीन गुच्छों में एकत्रित होकर
- (७) चूचुकवर्तुलक—(*Corpus mamillare*) से होते हुये अन्त में
- (८) अंकुशकर्णिका—में पहुँचते हैं। यहीं गन्धसंज्ञा ज्ञान में परिणत होती है।

गन्धसंज्ञा का वर्गीकरण

प्राथमिक गन्धसंज्ञाओं को निम्नांकित ६ वर्गों में विभक्त किया गया है:—

१. फलगन्ध (*Fruity or ethereal*)—सेब, नींबू आदि
२. उदनशील गन्ध (*Aromatic odour*)—कपूर, तिळ, बादाम आदि
३. सुगन्ध (*Fragrant or flowery*)—द्रव वर्ग
४. ज्वलनगन्ध (*Burning odour*)—राख, बिरोजा आदि
५. पृथिव्यगन्ध (*Putrid odour*)—हड्डियों का सड़ना आदि
६. अजागन्ध (*Goat odour*)—स्वाद, मोनिषाव तथा एक आदि।

प्राथमिक गन्धसंज्ञाओं के पक्ष में निम्नांकित प्रमाण हैं:—

- (१) कुछ व्यक्तियों को एक या अनेक विशिष्ट गन्धों की प्रतीति नहीं होती।
- (२) कुछ गन्धयुक्त पदार्थ दूसरे ऐसे ही पदार्थों का प्रतिरोध करते हैं या उन्हें उदासीन कर देते हैं तथा कार्बोयलिक अम्ल की गन्ध पृथिव्यगन्ध की क्रियाओं से उपपन्न गन्ध को नष्ट कर देती है।

(३) एक गन्ध का निरन्तर प्रयोग करने से आवरण कोषाणु ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल उसी गन्ध का प्रभाव नष्ट होता है, अन्य गन्धों की प्रतीति उस समय भी होती है।

गन्धसंज्ञा की प्राकृत शक्ति के अनुसार प्राणियों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है:—

१. अघ्राण (Anosmatic)—
२. मन्दघ्राण (Microsmatic)—
३. तीव्रघ्राण (Macrosmatic)—

मनुष्य द्वितीय वर्ग में आता है। तृतीय वर्ग के प्राणियों में घ्राणकला स्थूल होती है और घ्राणप्रदेश भी विस्तृत होता है।

गन्धनाश (Anosmia)

निम्नांकित कारणों से उत्पन्न होता है:—

- (१) घ्राणपिण्ड में आघात ।
- (२) इन्फ्लुएन्जा या नासा के अन्य तीव्र उपसर्ग के बाद ।

गन्धवैषम्य (Parosmia)

यह निम्नांकित कारणों से होता है:—

१. घ्राण केन्द्र का आघात
२. उन्माद

न्यूनतम उत्तेजक (Threshold stimulus)

गन्धसंज्ञा रससंज्ञा से भी अधिक सूक्ष्म है, यहाँ तक कि $\frac{1}{1000000000}$ ग्रेन कस्तूरी की गन्ध स्पष्टता प्रतीत हो सकती है। गन्ध ज्ञान के लिए न्यूनतम आवश्यक उत्तेजक को न्यूनतम उत्तेजक (Threshold stimulus) कहते हैं। इसका निर्धारण किसी गन्धयुक्त पदार्थ को एक निश्चित अवधि तक घटाने से होता है। अमोनिया के समान कट्ट पदार्थ इस प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि ये घ्राणनाड़ी के साथ-साथ पञ्चमी नाड़ी के संज्ञाग्रह सूत्रों को भी उत्तेजित करते हैं।

घ्राणमापन (Olfactometry)

घ्राणशक्ति की तीव्रता के मापन के लिए निम्नांकित विधि का उपयोग किया जाता है:—

एक बोतल में गन्धयुक्त पदार्थ लिया जाता है और उसमें कुछ अधिक भारयुक्त

वायु भर दी जाती है जिससे उसकी शॉट खोलने पर गन्ध के साथ वायु एक निश्चित आयतन में नासाकोटरों में प्रविष्ट होती है। विभिन्न गन्धवान् पदार्थों के लिए वायु के भिन्न-भिन्न आयतनों की आवश्यकता होती है—यथा—

वेन्जीन	५२६	सी. सी.
कर्पूर	१५०	" "
लवंग तैल	१७२२	" "

घ्राणमापक यन्त्र (Zwaarde maker s olfactometer)

इसमें गन्धयुक्त पदार्थ की एक रिक्त नलिका होती है जिसके द्वारा वायु नासा में ली जाती है। गन्धयुक्त नलिका की लम्बाई के अनुपात से ही घ्राण की सीमता का निश्चय होता है।

पेसा देखा गया है कि मासिक के पूर्व स्त्रियों की घ्राणशक्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत प्रतिरूपाय में बनेक दिनों तक यह कम हो जाती है। किसी वस्तु को कुछ देर तक सूँघने से उसकी गन्ध की सीमता कम हो जाती है। इसे अभ्यासन (Adaptation) कहते हैं। इसका कारण यह है कि घ्राणेन्द्रिय अतिशीघ्र श्रान्त हो जाती है। इसी कारण दुर्गन्ध में अधिक देर तक रहने से उसकी सीमता कम हो जाती है।

गन्धसंज्ञा का स्वरूप और महत्त्व

गन्धसंज्ञाअति प्राचीन संज्ञा है जिसका आदिम काल से प्राणियों के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मनुष्य की अपेक्षा मधुमक्खियों, छोटे कीड़ों तथा कुत्तों में यह अधिक विकसित होती है। जन्तुओं में ज्ञानसाधन की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्त्व है। किन्तु मनुष्यों में अनुभव २ की दृष्टि से इसका महत्त्व देखा जाता है। मनुष्य को गन्ध के द्वारा ही बहुत कुछ इष्टानिष्ट की प्रतीति होती है। गन्ध मौन भावनाओं को भी उत्तेजित करती है, विशेषतः छोटे प्राणियों में इसका प्रभाव अधिक देखा जाता है।



विंश अध्याय

चक्षु

रूपसंज्ञा का ग्रहण चक्षुरिन्द्रिय से होता है जिसका बाह्य अधिष्ठान नेत्र-गोलक होता है। नेत्रगोलक दृष्टिनाडी के अग्रभाग से संयन्ध रहता है जो नेत्र के भीतर प्रविष्ट होकर दृष्टिवितान के रूप में फैली रहती है। चक्षुरिन्द्रिय का आम्य-न्तर अधिष्ठान मस्तिष्क के भीतर होता है जहाँ से दृष्टिनाडी निकलती है। दृष्टि-नाडी के दो प्रभवस्थान होते हैं। आश्रकन्द, उत्तराधिपीठिकायें और उत्तरकला-यिकायें उत्तान प्रभव तथा त्रिकोणपिण्डिकायें और रासनपिण्डिकायें गम्भीर प्रभव-स्थान हैं और ये ही दर्शनेन्द्रिय के आम्यन्तर अधिष्ठान होते हैं।

नेत्र-रचना

नेत्रगोलक घमनियों, नादियों तथा पेशियों के सहित नेत्रगुहा में रहता है। उसके आगे नेत्रच्छद तथा अश्रुयन्त्र रहते हैं।

नेत्रच्छद-रचा और मांस से आवृत पतले तरुणास्थिपत्रकों से बने होते हैं। इनके किनारों पर अनेक कुटिल पक्ष्म लगे रहते हैं जो धूल और अन्य हानिकर पदार्थों को नेत्र में नहीं घुसने देते और इस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं। नेत्र-च्छदों की स्पर्शसंज्ञा अत्यन्त तीव्र होती है। नेत्रच्छद की छदपत्रिका (तरुणा-स्थिपत्रक) में अनेक स्नेह ग्रन्थियाँ होती हैं, जिनके स्रोत नेत्रच्छदों के स्वतन्त्र किनारों के समीप खुलते हैं।

प्रत्येक नेत्रच्छद का अन्त पृष्ठ एक कोमल श्लेष्मलकला से आवृत रहता है जिसे नेत्रवर्म कहते हैं। यह पलकों के किनारे पर खचा से मिली रहती है और नेत्रच्छद के अन्त पृष्ठ को आवृत करती हुई नेत्रगोलक पर भी फैल जाती है और उसके बाह्य स्तर से कुछ ससक्त रहती है। नेत्र की अन्तर्धारा के पास नेत्रवर्म अश्रुकोष और अश्रुस्रोत की श्लेष्मलकला तथा आगे नासा की श्लेष्मलकला से मिल जाती है।

नेत्रनिमीलनी पेशी के सकोच से नेत्रच्छद बन्द हो जाते हैं और ऊपरी नेत्रच्छद नेत्रोन्मीलनी पेशी से ऊपर की ओर उठता है जिससे नेत्र खुल जाता है। नेत्रनि-

मीलनी पेदी का सवन्ध मौखिकी नाडी तथा मैट्रोमीलनी पेदी का सवन्ध तृतीय नाडी से होता है। निम्नाङ्कित अवस्थाओं में नेत्र निर्मोहित हो जाते हैं —

- १ निद्राकाल ।
- २ तीव्र प्रकाश ।
- ३ नेत्र के सामने कोई पदार्थ सहसा आने से ।
- ४ पक्ष्मों के साथ किसी पदार्थ का सम्पर्क होना ।
- ५ स्वच्छमण्डल या नेत्रवर्त्म के छोम से यथा स्पर्श के द्वारा ।
- ६ छींकने के समय ।
- ७ स्वच्छमण्डल तथा नेत्रवर्त्म में जल का सचय करने के लिए ।

प्रत्यावर्तित क्रिया के द्वारा नेत्रच्छदों का चन्द होना नेत्रों की रक्षा के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। यह प्रत्यावर्तित क्रिया पक्ष्मों नाडी के चापुप भाग की किसी शाखा को उत्तेजित कर प्रारम्भ की जा सकती है। इस नाडी के केन्द्र से उत्तेजनायें तृतीय नाडी के केन्द्र में पहुंचती हैं। यहाँ से सूत्र निकल कर मौखिकी नाडी से मिल जाते हैं और वहाँ से उनका सवन्ध नेत्रनिमीलनी पेदी से होता है। यह प्रत्यावर्तित क्रिया सनाहर द्रव्यों से भी सय से अन्त में नष्ट होती है।

अश्रुग्रन्थि — यह नेत्रगुहा के बाह्य और ऊर्ध्व कोण में स्थित है। इसकी रचना लालाग्रन्थियों के समान होती है। इसका स्राव जो अनेक खोतों से ऊपरी नेत्रच्छद के अन्त-शृष्ठ पर आता है, इतना ही होता है जिससे नेत्रवर्त्म आर्द्र रहता है। यह नेत्र के अन्त-कोण के निकट दो अश्रुद्वारों से अश्रुकोप में आता है और वहाँ से नासा-नलिका द्वारा नासा की अश्रुगुहा में आता है। छोमक वाष्प या दुखद भावावेशों से अश्रु का स्राव अधिक होने पर वह आँसुओं के रूप में निचले पलकों से बाहर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त नासागत श्लेष्मलकला के छोम तथा तीव्र प्रकाश से भी अश्रु का स्राव बढ़ जाता है।

अश्रुस्राव रासायनिक दृष्टि से सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन है जिसमें कुछ श्लेष्मा, थलब्यूनिन और अन्य उत्सृष्ट भाग रहते हैं। इसका कार्य नेत्रवर्त्म एवं स्वच्छमण्डल को आर्द्र रखना तथा उनसे जीवाणुओं और बाह्य पदार्थों को हटाना है।

अश्रु का रासायनिक सङ्कटन निम्नांकित है:—

प्रतिशत

जल	९८.२
कुल ठोस द्रव्य	१.८
घार	१.०५
कुल नम्रजन	०.१५८
मांसतत्त्वरहित नम्रजन	०.०६१
यूरिया	०.०३
मांसतत्त्व (अलब्यूमिन' ग्लोब्यूलिन)	०.६६
मार्करा	०.६५
छोराइड (NaCl)	०.६५८
सोडियम (Na_2O)	०.६०
पोटाशियम (K_2O)	०.१४
अमोनिया	०.००५


अश्रुसावक नाडियाँ पश्चिमी नाड़ी की आश्रवी तथा दक्षिणद्वीप धाराओं और ग्रैवियक सापेदनिक में रहती हैं ।

नेत्रगोलक

इसका निर्माण तीन स्तरों से होता है:—बाह्य, मध्य और आन्तर ।

बाह्य स्तर श्वेत सौम्यिक तन्तु से बना हुआ है । इसके दो भाग हैं शुक्लवृत्ति और स्वच्छमण्डल । शुक्लवृत्ति स्थूल है तथा नेत्रगोलक के पश्चिम में भाग को आवृत्त करती है । उसीका सामने की ओर २ भाग पारदर्शक होता है, उसे स्वच्छमण्डल कहते हैं । स्वच्छमण्डल तथा शुक्लवृत्ति को मण्डलाकार सन्धि को स्वच्छ शुक्लसन्धि कहते हैं । इसीके निकट वारामण्डल तथा मन्दान-मण्डल स्वच्छमण्डल से मिलते हैं । वारामण्डल के शीर्ष पर स्वच्छमण्डल अन्तःस्तर स्थित है, जिसके बीच-बीच में लसीकाशयान ()

fontana) रहते हैं। ये अग्रिमा जलधानी से संपन्न रहते हैं। इस कोम के ऊपर सन्धिस्थान पर अग्रिम रसायनिका नामक रसायनी मार्ग है। सन्धि की



चित्र ५९-नेत्रगोलक

१. स्वच्छमण्डल २. अग्रिमा जलधानी ३. दृष्टिमण्डल (काच) ४. तारामण्डल
५ रसायनी ६. सन्धानपेशिका ७. सन्धानमण्डल ८. दृष्टिमण्डलबन्धनी ९. नेत्रच्छद
१०. कर्बुरवृत्ति ११. नुसलवृत्ति १२. दृष्टिवितान १३. पौनदम्ब १४. दृष्टिनाडी १५. दृष्टि-
वितान का अन्त्य भाग

परिधि में सिराधमनीचक्र होता है। स्वच्छमण्डल में ५ स्तर होते हैं:—

१. स्तरित आवरक तन्तु
२. पूर्व स्थितिस्थापक सूत्रमय भाग।
३. स्वच्छशार्द्रवस्तुमय भाग।
४. पश्चिम स्थितिस्थापक सूत्रमय भाग।
५. अन्तरावरण।

शुक्लवृत्ति को पीछे की ओर भेद कर दृष्टिनाडी तथा सिरायें, धमनियाँ और

नाड़ियां नेत्रगोलक में प्रविष्ट होती हैं। उसका भीतरी भाग श्यामवर्ण है तथा मध्यस्तर से मिला रहता है।

मध्यस्तर शुक्लवृत्ति और दृष्टिवितान के बीच में रहता है। इसके सामने से पीछे की ओर तीन भाग हैं:—तारामण्डल, संधानमण्डल और कर्बुरवृत्ति।

तारामण्डल—यह मध्यस्तर का सामने का भाग है जो संधानमण्डल के भीतर की ओर रहता है। यह कृष्ण या विंगलङ्ग का होता है। यह सौमिक एवं पेशीतन्तु से बनी हुई गोलकाकार कला है जो स्वच्छमण्डल के पीछे की ओर लगी रहती है। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे कनीनक कहते हैं। इससे प्रकाश किरणें नेत्र के भीतर प्रविष्ट होती हैं। इसमें पेशीसूत्र दो प्रकार के होते हैं:—

(१) कनीनकसंकोचन—ये कनीनक की परिधि में बलयाकार स्थित हैं।

(२) कनीनकविस्तारण—ये कनीनक के चारों ओर लम्बाई में स्थित हैं।

इनमें पहले प्रकार के सूत्र तृतीय नाड़ी की शाखाओं से उत्तेजित होते हैं और दूसरे प्रकार के सूत्र त्रिधारग्रन्थि तथा बाहुग्रन्थि से उत्पन्न स्वतन्त्र नाड़ीसूत्रों से। इन दोनों प्रकार के सूत्रों में संकोचन सूत्र अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस प्रकार तारामण्डल की रचना निम्नांकित अवयवों से होती है:—

आगे से पीछे की ओर:—

१. घर्णयुक्त अन्तरावरण कोपाणु।

२. चित्रवस्तु, जिसमें कोपाणु, संयोजक तन्तु के सूत्र तथा उसके जालकों में नाड़ी और धमनियां।

३. बलयाकार और बिसारी पेशीसूत्र।

४. घर्णयुक्त आवरककोपाणुओं के दो स्तर।

तारामण्डल के आगे एक तन्तु जलपूर्ण अवकाश है, जिसे अग्निमा जलधानी कहते हैं तथा उसके पीछे की ओर इसी प्रकार का अवकाश पश्चिमा जलधानी कहलाता है। दोनों का सम्बन्ध कनीनक मार्ग से रहता है। रासायनिक संपटन की दृष्टि से इस द्रव्य में जल, लवण, अल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन तथा शर्करा का अंश होता है। इसका स्वतन्त्ररूप से ओपजनीकरण होता है।

सन्धानमण्डलः—यह तारामण्डल और वर्णरचिता के बीच में रहता है तथा दोनों से मिला रहता है। इसके तीन भाग होते हैं:—

१. सन्धानवल्यिका—यह कर्बुरचिता की अभिमधारा से लगी रहती है।

२. सन्धानपेशिकाः—यह आगे की ओर सन्धानमण्डल की वाक्षपरिधि में लगी रहती है। इसमें दो प्रकार के पेशीसूत्र होते हैं—विसारीसूत्र और घृत्तसूत्र। विसारीसूत्र स्वच्छशुक्लसंधि से निकल कर कर्बुरचिता की ओर जाते हैं और घृत्तसूत्र सन्धानदशिकाओं के मूल में लगे हैं जिनसे उनका आकर्षण होता है और दृष्टिमण्डल की घन्धनी शिथिल हो जाती है। इस पेशिका का सम्बन्ध तृतीय नाड़ी से होता है।

३. सन्धानदशिका—ये संख्या में ७० या ८० होती हैं और इनका निर्माण रक्तवहस्रोतों, सौग्रिक तन्तुओं तथा वर्णक प्रस्तुओं से होता है। इनके अप्रभाग दृष्टिमण्डल घन्धनी की बहिःपरिधि में लगे होते हैं। इनके मूलभाग में सन्धानपेशिका के घृत्तसूत्र लगे रहते हैं।

कर्बुरचिता—यह शुक्लचिता तथा दृष्टिवितान के मध्य में रहती है। इसमें रक्तवहस्रोतों की अधिकता होती है। इसके संयोजकतन्तु में अनेक शाखायुक्त रक्तकोषाणु होते हैं। कर्बुरचिता और शुक्लचिता के बीच में एक वर्णयुक्त कला होती है जिसे शक्लकला कहते हैं। इसी प्रकार कर्बुरचिता और दृष्टिवितान के बीच में भी एक चितान भूमिका नामक कला होती है। इसमें निम्नाङ्कित नादियां आती हैं:—

१. तृतीय नाड़ी की शाखायें—कनीनक संकोचन।


२. स्वतन्त्र नाड़ी शाखायें—कनीनक विस्फारण।

३. पञ्चम नाड़ी की शाखायें—स्पर्शसंज्ञाप्रद।

आभ्यन्तर स्तर—नेत्रगोलक के भीतरी स्तर को दृष्टिवितान कहते हैं जो अभिम $\frac{1}{4}$ भाग को छोड़कर नेत्रगोलक के संपूर्ण भीतरी भाग में फैला हुआ है। दृष्टिवितान के केन्द्र में एक गोला पीतवर्ण का उठा हुआ भाग है जिसे पीतबिम्ब कहते हैं। इसका मध्यभाग कुछ गहरा होता है जो दर्शनकेन्द्र कहलाता है। दृष्टिशक्ति इसी बिन्दु पर तीव्रतम होती है। इसके लगभग २-५ मिलीमीटर भीतर की

ओर वह बिन्दु है जहाँ दृष्टिनाड़ी नेत्रगोलक से बाहर निकलती है । इस बिन्दु को सितविम्ब या अन्धबिन्दु कहते हैं, क्योंकि वहाँ दृष्टिशक्ति का सर्वथा अभाव होता है । आगे की ओर दृष्टिवितान की सम्मुख धारा आगे के समान दन्तुरधारा में समाप्त होती है जो कर्बुरवृत्ति की अग्रधारा के साथ साध रहती है । उसके आगे भी दृष्टिवितान पतली कला के रूप में सन्धान दक्षिकाओं के पीछे तक जाता है, उसे वितानाग्रकला कहते हैं । यहाँ नाडीकोषाणुओं के नहीं रहने से दृष्टिशक्ति बिल्कुल नहीं होती ।

दृष्टिनाड़ीसूत्र वस्तुतः दृष्टिवितान के नाडीकोषाणुओं के अन्ततन्तु हैं और उनके द्वादश दृष्टि नाड्यवरक कोषाणुओं (शूलों और शंकुओं) से मिले रहते हैं । दृष्टिनाड़ी नेत्रगोलक से निकल कर मस्तिष्कावरणकलाओं में लिपटी हुई मस्तिष्क के



चित्र ६०—दृष्टिवितान

मूलभाग में पहुँचती है। दृष्टिनाड़ी के सूत्र अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं और मेदसपिधान से आवृत होते हैं, किन्तु वाद्य नाट्यावरण उनमें नहीं होता। इन सूत्रों की संख्या ५००,००० से भी ऊपर होती है। नाड़ी के केन्द्र में एक छोटी धमनी और मिरा रहती है जो उसका पोषण करती है। इसमें अवरोध होने से अन्धता हो जाती है।

दृष्टिवितान का निर्माण नाड़ीकोषाणुओं तथा चंद्रवस्तु से होता है जो दस स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। ये भीतर से बाहर की ओर निम्नांकित रूप से हैं:—

१. अन्तःसीमिका—यह पतली कला है, जो सान्द्रजल के चारों ओर स्थित होकर दृष्टिवितान की अन्तःसीमा बनाती है।

२. वितानसूत्रिणी—यह दृष्टिनाड़ी के अमेदस सूत्रों से बनी होती है। वितान के भिन्न भिन्न भागों में इस स्तर की स्थूलता विभिन्न होती है।

३. पुरस्कन्दाणुकिनी—इसमें अनेक बहुशाखायुक्त नाड़ीकोषाणु होते हैं, जिनके केन्द्रक गोल तथा बड़े होते हैं। यह साधारणतः एक स्तर में होते हैं, किन्तु कई भागों में विशेषतः पीतविष्य के निकट यह अनेक स्तरों में व्यवस्थित अतः स्थूल हैं। इनके अन्तर्गत भीतर की ओर उपर्युक्त स्तर बनाते हैं और अन्य प्रवर्धन आगामी स्तर का निर्माण करते हैं।

४. तन्तुजालिनी आन्तरी—यह स्तर सूक्ष्मकणों से युक्त दिखाई देता है। इसमें पूर्वोक्त और आगामी स्तर के कोषाणुओं के नाड़ीतन्तुसूत्र परस्पर मिलकर जाल की सी रचना बनाते हैं।

५. यवकन्दिनी आन्तरी—यह यवाकार द्विबाहुक कोषाणुओं से निर्मित होता है। इनमें ओजःसार की मात्रा अत्यन्त अल्प होती है और मध्य में बड़ा अण्डाकार केन्द्रक होता है।

६. तन्तुजालिनी बाह्या—यह पूर्वोक्त चतुर्थ स्तर के समान होता है, किन्तु अपेक्षाकृत पतला होता है। इसमें एक ओर शूल और शंकु के सूत्रप्रतान तथा दूसरी ओर द्विबाहुक कोषाणुओं के सूत्र आते हैं।

७. यवकन्दिनी बाह्या—यह पूर्ववत् द्विबाहुक कोषाणुओं से निर्मित है।

८. बहिःसीमिका—यह पूर्वोक्त सात स्तरों की बहिःसीमा के रूप में स्थित है। इसको भेद कर सप्तम स्तर के कोषाणुओं की शाखाएँ बाहर जाती हैं।

९. रूपादानिका—(The layer of Rods and cones or the bacillary layer) इसमें शूलका (Rods) तथा शकाकार कोषाणु (Cones) होते हैं जो रूपसंज्ञा का ग्रहण करते हैं । प्रत्येक शूल प्रायः ००६ मिलीमीटर लम्बा और ००२ मिलीमीटर व्यास का होता है । इसके दो भाग होते हैं भीतरी स्थूल भाग और बाहरी तनु भाग । इसमें अनुप्रस्थ रेखायें होती हैं तथा दृष्टिवर्णक (Visual purple or rhodopsin) नामक रत्नद्रव्य होता है जिसके कारण इसका रंग बैंगनी लाल होता है । मृत्यु के बाद प्रकाश के कारण यह वर्णन नष्ट हो जाता है और दृष्टिवितान अपारदर्शक हो जाता है । शंकुकोषाणु लगभग ००३५ मिलीमीटर लम्बा और ०००६ मिलीमीटर व्यास वाला होता है । इसका भीतरी भाग चौड़ा तथा बाहरी भाग पतला होता है । शूल की अपेक्षा छोटे होने के कारण ये चित्र जनिका (दर्शन स्तर) से अधिक दूरी पर रहते हैं । इनमें दृष्टिवर्णक भी नहीं होता, अतः दृष्टिवितान का दर्शनकेन्द्र वर्णरहित होता है । दृष्टिवितान के केन्द्रीय भाग में इनकी संख्या अधिक होती है और दर्शनकेन्द्र में तो केवल ये ही होते हैं और वहाँ इनकी आकृति भी कुछ भिन्न होती है ।

१०. चित्रजनिका (Pigmentary layer)—यह पत्रकाकार पद-कोण चिपिटाकृति नानावर्णकधारी कोषाणुओं के एक स्तर से घना है । प्रत्येक कोषाणु में एक बड़ा केन्द्रक होता है और उसके भीतर वर्णकयुक्त भाग होता है जिससे लम्बे प्रवर्धन निकल कर उपर्युक्त कोषाणुओं के बीच-बीच में फैले रहते हैं । तीव्र सूर्य प्रकाश में ५-१० मिनट तक रहने पर ये प्रवर्धन अधिकाधिक फैल कर वहिःसीमिका कला के संपर्क में आ जाते हैं । इसके विपरीत, अन्धकार में लगभग दो घण्टों तक रहने पर ये कटुये के अङ्ग के समान सिकुड़ कर कोषाणु में प्रविष्ट हो जाते हैं । इन कोषाणुओं से दृष्टिवर्णक उत्पन्न होता है ।

रूपसंज्ञा का ग्रहण करने वाले कोषाणु पूर्वोक्त आठ स्तरों के पीछे रहते हैं, फिर भी उन स्तरों की स्वच्छता के कारण रूपग्रहण में कोई बाधा नहीं होती । यों भी पीतधिम्य में ये स्तर अत्यन्त पतले होते हैं, अतः व्यवधान कम होने से वहाँ तीव्रतम दृष्टि शक्ति होती है । इसके बाहर चारों ओर क्रमशः इनकी स्थूलता बढ़ती जाती है, अतः दृष्टिशक्ति की तीव्रता वहाँ कम होती जाती है ।

दृष्टिवितान वस्तुतः मस्तिष्क का ही एक भाग है, अतः उसकी रचना भी मस्तिष्क के अन्य भागों के समान होती है, यथा अन्य भागों की तरह इसमें नाडीकोषाणु, नाडीवस्तु, धारककोषाणु तथा सूत्र होते हैं। नाडीसूत्र रूपादानिका को छोड़कर प्रत्येक स्तर में जाल के रूप में फैले हुये हैं जिनके बीच बीच में नाडी-वस्तु तथा धारक कोषाणुसूत्र होते हैं। दृष्टिवितान में तीन प्रकार के नाडीकोषाणु होते हैं:—

१. गण्डकोषाणु (अन्तःस्तर में)
२. शूल और शंकु (बाह्यस्तर में)
३. द्विबाहुक कोषाणु (मध्यस्तर में)

ये कोषाणु सम्पूर्ण दृष्टिवितान में समान रूप से व्यवस्थित नहीं हैं। अन्धबिन्दु में शूल और शंकु नहीं होते, दर्शनकेन्द्र में केवल शंकु होते हैं तथा प्रान्तीय भाग में केवल शूल होते हैं। इसके अतिरिक्त, शूल और शंकु कोषाणुओं का गण्ड-कोषाणुओं (इस प्रकार दृष्टिनाडीसूत्रों) से भी सर्वत्र समान सम्यन्ध नहीं है। दर्शनकेन्द्र में प्रत्येक शंकु एक द्विबाहुक कोषाणु के द्वारा एक गण्डकोषाणु से सम्बद्ध रहता है, जब कि दृष्टिवितान के प्रान्तीय भाग में अनेक शूलों और शंकुओं के दन्द्र एक गण्डकोषाणु से मिले रहते हैं।

स्वच्छवस्तु-व्यूह (Transparent or Refracting media)

नेत्रगोलक के भीतर सामने से पीछे की ओर चार पारदर्शक भाग होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश दृष्टिवितान तक पहुँचता है। ये निम्नांकित हैं:—

१. स्वच्छमण्डल
 २. अनुजल (Aqueous humour)
 ३. दृष्टिमण्डल (Lens)
 ४. सान्द्रजल (Vitreous humour)
- इनमें स्वच्छमण्डल का वर्णन पहले हो चुका है।

अनुजल

यह किंचित् चार और लवण स्वच्छतरल है जो २-३ रत्ती की मात्रा में अग्रिमा और पश्चिमा जलधानी में रहता है। इसके द्वारा स्वच्छवस्तुव्यूह का पोषण होता है। इसके क्षीण होने पर प्रतिदिन अग्रिम रसायनी की लसीका से इसकी पूर्ति होती रहती है।

दृष्टिमण्डल

यह उभयोन्नतोदर, स्थितिस्थापक तथा पारदर्शक अवयव है, जो स्थितिस्थापक कलाकोष से आवृत रहता है। इसके आगे कर्नीनक सहित तारामण्डल तथा पीढ़े की ओर कलाकोष से आवृत सान्द्रजल रहता है। सान्द्रजलधरा कला का ही अग्रभाग दृष्टिमण्डल की परिधि को आवेष्टित किये हैं उसे कलाचक्र (Zonule of zinn) कहते हैं। इसी के दो स्तरों से दृष्टिमण्डल बन्धनी (Suspensory ligaments) बनती है जिसके सहारे दृष्टिमण्डल नेत्रगोलक के बीच में अवलम्बित रहता है। यह कलाचक्र सन्धानदशिका से लगा रहता है। बन्धनी के दोनों स्तरों के बीच में एक छोट होता है जिसे पश्चिम रसायनीमार्ग (Canal of Petit) कहते हैं। तथापि इसीका से दृष्टिमण्डल तथा सान्द्रजल का निरन्तर पोषण होता रहता है।

इसका विकास बहिर्बुद्बुद् (Epiblast) से होता है तथा अन्य आवश्यक तन्तुओं के समान इसके कोषाणुओं की वृद्धि होती रहती है। प्रान्तीय कोषाणुओं की वृद्धि से निरन्तर नये सूत्र बनते रहते हैं और पुराने सूत्र विसृष्ट होकर उन्हीं के भीतर दब कर केन्द्र में एकत्रित होते जाते हैं। इसीलिए केन्द्र का घनत्व अधिक होता है। इस प्रकार दृष्टिमण्डल का निर्माण पलाण्डुकन्द के निर्माण समान अनेक कोषस्तरों से होता है। इसके मध्य में स्थित कठिन भाग को मण्डलाक्षिका (Nucleus Lentic) कहते हैं। अनेक कोषस्तरों के होने पर भी इसकी पारदर्शकता में कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि सभी स्तर समानरूप से पारदर्शक हैं। दृष्टिमण्डल में प्रकाश वक्रीभवन की शक्ति भी सर्वत्र समान नहीं है। मर्यादीला में वक्रीभवनाङ्क १.४१ तथा प्रान्तों १.३० है।

इसमें सिरा, घमनी तथा नाड़ी का सम्बन्ध नहीं होता, अतः इसका पोषण केवल तनुजल से होता है। अपेक्षाकृत इसमें मांसतत्व अधिक होता है। इसमें निजी श्वसनयन्त्र रहता है जिससे इसका स्वतः शोषजनोन्मूलन होता है। इसके लिए उसमें ग्लुटाथायोन नामक सिरटीन सदृश पदार्थ अधिक मात्रामें रहता है तथा वो क्रिस्टलाइन नामक मांसतत्व होता है। यद्यपि इस पदार्थ की मात्रा अधिक

होती है और आयु बढ़ने पर क्रमशः कम होती जाती है। इसके कम होने से दृष्टिमण्डल में विनाशारम्भक परिवर्तन होने लगते हैं। इसीलिए वृद्धावस्था में वह दोस और अपारदर्शक हो जाता है। ओपजन की कमी, कार्बनट्रिओक्साइड का आधिक्य, नीललोहितोत्तर किरणों का सम्पर्क, तापकिरणों से सम्बन्ध, उदजन अणुकेन्द्रीभवन में परिवर्तन इन कारणों से दृष्टिमण्डल की श्वसनक्रिया में विकार आ जाता है जिससे उसमें विघटनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं और फलस्वरूप दृष्टिमण्डल अपारदर्शक हो जाता है। इस रोग को लिङ्गनाश (Cataract) कहते हैं। दृष्टिमण्डल का जो भाग अपारदर्शक होता है, उसके अनुसार इस रोग के विभिन्न प्रकार किये गये हैं। जब केवल दृष्टिमण्डल अपारदर्शक हो जाता है, तब इसे काचीय लिङ्ग नाश (Lenticular Cataract) कहते हैं। जब केवल कलाकोप अपारदर्शक हो जाता है, तब उसे कोचीय लिङ्गनाश (Capsular Cataract) कहते हैं। जब कला और काच दोनों विकृत होते हैं तब उसे काचकोशीय (Lenticulo-capsular Cataract) लिङ्गनाश कहते हैं। वृद्धावस्था में मण्डलाष्टिका कठिन और अपारदर्शक हो जाती है इसे जरा लिङ्गनाश (Senile cataract) कहते हैं।

इस रोग में दृष्टिमण्डल का रासायनिक संघटन भी बदल जाता है। यथा जल का परिमाण २० प्रतिशत कम हो जाता है तथा पोटेशियम और सोडियम की मात्रा भी घट जाती है, किन्तु गन्धक की मात्रा बढ़ जाती है। जरा लिङ्गनाश में कोलेस्ट्रॉल में अत्यधिक वृद्धि होती है।

सान्द्रजल (Vitreous humour)

यह मधु के समान अर्धतरल एक संयोजक सन्तु है जो नेत्रगोलक के भीतर पश्चिम से भाग में भरा रहता है। इसी के कारण नेत्रगोलक की आकृति ठीक रहती है। यह एक कलाकोप के भीतर रहता है, जिसे सान्द्रजलधरा कला (Hyaloid Membrane) कहते हैं। यही सामने की ओर दृष्टिमण्डल का कलाचक्र तथा कलाकोप बनाती है। इस कला के द्वारा सान्द्रजल दृष्टिवितान से पृथक् रहता है। इसके सामने की ओर एक हल्का खाव होता है जिसमें दृष्टिमण्डल का पृष्ठभाग रहता है, इसे दृष्टिमण्डलाधानिका (Fossa patellaris)

कहते हैं । सान्द्रजल के बीच में दृष्टिमण्डल के दृष्टभाग से दृष्टिनाड़ी के प्रवेशस्थान तक एक पतली लसीकापूर्ण नलिका होती है जिसे सान्द्रजलान्तरीया प्रपिका (Hyaloid canal) कहते हैं । यह गर्भस्थ शिशु की कनीनकच्छदपोषणी धमनी का अवशिष्ट रूप है ।

नेत्र का पोषण

शुक्लवृत्ति—इसका पोषण चाक्षुषधमनी की दीर्घसन्धानिका (Long Ciliary arteries) शाखाओं के द्वारा होता है ।

मध्यवृत्ति—इसमें रक्तसह चोतों का बाहुल्य होता है । दीर्घ, ह्रस्व तथा पुरोग सन्धानिका धमनियाँ (Long, short and anterior ciliary arteries) कर्बुरवृत्ति में प्रविष्ट होती हैं । इनमें दीर्घ और पुरोग शाखायें अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा तारामण्डल के चारों ओर दृष्ट धमनीचक्र तथा कनीनक के चारों ओर छुवकर चलाती हैं । उन्हें क्रमशः परितारामण्डल तथा परिकनीनक (Major and minor arterial circles) धमनी चक्र कहते हैं । इनसे तारामण्डल का पोषण होता है । ह्रस्व सन्धानिका धमनियाँ कर्बुरवृत्ति में फैली हुई हैं और उसके पश्चिमार्ध का पोषण करती हैं ।

दृष्टिवित्तान—इसका पोषण दृष्टिनाड़ी के मध्य में रहनेवाली धमनी (Arteria centralis retinae) के द्वारा होता है । यह सितविम्ब के चारों ओर सर्वत्र अपनी शाखाओं के रूप में फैली रहती है ।

स्वच्छवस्तुव्यूह—इसका पोषण तनुजल के द्वारा होता है ।

सिरायें

नेत्रगोलक में सिरायें अनेक होती हैं, किन्तु उनमें ४-६ मुख्य हैं । इन्हें सिरागुलिका (Venae Vorticosae) कहते हैं । यह पुच्छ और कर्बुरवृत्ति के बीच में रहती हैं ।

नाड़ियाँ

नेत्रगोलक में चार नाड़ियाँ आती हैं:—

१. दृष्टिनाड़ी—रूपसंज्ञाग्राहक ।

सान्द्रजल—यह एक अर्धतरल पदार्थ है । इसमें विट्रीन (Vitreine) नामक मांसतत्व होता है । इसका वक्रोन्मूलक १.३३ है ।

नेत्रगत तरल की उत्पत्ति

इसकी उत्पत्ति किस प्रक्रिया से होती है, इसके संबन्ध में तीन मत प्रचलित हैं:—

१. द्विविभाजन (Dialysis)
२. निःस्पन्दन (Filtration)
३. स्रवण (Secretion)

कृष्ण प्लेडर तथा उनके सहयोगियों के प्रयोगों के फलस्वरूप जो परिणाम निकले हैं, उनके आधार पर यह निश्चित होता है कि यह पदार्थ द्विविभाजन की ही है। तरल में सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोरीन की उपस्थिति द्विविभाजन सिद्धान्तों के अनुकूल होती है । इस प्रक्रिया में सन्धानमण्डल का पृष्ठ तथा तारामण्डल का पश्चिम भाग तनुजल तथा रक्त के बीच में अन्तर्वर्ती कला का कार्य करता है । इन दोनों पृष्ठों से प्रसरण का कार्य होता है । इसीलिए जल कनीनक को बन्द कर दिया जाता है, तो तारामण्डल के पीछे तनुजल संचित होने लगता है ।

नेत्रगत तरल का संग्रहण

नेत्रगत तरल का कुछ अंश नेत्रगोलक के अवयवों के द्वारा पुनः शोषित हो जाता है । शेष अंश का निर्हरण निम्नांकित तीन मार्गों से होता है:—

(१) कनीनक मार्ग से अप्रिमा जलधानी में आकर निःस्पन्दन त्रिकोण (Filtration angle) के द्वारा अप्रिमा रसायनिका में पहुँचता है और उसके द्वारा सन्धानिका सिराओं में चला जाता है ।

(२) तारामण्डल के पूर्वपृष्ठ से शोषित होकर तत्रस्थ सिराओं में चला जाता है ।

(३) दृष्टिमण्डल बन्धनी के बीच से होकर सान्द्रजल के पूर्वपृष्ठ में पहुँच जाता है और वहाँ से सान्द्रजलान्तरीया प्रपिका के द्वारा दृष्टिनाड़ी तक चला जाता है । वहाँ से दृष्टिनाड़ी के आवरण में स्थित रसायनियों या दृष्टिवितानगत सिराओं के द्वारा बाहर निकल जाता है ।

नेत्रगत भार (Intra-ocular tension)

नेत्रगोलक के भीतर तरलों की उपस्थिति के कारण वहाँ एक प्रकार का दबाव रहता है जिसे नेत्रगत भार कहते हैं। नेत्र के रूपा के द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। इस भार को प्राकृत स्थिति में रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेत्रगत तरल की उत्पन्न और निःसृत मात्रा समान हो। इस भार की कमी होने पर नेत्र के आन्तरिक अवयवों का पारस्परिक सम्बन्ध विकृत हो जाता है और दृष्टिमण्डलबन्धनी के शिथिल हो जाने से रश्मि-केन्द्रीकरणके निमित्त सन्धानपेशिका की क्रिया में बाधा होती है। इसके विपरीत, भार अधिक हो जाने से नेत्र के प्राकृत रक्तसंवहन में बाधा होती है और कर्तुरवृत्ति में भार अत्यधिक हो जाने से सन्धानपेशिका का कार्य भी ठीक से नहीं हो पाता, फलतः रश्मिकेन्द्रीकरण में विकार आ जाता है। अतः यह आवश्यक है कि नेत्रगत भार का सम्यक् नियन्त्रण हो।

प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि नेत्र में स्वभावतः इसका प्रबन्ध किया गया है, क्योंकि धमनीगत रक्तभार में जितना अन्तर होता है, उतना नेत्रगत भार में अन्तर नहीं होता। धमनीभार ७० से १८० मिलीमीटर (११० मि. मी. का अन्तर) होता है, किन्तु नेत्रगत भार ३२ से ४० मिलीमीटर (१७ मि. मी. का अन्तर) तक ही रहता है। अतः रक्तभार के परिवर्तनों की अपेक्षा नेत्रगत भार के परिवर्तन $\frac{1}{4}$ ही होते हैं।

नेत्रगत भार का मापन

प्राकृत नेत्रगत भार २५ से ३० मि. मी. होता है। इसका मापन करने के लिए एक सुई शुबलवृत्ति में प्रविष्ट कर उसका सम्यन्ध एक मापक यन्त्र से कर देते हैं। वैज्ञानिक कार्यों में भारमापक यन्त्र (Tonometer) का उपयोग होता है।

नेत्रगत भार का रक्तभार से संबन्ध

नेत्रगोलक का छेदन करने तथा नेत्रगत रक्तसंवहन बन्द होने या मृत्यु के बाद नेत्रगत भार ८-१० मि. मी. हो जाता है, अतः यह सिद्ध है कि शेष भार रक्तभार के कारण ही होता है। अतः सामान्य धमनीगत रक्तभार में वृद्धि या हास

होने से तदनुसार नेत्रगत भार में भी किंचित् परिवर्तन हो सकता है, यद्यपि यह बहुत कम होता है। नाड़ीस्पन्दन के कारण इसमें १-२ मि. मी. तथा श्वसन के कारण ३-५ मि. मी. का अन्तर आ जाता है, तथापि यह सदैव ध्यान में रखना होगा कि चूँकि नेत्रगत भार नेत्रस्थित केशिकाजालकों के दबाव के परिणाम स्वरूप होता है, न कि बड़ी बड़ी धमनियों के। अतः धमनीगत रक्तभाराधिक्य, जिसमें केशिकाभार नहीं बढ़ता है, के कारण नेत्रगत भार में वृद्धि नहीं होती। एमिल नाइट्हाइट प्रान्तीय धमनियों को प्रसारित करने के कारण धमनीभार को कम कर देता है, किन्तु केशिकाओं का प्रसार होने, फलतः भार बढ़ जाने से नेत्रगत भार में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार नेत्रगत भार का अधिक सम्बन्ध सिरागत भार से है। उदाहरणतः, सिरागुल्मिकाओं को बाँध देने से केशिका भार बढ़ जाता है, फलतः नेत्रगत भार ५०-१० मिलीमीटर हो जाता है।

नेत्रगत भाराधिक्य (Glaucoma)

नेत्रगत भार का प्रभाव मुख्यतः शुक्लवृत्ति पर होता है, यद्यपि कर्पूरवृत्ति तथा बाह्य नेत्रकलाकोप से भी इसमें सहायता मिलती है। वैकारिक अवस्थाओं में, नेत्रगततरल के परिवाही छोट दृष्टिमण्डल का तारामण्डल पर दबाव अधिक होने से तथा अग्रिमा जलधानी में आवरक धातु के पदार्थों का अधिक्य होने से बन्द हो जाते हैं। इसके कारण नेत्रगत भार अत्यधिक बढ़ जाता है। इसे नेत्रगत भाराधिक्य या अधिमन्थ (Intraocular hypertension or glaucoma) कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण पीड़ा और दृष्टिसम्बन्धी विकार हैं। नेत्रगोलक पथ्यर के समान कड़ा हो जाता है, कनीतक शिथिल और प्रसारित, सितविन्ध्य अधिक गम्भीर तथा रक्तवह सोतों में स्पन्दन होता है। भार अधिक होने से नेत्र के संवहन में भी बाधा हो जाती है।

दर्शन (Vision)

नेत्र दर्शन का बाह्य अधिष्ठान है। बाह्य पदार्थों से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र के भीतर घुसती हैं। इन किरणों का नेत्र के स्वच्छवस्तुव्यूह के द्वारा चक्री-भवन होकर इस प्रकार दृष्टिविस्तान पर संव्यूहन (Focussing) होता है

कि वहाँ उसका ठीक ठीक प्रतिबिम्ब दर्शनकेन्द्र पर बन सके। वहाँ से वह उत्तेजना दृष्टिनाड़ी के द्वारा मस्तिष्क के पश्चिम पिण्ड में स्थित 'दर्शनकेन्द्र' तक पहुँचती है और इस प्रकार रूप का ज्ञान होता है।

रूपमत्ता उत्पन्न करने वाली प्रकाश किरणों की तरंगें लम्बाई में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। वर्णपट्ट में लालवर्ण की ऐसी किरणों की लम्बाई ७२३० A. U. तथा बैंगनी वर्ण की किरणों की लम्बाई ३९७० A. U. होती है। समान्यतः इस प्रकार ४००० से ८००० A. U. लम्बी प्रकाश किरणतरंगों से रूपमत्ता उत्पन्न होती है।

(A. U. = Angstrom unit = यह १ मि. मी. का कोटितम भाग होता है) लालरंग के बाद रक्तोत्तर (Infra-red) या तापकिरणों (Heat rays) होती हैं जिनकी लम्बाई अधिक होती है और जो शोषित होने पर ताप में वृद्धि कर देती हैं। इसी प्रकार बैंगनी रंग के बाद नीललोहितोत्तर किरणें (Ultra-violet rays) होती हैं जिनकी लम्बाई कम होती है और जो रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इन्हें रासायनिक किरणें (Actinic rays) भी कहते हैं।

प्रकाश यन्त्र की दृष्टि से नेत्र एक तीव्र उन्नतोदर काच के समान कार्य करता है। ऊपर बतलाया गया है कि बाह्य पदार्थों से निकली हुई प्रकाश किरणों का नेत्र के विभिन्न पृष्ठों से वक्रीभवन होता है और उसके बाद दृष्टिप्रदान पर उनका प्रतिबिम्ब बनता है। इसको समझने के पहले उभयतः उन्नतोदर काच के द्वारा प्रतिबिम्ब निर्माण के सम्बन्ध में निम्नांकित भौतिक विचारों को ध्यान में रखना चाहिये:—

(क) दूर स्थित वस्तुओं से प्रकाशकिरणें समानान्तर आती हैं और वे जब उभयोन्नतोदर काच के एक पृष्ठ पर पड़ती हैं तब उनका वक्रीभवन हो जाता है। ये वक्रीभूत किरणें काच के दूसरे पृष्ठ के पीछे संगम्युद् केन्द्र पर पहुँचती हैं। समानान्तर किरणों का यह संगम्युद् केन्द्र मुख्य पश्चिम संगम्युद् केन्द्र (Principal posterior focus) कहलाता है और काच से इन केन्द्र की दूरी 'काच का केन्द्रान्तर' (Focal distance of the lens) या काच की लम्बाई (Length of the lens) कहलाती है। काच की प्रकाश वक्रीकरण

शक्ति इस केन्द्रान्तर के विपर्यस्त अनुपात में होती है यथा कम केन्द्रान्तर का काच प्रकाशकिरणों को अधिक चक्र करेगा और अधिक केन्द्रान्तर का कम । २० फीट से अधिक दूरी की वस्तुओं से जो किरणें आती हैं, वह समानान्तर मानी जाती हैं ।

उभयोन्नतोदर काच के मध्य में एक ऐसा बिन्दु होता है जिसे रश्मिकेन्द्र (Optical centre) कहते हैं । यहाँ से जाने वाली किरणों का चक्रीभवन नहीं होता । इसी प्रकार का एक केन्द्र नेत्र में भी होता है जो नाभिविन्दु (Nodal point) कहलाता है । इस केन्द्र तथा मुख्य संव्यूह केन्द्र को मिलाने वाली रेखा काच का 'मुख्य अक्ष' (Principal axis) कहलाती है ।

(ख) यदि वस्तु काच के और निकट लाई जाय जिससे समानान्तर किरणें तो नहीं निकलें, किन्तु इसकी दूरी मुख्य काचान्तर से अधिक हो, तब प्रकाश-किरणों का संव्यूहन मुख्य पश्चिम संव्यूह के बाहर होता है ।

(ग) यदि वस्तु और निकट लाई जाय जिससे उसकी दूरी काचान्तर से भी कम हो जाय तो किरणें ऐसी यहिर्मुखी होंगी कि काच के पीछे किसी बिन्दु पर उनका संव्यूहन नहीं हो सकेगा ।

नेत्र के द्वारा प्रतिबिम्ब का निर्माण

नेत्र के पृष्ठ उन्नतोदर काच के समान कार्य करते हैं । नेत्र के अनेक पृष्ठभास हैं जिनसे प्रकाश का चक्रीभवन होता है, किन्तु इनमें तनुजल, दृष्टिमण्डल और सान्द्रजल में ही तीन मुख्य हैं । उनका चक्रीभवनांक निम्नलिखित है:—


स्वच्छमण्डल	१.३४	तनुजल	१.३२
दृष्टिमण्डल	१.४२	सान्द्रजल	१.३३

प्रकाश का चक्रीभवन मुख्यतः नीचे पृष्ठों से होता है:—

१. स्वच्छमण्डल का पूर्वपृष्ठ
२. दृष्टिमण्डल का पूर्वपृष्ठ
३. दृष्टिमण्डल का पश्चिम पृष्ठ

समानान्तर किरणें एक केन्द्र पर संव्यूहित होती हैं जो स्वच्छमण्डल के पृष्ठ

के पीछे २२.८ मि. मी. दूरी पर स्थित है और प्राकृत नेत्र में स्वच्छमण्डल की दूरी भी यही है।



चित्र ६१-दृष्टि वितान पर वस्तुओं का प्रतिबिम्ब

क-ख-ग-दृश्यवस्तु, घ-दृष्टिकोण, च-प्रतिबिम्ब, छ-नाभिबिन्दु

अत्यधिक दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब स्वच्छमण्डल के २० मि. मी. पीछे बनता है जब कि ५ मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब स्वच्छमण्डल के २०.०६ मि. मी. पीछे बनता है। चूंकि दृष्टिवितान के रूपादानिका स्तर की गहराई ०.०६ मि. मी. है, अतः वस्तुओं का संव्यूहन धसीम दूरी से ५ मीटर तक नेत्र की शक्ति में किसी परिवर्तन के बिना किया जा सकता है। जब वस्तु ५ मीटर से कम दूरी पर होती है, तो उसका प्रतिबिम्ब दृष्टिवितान के पीछे पड़ता है और वस्तु साफ नहीं दीखती। वह दूरी, जिसमें वस्तुओं का संव्यूहन नेत्र में किसी परिवर्तन के बिना किया जा सके, 'संव्यूहगम्भीर्य' (Depth of focus) कहते हैं।

दृष्टिवितान में वस्तुओं का प्रतिबिम्ब उलटा बनता है

प्रकाश के वक्रोन्मेष के कारण वस्तुओं का प्रतिबिम्ब नेत्र के दृष्टिवितान पर उलटा और छोटा होता है। किन्तु इसे हम सीधा देखते हैं इसका कारण यह है कि मस्तिष्क में जाकर मनोवैज्ञानिक रीति से वह फिर उलट जाता है और इस प्रकार दो बार उलटने से उसका रूप सीधा हो जाता है। इस संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिये कि वस्तुतः रूपसंज्ञा नेत्र में उत्पन्न न होकर मस्तिष्क में होती है अतः मस्तिष्क में अन्तिम परिणाम होने के बाद उसके अनुसार ही वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त, उस संज्ञा को याद वस्तुओं में

आरोपित (Project) कर उनसे उसका संबन्ध स्थापित किया जाता है । यह अनुभव से सिद्ध है और न केवल रूप के संबन्ध में ही, बल्कि अन्य संज्ञाओं के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है ।

वस्तुओं का प्रतिबिम्ब नेत्र पर उलटा बनता है, इसको देखने के लिए निम्नांकित प्रयोग किया जा सकता है:—

नेत्र में वस्तुओं का प्रतिबिम्ब उलटा बनता है, किन्तु अभ्यास के कारण उन्हें हम सीधा देखते हैं । एक मोटे कागज में सुई से छोटा छेद कर दो और उसे नेत्र के सम्मुख प्रायः एक इंच की दूरी पर रखो । तब एक पिन या और कोई पतली वस्तु इस छिद्र और नेत्र के बीच में रखो और उसे ऊपर-नीचे उठाओ । पिन स्पष्ट देख पड़ेगा, किन्तु उलटा । यह तो प्रत्यक्ष है कि पिन को नेत्र के इतना निकट रखने पर उसका कोई प्रतिबिम्ब नेत्र के परदे पर नहीं पड़ सकता । फिर हम देखते क्या हैं ? केवल पिन की छाया जो इतनी स्पष्ट इस कारण दिखाई देती है कि प्रकाश एक अत्यन्त छोटे छिद्र में से आता है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि छाया सदा सीधी ही होती है किन्तु नेत्रपटल पर पड़ी हुई छाया को हम उलटी देखते हैं । अतः सिद्ध हुआ कि जैसा प्रतिबिम्ब हमारे नेत्रपटल पर पड़ता है, वस्तु को हम ठीक उससे उलटी समझते हैं ।

रश्मिकेन्द्रीकरण (Accomodation)

नेत्र स्वभावतः दूररष्टि का अभ्यस्त होता है । उपर कहा गया है कि नेत्र का मुख्य संव्यूहकेन्द्र इस प्रकार दृष्टिविज्ञान में व्यवस्थित है कि दूर से आने वाली प्रकाश की समानान्तर किरणें ठीक दृष्टिविज्ञान के रूपादानिका स्तर पर संव्यूहित होती हैं । पूर्णविश्रामकाल में, जिस दूरी तक वस्तुओं के रूप का ग्रहण ठीक-ठीक किया जा सके, उसे नेत्र का दूर बिन्दु (Far point or Punctum remotum) कहते हैं । प्राकृत नेत्र में यह बिन्दु असीम पर होता है, किन्तु व्यवहार में २० फीट से अधिक दूरी से आनेवाली किरणें समानान्तर मानी जाती हैं । अतः स्वाभाविक नेत्र उन्हीं वस्तुओं का ठीक-ठीक ग्रहण कर सकता है जो २० फीट या उससे अधिक दूरी पर स्थित हैं । इससे स्पष्ट है कि यदि वस्तुओं की दूरी इससे कम कर दी जाय और नेत्र में कोई परिवर्तन न हो तो उन

वस्तुओं से आने वाली किरणों का संव्यूहन दृष्टिवितान पर न होकर उसके कुछ पीछे होगा, फलतः प्रतिविम्ब स्पष्ट नहीं होगा। इस दोष के निराकरण के लिए, नेत्र में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, जिनसे दृष्टिमण्डल की वक्रता बढ़ जाती है और नेत्र की अन्तर्मुखीकरण शक्ति (Converging power) इतनी बढ़ जाती है कि निकट वस्तुओं से आने वाली किरणों का ठीक दृष्टिवितान पर संव्यूहन होता है और इस प्रकार निकटवर्ती वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिविम्ब प्राप्त होता है। नेत्र की यह शक्ति, जिससे दृष्टिमण्डल की वक्रता में परिवर्तन होता है, रश्मिकेन्द्रीकरण कहलाती है। फोटोग्राफ कैमरे में यह कार्य प्लेट को पीछे हटाने तथा काच को आगे बढ़ाने से हो जाता है, किन्तु नेत्र में न दृष्टिवितान पाछे हटाया जा सकता है और दृष्टिमण्डल ही आगे बढ़ाया जा सकता है। अतः संव्यूहन का कार्य दृष्टिमण्डल की वक्रता, फलतः प्रकाश वक्रीकरणशक्ति, बढ़ा कर संपन्न होता है।

रश्मिकेन्द्रीकरण-क्रिया

रश्मिकेन्द्रीकरण की क्रिया किस प्रकार होती है, इसका ज्ञान मुख्यतः हेमहौज नामक विद्वान् के अनुसन्धानों से प्राप्त हुआ है। इसे हेमहौज का शैथिल्यसिद्धान्त (Helmholtz relaxation theory) कहते हैं।

यह दृष्टिमण्डल की स्थितिस्थापकता पर निर्भर करता है। दृष्टिमण्डल एक उभयोनतोर वस्तु है जो आवरक कोषाणुओं से घना है तथा कलाकोष से आवृत रहता है। स्वतः दृष्टिमण्डल की रचना ऐसी है कि उसमें स्थितिस्थापकता का गुण नहीं है। किन्तु उसके कलाकोष में स्थितिस्थापकता है और उसका दबाव बराबर दृष्टिमण्डल पर पड़ता है। दृष्टिमण्डल भी कलाकोष के आकार के अनुरूप ही रहता है यह कलाकोष में थोड़ा सा भेदन करके देखा जाता है। भेदन करने पर द्रव फँस जाता है और उस छिद्र से दृष्टिमण्डल की कोमल वस्तु बाहर निकल आती है। यह परिणाम परिधिबेधनचक्र के सिंचाव के कारण नहीं होता, क्योंकि नेत्र से दृष्टिमण्डल को पृथक् करने पर भी यह देखा जाता है। कलाकोष परिधिबेधन-चक्र के द्वारा सन्धानमण्डल से सम्बद्ध रहता है। कलाचक्र के द्वारा कलाकोष सदैव सिंचाव पर रहता है जिससे कलाकोष तथा तदन्तर्बर्ती दृष्टिमण्डल

चपटे बने रहते हैं। कलाचक्र के सूत्र दृष्टिमण्डलबन्धनी के रूप में कार्य करते हैं जिसके सहारे वह सान्द्रजल के ऊपरी खात में अवलम्बित रहता है। जब ये सूत्र विच्छिन्न हो जाते हैं तब दृष्टिमण्डल अपने स्थान से अंशतः विक्षिप्त हो जाता है। इस अवस्था को दृष्टिमण्डल-विश्लेष (Subluxation) कहते हैं।

कलाचक्र जो दृष्टिमण्डल को अपने स्थान में धारण किये रहता है अनेक सूत्र-गुच्छों से बना है जो सन्धानमण्डल के पृष्ठ से कलाकोप तक फैले रहते हैं ज्यों ज्यों नेत्र का आकार बढ़ता है त्यों त्यों ये सूत्र अधिक खिंच जाते हैं जिससे दृष्टिमण्डल चपटा हो जाता है जो भ्रूणावस्था में प्रायः गोलाकार होता है।

पहले बतलाया गया है कि सन्धानपेशिका में तीन प्रकार के पेशीसूत्र होते हैं:—

१. विसारी सूत्र (Meridional fibres)—जो स्वच्छ शुक्लसंधिस्थान पर उत्पन्न होते हैं।

२. अनुलम्ब सूत्र (Longitudinal fibres)—जिनके बीच बीच में संयोजक तन्तु रहता है।

३. वृत्तसूत्र (Circular fibres of muller)—ये संकोचक सूत्र हैं और रश्मिकेन्द्रीकरण के समय संकुचित हो जाते हैं। निकट दृष्टि वाले व्यक्तियों में ये कम विकसित तथा दूर दृष्टि वालों में अधिक विकसित होते हैं।

रश्मिकेन्द्रीकरण के समय सन्धानपेशिका, विशेषतः इसके वृत्तसूत्र, संकुचित होते हैं, जिससे कर्तुरवृत्ति और सन्धानमण्डल आगे की ओर खिंच जाते हैं। परिणामस्वरूप, सन्धानमण्डल तथा दृष्टिमण्डल के बीच का अवकाश, जिसमें कला चक्र रहता है, कम हो जाता है और इस प्रकार कलाचक्र का खिंचाव शिथिल हो जाता है। इस शिथिलता के कारण दृष्टिमण्डल के कलाकोप का खिंचाव भी कम हो जाता है और दबाव हट जाने पर दृष्टिमण्डल भी अपने स्वाभाविक गोल आकार में जाने लगता है। फलतः दृष्टिमण्डल के दोनों ओर घर्षता बढ़ जाती है। चूँकि दृष्टिमण्डल का पश्चिम पृष्ठ सान्द्रजल के कारण स्थिर रहता है, कलाकोप के शैथिल्य का प्रभाव मुख्यतः उसके पूर्व पृष्ठ पर दृष्टि-गोचर होता है, जो सामने की ओर उन्नत हो जाता है और इस प्रकार दृष्टिमण्डल की प्रकाश चक्रीकरणशक्ति बढ़ जाती है। परिणाम यह होता है कि नेत्र की प्रकाश-

चक्रीकरणशक्ति ऐसी बढ़ जाती है जैसे उसके सामने उन्नतोदर काच रख दिया गया हो और प्राकृत नेत्र उस समय के लिए निकटदर्शी हो जाता है।

दृष्टिमण्डल की चक्रता में वृद्धि संधानपेशिका के संकोच के अनुपात से होती है। दृष्टिमण्डल जब आगे की ओर अधिक उन्नत हो जाता है तब उसका मध्य-रेखाव्यास भी कम हो जाता है। सामान्यतः विश्रामकाल में दृष्टिमण्डल के पूर्वपृष्ठ की चक्रता का मध्यरेखाव्यास (Radius) १० मि.मी. तथा पश्चिम पृष्ठ का ६ मि.मी. रहता है। निकट की वस्तुओं को देखने के समय दोनों पृष्ठों की चक्रता में अन्तर हो जाता है। प्रबल केन्द्रीकरण के समय पूर्वपृष्ठ की चक्रता ५.३ मि.मी. तथा पश्चिम पृष्ठ की चक्रता ५.३३ मि.मी. हो जाता है। अधिकतम केन्द्रीकरण के समय दृष्टिमण्डलबन्धनी के शैथिल्य के कारण दृष्टिमण्डल लगभग ०.२५ से ०.३ मि.मी. तक नीचे की ओर खिसक आता है।

अनुसन्धानों से यह सिद्ध है कि पूर्वपृष्ठ की चक्रता ८७ प्रतिशत बढ़ जाती है तथा पश्चिम पृष्ठ की २२.५ प्रतिशत। पूर्वपृष्ठ की चक्रता में वृद्धि होने से अग्रिमा-अलघानी वसी अनुपात में कुछ छोटी हो जाती है। इससे दृष्टिमण्डल के समस्त भाग में समान रूप से शक्ति नहीं बढ़ती, किन्तु अरु के निकट अधिकतम रहती है।

शनिङ्ग का दबाववृद्धि का सिद्धान्त

(Tscherning's theory of increased tension)

शनिङ्ग नामक विद्वान् के मत में सन्धानपेशिका के संकोच से दृष्टिमण्डल का चौथिह्य नहीं होता (जैसा कि हेमहौज ने प्रतिपादित किया है) बल्कि यह और फस जाता है जिससे दृष्टिमण्डल का कलाकोप दब जाता है । इसी दबाव के कारण दृष्टिमण्डल आगे की ओर निकल जाता है । इस मत के पक्ष में निम्नांकित प्रमाण हैं :—

(१) ररिमकेन्द्रीकरण के समय दृष्टिमण्डल का पूर्वपृष्ठ का आकार बदल जाता है । उसका केन्द्रीय भाग अधिक उन्नतोदर तथा प्रान्तीय भाग अधिक चपटा होता है । यदि कलाकोप शिथिल हो जाता है तो उसका आकार गोल हो जाना चाहिये, न कि बीच में उठा हुआ और दोनों प्रान्तों में चपटा ।

(२) यह देखा गया है कि कलाकोप की स्थूलता सर्वत्र समान नहीं है । पूर्वभाग में यह पतला और पश्चिमभाग में मोटा है । इसलिए ऐसी स्थिति में जब कोप का दबाव पड़ता है तो यह स्थूलभाग की ओर अधिक होता है और इसीलिए दृष्टिमण्डल आगे की ओर निकल आता है ।

मतभेद होने पर प्रायोगिक प्रमाण अधिक हेमहौज के सिद्धान्त के पक्ष में ही हैं क्योंकि यह देखा गया है कि केन्द्रीकरण के समय दृष्टिमण्डल कलाकोप के भीतर शिथिल अवस्था में रहता है ।

ररिमकेन्द्रीकरण की सीमा

ररिमकेन्द्रीकरण की शक्ति का माप दूर या निकट की सीमाओं से किया जाता है । दूरविन्दु (*Punctum remotum or far point*) वह बिन्दु है जहाँ केन्द्रीकरण क्रिया के शिथिल रहने पर नेत्र का संव्यूहन किया जाता है । निकटविन्दु (*Near point or punctum proximum*) वह बिन्दु है जहाँ अधिकतम केन्द्रीकरण के समय नेत्र का संव्यूहन किया जाता है ।

प्राकृत नेत्र में दूरविन्दु असीम दूरी पर रहता है, क्योंकि विध्राम की अवस्था में नेत्र का संव्यूह समानान्तर किरणों के लिए होता है । निकटविन्दु को निश्चित करने के लिए किसी वस्तु को नेत्र के निकट लाते हैं जब तक कि वह अस्पष्ट न हो जाय तथा सन्धानपेशिका के प्रचलित सङ्कोच के होने पर भी उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब

न हो सके। जहां से वह वस्तु अस्पष्ट होने लगती है, इसे निकटविन्दु कहते हैं। आयु के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, इसकी दूरी बढ़ती जाती है।

रश्मिकेन्द्रीयकरण के समय नेत्र में परिवर्तन

(१) दृष्टिमण्डल की चक्रता में वृद्धि विशेषतः उसके पूर्वपश्चिम व्यास में वृद्धि — यह वस्तुओं के स्पष्ट संव्यूहन के निमित्त सन्धानपेशिका के सङ्कोच से होता है। दृष्टिमण्डल अधिक स्थूल हो जाता है और उसका व्यास कम हो जाता है। इससे उसकी प्रकाश चक्रीकरण शक्ति बढ़ जाती है।

(२) नेत्रों की अन्तर्मुखता—अन्तर्दृष्टिनी पेशियों के सङ्कोच के कारण नेत्र अन्तर्मुख हो जाते हैं जिससे दोनों नेत्रों के दृष्टि वितान के समान बिन्दु पर वस्तुओं का संव्यूहन होता है और इस प्रकार द्विदृष्टि नहीं होने पाती।

(३) कर्नीनकों का सङ्कोच — कर्नीनकसङ्कोचनी पेशियों के सङ्कोच के कारण कर्नीनकों का सङ्कोच हो जाता है। इससे पारदर्शनी किरणों का निरोध हो जाता है और दृष्टिवितान पर प्रतिबिम्ब स्पष्ट बनता है।

उपर्युक्त तीनों पेशियों का सम्बन्ध तृतीय नाड़ी से है।

दृष्टिसम्बन्धी विकार

जिस नेत्र का दूरविन्दु असीम दूरी पर हो तथा निकटविन्दु लगभग ८ इंच की दूरी पर हो उसे प्राकृत नेत्र (Emmetropic eye) कहते हैं। कुछ व्यक्तियों के नेत्र में दृष्टिवितान स्वच्छमण्डल के २३ मि. मी. पीछे न होकर और अधिक दूरी पर पीछे (निकटदृष्टि) या और आगे (दूरदृष्टि) स्थित हो, तो प्रतिबिम्ब स्पष्ट न बनने से दृष्टि विकृत हो जाती है। इन विकारों को चक्रीभवन के विकार (Errors of refractions) तथा ये नेत्र को विकृत नेत्र (Ametropic) कहते हैं। ये विकार निम्नांकित कारणों से हो सकता है —

(क) नेत्रसोवक्रता का अभाव होना या अत्यधिक होने से, इसे अक्षीय विकार (Axial ametropia) कहते हैं।

(घ) प्रकाशचक्रीकरण दृष्टि की चक्रता में परिवर्तन होने से। इसे वक्रता-विकार (Curvature ametropia) कहते हैं।

(१) निकटदृष्टि (Myopia) इस विकार में निकट की वस्तुयें साफ दिखलाई पड़ती हैं किन्तु दूर की वस्तुयें नहीं दिखाई देती । इसका कारण यह है कि दूर से आती हुई समानान्तर किरणें दृष्टिवितान पर केन्द्रित न होकर उसके आगे होती हैं, इसलिए दृष्टिवितान पर प्रतिबिम्ब स्पष्ट नहीं बनता । इसके विपरीत, निकटवर्ती वस्तुओं की किरणें दृष्टिवितान पर ठीक-ठीक केन्द्रित होती हैं, अतः उनका प्रतिबिम्ब स्पष्ट बनता है ।

यह विकार नेत्रगोलक के अधिक लम्बा होने से या स्वच्छमण्डल या दृष्टिमण्डल की वक्रता अधिक होने से होता है । यह जन्म ही से हो सकता है, किन्तु सामान्यतः पोषण की कमी या रोगों के कारण नेत्रगोलक के स्तरों में दुर्बलता आ जाने से होता है ।

निकट की वस्तुओं को देखते समय नेत्रगोलकों के अन्तर्मुखी भवन से नेत्रगत तरल का दबाव बढ़ जाता है । जब नेत्रगोलक के स्तर दुर्बल होते हैं तब इस दबाव से प्रभावित होकर वे लम्बे हो जाते हैं और दृष्टिवितान भी पीछे की ओर हट जाता है । अतः मुख्य संव्यूहन केन्द्र दृष्टिवितान पर न होकर उसके सामने की ओर होता है ।

यह विकार नतोदर काच के द्वारा दूर किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य की स्वभाविक प्रकाश केन्द्रीकरणशक्ति मुख्य संव्यूह दूरी को कम कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती । नतोदर काच प्रकाश की किरणों को यहिर्मुख कर देते हैं और इस प्रकार काच और दृष्टिमण्डल का सम्मिलित संव्यूहान्तर अधिक हो जाने से दृष्टिवितान पर प्रतिबिम्ब स्पष्ट बनता है ।

(२) दूरदृष्टि (Hypermetropia) पूर्वाक्ष विकार के यह ठीक उल्टा होता है । इसमें दूर की वस्तुयें साफ दीखती हैं, किन्तु निकटवर्ती वस्तुयें स्पष्ट नहीं दीखती ।

इस विकार में नेत्रगोलक छोटा हो जाता है और उसका पूर्वपश्चिम व्यास कम हो जाता है । अतः समानान्तर किरणों का संव्यूहन दृष्टिवितान के पीछे किसी

बिन्दु पर होता है। प्राकृत नेत्र की अपेक्षा इसमें निकटबिन्दु अधिक दूरी पर होता है।

यह विकार उन्नतोदर काच के प्रयोग से दूर किया जाता है। ये काच नेत्र में प्रविष्ट होने वाली किरणों को अन्तर्मुख कर देते हैं जिससे दृष्टिविज्ञान पर प्रतिबिम्ब बनता है।

(३) जरादृष्टि (Presbyopia) बुढ़ापे में मण्डलाष्टिका के कठिन होने तथा सन्धानपेशिकाओं के दुर्बल होने से प्रकाशकेन्द्रीकरण शक्ति क्रमशः क्षीण हो जाती है, अतः निकट की वस्तुयें दिखालाई नहीं देती। पहिले बतलाया गया है कि आयु के साथ निकटबिन्दु भी बढ़ता जाता है यथा:—

आयु	निकटबिन्दु
१० वर्ष	७ से. मी.
२० " "	१० " "
३० " "	१४ " "
४० " "	२२ " "
५० " "	४० " "

जब निकटबिन्दु १५ से. मी. (१० इंच) पर पहुँचता है तब विकार स्पष्ट होने लगता है। रोगी को पुस्तक पढ़ने में कष्ट होने लगता है और साफ देखने के लिए वस्तुओं को कुछ दूरी पर रखना पड़ता है।

इस विकार में अल्पशक्ति के उन्नतोदर काचों का प्रयोग निकटवर्ती वस्तुओं को देखने या पढ़ने के लिए किया जाता है।

(४) विषमदृष्टि (Astigmatism) यह विकार स्वच्छमण्डल या दृष्टि मण्डल की वक्रता में वैषम्य होने से होता है। इसलिये नेत्र एक ओर निकटदर्शी तथा दूसरी ओर दूरदर्शी हो सकता है। सामान्यतः स्वच्छमण्डल में विकार होता है। इसका पृष्ठ अनुप्रस्थ दिशा में चौड़ा तथा अनुलम्ब दिशा में उन्नत होता है जिसके कारण उसका आकार घूर्त्त न हो कर अंडाकार हो जाता है। उस स्वच्छमण्डल को चमचाकार (Spoon-shaped) भी कहा जाता है। इस स्थिति

में जत्र समानान्तर किरणें नेत्र पर पड़ती हैं तो अनुलम्ब और अनुप्रस्थ दोनों किरणों का दृष्टिवितान के एक ही बिन्दु पर संव्यूहन नहीं हो पाता, जिससे प्रति-विम्ब स्पष्ट नहीं घनता । यह विकार चार प्रकार का होता है:—

(१) नियमानुरूप सामान्य विषमदृष्टि (Regular astigmatism according to the rule) इसमें स्वच्छमण्डल की चक्रता अनुप्रस्थ की अपेक्षा अनुलम्ब दिशा में अधिक होती है ।

(२) निषमविरुद्ध सामान्य विषमदृष्टि (Regular astigmatism against the rule) इसमें अनुप्रस्थ दिशा में चक्रता अधिक होती है ।

(३) असामान्य विषमदृष्टि (Irregular astigmatism) इसमें मग इत्यादि के कारण स्वच्छमण्डल का पृष्ठ अनियमित हो जाता है ।

(४) दृष्टिमण्डलीय विषमदृष्टि (Lenticular astigmatism) इसमें दृष्टिमण्डल के कुछ मुड़ जाने से विकृति होती है ।

यह विकार पेलनाकार (Cylindrical) काच के प्रयोग से दूर होता है।

(५) मण्डलीय दृष्टि (Spherical aberration) दृष्टिमण्डल के परिधिभाग से जानेवाली किरणों का केन्द्रभाग से जानेवाली किरणों की अपेक्षा चक्रीभवन अधिक होता है, अतः उनका संव्यूहन दृष्टिवितान के एक ही बिन्दु पर नहीं हो पाता ।

यह विकार कनीनक-मञ्जोचनी पेशियों के सञ्कोचसे दूर हो जाता है, क्योंकि इससे किरणें परिधिभाग से न आकर केवल केन्द्रभाग से आती हैं । परिधिभाग की अपेक्षा केन्द्रभाग की चक्रता बढ़ा देने से भी विकार का निराकरण हो जाता है । मनुष्य का नेत्र स्वभावतः ऐसा होता है ।

(६) वर्णदृष्टि (Chromatic aberration) प्रकाश की किरण दृष्टि मण्डल में घुसने पर अनेक वर्णों में विभक्त हो जाती है और प्रतिविम्ब के चारों ओर वर्णयुक्त परिधि प्रतीत होती है । इसे वर्णदृष्टि कहते हैं । इस किरण को यदि एक भेद्य काच के द्वारा प्रविष्ट कराया जाय तो यह विकार दूर हो जाता है । मनुष्य के नेत्र में स्वभावतः किरणों का वर्ण विभाग नहीं होता, क्योंकि दृष्टिवितान पर

पहुँचने के पहले वे स्वच्छमण्डल तथा दृष्टिमण्डल से गुजरती है जिनका आकार और घनत्व एक दूसरे से भिन्न होता है।

तारामण्डल के कार्य

(१) यह नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश के परिमाण का नियमन करता है। तीव्र प्रकाश में कनीनक संकुचित हो जाते हैं, जिससे आवश्यकता से अधिक प्रकाश नेत्र के भीतर नहीं घुस पाता और इस प्रकार दृष्टि वितान को कोई चति नहीं हो पाती। इसी तरह मन्द प्रकाश में कनीनक फैल जाते हैं जिससे अधिक से अधिक प्रकाश नेत्र में आ सके और वस्तुओं का प्रतिबिम्ब स्पष्ट बन सके।

(२) यह एक प्राचीर के रूप में कार्य करता है, जिससे अनियमित प्रान्तीय किरणें नेत्र के भीतर प्रविष्ट नहीं होने पाती और दृष्टि में कोई धाधा नहीं होने पाती।

(३) कनीनक का सङ्कोच संव्यूह की गम्भीरता को बढ़ा देता है, जो निकट दृष्टि के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

तारामण्डल की नाडियाँ

तारामण्डल में निम्नांकित तीन प्रकार की नाडियाँ सम्यक् रहती हैं:—

१. तृतीय नाडी—जो कनीनक सङ्कोचनी पेशी से सम्यक् है।
२. ग्रैवयक सांवेदनिक नाडी—जो कनीनक विस्फारणी से सम्यक् है।
३. पञ्चमी नाडी के चाक्षुष विभाग की नासानुरा शाखाओं के प्रतान—जो संज्ञा का वहन करते हैं।

कनीनक सङ्कोचनी पेशियों से सम्यक् नाडीसूत्र मध्यमस्तिष्क में उत्पन्न होकर तृतीय नाडी के द्वारा सन्धानगण्ड और उसके बाद लघु सन्धान नाडियों के रूप में कनीनक संकोचनी पेशियों से सम्यक् रहते हैं।

कनीनक विस्फारणी नाडियों के सूत्र निम्नांकित क्रम से विस्फारिणी पेशियों तक पहुँचते हैं:—

१. मध्य—मस्तिष्क (में उत्पन्न)
२. सुषुम्नाकाण्ड
३. चाक्षुषसौषुम्निक केन्द्र (Cilio-spinal centre)
४. प्रथम, द्वितीय और तृतीय चर्रीय सौषुम्निक नाडियाँ

५. प्रथम बन्धीय नाडीगण्ड
७. अर्धचन्द्र नाडीगण्ड
९. दीर्घ सन्धाननाडियां

६. ऊर्ध्व प्रवेयक नाडीगण्ड
८. चाक्षुषविभागा

तारामण्डल की प्रत्यावर्तित क्रियायें

कनीनकों का संकोच प्रत्यावर्तित रूप से निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है:—

१. जब नेत्र पर प्रकाश पड़ता है (प्रकाश प्रत्यावर्तन)
२. केन्द्रीकरण के समय—(केन्द्रीकरण प्रत्यावर्तन) इसी प्रकार कनीनकों का प्रसार होता है—

३. जब शरीर की अनेक संज्ञावह नाडियां उत्तेजित होती हैं (संज्ञा प्रत्यावर्तन)

(१) केन्द्रीकरण या अन्तर्मुख प्रत्यावर्तन (Accomodation or convergence reflex) जब निकटवर्ती वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र का केन्द्रीकरण किया जाता है तब कनीनकसंकोचनी पेशियों के संकोच के कारण कनीनक संकुचित हो जाते हैं । इस क्रिया में प्रत्यावर्तन चक्र निम्नांकित प्रकार से बनता है:—

(क) संज्ञावह सूत्र—पद्ममी नाडी के संज्ञासूत्र जो सन्धान पेशिका के संकोच से उत्तेजित होते हैं ।

(ख) केन्द्र—मध्यमस्तिष्क में तृतीय नाडी के केन्द्र के निकट स्थित है ।

(ग) श्रेष्ठा वह सूत्र—तृतीय नाडी की लघु सन्धानिका शाखायें । इसमें दोनों नेत्रों में संकोच होता है, यद्यपि एक नेत्र ढँका भी हो ।

ऐसा भी समझा जाता है कि यह शुद्ध प्रत्यावर्तित क्रिया नहीं है बल्कि अन्तर्दर्शिनी तथा सन्धानपेशिकाओं के संकोच से कनीनक संकोचनी पेशियों में भी 'साहचर्य' कार्य सम्पन्न होता है । इसे 'साहचर्य' सिद्धय (1889-1890-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-415

(२) प्रकाश प्रत्यावर्तन (Light reflex) यह देखा जाता है कि अतितीव्र प्रकाश में कनीनक नितान्त संकुचित हो जाते हैं। यह क्रिया स्वतन्त्र रूप से और अनजाने होती है। इसमें प्रत्यावर्तन वक्र निम्नांकित रूप से बनता है—

(क) संज्ञावह सूत्र—दृष्टिनाडीसूत्र ।

(ख) केन्द्र—कनीनककेन्द्र जो मध्यमस्तिष्क में तृतीयनाडीकेन्द्र के निकट स्थित है।

(ग) चेष्टावह सूत्र—लघु सन्धानिका नाडियाँ।

महत्त्वः—प्रकाश के प्रत्यक्षीकरण का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चिह्न है।

(३) द्विपार्श्विक प्रकाश प्रत्यावर्तन (Consensual light reflex) यदि एक नेत्र में प्रकाश दिया जाय तो दोनों कनीनकों का संकोच हो जाता है। इसे द्विपार्श्विक प्रकाश प्रत्यावर्तन कहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक दृष्टिवितान उत्तरकलायिका (Superior corpora quadrigemina) के द्वारा दोनों पार्श्वों के कनीनककेन्द्रों को उद्बोधित करता है। इसका प्रत्यावर्तन वक्र प्रकाश प्रत्यावर्तन के समान होता है।

महत्त्वः—इसके द्वारा हमें एक नेत्र की परीक्षा से ज्ञात हो जायगा कि दूसरे नेत्र से प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण होता है या नहीं? जिस नेत्र में दृष्टिनाडी के अवरोध के कारण प्रकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसमें प्रकाश देने पर न उसके कनीनक का संकोच होगा और न दूसरे नेत्र के कनीनक का। किन्तु यदि दूसरे स्वस्थ नेत्र में प्रकाश देने पर विकृत नेत्र में भी कनीनक का संकोच होता है तो इसका अर्थ यह है विकृति केवल दृष्टिनाडी तक ही सीमित है और चेष्टा वह मार्ग (तृतीय नाडी, सन्धानगण्ड और लघु सन्धान सूत्र) बिल्कुल स्वस्थ है।

(४) वर्निक का प्रत्यावर्तन (Wernick's reflex) यदि प्रत्यावर्तन सूत्रों के बाद दृष्टिनाडी के सूत्रों में विकृति हो तो प्रकाश प्रत्यावर्तन होगा, किन्तु प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। इसके विपरीत, निम्नांकित अवस्थाओं में, प्रकाश का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु प्रत्यावर्तन नहीं होता—

(क) तारामण्डल के कुछ रोग—यथा संसक्ति ।

(ख) चेष्टावह मार्ग में कोई विकार—यथा तृतीयनाडीकेन्द्र का आघात या लघुसन्धान नाडियों की क्रियाहीनता ।

(ग) कुछ नाडीसंस्थान के रोग—यथा—फिरिंगअन्य (*Tabes dorsalis*) या वर्धमान पक्षाघात । प्रथम रोग में केन्द्रीयवर्ण प्रत्यावर्तन ठीक रहता है किन्तु प्रकाश प्रत्यावर्तन मृदु या मन्द हो जाता है। यह एक-पार्श्विक या द्विपार्श्विक हो सकता है । इसे प्रत्यावर्तन रहित कनीनक (*Argyll-Robertson pupil*) कहते हैं और यह उस व्याधि के निदान में अत्यधिक सहायक होता है ।

(घ) आत्ययिक प्रकाश प्रत्यावर्तन (*Emergency light reflex*) जब अतितीव्र प्रकाश नेत्रों पर पड़ता है तब कनीनक संकुचित हो जाते हैं, पलक बन्द हो जाते हैं तथा झूझुक जाते हैं । और अधिक तीव्र प्रकाश होने पर शिर भी आगे की ओर झुक जाता है, समस्त मुखमण्डल संकुचित हो जाता तथा अभ्रबाहु नेत्रों के सामने आ जाते हैं । इसका प्रत्यावर्तनबन्ध निम्नांकित रूप में होता है—

१. संज्ञावह नाडी—हृदिनाडी ।

२. केन्द्र—तृतीयनाडी केन्द्र तथा प्रीना और नेत्र की पेशियों के केन्द्र ।

३. चेष्टावह नाडी—कनीनक संकोचनी, नेत्रच्छद, भ्रू, बाहु तथा शिर की पेशियों से सम्बद्ध नाडीसूत्र ।

(ङ) सहचारी प्रत्यावर्तन (*Associated reflexes*) छद प्रत्यावर्तन (*Lid reaction or orbicular reflex*) कनीनक का छद प्रत्यावर्तन पूर्वोक्त साहचर्यजन्य प्रत्यावर्तनों का एक उदाहरण है । इसमें नेत्रच्छद एक दूसरे से अलग कर दिये जाते हैं और उन्हें बन्द होने से रोक दिया जाता है । अब रोगी को आँखें बन्द करने को कहा जाता है । जैसे ही वह बन्द करने का प्रयत्न करता है, कनीनक संकुचित हो जाता है । यह प्रत्यावर्तन द्विपार्श्विक नहीं होता ।

महत्वः—यह प्रत्यावर्तन समस्त चेष्टावह मार्ग की समता का सूचक है ।

(च) मानस प्रत्यावर्तन (*Cortical reflexes*) केवल प्रकाश की

कल्पना से भी कनीनकों का संकोच हो जाता है। यदि इसी प्रकार कोई व्यक्ति यह कल्पना करे कि वह अन्धकार में है, तो उसके कनीनक प्रसारित हो जाते हैं।

(८) त्रिधारा प्रत्यावर्तन (Trigeminal reflex) यदि कोई बाह्य-पदार्थ नेत्र के स्वच्छमण्डल में घुस कर नेत्र में चोम उत्पन्न करे तो कनीनकों का संकोच हो जायगा विशेषतः इसका प्रभाव विकृत पार्श्व में दृष्टिगोचर होगा। पीडा-प्रद उत्तेजना से कनीनक पहले प्रसारित हो जाते हैं, किन्तु कुछ देर तक निरन्तर जारी रखने से वे संकुचित हो जाते हैं।

(९) प्रसार प्रत्यावर्तन (Ciliospinal or dilator reflex) शरीर के किसी अंग में, विशेषतः, शिर और ग्रीवा में, पीडा होने से कनीनकों का प्रसार हो जाता है। भावावेश यथा भय, शोक आदि की अवस्थाओं में भी प्रसार हो जाता है। इसका प्रत्यावर्तन वक्र निम्नलिखित होता है:—

(क) संज्ञावह सूत्र—सुषुम्नानाडियों विशेषतः अन्तिम ग्रैवेयक तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय वक्षीय नाडियों के पश्चिम मूल, शीर्षण्य नाडियों के संज्ञावहसूत्र तथा मस्तिष्क के बाह्य अंश से उद्भूत मानस वेग।

(ख) केन्द्र—बाधुपसौपुनिक केन्द्र (Ciliospinal centre)

(ग) चेष्टावहसूत्र—दीर्घ सन्धाननाडियाँ।

इनके अतिरिक्त एक और प्रत्यावर्तन होता है, जिसे -

निमेष प्रत्यावर्तन (Wink or corneal reflex)

किसी प्रकार स्वच्छमण्डल या नेत्रवर्त्म की उत्तेजना से नेत्रपलक घन्द हो जाते हैं। इसमें संज्ञावह सूत्र पंचमी नाडी की शाखाएँ होती हैं तथा चेष्टावह सूत्र सप्तमी नाडी के होते हैं जो नेत्रनिमीलनी पेशो से संबद्ध रहते हैं।

यदि एक पार्श्व की त्रिधारा नाडी निष्क्रिय हो जाय, तो विकृत पार्श्व के नेत्र-गत स्वच्छमण्डल का स्पर्श करने से किसी नेत्र का निमीलन न होगा और यदि स्वस्थ नेत्र के स्वच्छमण्डल का स्पर्श किया जाय तो दोनों नेत्रों में प्रत्यावर्तन मिलेगा।

इसी प्रकार यदि एक पार्श्व की मौखिकी नाडी निष्क्रिय हो जाय तो विकृत पार्श्व में यह प्रत्यावर्तन नहीं होगा, किन्तु स्वस्थ नेत्र में द्विपार्श्विक प्रत्यावर्तन होगा।

निमेष प्रत्यावर्तन अति तीव्र प्रकार में भी होता है (आत्ययिक प्रत्यावर्तन) । इसके अतिरिक्त झुँकने आदि में नासा की स्नेहलकला का छोम होने से या अचानक तीव्रध्वनि के द्वारा श्रुतिनादियों को उत्तेजित करने से यह प्रत्यावर्तन होता है । इस अन्तिम प्रत्यावर्तन को श्रुतिनिमेष प्रत्यावर्तन (Auro palpebral reflex) कहते हैं ।

तारामण्डल पर औषधों का प्रभाव

। कुछ द्रव्य सीधे मध्यमस्तिष्क में स्थित केन्द्रों पर क्रिया करके प्रभाव उत्पन्न करते हैं और कुछ पेशियों में स्थित नाड़ीग्रन्थियों पर स्थानिक क्रिया करते हैं । जो द्रव्य कनीनकों का विस्फार करते हैं उन्हें कनीनविस्फारक (Mydriatics) कहते हैं तथा जो उनको संकुचित करते हैं उन्हें कनीनसंकोचक (Miotics) कहते हैं ।

एट्रोपीन

यह लघु सन्धाननादियों की पेशीवाडीसंधि को निष्क्रिय कर देता है । इस प्रकार की कनीनसंकोचनी पेशियों को निश्चेष्ट बनाकर कनीनक का विस्फार कर देता है । इसके अतिरिक्त सन्धान पेशिकाओं की क्रियाहीनता से केन्द्रीकरण की शक्ति नष्ट हो जाती है । इसे सन्धान पेशिकाघात (Cycloplegia) कहते हैं । इसके विपरीत, जो द्रव्य कनीनक को संचित करते हैं वे सन्धानपेशिका के संकोच को भी बढ़ा देते हैं ।

इसेरिन, पाइलोकारपाइन और मसकेरिन

। ये लघुसन्धान नादियों के ग्रन्थिभागों को उत्तेजित करते हैं, इसलिए कनीनक को संकुचित कर देते हैं ।

कोकेन

यह दीर्घ सन्धाननादियों के ग्रन्थिभागों को उत्तेजित कर कनीनक को प्रसारित कर देता है तथा अतिप्रबल मात्रा में संकोचक सूत्रों को निष्क्रिय बना देता है और इस प्रकार कनीनक का और अधिक प्रसार हो जाता है । कम मात्रा में इससे संकोचक पेशियों का आघात नहीं होता, अतः प्रकाश प्रत्यावर्तन नष्ट नहीं होता ।

यह सभी स्वतन्त्र पेशियाँ को दुर्बल बना देता है, अतः सारामण्डल संकोचनी पेशी के दुर्बल होने से कनीनक का प्रसार हो जाता है।

रोगनिर्णय में इसका प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है चूँकि इसकी क्रिया दीर्घ सन्धान नाडियों के प्रान्तभागों पर होती है, अतः इन नाडियों के आघात की अवस्था में इससे कनीनक का प्रसार नहीं होता।

अद्रिनिलीन

यह दीर्घ सन्धान नाडियों को उत्तेजित कर कनीनक को प्रसारित कर देता है। अतः अधिपृष्ठाग्रन्थि के क्रियाधिक्य में कनीनकों का प्रसार हो जाता है।

अफीम

इसकी क्रिया केन्द्र पर होती है, अतः दोनों कनीनकों का सङ्कोच हो जाता है।

छोरोफार्म और ईथर

पहले ये केन्द्र को उत्तेजित करते हैं, अतः कनीनकों का सङ्कोच होता है, किन्तु अधिक मात्रा में केन्द्र का आघात होने से कनीनकों का प्रसार हो जाता है।

में भी वैषम्य होता है । इसे कनीनक वैषम्य (Anisocoria) कहते हैं ।

कनीनक का सङ्कोच और प्रसार निम्नाङ्कित कारणों से भी होता है:—

कनीनकसङ्कोच

१. तृतीय नाड़ी की उत्तेजना
२. ग्रैवेयक सांवेदनिक का आघात
३. प्रकाश प्रत्यावर्तन के समय
४. केन्द्रीकरण प्रत्यावर्तन के समय
५. इसेरिन पाइलोकारपाइन, यामसके-
रिन को लघुसन्धान नाड़ियों पर
क्रिया
६. केन्द्र पर अफीम की क्रिया
७. निद्राकाल में

८. क्षोरोफार्म से संज्ञाहरण के
प्रारम्भ में

कनीनकप्रसारण

१. तृतीय नाड़ी का आघात
२. ग्रैवेयक सांवेदनिक की उत्तेजना
३. अन्धकार में
४. केन्द्रीकरण की समाप्ति में
५. श्वासरुद्ध के समय तथा श्वासावरोध
की अन्तिम अवस्थाओं में
६. क्षोरोफार्म का प्रभाव
७. कुछ भाजावेदों की अवस्थाओं में, यथा
भय इत्यादि, जब अधिवृक् ग्रन्थि के
क्रियाधिक्य से रक्त में अदिनिलीन
का आधिक्य हो जाता है ।
८. ओपजन की कमी होने पर उपर्युक्त
कारण से
९. खूब में पीडाग्रद उत्तेजना विशेषतः
प्रीवाप्रदेश में
१०. ऐट्रोपीन के द्वारा लघुसन्धान नाड़ियों
का आघात
११. कोकेन के द्वारा दीर्घसन्धान नाड़ियों
को उत्तेजना
१२. क्युरार के द्वारा प्रसारकेन्द्र की
उत्तेजना
१३. नेत्रगत दबाव अधिक होने पर यथा
अधिमन्थ में

दृष्टिवितान के कार्य

(१) यह प्रकाश किरणों को नाड़ीवेगों में परिणत करता है जो अनेक मध्य-
वर्ती नाड़ीकोषाणुओं के द्वारा मस्तिष्कगत दृष्टिकेन्द्र में पहुँचकर रूपसंज्ञा उत्पन्न
करता है और इस प्रकार वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है ।

दृष्टिवितान के द्वारा रूप का ग्रहण हो, इसके लिए यह आवश्यक है प्रकाश की तीव्रता एक नियत सीमा तक हो तथा नियत समय तक वह दृष्टिवितान पर पड़े। इसे क्रमशः तीव्रतावधि (Intensity threshold) तथा कालावधि (Time threshold) कहते हैं।

(२) इसके द्वारा केवल प्रकाश का ही ग्रहण नहीं होता, बल्कि इंधर के विभिन्न कम्पनक्रम के कारण शंकुओं पर क्रिया होने से वर्ण का भी प्रत्यक्ष होता है।

(३) दृष्टिवितान रचना की दृष्टि से अनेक नाडीमान्तों का समूह है जो मस्तिष्क के विशिष्ट भाग को उत्तेजित करता है। इन समस्त उत्तेजनाओं के समूह से वस्तु के रूप या आकार का बोध होता है।

यदि वस्तु के आकार को धीरे धीरे घटाया जाय तो एक समय ऐसा आवेगा, जब उसका दर्शन असंभव हो जायगा। इस सीमा को रूपावधि (size threshold or visual acuity) कहते हैं।

रूपसंज्ञा का ग्रहण वस्तुतः दृष्टिवितान में स्थित शूल और शंकुकोषाणुओं के द्वारा होता है।

शूलकोषाणुओं के कर्म

शूलकोषाणु दृष्टिवितान के प्रान्तीयभाग में अधिक संख्या में स्थित हैं और ये मन्दप्रकाश में रूप का ग्रहण करते हैं। इसीलिए रात में देखने वाले पक्षियों यथा उल्लू, चमगादड़ आदि के नेत्र में इनकी संख्या अधिक होती है। तीव्र प्रकाश में इनकी क्रिया नहीं होती। इसीलिए तीव्र प्रकाश से अन्धेरे कमरे में जाने पर पहले कुछ नहीं दिखाई पड़ता, थोड़ी देर के बाद दीखने लगता है। इसी प्रकार अन्धेरे से सहसा तीव्र प्रकाश में जाने पर नेत्र चमक जाते हैं और कुछ नहीं दीखता, किन्तु थोड़ी देर के बाद दीखने लगता है।

दृष्टिवर्णक का महत्त्व

दृष्टिवर्णक रक्तरजक के समान एक संयुक्त मांसतत्व है, जिसमें मांसतत्व के अणु 'दर्शनी' (Retinene) नामक वर्णकद्रव्य के साथ संयुक्त रहते हैं। इसका आविष्कार १८७६ ई० में बौल नामक विद्वान् के द्वारा हुआ था। यह स्तनधारी

प्राणियों के शूलकोपाणुओं तथा पक्षियों के शंकुकोपाणुओं में पाया जाता है । मुर्गी, कवूतर, चमगादड़ आदि अनेक जन्तुओं में यह नहीं होता ।

चूँकि यह दर्शनकेन्द्र में स्थित शंकुकोपाणुओं में अनुपस्थित होता है, अतः ऐसी धारणा है कि रूपग्रहण के लिए यह आवश्यक नहीं है, केवल विभिन्न प्रकाश में नेत्र को केन्द्रित करने में सहायक होता है । इसी लिए मन्द प्रकाश में शूलकोपाणुओं की ग्रहणशक्ति को बढ़ा देता है । रासायनिक दृष्टि से यह जीवनीयद्रव्य 'ए' से सम्बद्ध होता है और प्रकाश लगाने पर यह एक मांसतत्व तथा दर्शनी नामक पीतवर्णक में विभक्त हो जाता है । एक विद्वान् के मतानुसार यह शंकुकोपाणुओं के क्षेत्र में भी होता है ।

दृष्टिवर्णक दृष्टिवितान के चित्रजवनिका नामक स्तर के कोपाणुओं में निरन्तर घनता रहता है और वहाँ से शूलकोपाणुओं में आता है । ग्रीन नामक विद्वान् के मत में शूलकोपाणुओं का कार्य केवल दृष्टिवर्णक को उत्पन्न करता है जो प्रान्तभारा से फैल कर दर्शनकेन्द्र में आता है और शंकुओं पर किया करता है । प्रकाश के द्वारा दृष्टिवर्णक का विश्लेषण हो जाता है और साथ ही एक विद्युद्द्वारा भी शंकुओं में उत्पन्न होती है । दृष्टिवर्णक के विश्लेषण तथा पुनरुद्भव के लिए जीवनीय द्रव्य ए अत्यन्त आवश्यक है । इस जीवनीय द्रव्य की कमी या अनुपस्थिति होने पर शूलकोपाणु ठीक ठीक कार्य नहीं कर पाते जिससे नक्तान्ध्य रोग उत्पन्न हो जाता है ।

शंकुकोपाणुओं के कार्य

वर्ण का ग्रहण मुख्यतः इन्हीं कोपाणुओं के द्वारा होता है । तीव्र प्रकाश में वर्णरहित वस्तुओं का भी ग्रहण होता है । इनकी क्रिया ठीक नहीं होने से वर्ण का बोध नहीं होता और दिवान्ध्य की अवस्था उत्पन्न हो जाती है । इनमें भी शूलकोपाणुओं के समान एक वर्णद्रव्य होता है जिसे नीललोहित दर्शनी (Visual violet or iodopsin) कहते हैं । यह भी एक सशुक्त मांसतत्व है ।

शूल और शंकुकोपाणुओं पर प्रकाशतरंगों का प्रभाव

शूल और शंकुकोपाणुओं पर प्रकाशतरंगों की क्रिया किस प्रकार होती है, इस सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं जो निम्नांकित हैं।—

(१) तापोत्तेजना का सिद्धान्त (Theory of thermal stimuli) इसका मत यह है कि प्रकाशतरंगों शोषित होकर दीर्घ तापतरंगों में परिणत हो जाती हैं ।

(२) विद्युदुत्तेजना का सिद्धान्त (Theory of electrical stimuli) इसके अनुसार प्रकाशतरंगों विद्युत् शक्ति में परिवर्तित हो जाती हैं ।

(३) चित्र रासायनिक सिद्धान्त (Photochemical theory) इसका विचार यह है कि प्रकाशतरंगों से शूल और शङ्कुकोपाणुओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनसे नाडीवेग प्रारंभ होकर मस्तिष्क में पहुँचते हैं । दृष्टिवर्णक प्रकाश के द्वारा विवर्ण हो जाता है, यह इसके पक्ष में प्रबल प्रमाण है ।

उत्तेजना के कारण दृष्टिवितान में परिवर्तन

(क) रासायनिक परिवर्तन:—(Chemical changes)

१. दृष्टिवितान किंचित् अम्ल हो जाता है । ऐसा समझा जाता है कि विवर्ण दृष्टिवर्णक से ही अम्लता उत्पन्न होती है ।

२. निरिन्द्रिय स्फुरक अम्ल में वृद्धि ।

३. ओपजन सामर्थ्य में वृद्धि ।

४. प्रकाश के प्रभाव से दुग्धाम्ल, क ओ तथा जल में विरलेपित करने की शक्ति बढ़ जाती है ।

५. अमोनिया की राशि में वृद्धि

६. रक्षण प्रतिक्रिया में परिवर्तन

७. दृष्टिवर्णक की विवर्णता

(ख) यान्त्रिक परिवर्तन:—(Mechanical changes)

१. शङ्कुओं का भीतरी भाग अधिक संकुचित हो जाता है । इस क्रिया का नियन्त्रण नाडी के द्वारा होता है ।

२. शूलकोपाणु छम्बाई में बढ़ जाते हैं ।

३. चित्रजवनिका के वर्णकद्रव्य भागों की ओर फैल जाते हैं ।

(ग) वैद्युत परिवर्तन (Electrical changes)

प्रकाश देने के समय नेत्र में विद्युद्वाता उत्पन्न होती है । विद्युच्चन्न द्वारा इसका विवरण लिया जाता है, जिसे दृष्टिवितानविद्युन्माप (Electro retinogram) कहते हैं ।

दृष्टि उत्तेजना का मार्ग

दृष्टि उत्तेजना निम्नांकित क्रम से, मस्तिष्क के दृष्टिकेंद्र में पहुँचती है:—

१. रूपादानिका
२. मयकन्दिनी बाह्य स्तर में स्थित कण
३. द्विबाहुक कोषाण
४. गण्डकोषाण
५. वितानसूत्रिणी
६. दृष्टिनाड़ी
७. बहिर्मानुषग्रन्थि (External Geniculate body)
८. थालाइन्ड की पश्चिम पार्श्विक कन्दिका (Pulvinar of Thalamus)

९. आन्तर कृच्छ्रवस्त्रिका (Internal capsule)

१०. मस्तिष्क का पश्चिम खण्ड—जहाँ रूप ज्ञान होता है ।

दृष्टिक्षेत्र (Field of vision)

नेत्र के स्थिर रहने पर जितने बाह्यप्रदेश का प्रतिबिम्ब दृष्टिवितान पर पड़ता है, उसे दृष्टिक्षेत्र कहते हैं। यह बहुत कुछ मुख की आकृति, नासासेतु, ध्रु तथा गण्डास्थियों की स्थिति पर निर्भर होता है। इसका निर्धारण एक यन्त्र से होता है जिसे दृष्टिक्षेत्रमापक (Perimeter) कहते हैं। इससे नेत्र के अनेक विकारों का निश्चय करने में सहायता मिलती है।

रूपसंज्ञा की अवधि

उत्तेजक वस्तु की अपेक्षा उत्तेजना की अवधि अधिक होती है। थोड़े समय तक प्रकाश देने पर भी दृष्टिवितान पर प्रतिबिम्ब ५ सेकण्ड तक बना रहता है। इस अवधि के भीतर दूसरी वस्तु का प्रतिबिम्ब धृक् नहीं बन पाता। इसीलिए पहिये को तेजी से घुमाने पर उसके आरे धृक् धृक् दिखाई नहीं पड़ते। सिनेमा में नेत्र के इस गुण का प्रयोग किया जाता है और एक सेकण्ड में हमें १५-२० चित्र दिखाए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हम उन्हें धृक् धृक् चित्र न समझ कर एक ही चित्र समझते हैं और चित्रगत मनुष्य इत्यादि हिलते चलते सजीव जान पड़ते हैं। प्रत्येक चित्र में पिछले चित्र से प्रायः ५ सेकण्ड याद का दृश्य दिखाया जाता है।

इसी प्रकार ध्वनों का भी मिश्रण हो जाता है।

अनुप्रतिबिम्ब (After-images)

वस्तु को हटा लेने पर भी मस्तिष्क में उसका जो प्रतिबिम्ब बना रहता है उसे अनुप्रतिबिम्ब कहते हैं। इस काल में उसी प्रकार की उत्तेजना का प्रभाव दृष्टि-वितान पर कम पड़ता है। अर्थात् सद्य उत्तेजना के लिए दृष्टिवितान का वह विश्रामकाल होता है यद्यपि दूसरे प्रकार की उत्तेजनाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है।

ये अनुप्रतिबिम्ब दो प्रकार के होते हैं—सद्य (Positive) और विपर्यस्त (Negative)। सद्य अनुप्रतिबिम्ब वस्तु प्रतिबिम्ब की चमक और वर्ण में समान होता है। वस्तु के प्रकाश की तीव्रता के अनुसार यह कुछ देर तक रहता है। विपर्यस्त अनुप्रतिबिम्ब रूपादानिका के धर्म के कारण होता है और वह यद्यपि आकार में मूल वस्तु प्रतिबिम्ब के समान होता है, किन्तु चमक में अन्तर होता है। यदि मूल प्रतिबिम्ब वर्णमय हो तो, इससे अनुयोगी वर्णसंज्ञा होती है।

समकालिक और आन्तरिक विरोध

(Simultaneous & Successive contrasts)

किसी वस्तु का वर्ण और चमक उसी समय या उसके बाद अन्य दृश्य वस्तु के वर्ण और चमक से प्रभावित होती है। विपर्यस्त अनुप्रतिबिम्ब आन्तरिक विरोध के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यदि सफेद पृष्ठभूमि पर चनाये हुये लाल चिह्न को कुछ देर तक देखा जाय और उसके बाद दूसरी सफेद पृष्ठभूमि को देखा जाय तो वहां हरे वर्ण का चिह्न दिखलाई देगा, क्योंकि लाल और हरा अनुयोगी वर्ण हैं। इसी प्रकार नील चिह्न से पीला अनुप्रतिबिम्ब होगा। समकालिक विरोध दो भागों में विभक्त कर दिया गया है प्रमाद्विरोध (Brightness contrasts) तथा वर्णविरोध (Colour contrasts)। उदाहरणतः, एक धूसर वस्तु चमकीली पृष्ठभूमि में गहरे रंग की दिखाई देती है। यदि पृष्ठभूमि रंगीय हो तो अनुयोगी वर्ण दिखाई देता है।

दृष्टिवितान का श्रम

यदि लगातार एक चमकीली वस्तु पर देखा जाय तो धीरे-धीरे संज्ञा की तीव्रता में कमी होती जाती है। इसका कारण यह है कि अन्य अंगों की तरह दृष्टि-वितान भी थान्त हो जाता है।

नेत्र और कैमरा

प्रकाश के कार्य की दृष्टि से नेत्र तथा कैमरे की बनावट में कोई अन्तर नहीं है। निम्नांकित कोष्ठक में दोनों के समान अवयवों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है:—

नेत्र

१. दृष्टिमण्डल
२. दृष्टिवितान
३. कर्चुरगुप्ति
४. तारामण्डल
५. संघानपेशिका
६. नेत्र पेशियों तथा शिर और ग्रीवा की पेशियों की सहायता से नेत्रगोलक के केन्द्रभाग में स्फुट प्रतिबिम्ब बनता है।

कैमरा

१. काच
२. प्रतिबिम्बग्राही काच (Sensitive plate)
३. यन्त्र की कृष्णवर्ण आभ्यन्तर परित्रि
४. जलनिकाचक (Irisdiaphragm)
५. जलनिकाचक को घुमाने वाला यन्त्र
६. यह कार्य कैमरे को आगे पीछे हटा कर किया जाता है तथा काच को भी हटाकर किया जाता है।

किन्तु इसके साथ-साथ नेत्र में कैमरे की अपेक्षा निम्नांकित विशेषताएँ हैं:—

१. वस्तुओं का संव्यूहन स्वतः होता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
२. कैमरे में रश्मिसंव्यूहन यन्त्र यवकाच होता है, किन्तु नेत्र में मुख्यतः दो होते हैं—स्वच्छमण्डल और दृष्टिमण्डल।
३. दृष्टिवितान में प्रकाश की तीव्रता तथा उसकी संवेदनीयता का आयोजन स्वतः होता है।
४. निकटवर्ती वस्तुओं का संव्यूहन होने के साथ ही साथ संव्यूह की गहराई भी बढ़ जाती है।

५. दृष्टिचेत्र अपेक्षाकृत अल्पधिक होता है। कैमरा में प्रायः यह ९० डिग्री से अधिक नहीं होता, किन्तु नेत्र में १०८ डिग्री होता है।

६. कैमरा में प्रकाश का बहुत सा अंश परावर्तन के द्वारा वायु और काच के बीच में नष्ट हो जाता है, किन्तु नेत्र में विभिन्न माध्यमों की चक्रीकरण शक्ति में

विरोध अन्तर नहीं होता और परावर्तन के द्वारा प्रकाश कम नष्ट होता है और अधिक से अधिक प्रकाश दृष्टिवितान तक पहुँचता है।

७. कैमरा के काच में जो अनेक दोष होते हैं उनका सुधार नेत्र में स्वतः हो जाता है।

८. निकटवर्ती वस्तुओं को देखने के लिए नेत्रों का अन्तर्मुखीमयन स्वतः नियंत्रित होता है।

९. दृष्टिवितान में प्रकाश ग्रहण के दो यन्त्र हैं—एक के द्वारा मन्द प्रकाश में केवल श्वेत और कृष्ण का ज्ञान होता है और दूसरे के द्वारा तीव्र प्रकाश में वर्णों का बोध होता है।

१०. दृष्टिवितान का पृष्ठ कटोरे की तरह होने के कारण प्रतिबिम्बों का आकार स्पष्ट होता है तथा दूरी आदि का भी मूल्य ठीक होता है।

वर्णदर्शन (Colour Vision)

दृष्टिवितान के द्वारा केवल प्रकाश का ही प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, बल्कि ईश्वर के विभिन्न कम्पनों के द्वारा वर्ण का भी ग्रहण होता है। यह कार्य विशेषकर शंङ्खों के द्वारा होता है। पीछे यह बतलाया गया है लगभग ४००० से ८००० A. U तक की प्रकाश किरणों का ही ग्रहण हमारे नेत्र के द्वारा हो सकता है। लम्बी तरंगियों फलतः मन्द कम्पनों से रक्त वर्ण तथा छोटी तरंगियों फलतः तीव्र कम्पनों से नील लोहित (वैगनी) किरणों की सज्ञा उत्पन्न होती है। इनके बीच में रक्त के बाद नारंगी, पीत, हरित, श्याम, नील ये वर्ण होते हैं। त्रिपार्श्व के द्वारा श्वेत रश्मि का विश्लेषण कर वर्णपट में इन वर्णों को देखा जा सकता है। ये वर्ण उपयुक्त क्रम से ही व्यवस्थित होते हैं और इसी क्रम से वे दृष्टिवितान पर भी पड़ते हैं, जिससे उनका पृथक् पृथक् ज्ञान होता है।

दो वर्णों को एक निश्चित अनुपात में परस्पर मिलाने पर भी श्वेत वर्ण उत्पन्न होता है। ये वे वर्ण अनुयोगी (Complementary) कहलाते हैं। लाल और हरित नील, नारंगी और नील, पीत और नील-श्याम, हरित-पीत और वैगनी तथा हरित और अरुण (Purple) ये पाँच अनुयोगी वर्णों के समूह हैं।

दृष्टिवितान के प्रत्येक भाग पर वर्णों का ग्रहण समानरूप से नहीं होता।

उसका बाहरी भाग काला और सफेद । मध्यभाग पीला और नीला तथा भीतरी केन्द्रीय भाग लाल और हरे रंग का ग्रहण करता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्णों के द्वारा दृष्टिवितान में विभिन्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं । वर्णों में परस्पर निम्नलिखित बातों में भिन्नता पाई जाती है:—

१. वर्ण (Hue or colour)
२. चमक (Luminosity or brightness)
३. सन्तुष्टि (Saturation or purity)

वर्णदर्शन के सिद्धान्त

वर्णदर्शन के संबन्ध में अनेक मत प्रचलित हैं जिनमें निम्नांकित मुख्य हैं:—

(१.) त्रिवर्णसिद्धान्त (Trichromatic theory of young Helmholtz)—इसके अनुसार लाल, हरा और नीला ये तीन मूल वर्ण हैं । और इन्हीं के अनुसार दृष्टिवितान में तीन रासायनिक द्रव्य होते हैं । प्रत्येक रासायनिक द्रव्य की क्रिया से एक वर्ण की संज्ञा होती है । किसी का मत है कि प्रत्येक शंकुकोषाणु से तीनों वर्णों का ज्ञान होता है ।

ये तीनों वर्ण जब उचित अनुपात में मिलते हैं तब अन्य वर्णों की उत्पत्ति होती है और जब सम अनुपात में मिलते हैं तब सफेद, काला या धूसर वर्ण उत्पन्न होता है । यह भी समझा जाता है कि तीनों वर्णों के पृथक् पृथक् ग्रहण करने के लिए तीन प्रकार के नाडीसूत्र भी होते हैं । इस प्रकार जब दीर्घ रश्मित-
त्यों से विशिष्ट रासायनिक द्रव्य मुख्यतः प्रभावित होता है तब लाल, जब मध्यम तरंगों से कुछ कम प्रभावित होता है, तब हरा और जब लघुतम तरंगों से न्यूनतम प्रभाव होता है तब वैगनी रंग की संज्ञा उत्पन्न होती है । दूसरा रासायनिक द्रव्य जब मध्यम रश्मितरङ्गों से मुख्यतः तथा लघु और दीर्घ तरंगों से कम प्रभावित होता है, तब हरित वर्ण की संज्ञा होती है । इसी प्रकार तीसरा रासायनिक द्रव्य मुख्यतः लघुतम तरंगों से प्रभावित होने पर वैगनी रंग उत्पन्न करता है ।

जब ये तीनों द्रव्य समानरूप से उत्तेजित होते हैं तब श्वेतवर्ण की संज्ञा होती है । दो अनुयोगी वर्णों की समकालिक क्रिया से भी श्वेतवर्ण होता है ।

उत्तेजना के अभाव से वृष्णवर्ण होता है। अन्य वर्णों की संज्ञा इन द्रव्यों की विषम उत्तेजना से होती है।

(१) चतुर्वर्ण सिद्धान्त (Burch's theory)—इसके मत में लाल, हरा, बैंगनी और नीला ये चार ही मूल वर्ण हैं।

(२) पङ्क्वर्ण सिद्धान्त (Hering's theory)—इसके अनुसार ६ वर्ण मूलतः होते हैं जिनमें दो-दो अनुयोगी वर्णों को मिला कर तीन युग्म बनते हैं यथा श्वेत और कृष्ण, लाल और हरा तथा पीला और नीला। दृष्टिविज्ञान में वर्तमान रासायनिक द्रव्यों के चयापचय से इन वर्णसंज्ञाओं की उत्पत्ति होती है।

द्रव्य	दृष्टिविज्ञानप्रक्रिया	वर्णसंज्ञा
लाल-हरा	अपचय	लाल
	चय	हरा
पीला-नीला	अपचय	पीला
	चय	नीला
श्वेत-कृष्ण	अपचय	श्वेत
	चय	कृष्ण

(४) विपर्यस्त रासायनिक क्रिया का सिद्धान्त (Muller's theory) यह उपर्युक्त सिद्धान्त पर ही आधारित है, किन्तु इसके अनुसार वर्ण संज्ञाओं की उत्पत्ति रासायनिक द्रव्यों की चयापचय क्रिया से नहीं होती, बरिन् विपर्यस्त रासायनिक क्रिया से होती है। रासायनिक क्रिया से रासायनिक द्रव्यों के द्वारा कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो विपर्यस्त रासायनिक क्रिया से पुनः मौलिक पदार्थ में परिणत हो जाते हैं।

(५) परमाणु विश्लेषण सिद्धान्त (The Ladd-Franklin's Molecular dissociation theory) इस मत में विशास के प्रारम्भ में

नेत्र के द्वारा वर्णों का ग्रहण नहीं होकर केवल चमक का ग्रहण होता है क्योंकि उसमें केवल एक ही श्वेतकृष्ण रासायनिक द्रव्य होता है जिसे धूसर द्रव्य (Grey substance) भी कहते हैं । यह शूल और शंकु दोनों कोपाणुओं में विद्यमान होता है । जब नेत्र पर प्रकाश पड़ता है तब इस धूसर द्रव्य का विश्लेषण होता है और इससे कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो शूल और शंकुओं को उत्तेजित कर श्वेत, धूसर या कृष्ण की वर्णरहित संज्ञायें उत्पन्न करते हैं । शूलकोपाणुओं में वर्तमान रासायनिक द्रव्य में केवल यही प्रतिक्रिया होती है ।

विकासक्रम में, शंकुकोपाणुओं में वर्तमान रासायनिक द्रव्य विभाजित हो जाता है । इसके एक भाग का विश्लेषण दीर्घ तरंगों से होता है और उससे पीतवर्ण की संज्ञा होती है । दूसरा भाग लघु तरंगों से विश्लेषित होता है जिससे नील-संज्ञा उत्पन्न होती है । याद में पीतवर्ण का भाग भी दो भागों में विभाजित हो जाता है जिनमें एक से लाल तथा दूसरे से हरा रंग उत्पन्न होता है ।

$$\begin{array}{c} \text{नील} \\ \text{धूसर} < \text{पीत} < \text{रक्त} \\ \text{हरित} \end{array}$$

यदि रक्त और हरित परमाणु एक ही समय विश्लेषित हों तो पीतसंज्ञा तथा रक्त, हरित और नील भागों का एक समय विश्लेषण हो तो धूसर संज्ञा उत्पन्न होती है ।

वर्णान्धता (Colour blindness)

अनेक व्यक्ति केवल वस्तुओं की चमक का ग्रहण करते हैं उनके पारस्परिक वर्णों में विभिन्नता का बोध उन्हें नहीं होता । इसे वर्णान्धता कहते हैं । यह सहज तथा दृष्टिविज्ञान के कुछ रोगों में लक्षणरूप में होती है । ऐसा भी विचार है कि दृष्टिकेन्द्र से पृथक् एक वर्णदर्शनकेन्द्र मस्तिष्क के बाह्यभाग में स्थित है जिसकी विकृति से वर्णान्धता नामक विकार उत्पन्न होता है । अधिकतर यह लाल और हरे रंगों के सम्बन्ध में होता है जिससे इन दोनों वर्णों में भेद नहीं प्रतीत होता । इसका कारण यह है कि रक्तहरित रासायनिक द्रव्य पूर्णतः विकसित नहीं होता जिससे रक्त या हरित एक ही वर्ण की संज्ञा होती है और रोगी रक्तान्ध या हरितान्ध हो जाता है ।

नेत्र की गति

नेत्र की गति निम्नांकित ६ पेशियों के सहारे होती है:—

- (१) ऊर्ध्वदर्शिनी (Superior rectus)
- (२) अधोदर्शिनी (Inferior rectus)
- (३) अन्तर्दर्शिनी (Internal rectus)
- (४) बहिर्दर्शिनी (External rectus)
- (५) वक्रोर्ध्वदर्शिनी (Superior oblique)
- (६) वक्राधोदर्शिनी (Inferior oblique)

जब ये पेशियाँ सहयोग से कार्य नहीं करती तो आँख टेढ़ी मालूम होती है। इसे नेत्रप्रकटा (Strabismus or squint) कहते हैं।

द्विनेत्रदर्शन (Binocular Vision)

‘यदि हमारे दो आँखें न हों तो हमें सभी वस्तुएँ एक ही धरातल में दीख पड़ेंगी। क्योंकि दोनों नेत्र वस्तु को एक समान नहीं देखते। एक उसके दाहिनी ओर का कुछ अधिक भाग देखता है और दूसरा बाईं ओर का। दोनों का मस्तिष्क पर ऐसा संयुक्त प्रभाव होता है कि वस्तु एक ही धरातल पर घने हुये चित्र की नाईं न दीख कर उभरी हुई मालूम पड़ती है। इस प्रकार द्विनेत्रदर्शन से निश्चित लाभ हैं:—

१. दृष्टिनेत्र अधिक बढ़ जाता है।
२. वस्तुओं की दूरी का ज्ञान स्पष्ट होता है।
३. वस्तुओं की आकृति (लम्बाई चौड़ाई) साफ मालूम पड़ती है।
४. वस्तुओं की गहराई का प्रत्यक्ष स्पष्ट होता है।
५. एक नेत्र का विकार बहुत कुछ दूसरे नेत्र से संशोधित हो जाता है।

कभी कभी प्रकाश की किरणें दृष्टिवितान के समान भाग पर न पड़कर पृथक् पृथक् पड़ती हैं जिससे वस्तु एक के स्थान पर दो दिखलाई पड़ती है। इसे द्विदृष्टि (Diplopia) कहते हैं।

एकविंश अध्याय

श्रोत्र

मनुष्य के श्रवणयन्त्र (श्रोत्र) के तीन भाग होते हैं:—

(१) बाह्यकर्ण (External ear)—यह कर्णशङ्कुली और कर्णकुहर से बना है और इसका कार्य वायु से शब्दतरंगों को ग्रहण करना है ।

(२) मध्यकर्ण (Middle ear)—इसमें पट्टकला और कर्णास्त्रियाँ होती हैं जो कर्णकुहर के द्वारा गृहीत वायुकम्पनों को बढ़ा कर अन्तःकर्ण तक पहुँचा देती हैं ।

(३) अन्तःकर्ण (Internal ear)—इसमें एक द्रवपदार्थ भरा रहता जिसके द्वारा शब्दतरंग बढ़ कर स्वरादानिका में पहुँचते हैं और उसे उत्तेजित करते हैं । यहाँ से वह उत्तेजना नाडी के द्वारा मस्तिष्क के श्रवणकेन्द्र में पहुँचती है ।

इनमें बाह्य और मध्य कर्ण शब्दतरंगों के वहन का कार्य करते हैं तथा अन्तःकर्ण के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है ।

चित्र ६२

बाह्यकर्ण

इसके दो मुख्य भाग हैं, कर्णशङ्कुली और कर्णकुहर ।

कर्णशङ्कुली (Pinna)—यह शब्दतरंगों को एकत्रित कर उन्हें कर्णकुहर में भेजने का कार्य करती है । इसे हटा देने पर शब्द के श्रवण में बहुत कम अन्तर आता है, किन्तु शब्द की दिशा का ठीक ठीक पूरा ज्ञान नहीं होता ।

कर्णकुहर (External auditory Meatus)—यह शब्दतरंगों को पट्टकला तक पहुँचाता है । इसका मार्ग कुछ टेढ़ा होता है जिससे बाह्य पदार्थ सीधे पट्टकला पर पहुँच कर आघात नहीं करते । इसका कटुस्वाद तथा बाहर की ओर निकले हुये घाल कीड़ों को भीतर घुसने नहीं देते । नलिका लम्बी होने से कला पर उष्णता का भी प्रभाव नहीं पड़ने पाता ।

मध्यकर्ण

पटहकला (Membrana tympani)—यह ०.१ मि० मी० मोटी है तथा तीन स्तरों से निर्मित है। बाहर की ओर यह कर्णकुहर की त्वचा से ढँकी है तथा भीतर की ओर श्लेष्मलकला से आवृत है। दोनों के बीच में सौत्रिक तन्तु है। इसके सूत्र केन्द्र से ग्रान्त की ओर फैले हुये हैं, किन्तु मुख्यतः इसके किनारों पर कुछ घृत्ताकार स्थितियापक सूत्र भी होते हैं। कला विलकुल चपटी नहीं होती, बल्कि पीकाकार होती है जिसका अग्रभाग भीतर की होता है।

कला में सूत्रों की व्यवस्था तथा इसकी पीकाकार आकृति उसके कार्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसकी शब्द वहनशक्ति बढ़ जाती है। इसमें कोई अपनी विशिष्ट ध्वनि नहीं होती, अतः यह सब प्रकार के शब्दतरंगों का वहन आसानी से करती है।

कर्णस्थियाँ (Auditory ossicles)—मध्यकर्णगुहा में पटहकला के भीतर की ओर लगी हुई तीन छोटी छोटी अस्थियाँ होती हैं। इनके नाम हैं मुद्गरक (Malleus), अंकुशक (Incus) और धरणक (Stapes)। ये पटहकला के कम्पनतरंगों को तुम्बिकाग्रिद्र को आवृत करने वाली कला तक पहुँचाती हैं। मुद्गरक का शिर पटहकला से लगा रहता है और उसी के साथ कम्पित होता है। अन्य दो अस्थियाँ भी मुद्गरक से मिली रहने के कारण कम्पित होती हैं और धरणक का अन्तिम भाग तुम्बिकाग्रिद्र पर लगा रहता है। इस प्रकार ये अस्थियाँ कर्णकुहर के वायुतरंगों को समान जलतरंगों में परिणत कर देती हैं जो कान्तारक में उत्पन्न होती हैं। तुम्बिकाग्रिद्र की कला पटहकला की अपेक्षा बहुत छोटी है, अतः शब्द का आयाम कम हो जाता है, किन्तु वेग बढ़ जाता है। इन अस्थियों की गति निर्म्नांकित दो पेशियों के सहारे होती है:—

पटहोत्तंसिनी (Tensor tympani)—इसका सम्बन्ध पञ्चमी नाडी की चेष्टावह शाखा से होता है। इसकी क्रिया मुद्गरक पर होती है और पटहकला को भीतर की ओर खींचती है जिससे उसका दबाव बढ़ जाता है। बहुत तीव्रध्वनि होने पर यह कला के कम्पन को कम कर देती है तथा अस्थियों को रगताती है जिससे ध्रुतिवाही की अति उत्तेजना नहीं होने पाती। नेत्र में

जिस प्रकार कनीनरुसंकोचनी पेशी आवश्यकता से अधिक प्रकाश को नेत्र में प्रविष्ट न होने देकर उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार यह अतितीव्र शब्द में श्रोत्र की रक्षा करती है। साथ ही यह तीव्र ध्वनि के ग्रहण में सहायता पहुँचाती है। इस पेशी के आघात की अवस्था में तीव्र ध्वनि का प्रत्यक्ष कम हो जाता है।

कुछ व्यक्तियों में इसकी क्रिया परतन्त्र होती है, किन्तु सामान्यतः यह एक प्रत्यावर्तित क्रिया है। मनुष्यों में यह प्रत्यावर्तित क्रिया तीव्र ध्वनि के कारण होती है। ध्रुतिनाडी के सूत्र संज्ञावहन कर पंचमी नाडी के चेष्टायह केन्द्र तक पहुँचाते हैं और चेष्टायह नाडी पंचमी नाडी की चेष्टायह दाख्ला है जो इस पेशी से लगी रहती है। बाधिर्य रोग में इस पेशी का कार्य नहीं होने से चय होने लगता है।

पर्याणिका (Stapedius)

इसका सम्बन्ध सप्तमी नाडी को एक शारा से होता है। इसका कार्य पटहो-चंसिनी पेशी के विपरीत होता है। इसके संकोच से पटहकला क्षिथिल हो जाती तथा कान्तारकगत दबाव कम हो जाता है जिससे उसमें अधिक कम्पन हो सके और मन्द से मन्द ध्वनि का ग्रहण हो सके। मन्द ध्वनि को सुनने के समय इसका कार्य होता है।


मध्यकर्ण में वायु द्वारा शब्द का संवहन

एक मत के अनुसार शब्दतरंगें कर्णकुहर द्वारा एकत्रित होकर मध्यकर्ण के वायुकम्पनों के द्वारा कान्तारक में पहुँचती हैं। प्रयोगों द्वारा यह दिखलाया गया है कि कान्तारक तक शब्द को पहुँचने का अकेला साधन मध्यकर्ण में स्थित वायु है। पटहकला घस्तुतः मध्यकर्णगत दबाव को नियमित रखती है। इसके अतिरिक्त इसका कार्य श्रोत्र की रक्षा करना है जिस प्रकार नेत्रच्छद्द नेत्र की रक्षा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि पटहकला और कर्णास्थियों श्रवण के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि धरणक को छोड़कर और सब रचनाओं के नष्ट होने पर भी बाधिर्य नहीं होता। यह भी देखा गया है कि रोगियों में कर्णास्थियों के शस्त्रकर्म के बाद भी श्रवण ठीक रहता है। इसके अतिरिक्त, पटहपूरणी वायुनलिका के द्वारा भी हम अपने शब्द को सुन सकते हैं।

पटहपूरणी वायुनलिका (Eustachian tube) — इसके द्वारा मध्य-कर्णगुहा के भीतर तथा बाहर दबाव समान रूप से रहता है, जिससे शब्दतरंगों का ग्रहण ठीक ठीक होता है। यह नलिका बराबर खुली नहीं रहती, केवल निगलने के समय तालूतंसनी पेशी की क्रिया से खुलती है जब इस नलिका में अवरोध हो जाता है तब भीतर वायु का दबाव कम होने से पटहकला भीतर की ओर खिंच जाती है। मध्यकर्ण में दबाव कम या अधिक होने से श्रवण में बिगार आ जाता है। इसलिए गले के रोगों में इस नलिका में अवरोध होने से श्रवण मन्द पड़ जाता है।

अन्तःकर्ण

इसके दो भाग होते हैं:—श्रुतिसम्बूक (Cochlea) और तुम्बिका (Vestibule)। इनमें श्रुतिसम्बूक का ही सम्बन्ध श्रवण से है और तुम्बिका शरीर की स्थिति को सन्तुलित रखती है। अतः शम्बूक के विकारों में बाधिर्य हो जाता है और तुम्बिका के रोगों में स्थिति-सन्तुलन नष्ट हो जाता है।



चित्र ६३ अन्तःकर्ण

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| १. तुम्बिका | २. जाम्बव विवर | ३. ऊर्ध्व अर्धवृत्त नलिका |
| ४. अनुप्रस्थ (बाह्य) अर्धवृत्त नलिका | ५. पश्चिम अर्धवृत्त नलिका | |
| ६. शम्बूक का प्रथम भाग | ७. शम्बूक का द्वितीय भाग | |
| ८. शम्बूक का तृतीय भाग | ९. वृत्त विवर | |


पटहकला के कम्पन कर्णास्थियों के द्वारा तुम्बिकादिद्र की आवरककला में

पहुँचते हैं तथा उत्तरसोपानिका (Scala vestibuli) के भीतर स्थित परिजल में कम्पन उत्पन्न करते हैं। साथ ही चूड़ाबिचर (Helicotrema) के द्वारा अधरसोपानिका (Scala tympani) के परिजल में कम्पन उत्पन्न होते हैं। जब तुम्बिकादिद्र की कला भीतर दबती है तो शम्बूकदिद्र की कला दबाव से बाहर निकल आती है और जब वह बाहर निकलती है तब यह भीतर दब जाती है। इस प्रकार तुम्बिकादिद्र एक रक्षक कपाट के समान कार्य करता है। मध्यसोपानिका (Canalis cochleae) के भीतर स्थित अन्तर्जल दो कलाओं—परलपत्रिका (Vestibular membrane) तथा तलपत्रिका (Basilar membrane) के द्वारा परिजल से पृथक् रहता है। परिणामतः परिजल के कम्पन आसानी से अन्तर्जल में पहुँच जाते हैं जिनका प्रभाव तलपत्रिका में स्थित स्वरादानिका (Organ of corti) नामक शब्दग्राही यंत्र पर होता है।

स्वरादानिका (Organ of Corti)

इसकी रचना निम्नांकित भागों से होती है:—

(१) सूक्ष्मदण्डक (Rods of Corti) :—यह तलपत्रिका पर स्थित



चित्र ६४ स्वरादानिका

दो अवयव हैं एक दूसरे से कुछ पृथक् रहते हैं और ऊपर की ओर झुककर शिरो-भाग में एक दूसरे से मिले रहते हैं। आभ्यन्तर सूक्ष्मदण्डक के शिर में गम्भीर नतोदर भाग होता है जिसमें बाह्यदण्डक का उन्नतोदर शिर लगा रहता है। इस प्रकार दोनों दण्डकों के बीच में एक त्रिकोणाकार नलिका रह जाती है जिसे त्रिकोणसुरंगा (Tunnel of corti) कहते हैं।

(२) सरोमकोषाणु (Hair cells)—ये स्तन्याकार होते हैं तथा सूक्ष्मदण्डकों के भीतरी और बाहरी पार्श्वों में पाये जाते हैं। बाहरी कोषाणु संख्या में अधिक होते हैं। इन कोषाणुओं के अग्रभाग में रोम होते हैं जिन्हें श्रुति-रोम (Auditory hairs) कहते हैं। उन्हीं रोमसदृश प्रवर्धनों से शग्वुकी नाड़ी के प्रान्तभाग संबद्ध रहते हैं।

(३) धारककोषाणु (Cells of Deiters or supporting Cells)—ये कोषाणु उपर्युक्त सरोमकोषाणुओं का धारण करते हैं।

(४) छदिपत्रिका (Reticular membrane)—यह सूक्ष्मदण्डकों के शिरोभाग में ऊपर की ओर स्थित है। इसमें अनेक छिद्र होते हैं जिनसे श्रुतिरोम बाहर निकले रहते हैं।

(५) मध्यमपत्रिका (Membrana tectoria)—यह स्वरादानिका के ऊपर फैली हुई है और उसमें पहुँचने वाले कम्पनों का नियन्त्रण करती है।

शब्द का मस्तिष्क तक संवहन मार्ग

शब्द तरंगों निम्नांकित क्रम से मस्तिष्क तक पहुँचती हैं:—

१. कर्णशङ्खुली।
२. कर्णकुहर।
३. पटहकला।
४. कर्णास्थियां।
५. त्रुम्बिकाछिद्र की आवरणकला।
६. उत्तर तथा अधर सोपानिकाओं का परिजल।
७. मध्यसोपानिका का अन्तर्जल।
८. स्वरादानिका के रोमकोषाणु।
९. स्तम्भिका की स्तम्भकन्दिका (Spiral ganglia)

१०. शम्बूक नाड़ी
 ११. त्र्यङ्गीपक के पश्चिम और बायाँ केन्द्रक ।
 १२. त्रिकोणिका (Orpus trapezoidum or trapezium)
 १३. ध्रुतिसूत्र (Striae acousticae or striae medullaris)
 १४. वलिलिका (Lemniscus or tract of fillet)
 १५. पार्श्विक वलिलिका (Lateral or Lower fillet)
 १६. अधर कलायिका (Inferior colliculus)
 १७. अन्तर्जानुक ग्रन्थि (Internal geniculate body)
 १८. आन्तरकूर्चवलिलिका (Internal capsule)
 १९. उत्तरशंखकणिका (Superior temporal gyrus)
- यहाँ शब्द का प्रत्यक्ष होता है ।

यह देखा गया है कि श्वसित वायु में कार्बन द्विऑक्साइड ३ प्रतिशत से अधिक होने पर या प्रबल निःश्वास के बाद रक्त में इसकी कमी हो जाने पर तथा श्वसित वायु में ऑक्सीजन की कमी होने पर श्वसन में कुछ कमी हो जाती है ।

शब्द के गुणधर्म (Properties of sound)

स्थितिस्थापक वस्तुओं के कंपन से शब्द उत्पन्न होता है । सामान्यतः शब्द-तरङ्गों का वहन वायु के द्वारा होता है, क्योंकि वायुमय स्थान में किसी वस्तु को हिलाने से शब्द नहीं मालूम होता । वायु के अतिरिक्त जल तथा दोस पदार्थों से भी शब्दतरङ्गों का संवहन विभिन्न क्रम से होता है जो निम्नांकित कोष्ठक से स्पष्ट होगा:—

शब्द की गति

पदार्थ	गति प्रतिसेकण्ड	
१. वायु (०° श)	३३१	मीटर
२. हाइड्रोजन	१२८६	"
३. कार्बनड्विऑक्साइड	२५७	"
४. जल (२५°)	१४५७	"
५. लोहा	५०००	"

६. पीतल	३६५०	"
७. सीसा	१२३०	"
८. काँच	५५००	"
९. लकड़ी	३०००-५०००	"
१०. रबड़	४५	"

शब्द की गति उसकी तीव्रता के अनुपात से होती है। तीव्र शब्द मन्द शब्द की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गति करता है।

शब्द में तीन मौलिक धर्म होते हैं:—

१. सुर (Pitch)

२. तीव्रता (Intensity or loudness)

३. आकृति (Quality or timbre)

सुर:—यह उस धर्म का नाम है जिसके कारण हम किसी शब्द को मोटा और किसी को महीन कहते हैं। इसका कारण शब्दोत्पादक वस्तु की कम्पनसंख्या है। कम्पनसंख्या जितनी कम होगी सुर उतना ही नीचा होगा और जब कम्पनसंख्या अधिक होगी तो ऊँचे सुर का शब्द उत्पन्न होगा। कम से कम ४० और अधिक से अधिक ४८०० प्रतिसेकण्ड कम्पनसंख्या वाले शब्द संगीत का सुर उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः १६ से कम कम्पनसंख्या होने पर शब्द का ग्रहण नहीं होता इसे ध्वनदेहली (Threshold of audibility) कहते हैं। प्रतिसेकण्ड २०००० से अधिक कम्पनसंख्या वाले शब्दों की भी श्रवण प्रतीति नहीं होती और उनसे पीडाप्रद संज्ञा उत्पन्न होती है।

तीव्रता:—तीव्रता का आधार कम्पन का विस्तार या आयाम है। जितना ही अधिक कम्पन विस्तार होगा, शब्द की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी और उतनी ही अधिक दूर तक वह सुनाई पड़ेगा। माध्यम के घनत्व पर भी शब्द की तीव्रता बहुत कुछ निर्भर होती है। इसीलिप् पहाड़ के शिखर पर बोलने से ध्वनि मन्द तथा शान्त वातावरण में बोलने से तीव्र होती है।

आकृति:—जब कभी कई मनुष्य एक साथ गाते हैं तब भी सबकी आवाज पृथक् पृथक् भिन्नरूप से मालूम होती है। इसका कारण कम्पन वक्रों की

आकृति में भेद है । सुर और तीव्रता समान होने पर भी शब्द में इसके कारण भिन्नता आ जाती है ।

श्रवण के सिद्धान्त

शब्द के विभिन्न स्वरों का ज्ञान कैसे होता है, इसके सम्बन्ध में दो प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं । एक सिद्धान्त के अनुसार स्वरों का विभाजन स्वरादानिका में ही हो जाता है और दूसरे सिद्धान्त के अनुसार यह कार्य-मस्तिष्क द्वारा होता है । प्रथम सिद्धान्त अनुकम्पन सिद्धान्त (Resonance theory) तथा द्वितीय सिद्धान्त दूरश्रवणसिद्धान्त (Telephone theory) कहलाता है ।

(क) अनुकम्पन सिद्धान्त

इस सिद्धान्त में भी अनेक विद्वानों के विभिन्न मत हैं जिनका सक्षेप में नीचे निर्देश किया जाता है:—

‘(१) हेमहौज का सिद्धान्त (Theory of Helmholtz) इसके अनुसार श्रुतिशाम्बूक में ऐसे अवयव हैं जो पृथक् पृथक् शब्दतरंगों से स्वतः अनुकम्पित होते हैं । जिस प्रकार पियानो के सामने गाना गाने से उसके स्वर के अनुरूप ही उसके तार से प्रतिध्वनि निकलती है, उसी प्रकार की क्रिया श्रवण में भी होती है । श्रुतिशाम्बूक में इसी प्रकार अनुकम्पित होने वाले अनेक तार हैं जिनकी संख्या १५ से १५०००० तक है । कुछ लोगों का अनुमान था कि स्वरादानिका के सूक्ष्म दण्डों में ही अनुकम्पन होता है, किन्तु उनकी संख्या कम (लगभग ३०००) होने से इसकी पुष्टि नहीं होती । इसके अतिरिक्त, पक्षी आदि जिनमें सूक्ष्मदण्ड नहीं होते उन्हें भी सुर का ज्ञान होता है । अतः हेमहौज महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि तलपत्रिका के मध्यस्तर में विद्यमान सूत्र ही यह कार्य करते हैं । जब कोई स्वर वहाँ पहुँचता है तब उससे एक विशिष्ट सूत्र कम्पित हो जाता है जिसका प्रभाव रोमकोषाणुओं पर पड़ता है और वहाँ से पारवर्तित नाड़ी सूत्र के द्वारा यह संज्ञा मस्तिष्क में पहुँचती है । इसप्रकार इस मत के अनुसार स्वरों के विश्लेषण का कार्य स्वरादानिका में होता है और श्रुतिनाड़ी का एक सूत्र एक विशिष्ट स्वर का ही संबन्ध करता है । श्रुतिशाम्बूक के अधोभाग में छोटे सूत्र होते हैं जिनसे उच्च स्वरों की प्रतीति होती है तथा उसके ऊर्ध्वभाग में दीर्घसूत्र होते हैं जो निम्न स्वरों

के द्वारा कम्पित होते हैं। संयुक्त स्वरों का विश्लेषण अनेक सामान्य स्वरों में हो जाता है और उनसे तदनुकूल सूत्र कम्पित हो उठते हैं। ये कम्पन मिश्रित होकर मस्तिष्क में पहुँचते हैं जिनसे संयुक्त स्वर का ज्ञान होता है। यह उसी प्रकार होता है जैसे अनेक सामान्य वर्णों के मिलने से विभिन्न वर्ण उत्पन्न होते हैं।

इस सिद्धान्त के पक्ष में प्रमाण

१. तलपत्रिका में लगभग २४००० सूत्र हैं जिनकी लम्बाई ०.०४१ से ०.४९५ मि० मी तक है। इसके ऊर्ध्वभाग में लम्ब सूत्र हैं जिनसे निम्न स्वरों की प्रतीति होती है तथा अधोभाग में ह्रस्व सूत्र हैं जिनसे उच्च स्वरों का ग्रहण होता है।

२. अनेक जन्तुओं में प्रयोग कर देखा गया है कि श्रुतिशाम्यक के अधोभाग को नष्ट कर देने पर उच्च स्वरों का ज्ञान नहीं होता।

३. मनुष्यों में भी, श्रुतिशाम्यक के अधोभाग की विकृति या उससे संघट्ट नाड़ी सूत्रों का घट होने पर उच्च स्वरों का परिज्ञान नहीं होता।

४. घ्राण, रसना आदि अन्य ज्ञानेन्द्रियों के समान एक विशिष्ट स्वर की दीर्घकालीन उत्तेजना से भ्रान्त हो जाता है, किन्तु उस समय भी उस स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों का ग्रहण होता है। इसका अर्थ यही है कि एक विशिष्ट स्वर एक विशिष्ट रोमकोषाणु को कम्पित करता है और यह कम्पन एक विशिष्ट नाड़ी सूत्र के द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है। अधिक देर तक उत्तेजित करने से यह नाड़ीसूत्र और रोमकोषाणु भ्रान्त हो जाते हैं।

५. जिन जन्तुओं में तलपत्रिका छोटी होती है, उन्हें स्वरों के तारतम्य का भी ज्ञान नहीं होता।

हेमहौज सिद्धान्त के विपक्ष में प्रमाण

(१) तलपत्रिका के सूत्र परस्पर ऐसे संसक्त रहते हैं कि कोई सूत्र स्वतन्त्रतया पृथक् कम्पित नहीं हो सकता और उसका कम्पन निकटवर्ती सूत्रों में भी पहुँच जाता है।

इस आपत्ति का निराकरण अधिकतम उत्तेजना के सिद्धान्त (Principle of maximum stimulation) के आधार पर किया जाता है। इससे

यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि किसी स्वर से सभी सूत्र कम्पित होते हैं किन्तु उस स्वर के अनुरूप सूत्र अधिकतम कम्पित होता है, अतः उसो का बोध होता है । ॥

(२) सूत्रों की लम्बाई पर्याप्त नहीं है जिससे विभिन्न स्वरों का ग्रहण हो सके ।

इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि किसी तार का कम्पन उसकी लम्बाई पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसके दबाव और भार का भी प्रभाव पड़ता है । अतः अन्तःकर्ण के तरल पदार्थों से इस वृत्ति की पूर्ति हो जाती है ।

मेयर का जलीय सिद्धान्त (Meyer's Hydraulic theory)

इसके अनुसार धरणक के अन्तःकर्ण पर विभिन्न दबाव के अनुसार परिजल का स्थानान्तरण होता है और उससे तलपत्रिका के विभिन्न भाग कम्पित हो उठते हैं । केवल सूत्रों में ही कम्पन नहीं होता, बल्कि उसके अतिरिक्त अन्य भाग में भी होता है । कम्पित होने वाले भाग की लम्बाई पर स्वर की तीव्रता तथा कम्पन के क्रम पर उसका सुर निर्भर होता है । इसमें भी वही आपत्तियाँ हैं जो उपर्युक्त सिद्धान्त में हैं ।

एयर का सिद्धान्त (Ayer's theory)

यह भी सांवेदनिक कम्पन के सिद्धान्त पर ही आधारित है, किन्तु इसके अनुसार तलपत्रिका के सूत्रों में कम्पन न होकर मध्यमपत्रिका में कम्पन होता है जिससे रोमराजि का स्थानान्तरण होकर रोमकोपाणु उत्तेजित होते हैं और उनमें कम्पन होने लगता है । एक रोमकोपाणु एक प्रकार के स्वर का ग्रहण करता है । स्वभावतः हम ११०५० विभिन्न स्वरों का ग्रहण कर सकते हैं और वही संख्या रोमकोपाणुओं की है । इसके अतिरिक्त, रोमकोपाणुओं के रोमप्रवर्धन इस स्थिति में होते हैं कि उनके द्वारा कम्पन का ग्रहण उत्तम रीति से हो सकता है । ये कम्पन रोमकोपाणुओं से संबन्ध नाड़ीप्रान्तों से संबन्धित होकर मस्तिष्क में पहुँचते हैं ।

विद्युद्धार का सिद्धान्त (Volley theory)

इसके अनुसार स्वरादानिका तक पहुँचने वाले वायु के कम्पन विद्युद्धार उत्पन्न करते हैं जिनका मस्तिष्क तक संवहन श्रुति नाड़ी के सूत्रों द्वारा होता है, किन्तु

एक स्वर का संवहन केवल एक नाडीसूत्र के द्वारा न होकर विभिन्न विधामकाल वाले अनेक सूत्रों द्वारा होता है।

दूरश्रवण सिद्धान्त (Telephone theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार स्वरों का विश्लेषण स्वरादानिका में न होकर मस्तिष्क में होता है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित विद्वानों के मत प्रसिद्ध हैं:—

रदरफोर्ड का सिद्धान्त (Rutherford's theory)

यह स्थितिस्थापक कलाओं के कम्पन के सिद्धान्त पर आधारित है। टेलीफोन के ग्राहक और प्रेषक भागों के समान श्रुतिशम्बूक में उत्तेजना होती है। विभिन्न प्रकार के स्वर स्थितिस्थापक कलाओं में विभिन्न प्रकार के कम्पन उत्पन्न करते हैं। जब कोई शब्दतरङ्ग श्रुतिशम्बूक में पहुँचती है तब उससे उसका कोई विशिष्ट भाग कम्पित नहीं होता, यविक टेलीफोन के प्लेट के समान समूची तालपत्रिका कम्पित हो उठती है। ये कम्पन शब्दतरङ्गों के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये कम्पन रोमकोषाणुओं में पहुँचते हैं और यहाँ से श्रुतिनाडीसूत्रों द्वारा मस्तिष्क में जाते हैं जहाँ शब्द की तीव्रता, सुर और आकृति का विश्लेषण होता है।

इस सिद्धान्त के विरुद्ध आपत्तियाँ

१. स्वरादानिका की रचना अत्यन्त जटिल है और उच्चवर्ग के प्राणियों में प्रमशः यह जटिलतर होती जाती है। मनुष्य में इसकी रचना जटिलतम है, अतः शब्दविश्लेषण शक्ति भी उनमें अधिकतम है। अतः इसे केवल एक सामान्य स्थितिस्थापक कम्पनशील कला समझना उचित नहीं है।

२. मस्तिष्क में किस प्रकार स्वरों का विश्लेषण होता है, यह भी इससे स्पष्ट नहीं होता।

३. स्वरादानिका के किसी भाग की विकृति के कारण जो घाथिर्य उत्पन्न होता है, उसकी व्याख्या भी इससे सन्तोषजनक नहीं होती।

४. इससे यह भी नहीं ज्ञात होता है कि दीर्घकालीन उत्तेजना से एक विशिष्ट स्वर के प्रति ध्रम क्यों उत्पन्न हो जाता है जब अन्य प्रकार के स्वर अविकृत रहते हैं।

वाल्डर का सिद्धान्त

वाल्डर ने रदरफोर्ड के मत में किञ्चित् परिवर्तन उपस्थित कर आपत्तियों के निराकरण की चेष्टा की है । इस मत में सभी शब्दों से सम्पूर्ण तलपत्रिका में कम्पन उत्पन्न होता है, किन्तु सुरों के अनुसार कुछ भागों में विशिष्ट कम्पन होते हैं और इस प्रकार शब्द का कुछ विश्लेषण यहाँ हो जाता है ।

इवाल्ल्ड का श्रवणप्रतिबिम्ब सिद्धान्त

(Ewald's acoustic image or sound pattern theory)

इसके अनुसार शब्द के द्वारा सम्पूर्ण तलपत्रिका में कम्पन होता है, किन्तु इसके साथ ही वहाँ विशिष्ट तरङ्ग उत्पन्न होती हैं, जिन्हें श्रवणप्रतिबिम्ब (Sound pictures or acoustic images) कहते हैं । इन तरङ्गों की स्थिति के अनुसार तलपत्रिका के उस भाग के रोमकोपाणु उत्तेजित होते हैं और पार्श्ववर्ती नाड़ीसूत्रों के द्वारा यह संज्ञा मस्तिष्क के विशिष्ट कोपाणुओं में पहुँच कर विशिष्ट सुर उत्पन्न करती है ।

कोलाहल

जब स्वर एक नियमित क्रम से उत्पन्न होते हैं तो उससे मनोहर सङ्गीत का सुर निकलता है और जब ये अनियमित रूप से आने लगते हैं तो कर्णकटु प्रतीत होते हैं । इसे कोलाहल कहते हैं ।

हेमह्वीज के मत के अनुसार तुम्बिका और कन्दुकी में स्थित संज्ञावहा नादियों की उत्तेजना से कोलाहल की प्रतीति होती है । अन्य विद्वान् के मत से जब स्वरादानिका के विशिष्ट सूत्र कम्पित होते हैं तब सङ्गीत निकलता है और जब अनेक सूत्र एक बार उत्तेजित हो उठते हैं तब कोलाहल की संज्ञा होती है ।

द्वाविंश अध्याय

त्वचा

‘त्वचा’ सम्पूर्ण शरीर को आवृत करती है तथा स्पर्शान्द्रिय, स्वेदबह स्रोत और रोमकूपों का अधिष्ठान है। यह दो भागों में विभक्त है:—बहिस्त्वक् (Epidermis) तथा अन्तस्त्वक् (Dermis) जो अनेक स्तरों से बनी हुई हैं। सम्पूर्ण शरीर की त्वचा का भार लगभग ४ किलोग्राम होता है और इस प्रकार यह शरीर का एक प्रमुख अङ्ग है।

चित्र ६५

बहिस्त्वक्

यह अत्यन्त पतली तथा सिरा, धमनी आदि से रहित है। यह चार स्तरों से बनी है जो बाहर से भीतर की ओर निम्नांकित क्रम से व्यवस्थित हैं:—


१. शार्ङ्गिणी (Stratum Corneum)
२. शल्किनी (Stratum lucidum)
३. कणिनी (Stratum Granulosum)
४. मर्जिनी (Stratum Malpighi or Rete mucosum)

बहिस्त्वक् हाथ और पैर के तल में मोटी होती है और उसमें स्वेदबह स्रोतों की बहुलता होती है। इसके विभिन्न स्तरों का पोषण सूक्ष्म लसीकाबह स्रोतों के द्वारा होता है।

अन्तस्त्वक्

यह स्थूल स्तरों से बनी हुई है तथा स्पर्शान्द्रिय का मुख्य अधिष्ठान है। इसके द्वारा शरीर के ताप की रक्षा तथा स्नेह इत्यादि का शोषण होता है। इसमें केशिकाजालक तथा स्पर्शाङ्कुरिकायें होती हैं और स्थितिस्थापक सूत्र और मेदसतन्तु भी पाये जाते हैं। शरीर के कुछ भागों यथा चूचुक, शिशन और वृषण में स्वतन्त्र पेशीसूत्र भी पाये जाते हैं। कुछ पेशीसूत्र रोमकूपों तथा स्वेदग्रन्थियों में भी पाये जाते हैं। अन्तस्त्वक् में रक्तबह स्रोत, रसायनियों तथा मेदस और अमेदस नाडीसूत्र सम्बद्ध रहते हैं।

खचा



चित्र ६५

१-खेह-प्रथि २-रोमपिण्ड ३-रोमाञ्चक पेशी ४-अतरत्त्वक् ५-बहिस्त्वक्

सूक्ष्मदर्शकयन्त्र से देखने पर अन्तस्त्वक् दो स्तरों में विभक्त दिखलाई पड़ती है:-

(१) अङ्कुरिणी (Papillary layer)—

यह बाहरी स्तर है जिसमें सूक्ष्म अङ्कुर के समान भाग निकलते रहते हैं । यहिस्त्वक् का चतुर्थ स्तर इसीके ऊपर होता है । इन अङ्कुरों में सिरा धमनी की शाखायें तथा श्रेणीनिबद्ध स्पर्शाङ्कुरिकायें होती हैं ।

(२) जालिनी (Reticular layer)—यह जाल के समान फैला हुआ अन्तस्त्वक् का भीतरी स्तर है जो त्वक्शय्या के ऊपर रहता है । इसमें शिथिल सौत्रिक तन्तु तथा स्नेहकोषाणु होते हैं । सिरा, धमनी और रसायनी की सूक्ष्म शाखायें तथा नाड़ियाँ भी फैली रहती हैं । इसके अतिरिक्त, रोमों के मूल और काण्डभाग, वसाग्रन्थियाँ, स्वेदग्रन्थियों के खोत तथा रोमों से संबद्ध सूक्ष्मपेशीतन्तु पाये जाते हैं ।

त्वचा के परिशिष्ट भाग (Appendages of the skin)

नख, रोम, स्वेदग्रन्थियाँ, पिंज्रुपग्रन्थियाँ और वसाग्रन्थियाँ त्वचा के परिशिष्ट भाग कहलाते हैं । ये वस्तुतः यहिस्त्वक् के चतुर्थस्तर के मोटा होने से बनते हैं ।

नख—कुछ स्थानों में शार्ङ्गिणी स्तर विशेष रूप से मोटा हो जाता है और ऊपान्तरित होकर नखचेत्र (Matrix or bud of the nail) में परिणत हो जाता है । इसमें अनेक नाड़ीसूत्र होते हैं । नखचेत्र के पश्चिम भाग में एक परिखा होती है जिसे नखपरिखा (Nail groove) कहते हैं । यहीं से नख आगे की ओर बढ़ता है ।

रोमः—ये यहिस्त्वक् के परिणाम हैं और इनकी रचना वर्णमय सौत्रिक तन्तु से होती है जिसके बाहर की ओर दाढ़की रोमावरण (Hair cuticle) होता है । ये सूत्र त्वचा के भीतर रोमकूशों (Hair follicles) में सन्निविष्ट हैं और इनके मूलभाग (Hair bulbs) अन्तस्त्वक् के जालिनीस्तर या त्वक्शय्या में लगे होते हैं । मूलाङ्कुरों में सिरा, धमनी, रसायनी और नाड़ी की सूक्ष्म शाखायें प्रविष्ट होती हैं । रोमों के पार्श्वभाग में रोमाघनी (Erector pili) नामक पेशियाँ लगी रहती हैं जिनके सङ्कोच से रोमाघ्न होता है ।

वसाम्रन्थियाँ (Sebaceous glands)—

ये अन्तस्त्वक् में प्रायः रोमों के पार्श्व में रहती हैं। इनसे एक प्रकार का तैल के समान साव होता है जिसे 'रोमस्नेह' (Sebum) कहते हैं। यह साव रोमों को जिम्घ रखता है तथा त्वचा की रक्षा करता है। यह अंगूर के गुच्छे की तरह अन्तस्त्वक् में व्यवस्थित रहती हैं। यह ग्रन्थियाँ दो प्रकार की होती हैं:—

(१) सामान्य (Eccrine glands)—यह सम्पूर्ण शरीर में समानरूप से होती हैं और इनसे जल तथा लवण का साव होता है।

(२) विशिष्ट (Apocrine glands)—ये गुवावस्था में विकसित होती हैं और केवल कक्षा, स्तन तथा जननेन्द्रियप्रदेश में पाई जाती हैं। इनसे जल, लवण, नम्रजनयुक्त तथा स्नेह पदार्थों का साव होता है। स्त्रियों में यह विशापरूप से विकसित होती हैं।

पिञ्जूप ग्रन्थियाँ (Ceruminous glands)

ये उपर्युक्त ग्रन्थियों के समान ही, किन्तु उनसे कुछ बड़ी होती हैं और कर्णकुहर में पाई जाती हैं। इनसे पिञ्जूप (कर्णमल) का साव होता है।

स्वेदग्रन्थियाँ (Sweat glands)

लगभग २० लाख की संख्या में ये ग्रन्थियाँ सम्पूर्ण शरीर में स्थित हैं, किन्तु विशेषतः करतल, पादतल, ललाट तथा कक्षा में पाई जाती हैं। यह अन्तस्त्वक् या त्वक्शय्या में रहती हैं और इनकी नलिकायें टेढ़ी-मेढ़ी धूमती हुई समस्त त्वचा से होकर बाहर की ओर खुलती हैं। इनके मुखचाहर त्वचा में देखे जा सकते हैं। इन्हें स्वेददृष्ट (Openings of sudoriferous ducts) कहते हैं। इन ग्रन्थियों के मूल में रक्तवह स्त्रोतों की अधिकता होती है क्योंकि रक्त से स्वेद जल का साव होता है।

स्वेद:—

प्रतिक्रिया—उदासीन या क्षारीय (कभी-कभी एसिड सोडियम फास्फेट के कारण अम्ल)

गन्ध	उद्वनशील
विशिष्ट गुरुत्व	१.००३
रासायनिक संघटन जल	९९%
	कुल ठोस १%
	सोडियम डोरोइड
	प्रोटीन
	जलमात्रा
	यूरिया

परिमाण—१ पौण्ड प्रतिदिन

स्वेद का परिमाण शरीर में ताप की उत्पत्ति तथा बाह्य तापक्रम पर निर्भर करता है। उष्णकाल में अत्यधिक व्यायाम से स्वेद का अधिक उत्सर्ग होता है। अधिक या कम जल पीने से इस में कोई विशेष अन्तर नहीं आता। कारण यह है कि अधिक जल लेने पर शरीर से उसका निर्वहन दो प्रकार से होता है—

(१) दृश्य स्वेदन (Sensible perspiration)—जब स्वेद कणों के रूप में त्वचा पर संचित हो जाता है।

(२) अदृश्य स्वेदन (Insensible perspiration)—

जब निरन्तर स्वेद ग्रन्थियों की क्रिया तथा प्रसरण के द्वारा जल त्वचा में आता है और क्षीघ्र वाष्पीभूत हो जाता है, अतः अदृश्य होता है। यह स्वेदन त्वचा में प्रवाहित रक्त की मात्रा पर निर्भर है न कि शरीर में लिये गये जल की राशि पर।

स्वेदस्राव का नाड़ीसम्बन्ध

संज्ञाबह नाड़ी—यह शरीर की अनेक संज्ञाबह नाड़ियों विशेषतः त्वचा से आनेवाली नाड़ियों में मिली रहती है।

केन्द्र (Adamkiewicz centre)—यह विण्ड में स्थित है और प्रत्यावर्तित रूप से संज्ञाबह नाड़ियों से आनेवाले धेगों के द्वारा उत्तेजित होता है। इसको साक्षात् रूप से उत्तेजित करनेवाले निम्नांकित कारण हैं—

१. रक्त के रासायनिक संघटन में परिवर्तन यथा कार्बनडिऑक्साइड की वृद्धि।

२. रक्त के तापक्रम में वृद्धि।

३. स्वेदल द्रव्यों का प्रभाव यथा पाइलोकार्पाइन।

४. मानस भाव यथा भय, हृष्टासजन्य क्षोभ।

चेष्टावह नाड़ी—सुषुम्ना के द्वितीय चर से चतुर्थ कटिप्रदेश तक से निकल कर सांवेदनिक सस्थान के पार्श्वगण्ड में समाप्त हो जाती है। वहाँ से नये सूत्र निकल कर सौपुग्निक नाड़ियों से मिलते हैं और शरीर की स्वेदग्रन्थियों तक पहुँचते हैं।

स्वेद का उपयोग

स्वेद का प्रधान उपयोग शरीर ताप को नियमित रखना है। जब कभी शरीर का तापक्रम बढ़ता है तो स्वेद का स्राव अधिक होने लगता है जिससे वाष्पीभवन के द्वारा शरीर से अधिक ताप का ह्रास होता है। तापक्रम की वृद्धि का प्रभाव स्थानीय संज्ञावह नाड़ियों (स्थानीय) तथा केन्द्र (केन्द्रीय) दोनों पर होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि स्वेदस्राव की प्रक्रिया पूर्णतः भौतिक है, क्योंकि उस समय त्वचा की रक्तवाहिनियाँ प्रसारित हो जाती हैं और निस्स्यन्दन के द्वारा स्वेद का निर्गम होता है, किन्तु वस्तुतः ये दोनों क्रियाएँ बिल्कुल स्वतन्त्र हैं और स्राव कोषाणुओं की घातकीय क्रिया से होती है। यह निम्नांकित प्रमाणों से प्रमाणित होता है—

(१) ज्वर में त्वचा रक्तवर्ग (रक्तवाहिनियों के प्रसार से) होने पर भी स्वेद का स्राव नहीं होता।

(२) कुछ मानसिक अवस्थाओं यथा भय, हृष्टासजन्य क्षोभ आदि में रक्तवह स्रोतों का संकोच होने पर भी अत्यधिक स्वेदनिर्गम होता है।

(३) अचिर—विच्छिन्न अंग में गृध्रसी नाड़ी को उत्तेजित करने से स्वेद का स्राव होता है।

(४) गृध्रसी नाड़ी की उत्तेजना से रक्तवह स्रोतों का संकोच तथा अति-स्वेदागम होता है।

(५) पेट्रोपीन के द्वारा स्वेद नाड़ियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं।

स्पर्शकुरिका (Sensitive papillae)

यह अन्तस्त्वक् में स्थित स्पर्श का ग्रहण करने वाला यन्त्र है । इनमें कुछ पतली और कुछ मोटी होती हैं । पतली स्पर्शकुरिकाओं को अप्रकुरिका (Tactile corpuscles) तथा मोटी को स्पर्शण्डिका (Pacinian corpuscles) कहते हैं । स्पर्शकुरिकाओं के मूलभाग में नाडी की शाखायें प्रविष्ट होती हैं जिनसे स्पर्श संज्ञा का मस्तिष्क तक संचरण होता है । स्पर्शकुरिकाओं पर दबाव पड़ने से ये नाडियाँ उत्तेजित हो जाती हैं और यही उत्तेजना मस्तिष्क में पहुँचने पर स्पर्शज्ञान उत्पन्न करती है । आधुनिक विद्वानों का मत है कि उष्ण, शीत, स्पर्श तथा पीडा इन सब के ग्रहण के लिए पृथक् पृथक् चार प्रकार की स्पर्शकुरिकायें हैं ।

त्वचा के कार्य

त्वचा के निम्नांकित मुख्य कार्य हैं:—

- (१) अधोवर्ती धातुओं का रक्षण । (२) तापस्थ का नियमन ।
- (३) द्रव्यों का शोषण । (४) जीवाणुओं से शरीर की रक्षा ।
- (५) नीललोहितोत्तर किरणों से जीवनीय द्रव्य डी की उत्पत्ति में सहायता ।



त्रयोविंश अध्याय

ताप

शरीर तापक्रम की दृष्टि से प्राणियों के दो वर्ग किये गये हैं —

(१) उष्णरक्त या स्थिरताप (Warmblooded or Homoiothermal)—इन प्राणियों का तापक्रम वायुमण्डल के तापक्रम की अपेक्षा न रखते हुये प्रायः स्थिर होता है । स्तनधारी प्राणी तथा पक्षी इस वर्ग में आते हैं ।

(२) शीतरक्त या अस्थिरताप (Coldblooded or poikilo thermal) सरीसृप, मेढक, मछली और प्रायः सभी पृष्ठवशविहीन प्राणिवर्ग के

शरीर का तापक्रम अस्थिर होता है। इन प्राणियों का वायु के तापक्रम के अनुसार बदलता रहता है क्योंकि इनके सन्तुलीकरण का क्रम उसी के अनुपात से होता है।

ताप का नियमन

मनुष्यों तथा अन्य उष्णरक्त प्राणियों का तापक्रम बराबर एक समान प्राकृत सीमा पर रहता है। वायु वायुमण्डल के दैत्य या उष्णता का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। इसका कारण यह है कि तापोत्पत्ति (Thermogenesis) तथा तापक्षय (Thermolysis) की क्रिया पूर्ण सन्तुलित रहती है। उदाहरणतः, जब वायु वायुमण्डल का तापक्रम कम होता है, तब शरीर में ताप की उत्पत्ति अधिक तथा क्षय कम होता है। इसी प्रकार जब वाह्य गर्मी अधिक होती है, तब शरीर में ताप की उत्पत्ति कम हो जाती है और क्षय अधिक हो जाता है।

सामान्यतः मनुष्य का तापक्रम औसतन—

(१) कक्षा में 98.6° फ०

(२) मुत्र में 98.6° फ०

(३) गुदा में 98.6° फ०

रहता है। विभिन्न व्यक्तियों का तापक्रम भी 97.9° से 99° तक होता है।

इस प्रकार ताप का नियमन दो प्रकार से होता है:—

(क) ताप की उत्पत्ति में परिवर्तन के द्वारा (रासायनिक नियमन—Chemical regulation)

(ख) ताप के क्षय में परिवर्तन के द्वारा (भौतिक नियमन—Physical regulation)

रासायनिक नियमन (तापोत्पत्ति)

शरीर ताप का नियमन (Thermotaxis) शरीर में कार्बन तथा उदजन के ओपजनीभवन के फलस्वरूप उत्पन्न ताप की मात्रा को बढ़ाने या घटाने से होता है। यह ओपजनीभवन मुख्यतः शरीर की परतन्त्र पेशियों तथा ग्रन्थियों में होता है, अतः ये ही दोनों तापोत्पत्ति के मुख्य साधन हैं।

आकार और भार की दृष्टि से ग्रन्थियों के द्वारा अधिक ताप उत्पन्न होता है, किन्तु यह निरन्तर नहीं होता, क्योंकि पाचनकाल में यह ग्रन्थियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं और बाद में इनकी क्रिया मन्द पड़ जाती है। इसके विपरीत पेशियों के निरन्तर संकोच की अवस्था में रहने के कारण ताप की उत्पत्ति भी निरन्तर होती रहती है।

शीतऋतु में पेशियों का संकोच अधिक हो जाता है, अतः ताप भी अधिक उत्पन्न होता है और इस प्रकार वायुमण्डल का तापक्रम कम होने पर भी शरीर ठंडा नहीं होने पाता। जब वाद्य तापक्रम और कम होता है, तब पेशियों की क्रिया और बढ़ जाती है और शरीर काँपने लगता है जिससे ताप अधिक उत्पन्न होता है और प्राकृत ताप स्थिर रहता है। इसके विपरीत, उष्ण ऋतु में पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं जिससे ताप कम उत्पन्न होता है। जाड़े में अधिक भूख लगती और भोजन भी अधिक किया जाता है। इससे भी ग्रन्थियों की क्रिया बढ़ जाती है और ताप अधिक उत्पन्न होता है। गर्मी के दिनों में, इसके विपरीत, भूख कम हो जाती और भोजन घट जाता है जिससे ग्रन्थियों के द्वारा ताप कम उत्पन्न होता है।

जब पेशी का संकोच औपधद्रव्य के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो उसका तापक्रम शीघ्र ही गिर जाता है और फिर वाद्य तापक्रम के अनुसार बढ़ जाता है, अर्थात् वह शीतरक्त प्राणी हो जाता है और उसका तापक्रम वायुमण्डल के तापक्रम के समान घटता बढ़ता है। जब वायुमण्डल का तापक्रम बहुत नीचे गिर जाता है तब ताप की उत्पत्ति तो बढ़ ही जाती है, साथ ही तापक्षय भी कम हो जाता है और ये दोनों मिलकर प्राकृत ताप को स्थिर रखते हैं।

भौतिक नियमन (तापक्षय)

तापक्षय के निम्नांकित स्रोत हैं:—

- | | |
|-----------------------|--------------|
| (१) त्वचा | ८७.५ प्रतिशत |
| (२) फुफ्फुस | १०.७ " |
| (३) शरीर द्रव और मल | १.८ " |

(१) त्वचा के द्वारा तापक्षय

निम्नांकित प्रक्रियाओं से त्वचा के द्वारा ताप का क्षय होता है:—

- (क) चालन (Conduction)
- (ख) वाहन (Convection)
- (ग) विकिरण (Radiation)
- (घ) वाष्पीभवन (Evaporation)

(क) चालन:—इसके द्वारा शरीर के पृष्ठभाग से ताप निकलकर त्वचा के संपर्क में आने वाले माध्यम में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात् इन दोनों माध्यमों में ताप का विनिमय होता है। चालन के द्वारा ताप का क्षय निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है:—

(१) वायु की आर्द्रता—आर्द्र वायु के द्वारा शीघ्र और अधिक तापक्षय होता है।

(२) व्यक्ति का आकार—मेढ़ ताप का कुचालक है, अतः मेढ़रखी पुरुषों में इसके द्वारा तापक्षय बहुत कम होता है। उत्तरी ध्रुव के शीत प्रदेश के व्यक्ति इसी लिए मेढ़रखी होते हैं।

(३) वस्त्र का प्रभाव—वस्त्र ताप का कुचालक है, अतः यह तापक्षय को रोकता है, किन्तु कपड़ा भीगा होने पर तापक्षय अधिक होता है, क्योंकि जल ताप का अच्छा चालक है। इसीलिए आर्द्र वस्त्र पहनने पर ठंडक महसूस पड़ती है।

(ख) वाहन:—इस प्रक्रिया से गतिशील वायु के द्वारा शरीर ताप का निर्हरण होता है। जब वायु स्थिर होती है तो त्वचा के निकट संपर्क में आने वाली वायु चालन के द्वारा शरीर ताप का ग्रहण करने के कारण गरम हो जाती है। यह गरम वायु हलकी होने से ऊपर की ओर उठती है और दूसरी ठंडी वायु इसका स्थान लेती है। तीव्र प्रवात या पखे की हवा में अधिक शीत और गतिशील वायु का त्वचा के साथ संपर्क होने के कारण शरीर से ताप का क्षय अधिक होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में बिजली के या दूसरे पंखों की आवश्यकता होती है।

(ग) विकिरणः—इसके द्वारा शरीर के पृष्ठभाग और बाह्य शीतल माध्यम के बीच ताप का विनिमय होता है । इस प्रक्रिया से शरीर का लगभग ७३ प्रतिशत ताप नष्ट होता है । इस पर निम्नांकित कारणों का प्रभाव पड़ता हैः—

१. वायु की आर्द्रता—शीतशुष्क वायु में यह क्रिया अत्यधिक होती है और वायु में आर्द्रता होने पर इस प्रक्रिया के द्वारा तापक्षय में बाधा होती है ।

२. व्यक्ति का आहार—रूढ़ और लम्बे व्यक्तियों में विकिरण के द्वारा ताप का क्षय अधिक होता है, क्योंकि शरीर का पृष्ठभाग जितना ही अधिक होगा, ताप का क्षय भी उतना ही अधिक होगा ।

३. वस्त्र—वस्त्र से भी तापक्षय में बाधा होती है । शरीर का ताप पहले कपड़ों में प्रविष्ट होता है और फिर वहाँ से बाह्य वायुमण्डल में जाता है ।

(घ) वाष्पीभवन—लगभग ६०० सी. सी. स्वेद वाष्पीभवन के द्वारा शरीर के पृष्ठभाग से बाहर निकलता है और यह मात्रा व्यायाम के समय अधिक हो जाता है । इस काल में रक्त का सञ्चित ताप खचा की रक्तवाहिनियों में आ जाता है और वाष्पीभवन के द्वारा बाहर निकल जाता है । जब याद वायुमण्डल का तापक्रम अत्यधिक होने से उपर्युक्त तीनों विधियों से ताप का क्षय नहीं हो पाता, तब मुख्यतः यह विधि काम में आती है और शरीर से स्वेद पर्याप्त मात्रा में निकल कर खचा पर सञ्चित होने लगता है ।

१. इस विधि के द्वारा तापक्षय निम्नांकित कारणों पर निर्भर होता हैः—

१. व्यक्ति का आकारः—नाटे और स्यूल व्यक्तियों में यह प्रक्रिया अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि शरीर का पृष्ठभाग कम होने तथा मेद ताप का कुचालक होने से अन्य विधियों से ताप का क्षय नहीं हो पाता । विशिष्ट अवस्थाओं में जब स्वेदावरोध हो जाता है तब तापक्रम बहुत बढ़ जाता है ।

२. वायु की आर्द्रता—वायुमण्डल आर्द्र होने पर वाष्पीभवन की क्रिया में अवरोध होता है । अतः गर्मी के दिनों में याद तापक्रम अधिक होने पर कष्ट नहीं मालूम होता जब कि बरसात में तापक्रम कम होने पर भी अधिक कष्ट होता है ।

(२) कुप्फुसों के द्वारा ताप का क्षय

कुप्फुसों के द्वारा ताप का क्षय दो प्रकार से होता है:—

(क) श्वास मार्ग में स्थित जल के वाष्पीभवन से ।

(ख) निःश्वसित वायु को उष्ण करने से ।

प्रथम प्रकार से लगभग ७ प्रतिशत तथा द्वितीय प्रकार के ४ प्रतिशत ताप नष्ट होता है । कुत्ते आदि जन्तुओं में, जिनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, यह प्रक्रिया अधिक उपयुक्त होती है । इसीलिए शरीर का तापक्रम अधिक होने पर तथा बाह्य वायुमण्डल का ताप अधिक होने से श्वास की क्रिया बढ़ जाती है जिससे वाष्पीभवन के द्वारा ताप का क्षय अधिक होता है ।

(३) आहार और मल के द्वारा ताप का क्षय

लगभग २ प्रतिशत ताप मूत्र तथा पुरीष को उष्ण बनाने में नष्ट होता है । भोजन आमाशय में जाने पर भी गरम हो जाता है और कुछ ताप का शोषण करता है ।

इस प्रकार प्रतिदिन जितना ताप उत्पन्न होता है, उतना ही नष्ट भी होना चाहिये क्योंकि अधिक या कम ताप का क्षय होने से शरीर का तापक्रम कम या अधिक हो जायगा । हल्का परिश्रम करने वाले व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग ३००० कैलोरी ताप उत्पन्न होता है, अतः इतना ही ताप प्रतिदिन नष्ट होना चाहिये । विभिन्न स्रोतों से यह ताप किस प्रकार नष्ट होता है, यह निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होगा:—

	कैलोरी	प्रतिशत
(क) चालन, वाहन और विकिरण	२१००	७०
(ख) त्वचा और कुप्फुस से वाष्पीभवन	८१०	२७
(ग) श्वसित वायु को उष्ण करने में	६०	२
(घ) मूत्र और पुरीष	३०	१
प्रतिदिन कुल तापक्षय	३०००	१००

तापनियामक केन्द्र (Heat-regulating centre)

तापनियामक केन्द्र मस्तिष्क के कन्डाधरिक (Hypothalamus) भाग में रहता है । यह रक्तवह चालन, श्वसन एवं स्वेदन के केन्द्रों को प्रभावित करता है जिससे आवश्यकतानुसार ताप की उत्पत्ति एवं क्षय का सन्तुलन बना रहता है । इस केन्द्र के नष्ट या विकृत होने से मनुष्य का ताप शीतरक्त प्राणी के समान अस्थिर हो जाता है ।

तापनियमन के विकार

ऊपर बतलाया जा चुका है कि ताप की उत्पत्ति और क्षय में सन्तुलन के कारण शरीर का प्राकृत तापक्रम स्थिर रहता है । इस सन्तुलन के नष्ट होने से शरीर में ताप सम्बन्धी विकार उत्पन्न हो जाते हैं । उष्णस्नान, स्वेदन या अतिव्यायाम से शरीर का ताप थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है । ताप की उत्पत्ति का रासायनिक नियमन होने से प्राकृत व्यक्तियों में ताप की कमी कम देखने में आती है ।

(क) अंशुघात (Heat or sunstroke)

उष्ण आर्द्र वायुमण्डल में अधिक देर तक रहने से शरीर से ताप का क्षय पूर्णतः नहीं होने पाता जिससे तापक्रम अधिक हो जाता है । सूर्य की रश्मियों से शरीर में ताप का शोषण होने से तापक्रम बढ़ जाता है । इससे नाड़ीतन्तु में विकार उत्पन्न होते हैं और अन्त में मृत्यु भी हो जाती है । तीव्र ताप होने पर भी यदि ताप का क्षय हो तो यह विकार उत्पन्न नहीं होता । इससे बचने के लिए लघु आहार, व्यायाम का निषेध, पर्याप्त जलपान, ढीले वस्त्र, पंखे, शीतल जलधारा का सेवन तथा शिर की धूप और गरमी से रक्षा करनी चाहिये ।

ज्वर

इसमें जीवाणुविष या अन्य दोषों के कारण रक्तवाहिनियाँ संकुचित हो जाती हैं और रक्त भीतर अंगों में चला जाता है तथा धातुओं में द्रव आकर्षित होने के कारण रक्त के आयतन में भी कमी हो जाती है । इससे ताप का क्षय कम होने लगता है और साथ ही ताप की उत्पत्ति अधिक होती है । इस प्रकार ताप का सन्तुलन नष्ट हो जाने से शरीर का प्राकृत तापक्रम बढ़ जाता है । ज्वर के

प्रारंभ में त्वचा से रक्त के हट जाने के कारण ही शीत का अनुभव होता है। शीत से शरीर काँपने लगता है जिससे वेनियों की क्रिया अधिक होने से ताप अधिक उत्पन्न होता है और तापक्रम बढ़ाने में सहायक होता है। थोड़ी देर में रक्त पुनः त्वचा में आने लगता है और रोगी उष्णता का अनुभव करने लगता है। यह उष्णता का अनुभव उष्ण रक्त के द्वारा त्वचा की संज्ञाबद्ध नाडियों की उत्तेजना से होता है। फिर भी तापक्रम प्राकृत से अधिक ही रहता है। ज्वर के अन्त में पसीना आता है जिससे तापक्षय जो अग्ररुद्ध था फिर होने लगता है और तापक्रम कम हो जाता है। इस प्रकार तापसन्तुलन प्राकृत सीमा पर पहुँच जाता है।

ज्वरघ्न औषधें ताप के निहंरण में सहायता पहुँचाती हैं। उन औषधों के प्रभाव से रक्तगत शर्करा की मात्रा बढ़ जाती जिससे धातुओं से रक्त खिंच कर त्वचा में आ जाता है और इस प्रकार ताप के निहंरण में आसानी होती है।

चतुर्विंश अध्याय

प्रजनन-संस्थान

अमर जीव

जीव की निरूपता दार्शनिक ग्रन्थों में प्रतिपादित की गई है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से पाश्चात्तय शरीर का रूपान्तर प्रतीत होता है तथापि उसका आभ्यन्तर तत्त्व सदैव एक समान रहता है, उसकी तात्त्विक एकता सदैव अक्षुण्ण रहती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ही नहीं, क्रिया शरीर की दृष्टि से भी जीव अमर है। यद्यपि उसका वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है, तथापि भविष्य में भी सन्तति के रूप में उसकी स्थिति बनी रहती है। इसीलिए प्राचीन शास्त्रों में लिखा है—
‘अमरा वै जायते पुनः’ । पुनः उत्पन्नः मृत्युः का. श्री. आप्ला. नवीन. रूप. है. । अमर. प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाय तो प्रजनन भी पुरुष की सहज रक्षात्मक भावना का ही एक रूप है। जिस प्रकार पुरुष अपने वर्तमान जीवन की रक्षा में तत्पर रहता है, उसी प्रकार भविष्य में भी वह अपनी सत्ता बनाये रखना चाहता

है और उसकी यही इच्छा प्रजनन के रूप में प्रकट होती है । प्रजनन सृष्टि की स्थिति के लिए एक आवश्यक कार्य है जिसकी सिद्धि पुरुष की इसी सहज भावना के द्वारा होती है ।

पाश्चात्य देशों में विकसित आधुनिक विकासवाद के विचारों से भी इस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । प्रत्येक जाति के जनक कोषाणुओं में क्रोमोजोम की संख्या निश्चित होती है । इन्हीं क्रोमोजोम के द्वारा पिता के आनुवंशिक संस्कार पुत्र में संक्रान्त होते हैं । दूसरे शब्दों में, पुत्र की शारीरिक और मानसिक स्थिति की आधारशिला इन्हीं से बनती है । विभजन पद्धति से पुरुष के शुक्र में क्रोमोजोम की संख्या आधी रह जाती है और इसी प्रकार स्त्रीबीज में भी उनकी संख्या आधी हो जाती है । पुनः दोनों के मिलने से गर्भ में क्रोमोजोम की संख्या स्वाभाविक हो जाती है । यद्यपि मानवशरीर नश्वर है तथापि उसके जनककोषाणु अमर होते हैं जिनका उत्तरोत्तर विकास नये नये रूप में होता रहता है । अमीबा में पृथक् प्रजनन कोषाणु नहीं होते, केवल सामान्य विभजन के द्वारा उनमें संतानोत्पत्ति का कार्य सम्पादित होता है । एक अमीबा विभाजित होते होते असंख्य रूपों में स्थित हो जाता है और इस विराट् रूप में वह भी अमर हो जाता है । अतः यह कहा जा सकता है कि मानव मरणशील है, किन्तु महामानव अमर है ।

मनुष्य का जन्मोत्तर विकास

गर्भरूप में मनुष्य गर्भाशय में स्थित होकर माता के रक्त से ही पोषक तत्वों का ग्रहण करता है, किन्तु प्रसव के बाद नाभिच्छेदन के द्वारा माता से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है । अतः श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे शिशु को ओषजन प्राप्त होता है तथा माता के दूध से पोषण मिलता है । अन्नप्राशन के बाद शनैः शनैः अन्य भोज्यपदार्थों के ग्रहण से भी पोषण प्राप्त होने लगता है ।

अंगों की रचना में परिवर्तन होने लगते हैं । जन्म के बाद शुक्तिद्विद्र बन्द हो जाता है तथा सेतुसिरा एवं सेतुधमनी के छोट भी बन्द हो जाते हैं । नाभिनालगत रक्तवह छोट भी कार्य न रहने से बन्द हो जाते हैं और सौत्रिक रज्जु के रूप में परिणत हो जाते हैं । ये परिवर्तन जन्म के कुछ दिनों के भीतर हो जाते हैं ।

इनके अतिरिक्त, शिशु का विकास निरन्तर होता जाता है। अनेक अंगों और धातुओं का, जिनका निर्माण अपूर्ण रहता है, पूर्ण हो जाता है। यथा केन्द्रीय नाडी-मण्डल के नाडीसूत्रों में मेदस विधान लगने लगते हैं और अस्थि विकास का भी कार्य होता रहता है जब तक कि अस्थिकंकाल पूर्ण विकसित नहीं हो जाता।

गर्भाशय में विकास की गति जितनी तीव्र रहती है, उतनी जन्म के बाद नहीं होती। प्रारंभिक वर्षों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का विकास शीघ्रता होता है, किन्तु युवावस्था के बाद स्थिति उल्ट जाती है। सामान्यतः युवावस्था में स्त्री और पुरुष दोनों का विकास बढ़ जाता है, किन्तु क्रमशः बाद में यह घटने लगता है और अन्त में एकदम बन्द हो जाता है।

युवावस्था में प्रजनन अंग परिपक्व और क्रियाशील हो जाते हैं। बालिकाओं में, १४ या १५ वर्ष की आयु में इसका प्रारम्भ मासिकस्राव के साथ होता है। मासिकस्राव प्रायः ५० वर्ष की आयु तक जारी रहता है जिसके बाद क्रमशः या सहसा बन्द हो जाता है। फलतः उसके बाद सन्तानोत्पत्ति बन्द हो जाती है। इनके अतिरिक्त, युवावस्था में अन्य विशिष्ट लक्षण भी उत्पन्न होते हैं—यथा स्त्रियों में स्तन-वृद्धि और यौवन के अन्य मानसिक और शारीरभाव तथा पुरुषों में दाढ़ी मूँछ का उदय, कड़ा आदि अन्य स्थानों में केश का प्रादुर्भाव, स्वरयंत्र के आकार में वृद्धि, जिससे स्वर में भारीपन आदि।

प्रजनन (Reproduction)

प्राणियों में प्रजनन की दो पद्धतियाँ मानी गई हैं :—

(१) अमैथुनी—(Asexual) (२) मैथुनी—(Sexual)

एक-कोषाणवीय वनस्पतियों और प्राणियों में अमैथुनी पद्धति ही प्रजनन की प्रधान पद्धति है। इसके कई रूप हैं :—

(१) साक्षात् विभजन (Direct division)

(२) अंकुरण (Gemination)

(३) बहुविभाजन और बीजनिर्माण (Endogenous cell formation)

साक्षात् विभजन अमीबा-सदृश

जाता है।

कोषाणु का भोजःसार केन्द्र सहित लगभग दो समान भागों में विभक्त होकर एक दूसरे से पृथक् हो जाता है । इस प्रकार जनक का शरीर दो सन्ततियों के रूप में परिणत हो जाता है और ये सन्ततियाँ भी बाद में बढ़ कर स्वयं जनक बन जाती हैं ।

मैथुनी प्रजनन पारस्परिक संयोग है जिसमें दो समान व्यक्तियों का शरीर पूर्णतया एक दूसरे से मिल कर एकाकार हो जाता है और पुनः कई बीज सहायकों में विभक्त होकर युवा कोषाणु बनते हैं । इस प्रकार का संयोग हेटरोमिटा नामक सूक्ष्म जीव में पाया जाता है । मनुष्य आदि उच्च प्राणियों के विशिष्ट मैथुनी प्रजनन में एक ही वर्ग के दो भिन्न लिंगवाले व्यक्ति होते हैं जिनमें शरीर-रचना एवं शरीरक्रिया संबंधी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है ।

प्रत्येक व्यक्ति में शरीरगत भोजःसार दो प्रकार का होता है:—

(१) सामान्य कोषाणु—(Somatic cells)

(२) बीजकोषाणु—(Germinal cells)

सामान्य कोषाणु साधारण पोषण तथा जीवनसम्बन्धी अन्य कार्य करते हैं और बीजकोषाणु प्रजनन में भाग लेते हैं । पुरुष के बीजकोषाणु को शुक्रकीट तथा स्त्री के बीजकोषाणु को द्विग्व कहते हैं ।

जीवनकाल में सामान्य तथा बीजकोषाणुओं में परोक्ष विभजन होता है, किन्तु यह विभजन भी दो प्रकार का होता है:—

(१) समविभजन (Homotypical)—सामान्य कोषाणु में

(२) विषम विभजन (Heterotypical)—बीजकोषाणुओं में

(१) सम विभजन—इसमें सर्वप्रथम केन्द्र के बीच में एक संकोच उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे गहरा होने लगता है और अन्त में केन्द्र बीच से टूटकर दो भागों में विभक्त हो जाता है । यदि में इसी प्रकार भोजःसार तथा कोषाणु के आवरण में भी संकोच होता है जो गहरा होकर कोषाणु को दो भागों में विभक्त कर देता है । इस विभजन में कोमेटिन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता । कभी कभी इसमें केन्द्र तो विभक्त हो जाता है, किन्तु भोजःसार विभक्त नहीं होता । ऐसी अवस्था में कोषाणु के भीतर दो या अधिक केन्द्र पाये जाते हैं ।

(२) विषम विभजन (Heterotypical or reduction) शरीर के सभी सामान्य कोषाणुओं में इस प्रकार का विभजन होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें केन्द्र में एक विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन मिलता है। इस परिवर्तन में निम्नांकित अवस्थाएँ होती हैं:—

- (१) पूर्वावस्था (Prophase)
- (२) विभिन्नावस्था (Metaphase)
- (३) परावस्था (Anaphase)
- (४) अन्तावस्था (Telophase)

(१) पूर्वावस्था—प्रथम परिवर्तन केन्द्र में होता है जिससे क्रोमेटिन का जाल एक छपेटे हुये छम्बे सूत्र के रूप में हो जाता है। इसी अवस्था को गुच्छावस्था (Spirem phase) कहते हैं। इसके साथ ही केन्द्राघरण अस्पष्ट होकर अन्त में छुप्त हो जाता है और केन्द्र के बाहर स्थित आकर्षणमण्डल विभक्त होकर इसके दोनों सिरों पर चला जाता है। प्रत्येक आकर्षणमण्डल के चारों ओर कोषाणु का धोजःसार ज्योतिर्मण्डल के रूप में स्थित हो जाता है जिसे 'तारक' (Aster) कहते हैं। सूत्रम सूत्रों का घेमाकार भाग (Spindle) दोनों आकर्षणमण्डलों को मिलाता है जिसे वर्णरहित घेमा (Achromatic spindle) कहते हैं।

क्रोमेटिन का सूत्र टूटकर V की आकृति के अनेक तरंगित खण्डों में विभक्त हो जाता है। इन खण्डों को क्रोमोजोम (Chromosomes) कहते हैं। जाति के अनुसार इनकी संख्या में भी भिन्नता होती है, किन्तु एक जाति में इनकी संख्या निश्चित होती है। यथा मनुष्य में ४० क्रोमोजोम होते हैं जिनमें आधे पिता तथा आधे माता से उत्पन्न होते हैं।

केन्द्राणु का भी लोप हो जाता है तथा क्रोमोजोम दोनों आकर्षणमण्डलों के बीच में घेमा की मध्यरेखा पर वृत्ताकार व्यवस्थित होकर तारा के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इस अवस्था को तारकावस्था (Aster phase) कहते हैं।

(२) विभिन्नावस्था—इस अवस्था में प्रत्येक क्रोमोजोम छम्बाई में दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और इस प्रकार उनकी संख्या दूनी हो जाती है।

ये विभक्त क्रोमोजोम दो समूहों में घुसक होकर वेमा के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षणमण्डल के निकट चले जाते हैं और आकर्षणमण्डल को घेरकर तारासदृश आकृति बनाते हैं । इस प्रकार वर्णरहित वेमा के दोनों किनारों पर दो तारे बन जाते हैं । इस अवस्था को द्वितारक अवस्था (Diaster phase) कहते हैं ।

(३) परावस्था :—इस अवस्था में क्रोमोजोम संयुक्त होकर क्रोमेटिन का जाल बनाते हैं । केन्द्राणु तथा केन्द्रावरण का पुनः निर्माण हो जाता है । कोषाणु के प्रान्तभाग में चारों ओर संकोच दिखाई पड़ने लगता है ।

(४) अन्तावस्था :—कोषाणु में चारों ओर से संकोच गहरा होने लगता है जिससे क्रमशः कोषाणु दो भागों में विभक्त हो जाता है और इस प्रकार एक कोषाणु से दो सन्ततिकोषाणु (Daughter cells) बनते हैं । प्रत्येक सन्ततिकोषाणु में केन्द्र एवं आकर्षणमण्डल होता है ।

मैयुनी प्रजनन में केन्द्रसहित दो कोषाणुओं का मिलन होता है । यदि दोनों कोषाणुओं में क्रोमोजोम की सामान्य संख्या वर्तमान हो तो संयुक्त कोषाणु में इनकी संख्या प्रत्येक सन्तति में दूनी हो जायगी । अतः क्रोमोजोम की संख्या दूनी न हो, इसके लिए शुक्रक्रीडाणु तथा स्त्रीबीज में एक विशेष प्रकार का विभजन होता है, जिसके परिणामस्वरूप परिपक्व बीजकोषाणु में वर्गविशेष के लिए निश्चित क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है । कोषाणु विभजन की इस पद्धति को विषम विभजन या हासोन्मुख विभजन (Division by reduction) कहते हैं ।

हास निम्नांकित प्रकार से होता है :—

विभिन्नावस्था में क्रोमोजोम दो भागों में विभक्त न होकर युग्मरूप में अवस्थित हो जाते हैं । बाद में ये क्रोमोजोम दो भागों में विभक्त होकर प्रत्येक भाग वेमा के ध्रुवों की ओर चले जाते हैं । इस प्रकार प्रत्येक सन्ततिकोषाणु में उनकी संख्या आधी रह जाती है ।

पुरुषप्रजनन यन्त्र

शिरन, दो वृषण, दो शुक्रग्राहिनी, दो शुक्रप्रणिय, पौरुषप्रणिय और दो शिरनमूल पार्श्विक ग्रन्थियाँ इन दस अवयवों से प्रजनन यन्त्र बना है ।

शिरन (Penis)

यह पुरुषों में मैथुन का साधन है तथा, मूत्रप्रसेक को भी धारण करता है। यह लम्बी दण्डाकृति तीन मांसपेशियों से बना है। दो पेशियाँ पार्श्वभागों में रहती हैं जिन्हें शिरनपार्थिका (Corpora cavernosa) कहते हैं। इन पेशियों के नीचे मध्यरेखा में एक पेशी स्थित है जिसे 'मूत्रप्रसेकधरा' (Corpus spongiosum) कहते हैं। इस पेशी का अध्रभाग धृत्र के समान फेला हुआ होता है जो शिरनपार्थिका पेशियों के अध्रभाग को ढँकता है। इसे शिरनमुण्ड या शिरनमणि (Glans penis) कहते हैं। इसके समुत्त बाहर में मूत्रप्रसेक द्वार है जिससे शुक्र और मूत्र बाहर निकलता है। ऊपर शिरनपृष्ठ के मध्य में एक या दो शिरनशिरा, दोनों ओर शिरनधमनियाँ और इनके दोनों ओर कामसंवेदिनी नाम की दो नाडियाँ दिखाई देती हैं।

वृषण (Testicles)

इन्हीं ग्रन्थियों में शुक्र उत्पन्न होता है। ये ग्रन्थि अण्डकोष के भीतर वृषणबन्धनियों के द्वारा लटकते रहते हैं। अण्डकोष बाहर की ओर चर्म से आवृत होता है जिसे चर्मकोष कहते हैं। इसके भीतर एक स्थूल कलामय पुटक है जिसे आवरणकोष कहते हैं। मध्यस्थ कलाप्राचीर के द्वारा यह दो भागों में विभक्त है, प्रत्येक भाग में एक एक वृषणग्रन्थि रहती है। वृषणग्रन्थि को आवृत करने वाला एक और कलापुटक होता है, जिसे 'अण्डधर पुटक' (Tunica vaginalis) कहते हैं। वस्तुतः यह उदर्या कला का ही एक अंश है। इस कोष में दोनों स्तरों के भीतर जल सञ्चय हो जाने पर 'मूत्रवृद्धि' (Hydrocele) नामक रोग हो जाता है।

वृषणग्रन्थि (Testes)

ये दोनों ग्रन्थियाँ कच्चे आम के फल के समान या अण्डे के समान हैं तथा चन्धनियों के साथ अण्डधरपुटक के भीतर रहती हैं। प्रत्येक ग्रन्थि के पार्श्व में एक अधिचन्ध्राकार भाग लगा हुआ है जिसे 'अधिचन्ध्रणिका' (Epididymus) कहते हैं। इसमें अण्डशिरार से निकले हुये अनेक सूक्ष्मवह स्रोत गुसते हैं। यह

देखने में छोटी होने पर भी वस्तुतः अत्यन्त लम्बी शुक्रनलिका ही है जो सङ्कुचित स्थिति में अण्ड के पार्श्व में रहती है। यह ऊपर की ओर स्थूल ग्रन्थि के समान है और नीचे की ओर पतली होकर शुक्रवाहिनी का रूप धारण करती है जो वृषणवन्धनी के साथ ऊपर जाकर वंछणसुरङ्गा में प्रवेश करती है।

सूक्ष्म शारीर

अनुलग्न छेदन करने पर वृषणग्रन्थियों की सूक्ष्मरचना स्पष्टतः देती जा सकती है। इनमें अण्डधर पुटक के भीतर वृषणग्रन्थि को आवृत करने वाला, पतली कला से बना हुआ अण्डरुद्ध (Tunica Albuginea) नामक एक कोप है। इसकी शाखायें १० या १२ स्नायुपत्रिकाओं के रूप में ग्रन्थिवस्तु के भीतर प्रविष्ट

होकर उसको इतनी ही प्रकोष्ठिकाओं में विभक्त कर देती हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठिका में शुक्रनिर्माणक ग्रन्थिवस्तु से निकला हुआ एक-एक सूक्ष्म शुक्रस्रोत दिखाई देता है जो मूल में कुण्डली के आकार का होता है। प्रत्येक प्रकोष्ठिका में ग्रन्थिवस्तु को घेरित किये सूक्ष्म रक्तवह स्रोतों का जाल दीखता है जिससे शुक्रनिर्माणार्थ सदा लक्षिका का साव होता रहता है। इस प्रकार ग्रन्थिवस्तु में बना हुआ शुक्र सूक्ष्म शुक्रवह स्रोतों में बहता हुआ अण्डशिरः स्थित अधिवृषणिका में पहुँच



चित्र ६१—वृषणग्रन्थि जाता है। पुनः इसके द्वारा क्रमशः बढ़ता हुआ शुक्र वाहिनी से ऊपर ले जाया जाता है।

शुक्रवाहिनी (Ducta Deferentia)

ये अधिवृषणिका से निकली हुई स्नायु—बहुल मांसतन्तुनिर्मित दो नलिकायें हैं जो वृषण से निकले शुक्र को वस्तिद्वार तक ले जाती हैं। वंछणसुरङ्गाद्वार से श्रोणिगुहा में जाकर वस्तिपृष्ठ के माध्य से वस्तिद्वार के दोनों ओर रहती हैं। इनके पार्श्वों में शुक्रप्रणिकायें दिखाई देती हैं। प्रत्येक ओर वस्तिद्वार के समीप

शुक्रप्रपिका और शुक्रवाहिनी के मिलने से शुक्रप्रसेक बनता है जिसका द्वार मूत्र-प्रसेक के भीतर दीखता है।

शुक्रप्रपिका (Vesicula seminalis)

ये स्नायुतन्तु—बहुल दो शुक्राधारिकायें हैं। ये प्रायः ४ अङ्गुल लम्बी तथा कनिष्ठिका के समान मोटी हैं और यस्तिवृष्ट में शुक्रवाहिनियों के साथ रहती हैं। प्रत्येक शुक्रप्रपिका का अधोमुख पतला होकर शुक्रवाहिनी के मुख से मिल जाता है जो यस्तिद्वार के पार्श्व में रहता है। इसे शुक्रप्रसेक कहते हैं।

पौरुषप्रन्थि (Prostate glands)

यह यस्तिद्वार तथा मूत्रप्रसेक के प्रथम भाग को घेर कर रहती है। इसके १० या १२ छोट अतिसूक्ष्म छिद्रों द्वारा मूत्रप्रसेक के अन्दर खुलते हैं।

शिरनमूलिक प्रन्थियाँ (Cowper's glands)

ये दो प्रन्थियाँ मूंग के दाने के बराबर हैं। ये मूत्रप्रसेक के मध्यभाग के बाहर दोनों तरफ रहती हैं। इनके दोनों छोट मूत्रप्रसेक के भीतर दिखाई देते।

शुक्रकीटाणु (Spermatozoon)

शुक्रकीटाणु वृषण के शुक्रस्रावी छोटों में विकसित होते हैं। इनमें शिर, ग्रीवा, संयोजक भाग तथा पुच्छ होते हैं।

शिरः—अण्डाकार और चपटा होता है जिससे यह सरलतापूर्वक स्त्रीबीज में प्रवेश कर जाता है। इसमें क्रोमेटिन का एक समूह होता है जो क्रोपाणु का केन्द्र तथा गर्भाधान के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है।

ग्रीवाः—रुद्ध संकुचित होती है और इसके तथा शिर के सन्धिस्थल पर पूर्वोक्त आकर्षणमण्डल स्थित है जिसमें दो या तीन घृत्ताकार कण होते हैं।

संयोजक भागः—इसे शरीर भी कहते हैं। यह दण्डसदृश होता है जिसका पश्चिम अंश मुद्रिका-भाग या अन्तिमकोष (Terminal Disc) से सीमित है। इसके तथा ग्रीवा के सन्धिस्थान पर पश्चिमीय आकर्षणमण्डल रहता है जिसमें एक सूत्र (जिसे अक्षसूत्र—Axial filament—कहते हैं) शरीर तथा पुच्छ से हो कर पीछे की ओर चला जाता है। मात्र में यह सूत्र एक

अन्य तरंगित सूत्र के द्वारा आवेष्टित है जिसके चारो ओर सूक्ष्मकण-युक्त द्रव्य का आवरण रहता है । इसे कणयुक्त पिघान (Mitochondrial sheath) कहते हैं ।



पुच्छः—यह अधिक लम्बा होता है और तनु कोष से आवृत अक्षसूत्र से बनता है । इसका अन्तिम भाग केवल अक्षसूत्र से बना हुआ है और अन्त्य खण्ड (End piece) कहा जाता है । इसी पुच्छ की सहायता से शुक्रकीटाणु गति करने में समर्थ होते हैं ।

स्त्रीप्रजनन यन्त्र

अनेक अवयवोंके साथ बीजकोष तथा गर्भाशय स्त्रीप्रजनन-यन्त्र कहलाते हैं ।

चित्र ६७—शुक्रकीटाणु


गर्भाशय (Uterus) :—यह मासिक रजःस्राव का अंग है । गर्भावस्था में यह स्त्रीबीज का ग्रहण, धारण एवं पोषण करता है और प्रसवकाल में संकुचित होकर उसे बाहर निकाल देता है । इसके तीन भाग होते हैं :—

१. गर्भाशयमुख (os uteri)
२. गर्भाशय ग्रीवा (Cervix)
३. गर्भाशय शरीर (Body of the uterus)

गर्भाशय शरीर के भीतर त्रिकोणाकार रिक्त स्थान होता है । इस त्रिकोण के ऊपर दोनों पार्श्वस्थ कोण बीजवाहिनियों से मिले हैं और नीचे का कोण द्विद्रुप होकर ग्रीवासरणि से मिला है । गर्भाशय—शिखर का नाम गर्भतुम्बी (Fundus uteri) है । गर्भाशय शरीर का निर्माण स्नेहिक, पेशीमय तथा कलामय तीन स्तरों से हुआ है ।

बीजवाहिनी (Fallopian tubes) :—बीजवाहिनियाँ रक्तयन्त्र मांसपेशी से बनी हुई नलिकाएँ हैं जो गर्भाशय-शृंग से बीजकोष तक बाहु की

मौलि फैली रहती हैं। इनके बहिर्ग्रन्थि विकसित कुप्पाण्डपुसुम के समान हैं, इसलिए ये पुष्पितग्रन्थि (Eimbriated ends) कहलाते हैं। बीजकोष के फटने से निकले हुये स्त्रीबीज प्रतिमास इनके द्वारा गृहीत होकर गर्भाशय तक पहुँचाये जाते हैं।



चित्र ६८—गर्भाशय और बीजकोष

१. गर्भाशय-शरीर। २. गर्भाशय-ग्रीवा। ३. गर्भाशय-मुख। ४. योनि।
५. बीजवाहिनी। ६. बीजकोष।

बीजकोष (Ovary):—छोरी चिड़िया के अण्डे के, समान गर्भाशय के पार्श्व में स्थित दो ग्रन्थियाँ हैं। इनका मुख्य कार्य स्त्रीबीज का विकास एवं निर्धारण होता है। इनसे एक प्रकार का आन्तर्ग्रन्थिक रस निकलता है जिसे अन्तःस्त्राव कहते हैं। रजःचय के पश्चात् ये बहुत छोटे हो जाते हैं और वृद्धावस्था में भट्टर से अधिक बड़े नहीं रह जाते।

इसके दो भाग होते हैं:—

(१) बहिर्वस्तु (Cortex) (२) अन्तर्वस्तु (Medulla)

बहिर्वस्तु में स्त्रीबीज तथा कोष (Follicles) होते हैं। बहिर्वस्तु का सबसे बाहरी भाग धूसर होता है जिसे कलापुट (Albuginea) कहते हैं। अन्तर्वस्तु का निर्माण शिथिल सौम्यक तन्तु, अरोत्तांकित पेशीसूत्र तथा रक्तमलिकाओं से होता है।

बीजकोष का अन्तःस्त्राव दूसरे प्रजनन अंगों की पूर्णता को बनाये रखता है । प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि बीजकोषों को निकाल देने पर गर्भाशय तथा योनि का छय हो जाता है, किन्तु इन बीजकोषों को शरीर के किसी भाग में स्थापित कर देने पर योनि तथा गर्भाशय का छय नहीं होता । इस प्रकार जन्तुओं एवं स्त्रियों के बीजकोषों का छेदन कर शरीर के अन्य भागों में या उसी वर्ग के अन्य जन्तुओं में प्रस्थापन किया जाता है जहाँ रक्तवाहिनियों से सम्बन्ध स्थापित कर वे अपनी प्राकृत क्रियाओं का सम्पादन करते रहते हैं ।

गुरुकोष (Graafian follicles)

जन्म से मैथुनी जीवन के अन्त तक गुरुकोष निरन्तर वृद्धि करते रहते हैं । युवावस्था के पूर्व ये यद्विर्वस्तु के गम्भीरतर भाग में रहते हैं और बीजकोष के पृष्ठ तक नहीं आते । इसके बाद यद्विर्वस्तु के बाह्यभाग में आकर बीजकोष के पृष्ठभाग पर पहुँच जाते हैं और पारदर्शक कणों के रूप में प्रकट होते हैं । ज्यों ज्यों गुरुकोष बीजकोष के पृष्ठभाग पर पहुँचता जाता है, इसकी दीवालें पतली होती जाती हैं । इसके बड़े और नुकीले भाग को नाभि (Stigma) कहते हैं । इसी स्थान पर यह विदीर्ण होता है ।


गुरुकोष में निम्नांकित रचनाएँ पाई जाती हैं:—

बाह्य दीवाल जिसे आधारकला (Theca folliculi) कहते हैं । यह सौम्रिक तन्तु से बनी हुई है । इस कला के बाह्य और अन्तः दो भाग होते हैं । अन्तःभाग के भीतर की ओर कणयुक्त कला (Membrana granulosa) पाई जाती है जो बीजावरणकला से उत्पन्न कोषाणुओं के अनेक स्तरों से बनी होती है । इसके और आधारकला के बीच में रत्नमाकार कोषाणुओं का एक स्तर होता है जिसे *ग्रानुलर स्तर* (Boundary layer) कहते हैं । इसके भीतर एक द्रव भरा होता है जिसे कोषद्रव (Liguor folliculi) कहते हैं । यह द्रव बीजकोषाणुओं से स्रावित होता है और इसमें स्त्रीबीज का विशिष्ट अन्तः-स्त्राव होता है जिसे कोषान्तःस्त्राव (Follicular or oestrin hormone) कहते हैं । इस द्रव के कारण कणयुक्तकला बीजकलाकोष (Discus Proli-

gerus), जो कुछ कोषाणुस्तरों से निर्मित तथा स्त्रीबीज को घेरे हुये हैं, से घृथक् रहती है।

स्त्रीबीज (Ovum)

यह बीजकलाकोष से आवृत एक छोटा कोषाणु है जिसके चारों ओर निम्नांकित रचनायें होती हैं:—



चित्र ६९—स्त्रीबीज

(१) विसारिकिरणमण्डल (Corona radiata)

(२) पाण्डु क्षेत्र (Zona Pellucida)

(३) परिपृथिवेक्षेत्र (Perivitelline space)

(४) भोजःसार का एक स्वरूप स्वच्छ क्षेत्र

(५) भोजःसार का विस्तृत कणयुक्त क्षेत्र

(६) केन्द्रीय अन्तःसार क्षेत्र (central deutoplasmic zone)

केन्द्र तथा केन्द्राणु क्रमशः बीजबिन्दु (Germinal vesicle) तथा बीजबिन्दु (Germinal spot) कहे जाते हैं।

कोषद्रव मात्रा में बढ़ता है और उसकी वृद्धि के साथ ही साथ गुल्फोप भी आकार में बढ़ता जाता है। इस प्रकार यह बीजकोष के पृष्ठभाग पर पहुँच कर

एक उभार उत्पन्न करता है जिसे नाभि (Stigma) कहते हैं । गुरुकोप में रक्तनलिकाओं की वृद्धि के कारण रक्ताधिक्य हो जाता है जिससे यह फट जाता है और स्त्रीबीज बाहर आ जाता है । बीजवाहिनियों के पुष्पित अंशों द्वारा वह पकड़ लिया जाता है और इस प्रकार वह गर्भाशय में पहुँचता है । पहले ऐसा समझा जाता था कि गुरुकोप अन्तर्वर्त्ती द्रव के शीघ्रसंचय के कारण दबाव बढ़ जाने से फट जाता है, किन्तु अब यह एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, जो मुख्यतः रक्तसंवहन सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण होती है । बीजकोप रक्तकोप से भर जाता है और उसके भीतर दबाव अत्यधिक बढ़ जाने से स्त्रीबीज बाहर पृष्ठ पर चला जाता है । गुरुकोप के सबसे अधिक प्रसारित भाग में रक्तसंवहन समुचित रूप से नहीं हो पाता, जिससे उसकी नाभि गल जाती है और अन्त में उसके फट जाने से स्त्रीबीज बाहर निकल आता है ।

बीजकिणपुट (Corpus luteum)

विदीर्ण गुरुकोप के स्थान में ही यह रचना बनती है । आधारकला के अन्तःस्तर में स्थित रक्तनलिकाओं के फट जाने से गुरुकोप रक्त से भर जाता है तथा कणयुक्त कला से कुछ पीतवर्ण के कोषाणु बन कर इसमें आ जाते हैं और बीजकिणपुट में परिणत हो जाते हैं । ये पीतकोषाणु, जिनमें ल्यूटिन (Lutein) नामक पीतरञ्जक द्रव्य तथा केन्द्र होते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं और स्तरों में व्यवस्थित हो जाते हैं । आधारकला के अन्तःस्तर की रक्तवाहिनियाँ भी संख्या में बढ़ने लगती हैं, जिससे बीजकिणपुट के आकार में भी वृद्धि होती है और इस प्रकार इस संहत रचना का निर्माण होता है ।

यदि गर्भाधान नहीं हुआ तो बीजकिणपुट में चयोन्मुख परिवर्तन होने लगते हैं । उसके कोषाणु क्षीण होने लगते हैं और अन्त में क्रमशः लुप्त हो जाते हैं तथा बीजकोप के पृष्ठ पर केवल घनवस्तु रह जाती है । गर्भाधान हो जाने पर वह क्षीण न होकर बढ़ता जाता है । यह क्रम उस समय तक होता रहता है जब तक स्त्रीबीज की वृद्धि पर्याप्त नहीं हो जाती । गर्भावस्था के अन्त में उसका घ्यास ३ इंच की हो जाती है । तुलनात्मक अध्ययन के लिए निर्मांकित कोष्ठक नीचे दिया जाता है:—

काल	सामान्य बीजकिणपुट	गर्भाधानोत्तर बीजकिणपुट
सीन सप्ताह के अन्त में	$\frac{3}{4}$ इंच व्यास, केन्द्रीय रक्तस्कन्द रक्तम, बाह्य-भित्ति पीताम्ब	
एक मास	छोटा, बाह्यभित्ति चमकीली पीली, स्कन्द रक्तम	बहु वडा, बाह्य भित्ति चमकीली पीली, स्कन्द रक्तम
दो मास	स्वल्प प्रगवस्तु के रूप में परिणत	$\frac{5}{8}$ इंच व्यास, भित्ति चमकीली पीली, स्कन्द विवर्ण
३ मास	अनुपस्थित	पूर्ववत् आकार, भित्ति पाण्डुर, स्कन्द सूत्रमय
९ मास		$\frac{1}{2}$ इंच व्यास, स्कन्द प्रगवस्तु में परिणत, बाह्यभित्ति स्थूळ और पीतवर्ण से रहित


बीजकिणपुट से एक अन्तःछाव निकलता है जिसके कार्य निम्नांकित हैं:—

- (१) गर्भाशय के रक्तप्रवाह को नियमित करना।
- (२) मासिक रजःछाव तथा गर्भाशय की श्लेष्मलकला के परिवर्तनों को नियन्त्रित करना जिससे गर्भाशय ऐसी स्थिति में आ जाय कि वह छोटीबीज को ग्रहण कर उसका पोषण कर सके।
- (३) गर्भावस्था में स्तनप्रणियों की वृद्धि को उत्तेजित करना।

शुक्रकोषाणुओं का विकास (Spermatogenesis)

शुक्रकोषाणुओं का विकास वृषण में होता है और ये अधिक संख्या में शुक्रछाव में उपस्थित रहते हैं। इनमें स्पष्ट गतिशीलता होती है। ये एक मिनट में १ सेन्टीमीटर गति कर सकते हैं। इनका विकास प्राथमिक बीजकोषाणुओं से होता है जो स्वच्छ एवं सकेन्द्र घनाकार कोषाणुओं का एक स्तर बनाते हैं। इनमें सामान्य साधारण विभजन होता है और ये विभाजित होकर ये विशिष्ट कोषाणुओं में परिणत हो जाते हैं जिन्हें शुक्रजनक कोषाणु (Spermatogonia) कहते हैं। इन कोषाणुओं के बीच दीर्घ में कुछ बड़े कोषाणु होते हैं जिन्हें पोषक कोषाणु

(Cells of sertoli) कहते हैं । ये पोषण का कार्य करते हैं । शुक्रजनक कोषाणुओं का विभजन भी समविभजन पद्धति के द्वारा होता है । तत्पश्चात् प्राथमिक शुक्रकोषाणु (Primary spermatocytes) कहलाते हैं । प्रत्येक प्राथमिक शुक्रकोषाणु विषमविभजन पद्धति से विभक्त होकर दो द्वितीयक शुक्रकोषाणुओं (Secondary spermatocytes) में परिवर्तित हो जाते हैं जिनके केन्द्र में क्रोमोजोम की सख्या आधी रह जाती है । ये द्वितीयक शुक्रकोषाणु पुनः सम विभजन से तरुण शुक्रकीटाणु (Young spermatozoa) बनते हैं जो अन्त में अधिक विकसित होकर परिपक्व शुक्रकीटाणुओं में परिणत हो जाते हैं ।




चित्र ७०—शुक्रकीटाणु का विकास

स्त्रीबीज का विकास और परिपक्व

(Oogenesis and Maturation of Ovum)

स्त्रीबीज गर्भाधान के योग्य हो उसके इसके लिये वृद्धिशील गुरुकोष में उसका परिपक्व होता है। स्त्रीबीज का परिपक्व निम्नांकित क्रम से होता है:—

स्त्रीबीज का उद्गम बीजकोष को घेरे हुए बीजस्तर (Germinal epithelium) के कोषाणुओं से होता है। इन कोषाणुओं को स्त्रीबीजजनक (Oogonia) कहते हैं। ये सामान्य विभजनपद्धति से विभाजित और पुनः विभाजित होकर प्राथमिक स्त्रीबीजकोषाणुओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक प्राथमिक स्त्रीबीजकोषाणु (Primary oocyte) पुनः दो विषम आकार के कोषाणुओं में विभक्त हो जाते हैं जिन्हें द्वितीयक स्त्रीबीज कोषाणु (Secondary oocyte) तथा प्रथम परित्यक्त भाग (First polar body)



चित्र ७१—स्त्रीबीज का विकास

कहते हैं । द्वितीयक स्त्रीबीजकोषाणु पुनः विभक्त होते हैं जिससे परिपक्व स्त्रीबीज तथा द्वितीय परित्यक्त भाग (Second Polar body) बनते हैं । यह विभजन विषम विभजनपद्धति से होता है जिसका कारण स्त्रीबीज में क्रोमोजोम की संख्या ४८ (जैसा कि प्राथमिक स्त्रीबीजकोषाणु में होता है) न होकर २४ ही रह जाती है । परिपक्व स्त्रीबीज का केन्द्र स्त्रीपूर्वकेन्द्र (Female Pro-nucleus) कहलाता है ।

स्त्रीबीज का गर्भाशय में गमन

गुस्कोप के विदीर्ण होने के समय बीजवाहिनी के पुष्पित प्रान्त बीजकोष पर आ जाते हैं । नलिका में रोमों की गति के कारण एक प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे स्त्रीबीज नलिका में पहुँचकर गर्भाशय की ओर प्रेरित होता है ।

गर्भाधान (Fertilisation)

शुक्रकीटाणु के साथ परिपक्व स्त्रीबीज के संयोग को गर्भाधान कहते हैं । यह सामान्यतः बीजवाहिनी के ऊपरी भाग में होता है । स्त्रीबीज अपनी विशिष्ट शक्ति से शुक्रकीटाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस प्रकार गर्भाधान की क्रिया सम्पन्न होती है । परिपक्व स्त्रीबीज के आवरण में अनेक शुक्रकीट प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, किन्तु जब एक शुक्रकीटाणु स्त्रीबीज में प्रविष्ट हो जाता है तब स्त्रीबीज के बाहरी स्तर में कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है कि अवशिष्ट शुक्रकीटाणु शीघ्र उससे पृथक् हो जाते हैं । स्त्रीबीज में प्रवेश कर जाने के पश्चात् शुक्रकीटाणु का पुच्छ छीन होकर शोषित हो जाता है । शुक्रकीटाणु का शिर पुरुष पूर्वकेन्द्र (Male pronucleus) कहलाता है जो स्त्रीपूर्वकेन्द्र से मिलकर एक हो जाता है । इस प्रकार पुरुष तथा स्त्री पूर्वकेन्द्र के संयोग से एक कोषाणु बनता है जिसे गर्भकेन्द्र (Segmentation Nucleus) कहते हैं । परिपक्व स्त्रीबीज तथा शुक्रकीटाणु के मिलने से गर्भकेन्द्र में क्रोमोजोम की संख्या पूरी हो जाती है । यही कारण है कि गर्भ में क्रोमोजोम की संख्या अधिक न होने पर भी उसमें पैतृक तथा मातृक गुण चले जाते हैं । स्त्रीबीज तथा शुक्रकीट का मिलन बीजवाहिनी के पार्श्वभाग में होता है, किन्तु कभी-कभी अन्य स्थानों में भी यह क्रिया होती है । कभी-कभी इन दोनों का मिलन बीजकोष में ही हो जाता

है और वहीं गर्भकेन्द्र वृद्धि करता है। बीजशहिनो, उदर गुहा इन स्थानों में भी गर्भकेन्द्र रुककर वृद्धि करते हैं।

सामान्यतः गर्भकेन्द्र गर्भाशय में चला जाता है और वहीं उसकी श्लेष्मल-कला में गर्भकेन्द्र का अन्तर्वपन होता है। अन्तर्वपन तथा अपरा का निर्माण बीजकोष तथा बीजकिणपुट के अन्तःस्त्राव की सहायता से होता है। इसका प्रमाण यह है कि यदि गर्भाधान के बाद शीघ्र ही बीजकोष तथा बीजकिणपुट को छुट्का कर दिया जाय तो अन्तर्वपन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

गर्भविकास (Segmentation)

गर्भकेन्द्र लगभग दो समान भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार ये पुनः विभक्त होते चले जाते हैं और अन्त में इनसे शहनुत के आकार की एक रचना बनती है जिसे कलठ (Morula) कहते हैं। तदनुसार इसमें एक कोटर बन जाता है जिससे कलठ कोष में परिणत हो जाता है। इससे गर्भकोष (Blastodermic Vesicle) कहते हैं। कलठ के कोषाण व्यवस्थित होकर अन्तः एवं बाह्य कोषाणुओं में विभक्त हो जाते हैं। बाह्य कोषाणु क्रमबद्ध होकर बाह्यस्तर का निर्माण करते हैं जिसे गर्भपरिधि (Trophoblast) कहते हैं और इससे युक्त गर्भकोष को एक-पत्रक गर्भकोष (Unilaminar blastocyst) कहते हैं। अन्तःकोषाणु एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं जिसे गर्भ-ध्रुव (Embryonic pole) कहते हैं। इसी स्थान पर भावी भ्रूण की वृद्धि होती है। अनेक स्तनधारी प्राणियों में, गर्भपरिधि और गर्भध्रुव के बीच में द्रव संचित हो जाता है और इस प्रकार एक गर्भकोष्ठ (Segmentation Cavity) बन जाता है।

गर्भपरिधि:—यह भ्रूण के निर्माण में कोई योग नहीं देता, इससे केवल कोडीन (Chorion) नाम की एक कला बनती है जिसके कुछ अंश से अपरा का निर्माण होता है। गर्भपरिधि दो स्तरों में विभक्त हो जाता है। बाह्यस्तर को बाह्यपरिधि (Syncytium) तथा अन्तःस्तर को अन्तःपरिधि (Layer of Langhans) कहते हैं। गर्भपरिधि छोटीज को गर्भाशय की श्लेष्मलकला में स्थापित करने में प्रधान भाग लेता है।

आन्तरिक कोषाणुसमूहः—इस समूह के कोषाणु एक स्तर में व्यवस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार गर्भकोष द्विपत्रक गर्भकोष (Bilaminar blastocyst) में परिणत हो जाता है। ये कोषाणु दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। बाह्यभाग को बाह्यस्तर (Ectoderm) तथा आन्तरिक भाग को अन्तःस्तर (Entoderm) कहते हैं। बाद में इन दोनों भागों में कोटर बन जाते हैं। बाह्यस्तर में स्थित कोटर को बाह्यकोटर (Amniotic cavity) तथा अन्तःस्तर में स्थित कोटर को अन्तःकोटर (Archenteron) कहते हैं।

मध्यस्तर (Mesoderm):—बाह्यस्तर के कुछ कोषाणु संख्या में वृद्धि कर समीपस्थ कोषाणुओं से मिलकर अपारदर्शक रेखा के रूप में परिणत हो जाते हैं जिसे प्राथमिक रेखा (Primitive streak) कहते हैं। इससे कोषाणुओं का तीसरा स्तर बनता है और बाह्यस्तर तथा अन्तःस्तर के बीच में रहता है। इस स्तर को मध्यस्तर कहते हैं।

नाडीपरिखा (Neural groove) जो मध्यरेखा के दोनों ओर बाह्यस्तर की वृद्धि से बनती है, के दोनों पाशों में मध्यस्तरीय कोषाणु समूहों में स्थित होते हैं, जिन्हें मध्यस्तरीय कोषाणुसमूह (Mesoblastic Somites or Protovertebrae) कहते हैं।

इसके बाद मध्यस्तरीय कोषाणु बाह्य तथा अन्तःस्तर के बीच में फैलते हैं और क्रमशः इसमें एक विदार बन जाता है जिससे यह दो भागों में विभक्त हो जाता है। बाहर का स्तर जिसे परिसरीय स्तर (Somatic layer) कहते हैं, बाह्यस्तर से लगा रहता है और ये दोनों मिलकर परिसरीय भाग (Somatopleur) का निर्माण करते हैं। भीतरी स्तर, जिसे आशयिकस्तर (Splanchnic layer) कहते हैं, अन्तःस्तर से लगा रहता है और ये दोनों मिलकर आशयिक भाग (Splanchnopleur) बनाते हैं। परिसरीय एवं आशयिक भाग के बीच का स्थान कायगुहा (Body cavity or Coelom) कहलाता है।

इस अवस्था में स्त्रीबीज में बाहर से भीतर की ओर निम्नांकित रचनाएँ पाई जाती हैं:—

१. बाह्यस्तर जो

२. परिसरीय स्तर से आवृत रहता है और दोनों मिलकर परिसरीय भाग बनाते हैं।

३. कायगुहा—यह परिसरीय तथा आशयिक भाग के बीच का स्थान है। आशयिक भाग का निर्माण अन्तःस्तर के साथ आशयिक स्तर के मिलने से होता है।

४. आशयिक स्तर।

५. अन्तःस्तर।

आशयिक भाग की केन्द्रीय गुहा अन्तःकोटर बनाती है।

प्राथमिक रेखा के पूर्वभाग में चाइस्टर के कोषाण मोटे तथा स्तरों में व्यवस्थित होने लगते हैं जिन्हें नाडीस्तर (Neural fold) कहते हैं। इन स्तरों से नाडीपरिखा (Neural groove) बनती है। ये स्तर नाडीपरिखा के दोनों पार्श्वों में ऊपर की ओर बढ़कर अन्त में भीतर की ओर मुड़ जाते हैं और एक दूसरे से पूर्णतया मिल जाते हैं जिससे उनके मध्य में एक अवकाश रह जाता है जिसे नाडीनलिका (Neural canal or Neural tube) कहते हैं।

अब धीज के चारों ओर एक संकोच आरम्भ होता है जिससे वह ऊर्ध्व और अधः दो भागों में विभक्त हो जाता है। ऊपर के भाग से भ्रूण का विकास होता है और नीचे के भाग से उसके अन्य अंग बनते हैं। ये दोनों भाग बढ़ते जाते हैं और संकोच अधिक गहरा होता जाता है। इसी स्थान पर भ्रूण की नामि बनती है। ऊर्ध्वभाग, जिसे भ्रूणभाग (Embryonic part) कहते हैं, बढ़कर लम्बा हो जाता है। इसका पूर्व अंश शिरोभाग (Head fold) तथा पश्चिम अंश पुच्छभाग (Tail fold) कहलाता है। अन्तःकोटर का पृष्ठभाग, जो भ्रूण के भीतर रहता है प्राथमिक पाचननलिका बनाता है। यह नलिका भी पूर्व (Fore-gut), मध्य (Midgut) तथा अन्त्य (Hindgut) भागों में विभक्त हो जाती है।

भ्रूण में स्थित कायगुहा के एक अंश से फुफुसावरण, उदरावरण तथा हृदयावरण की गुहायें बनती हैं। नाडीपरिखा के नीचे अन्तःस्तर के कोषाणों के स्थूल होने के कारण एक धारा बन जाती है जिसे कंकाल धारा (Notochord) कहते हैं। यही अस्थि कंकाल के कवच का उद्गम बिन्दु है। कंकालधारा अन्तःस्तर

से पृथक् होकर एक वृत्ताकार रज्जु के समान भाग बनाती है जो बनने वाले भावी मेरुदण्ड की पूरी लम्बाई में फला रहता है ।

नाडीनलिका एवं कंकालधारा को घेरे हुये मध्यस्तरीय कोषाणुओं से कपाल, मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा कशेरुकाओं के आवरण बनते हैं । नाडीनलिका से नाडी-संस्थान बनता है । नाडीनलिका के शिरोभाग में तीन प्रसार होते हैं जिनसे अग्र-मस्तिष्क तथा मध्यममस्तिष्क तथा पश्चिम-मस्तिष्क बनते हैं । नाडीनलिका के अवशिष्ट भाग से सुषुम्ना बनती है ।

गर्भ के बाह्य, मध्य तथा अन्तःस्तरों से शरीर की निम्नांकित रचनाओं का निर्माण होता है :—

बाह्यस्तर :—

१. संपूर्ण नाडीसंस्थान २. त्वचा का बाह्यस्तर ३. केश, नख
४. स्नेह, स्वेद तथा स्तन्यग्रन्थियों के आवरणतन्तु
५. नासापय के आवरणतन्तु
६. मूत्रप्रसेक द्वार के निकटवर्ती आवरणतन्तु
७. मुख के ऊर्ध्वभाग एवं कपोलों के आवरणतन्तु
८. मलाशय के अन्तिम भाग के आवरणतन्तु
९. दन्त का बाह्य आवरण १०. ज्ञानेन्द्रियों के नाड्यावरक तन्तु
११. नेत्र के अग्रिमभाग के आवरण में स्थित आवरणतन्तु
१२. अश्रुस्रोत तथा अश्रुग्रन्थियों का आवरणतन्तु
१३. तारामण्डल की संकोचक एवं विस्फासक पेशियाँ
१४. स्वेदग्रन्थियों की पेशियाँ १५. पोषणकग्रन्थि का अग्रदण्ड
१६. अधिवृक्क ग्रन्थि का अन्तःभाग १७. पीयूषग्रन्थि

अन्तःस्तर :—

१. अन्ननलिका के आवरणतन्तु
२. पाचननलिका में खुलनेवाली ग्रन्थियों के आवरणतन्तु
३. स्वरयन्त्र, श्वासनलिका, श्वासप्रणालिका एवं श्फुस के वायुकोषों के आवरणतन्तु

४. पटहपूरणिका तथा धर्णपटह के आवरकतन्तु

५. मूत्राशय तथा मूत्रप्रसेक के आवरकतन्तु

६. अवट्ट तथा ग्रैवेयक ग्रन्थि के कोषों के आवरकतन्तु

मध्यस्तर—

(क) परितरीय स्तर :—अस्थि, पेशी तथा संयोजक तन्तु

(ख) आशयिकस्तर :—पाचननलिका, रक्तवहसंस्थान तथा मूत्र-प्रजननसंस्थान ।



चित्र ७२—पाँच महीने का भ्रूण

गर्भकला (Decidua)

गर्भाशय की परिवर्तित श्लेष्मलकला को गर्भकला कहते हैं। स्त्रीबीज के अन्तर्वपन के पूर्व श्लेष्मलकला में रक्तसंचय होने लगता है और यह मोटी हो जाती है। इसके सीत्रिकतन्तु के कोषाणुओं की संख्या अधिक हो जाती और गर्भाशय की ग्रन्थियाँ विस्तृत हो जाती हैं।

जब शुक्रगर्भित स्त्रीबीज गर्भाशयगुहा में पहुँचता है तब वह सामान्यतः कललावस्था में होता है। गर्भाशय की श्लेष्मलकला में बीज का अन्तर्वपन हो जाने के पश्चात् श्लेष्मलकला मोटी हो जाती है और उसका रक्तसंवहन बढ़ जाता है। गर्भाशय की ग्रन्थियाँ लम्बी हो जाती हैं और कीपाकार (Funnel shaped) सुखों से दृष्टभाषा पर सुलक्ष्मी हैं ।

स्त्रीबीज के अन्तर्वपन के पश्चात् श्लेष्मलकला निर्गन्धित तीन भागों में विभक्त हो जाती है :—

(१) बीजावरक गर्भकला (Decidua Capsularis)

(२) अपरीय गर्भकला (*Decidua basalis*)

(३) अवशिष्ट गर्भकला (*Decidua vera*)

बीजावरक गर्भकला श्लैष्मिककला के उस भाग को कहते हैं जो स्त्रीबीज को आवृत करता है । अपरीय गर्भकला श्लैष्मिककला तथा स्त्रीबीज के मध्यभाग को कहते हैं । अवशिष्ट श्लैष्मिककला को अवशिष्ट गर्भकला कहते हैं ।

स्त्रीबीज ज्यों ज्यों बढ़ता है, बीजावरक गर्भकला पतली होती जाती है और तीसरे मास तक अवशिष्ट गर्भकला से मिल जाती है तथा पांचवें मास तक पूर्णतया लुप्त हो जाती है ।



चित्र ७३—आठ सप्ताह का भ्रूण

भ्रूणावरण (*Amnion*)

यह सबसे भीतर की चिकनी फला है जो भ्रूण को आवृत करती है । इसका निर्माण परितरीय भाग के शिरोभाग तथा पुच्छभाग से होता है जो भ्रूण की पूर्वावस्था में इसके शिर तथा पुच्छ भागों के रूप में होते हैं ।

ज्यों ज्यों भ्रूण बीजाण्डु (Yolk) में बढ़ता जाता है, र्यों र्यों इन स्तरों की वृद्धि होती जाती है और अन्त में ये एक दूसरे से मध्यरेखा में मिलकर दो स्पष्ट कलाओं का निर्माण करते हैं—

(क) मिथ्या भ्रूणावरण (False amnion)—यह पाण्डुरेत्र (Zona pallucida) के बचे हुये भाग से बनता है।

(ख) वास्तविक गर्भकला (True amnion)—यह भीतर का भाग है जो भ्रूणकोष (Amniotic sac) बनाता है। इसी कोष में भ्रूण रहता है। ज्यों ज्यों वृद्धि होती जाती है, इसका आकार बढ़ता जाता है और अन्त में यह झोड़ीन के साथ मिल जाता है। इसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ जिसे गर्भोदक (Liquor amnii) कहते हैं, इकट्ठा हो जाता है। इस तरल का निर्माण निम्नांकित प्रकार से होता है:—

(१) माता की रक्तवाहिनियों के छाव से

(२) भ्रूण की रक्षा एवं वृक्क के मलोत्सर्ग से

(३) नाभिनाल तथा अपरा के छाव से

गर्भोदक के कार्य

(१) गर्भावस्था एवं प्रसव की प्रथमावस्था में भ्रूण एवं नाभिनाल के ऊपर अत्यधिक दबाव को रोकता है।

(२) भ्रूणावस्था के स्तरों को परस्पर तथा भ्रूण में चिपकने से रोकता है।

(३) प्रसवकाल में गर्भाशय—ग्रीवा का प्रसारण करता है और योनि का प्रचालन करता है।

(४) भ्रूण को चारों ओर से सहारा देता है।


(५) आघात से भ्रूण की रक्षा करता है।

अपरा (Placenta)

यह एक अवयव है जिससे गर्भाशय की कला तथा भ्रूण की कलाओं के बीच निकटतम सम्पर्क स्थापित होता है। इसी के द्वारा पोषक पदार्थ माता से भ्रूण में जाते हैं और उत्सृष्ट मलपदार्थ भ्रूण से माता में आते हैं। इसी रचनाविशेष से भ्रूण को पोषकत्व तथा ओषजन मिलता है। इसके दो भाग होते हैं:—

(१) भ्रूणभाग (Foetal part)—यह कोटीन तथा इसके अंगुरों से घनता है ।

(२) मातृभाग (Maternal part)—यह अर्परीय गर्भकला से घनता है ।



चित्र ७५—गर्भांतपस्थित प्रसूत गर्भ

पूर्णावस्था में यह वृत्ताकार होता है। इसका भार १ पौण्ड होता है। यह बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। इसका अन्तःपृष्ठ चिकना तथा भ्रूणावरण से आवृत रहता है जिसके नीचे से नाभिनाल की बड़ी बड़ी रक्तवाहिनियाँ अपरा में प्रवेश करती हैं। इसका बाह्यपृष्ठ गर्भकला तथा गर्भाशय की दीवाल से मिला रहता है और प्रसवकाल में इनसे पृथक् हो जाता है। चतुर्थ मास के अन्त में इसकी बनावट पूर्ण हो जाती है।

अपरा के कार्य

(१) यह भ्रूण के लिए श्वसनयन्त्र का कार्य करता है जिससे उसको ओपजन मिलता रहता है।

(२) यह पोषक अंग है जिसके द्वारा पोषक पदार्थ माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में जाते हैं।

(३) यह मलोरसर्ग का भी कार्य करता है जिससे भ्रूण त्याज्य वस्तुओं को बाहर निकालता है।

(४) इससे अन्तःछाद निकलता है।

(५) यह रक्तक अंग के समान कार्य करता है जिससे जीवाणु तथा विष भ्रूण में नहीं जा पाते।


गर्भस्थ शिशु का रक्तसंवहन

माता का ओपजनयुक्त रक्त संवाहिनी सिरा द्वारा भ्रूण में पहुँच कर निम्न-लिखित तीन मार्गों से अधरा महासिरा में पहुँचता हैः—

(१) कुछ रक्त यकृत के धाम खण्ड, चतुरस्रपिंडिका तथा दीर्घपिंडिका में सीधा चला जाता है और वहाँ से याकृती सिरा के द्वारा अधरा महासिरा में पहुँचता है।

(२) रक्त की अधिक मात्रा प्रतीहारिणी सिरा के द्वारा यकृत में होता हुआ याकृती सिरा के द्वारा अधरा महासिरा में पहुँचता है।

(३) बचा हुआ रक्त सेतुसिरा से अधरा महासिरा में सीधे पहुँच जाता है। सेतुसिरा संवाहिनी सिरा की एक शाखा है। बालक की गर्भावस्था में यह खुला रहता है, किन्तु जन्म के पश्चात् बन्द होकर यकृत की सिराबन्धनी का निर्माण करता है।



चित्र ७५—भ्रूण का रक्तसंवहन

- | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| १. दक्षिण अलिन्द | २. दक्षिण निलय | ३. वाम निलय | ४. फुफुसी धमनी |
| ५. फुफुसी धमनी | ६. उत्तरा महासिरा | ७. अधरा महासिरा | ८. यकृत |
| ९. प्रतीक्षारिणीसिरा | १०. संवाहिनी धमनी | ११. सेतुसिरा | १२. यकृत |
| १३. नाभिनाल | १४. अधरा | १५. महाधमनी | |

शब्दसूची

अ	पृ०	अग्रिम शृंगसेतु	पृ०	अनुप्रतिविम्ब	पृ०
अंकुरगति	३१३	अग्रिमाजलधानी	४१४	अनुप्रस्थशक्ति-	५२८
अंकुशकर्णिका	४४२	अग्राण	४८५	कर्णिका	४४१
अंकुशगुच्छ	४३५	अजागन्ध	४८४	अनुमध्यान्तराकर्णिका	४४७
अंकुशतन्त्रिका	४१५	वातिरिक्त वायु	१८४	अनुमन्याक गण्ड	४६७
अंग	१	अतिथमन	१९०	अनुयोगी वर्ण	२३०
अंगविकारज अलङ्घ्य-		अद्रिनिलीन इष्टमेह	२९५	अनुवृत्त गुच्छ	४१५
मिन मेह	३१४	अधर अनुदीर्घगुच्छ	४३५	अनैमित्तिक	८१
अंशुलीन	२६२	अधर वृन्तिका	४२३	अन्तःकर्ण	५३८
अक्ष	२५	अधरा अधिपीठिका	४१९	अन्तःखंडीय रक्तवह	
अक्षीय विकार	५१२	अधरा मूलसूत्रिका	४१२	स्रोत	३१७
अग्निद्वीप	२६२	अधरालिका	४२९	अन्तःशसन	१७८
अग्न्याशय रस	२६२	अधिकतम उत्तेजना		अन्तःजाय	३७७
अग्न्याशयिक	३८६	का सिद्धान्त	५४४	अन्तःस्रवा प्रस्थियाँ	३७५
अग्न्याशयिक इष्टमेह	२९५	अधिमग्न	५०३	अन्तर्मुख प्रत्यावर्तन	५१७
अग्न्याशयिक पाचक-		अधिवृक् प्रस्थि	३७८	अन्तर्जात सारमीकरण	२८४
तत्त्व	२६५	अधिवृक्षीय	३८६	अन्तर्मुखीकरण शक्ति	५०८
अग्रिम आज्ञाभिरा		अधिशोषण	२२२, ३२५	अन्तर्वराशिक	४१६
तन्त्रिका	४१४	अधिसेतुका	४३३	अन्तर्हार्दिक दबाव	१४२
अग्रिम कन्दिका	४३०	अधोहन्वीय प्रत्या-		अन्तस्त्वक्	५४८
अग्रिमगुच्छ	४३६	वर्तन	४६०	अन्यकुण्डलिकाभारा	३२७
	४१४	अनियमित शसन	१९७	अन्वन्तरा	४३३
	४४०	अनुकम्पन सिद्धान्त	५४३	अपरा	५८८
	४३३	अनुकटिकास्फीति	४१२	अपूर्ण दीर्घसंकोच	६३
	४२२	अनुमीविका स्फीति	४१२	अभिघातज इष्टमेह	२९६
			१७२	अभ्यासन	४८६
			४३१	अभ्यासात्मक चैष्टायें	८५
			३३७	अभ्यस्तक्रियानाश	४३९

इस प्रकार अधरा महासिरा में आया हुआ रक्त अधःशाखाओं से आये हुये रक्त के साथ मिलकर हृदय के दक्षिण अलिन्द में पहुँचता है। इस कोष्ठ से रक्त दक्षिण निलय में न जाकर शुक्तिरूपाट से प्रेरित होकर शुक्तिखात के द्वारा वाम अलिन्द में जाता है। वाम अलिन्द से वामनिलय में रक्त आकर महाधमनी में चला जाता है और वहां से शिर तथा ग्रीवा को जाता है। इसी समय थोड़ा रक्त अवरोहिणी महाधमनी में चला जाता है। शिर और ग्रीवा की रक्तवाहिनियों से होता हुआ रक्त उत्तरा महासिरा के द्वारा दक्षिण अलिन्द में जाता है और वहां से दक्षिण निलय से होता हुआ फुफुसाभिगा धमनी से होकर फुफुस में जाता है।

रक्त को अत्यल्प मात्रा भ्रूण के क्रियाहीन फुफुसों में जाता है। बचा हुआ रक्त सेतुधमनी के द्वारा, जो भ्रूणावस्था में खुला रहता है, महाधमनी में प्रविष्ट होता है। यह सेतुधमनी खसनकार्य आरम्भ होने पर संकुचित होने लगती है और जन्म के पांचवें दिन पूर्णतया बन्द हो जाती है। इसी से धमनी-बन्धनी का निर्माण होता है जो वाम फुफुसाभिगा धमनी को महाधमनी के तोरणभाग से मिलाता है।

अवरोहिणी महाधमनी में स्थित रक्त का थोड़ा अंश उदर के आशयों तथा अधःशाखाओं में घूमता है और बचा हुआ रक्त संवाहिनी धमनियों द्वारा अपरा में लौट जाता है।



शब्दसूची

अ	पृ०	अ	पृ०	अ	पृ०
अकुरगति	३१३	अग्रिम श्रमसेतु	४१४	अनुप्रतिग्रिम्	५२८
अंकुशकर्णिका	४४२	अग्रिमाजलधानी	४९१	अनुप्रस्थशक्ति	
अंकुशगुच्छ	४३५	अघ्राण	४८५	कर्णिका	४४१
अंकुशतन्त्रिका	४१५	अजागन्ध	४८४	अनुमध्यान्तराकर्णिका	४४७
अंग	१	अतिरिक्त वायु	१८४	अनुमन्याक गण्ड	४६७
अंगधिकारज अलङ्घ्य		अतिश्रसन	१९०	अनुयोगी वर्ण	५३०
मिन मेह	३६४	अद्रिनिलीन इष्टमेह	२९५	अनुवृत्त गुच्छ	४१५
अंशुलीन	२६२	अधर अनुदीर्घगुच्छ	४३५	अनैमित्तिक	८१
अक्ष	२९	अधर घृन्तिका	४२३	अन्त कर्ण	५३८
अक्षीय विकार	५१२	अधरा अधिपीठिका	४१९	अन्त खडीय रक्तवह	
अग्निद्वीप	२६२	अधरा मूलसूत्रिका	४१२	स्रोत	३१७
अग्न्याशय रस	२६२	अधरालिका	४२९	अन्त श्रसन	१७८
अग्न्याशयिक	३८६	अधिकतम उत्तेजना		अन्त स्त्राय	३७७
अग्न्याशयिक इष्टमेह	२९५	का सिद्धान्त	५४४	अन्त क्षवा ग्रन्थियाँ	३७५
अग्न्याशयिक पाचक-		अधिमन्थ	५०३	अन्तर्मुख प्रत्यावर्त्तन	५१७
तत्त्व	२६५	अधिवृक् ग्रन्थि	३७८	अन्तर्जात सारमीकरण	२८४
अग्रिम आज्ञाभिगा		अधिवृक्षीय	३८६	अन्तर्मुखीकरण शक्ति	५०८
तन्त्रिका	४१४	अधिशोषण	२२२, २२५	अन्तर्वराशिक	४१३
अग्रिम कन्दिका	४३०	अधिलेनुका	४३३	अन्तर्हार्दिक दबाव	१४२
अग्रिमगुच्छ	४३६	अधोहन्वीय प्रत्या		अन्तस्त्वक्	५४८
अग्रिम दीर्घगुच्छ	४१४	वर्त्तन	४६०	अन्त्यकुण्डलिकाभाग	३२७
अग्रिम दृष्टिचेत्र	४४०	अनियमित श्रसन	१९७	अन्वन्तरा	४३३
अग्रिम पिण्ड	४३३	अनुकम्पन सिद्धान्त	५४३	अपरा	५८४
अग्रिम भस्तुलुग	४२२	अनुकटिकास्फीति	४१२	अपूर्ण दीर्घसंकोच	६३
अग्रिम रसायनी	४९०	अनुग्रीविका स्फीति	४१२	अभिधातज इष्टमेह	२९६
अग्रिम श्रम	४१४	अनुज रक्तकण	१०२	अभ्यासन	४८६
अग्रिमश्रम कोषाणु	४२०	अनुदीर्घा महासीता	४३१	अभ्यासारमक चेष्टायें	८५
		अनुपादेय	३३७	अभ्यस्तक्रियानाश	४३९

	पृ०		पृ०		पृ०
अभेदम सूत्र	३९	अस्थिजनक सूत्र	१९	आवश्यक रक्तभार	१६०
अमोनिया	३५९	अस्थिवृद्धि	३८८	आवस्थिक	५४
अमोनिया निदर्शक	३५१	अस्थ्युत्पादक कण	१८	आवेशजन्य इष्टुमेह	२९५
आम्ल आहार	३०१	आ		आशयिक	४१७, ४५१
आम्लशारसमीकरण	३०३	आकर्ममण्डल	६	आशयिक संज्ञायें	४१३
आम्लभाव	२९८	आकस्मिक	८१	आश्रयी प्रत्यावर्तन	४६१
आम्लरंगेच्छु श्वेतकण	१०८	आकारगत परिवर्तन	४५	आहार	२२५
अरिगणावर्तक	२८२	आकृति	५४२	आहारज इष्टुमेह	२९४
आयुवाधिर्य	४४७	आरोप क्रम	६२	इ	
अर्धचन्द्रगण्ड	४७९	आज्ञाकन्द	४२२, ४२९	इष्टुमेह	२९३
अर्धप्रवेश	२१९	आज्ञाभिगा तन्त्रिका	४१५	इष्टुमर्करावर्तक	२६९
अर्धपरस्परभ्रम	१०६	आत्मतन्त्रजन	१५०	इष्टिकन	३६३
अलिन्दोय सूत्रसंकोच	१९६	आत्मविदलेपन	२८६	इष्टोक्सिल	३६३
आलुमिनि	३६५	आत्ययिक प्रकाश		इवाहट का प्रवण	
आलुमिनोमीटर	३६७	प्रत्यावर्तन	४६२, ५१९	प्रतिविम्ब सिद्धान्त	५४७
अलिन्द	१२९	आयुष्टुण्डलिकामाग	३२७	ई	
अलिन्दनिलयगुच्छ	२८, १९१	आनन्तरिक निरोध	५२८	ईष्टिऑल	४०१
अलिन्दस्फुरण	१५९	आन्तरी कन्दिका	४३०	ईष्टोन	४०१
अवपावधिक	४५१	आन्तरवृद्धि वल्लिका	४३१	उ	
अवधेयक	११४	आन्तरस	२६७	उद्यतम उत्तेजक	४८
अवटुक	४०३	आन्त्रिक पाचकताव	२६९	उद्यतम संज्ञाकोषाणु	४४६
अवरोही	४१५	आन्त्रिक पाचन	२६२	उद्यतर	४५१
अवशिष्टप्रत्यावर्तनकाल	४५२	आन्त्र-व्यवृत्त संवहन	३२२	उद्यभारिक	२२०
अवशिष्ट वायु	१८५	आन्त्रस्रोत	३२७	उद्यनशील गन्ध	४८४
अवसादक अन्तःस्त्राव	३७७	आपेक्षिक रक्तकणा-		उत्तर शैलिककणिका	४४७
अव्यक्तकाल	४६	धिय	९९	उत्तरा अधिपिण्डिका	४२९
अश्रुग्रन्थि	४८८	आमाशयान्त्रिक प्रत्या-		उत्तरा मूलसूत्रिका	४१२
असामान्य विषमदृष्टि	५१५	वर्तन	३१५	उत्तरालिका	४२९
अस्थि	१५	आमाशयिक पाचन	२५४	उत्तान	४५१
अस्थिजनक कोषाणु	१९	आम्लिक कोषाणु	३९६	उत्तान प्रत्यावर्तित	
अस्थिचय	३९१, ३९२	आरोही	४१५	क्रियायें	४६४
अस्थिजनक सन्तु	१७	आवरक तन्तु	६	उत्तेजक अन्तःस्त्राव	३७७

उत्तेजक योग	६०	पृ०	पृ०	कणकुहर	५३५
उत्तेजनाजन्य श्रम	७१	पृ०	३५२	कणशङ्कुली	५३५
उत्तेजनीयता	४१	पृ०	९९	कर्णास्थियाँ	५३६
उत्सिकापुटक	३२७	पृ०	५४५	कर्णिक गण्ड	४६७
उदजनकेन्द्रीभवन	३०५	पृ०	३६७	कर्णिका	४०४, ४३३
उदर्य	४५५	पृ०	३६७	कर्णुर घृति	४९२
उदर्य सावेदनिक	४६६	पृ०	३७०	कलाचक्र	४९७
उदासीन भाहार	३०४	पृ०	-	कलायिका चतुष्टय	४२२, ३२९
उदासीन गन्धक	३६३	पृ०	६३	कलान्तरिक विकास	१९
उपादेयद्रव्य	३३७	पृ०	४५२	काच का केन्द्रान्तर	५०४
उपधानकर्णिका	४४२	पृ०	४४७	काचकोपीय लिङ्ग-	
उपधानसेतु	४३५	पृ०	४४७	नाश	४९८
उपमांसतरव	२६६	पृ०	३	काचीय लिङ्गनाश	४९८
उपस्नेह	२१३	पृ०	३६४	कान्तारकीय संशोध-	
उष्णरक्त	५५३	पृ०	१०४	नात्मक प्रत्यावर्तन	४५६
उष्णीषक	४२३	पृ०	१०४	कार्डिलैक्टिन	३८४
ऊ		पृ०	१०५	कार्डियासिन	३८४
ऊर्ध्व अनुदीर्घ गुच्छ	४३९	पृ०	४०२	कार्यसामर्थ्य	६५
ऊर्ध्ववह्निकासूत्र	४३५	पृ०	४०२	कार्वरडाइन का सकारो-	
ऊ		पृ०	४०२	मीटर	३६९
शुक्रका धमनियाँ	३२८	पृ०	३७७	कार्वोनेट	३६५
शुक्रका सिरायें	३२८	पृ०	३७७	कार्वोपरक्तरञ्जक	१०६
शुक्रभाग	३२७	पृ०	३७७	कालावधि	५२४
श्रण परिवर्त्तनीय धारा	५९	पृ०	३७७	कास	४२९
श्रणविद्युदणु	२१७	पृ०	३७७	किण्वतर	२३६
ए		पृ०	३७७	किण्वीकरण	२३६
एककोपाशुधारी	१	पृ०	३७७	किफेलिन	९३
एकशर्करिद्	२१२	पृ०	३७७	कुटिला मुकुलतन्त्रिका	४१४
एकाकी	४५०	पृ०	३७७	कुथवितान	४२८
एकावस्थिक	५९	पृ०	३७७	कुशनी का शोषण	
एकीपप्यूरिन	३५२	पृ०	३७७	सिद्धान्त	३३१
एडिनिलपाइरोफास्फेट	५५	पृ०	३७७		

पृ०	पृ०	पृ०			
मूर्चाकार	४७५	कोषाणवीर्यक्रिण्वतत्त्व २३८	गन्धरक्षरञ्जक	१०६	
फूफर के तारक-		कोषाणु	१	गन्धसंज्ञा का आदान ४८३	
कोषाणु	३१७	कोषीयलिङ्गनाश	४९८	गन्धादान यन्त्रिका ४८२	
कृकाटक	४०४	कोष्ठविलयन	९६	गरहृद् की परीक्षा ३७१	
कृष्ण खण्ड	२३	कौटिन	३८४	गर्भकला	५८२
केथोट किरण नलिका	५८	क्रामकसमूह	११२	गर्भधारक	४०१
केन्द्रक	५	क्रियाजन्य विद्युद्गारा	५८	गर्भपिण्डिका	४३३
केन्द्रकरहित रक्तकण	१०२	क्रियात्मक विद्युन्मापक	६०	गर्भविकास	५७८
केन्द्राकर भूमि	४२९	क्रियाशरीर विधि	४३७	गर्भविज्ञानविधि	४३८
केन्द्रीकरण	५१७	क्रिमेटिन	३५७	गर्भस्थ बालक का रक्त	
केन्द्रीकरण प्रत्यावर्तन		क्रिमेटिनीन	३५६	संवहन	१४७
	४६२, ५१७	क्रिमेटिनीन निदर्शक	३५७	गर्भस्थ शिशु का रक्त	
केन्द्रीय नाडीसरथान	४११	छोराइड क्रमण	२०२	संवहन	५८६
केन्द्रीय पसरियनी	२६८	क्षतजन्य विद्युद्गारा	५७	गर्भाधान	५७७
केन्द्रीय प्रत्यावर्तन-		क्षयधु	४६०	गर्भावरिथक इष्टुमेह	२९६
काल	४६२	चार आहार	३०४	गर्भाशय	५६९
केशिका जालक	१३५	चारकोष	३०२	गर्भोत्पादक	४०१
केशिका विद्युन्मापक		चारभाव	२९८	गर्भोद्दक	५८४
यन्त्र	५८	चारमेह	३६३	गर्वाणी	३२८
कैफीन	३५२	चाररक्तक पदार्थ	३०१	गुदीय प्रत्यावर्तन	४५५
कैमरा	५२९	क्षुधा	४७३	गुरुकोष	३८८
कोणकन्दिका	४२३	क्षुधारस	२५५	गुणतीय प्रत्यावर्तन	४५७
कोणचूड़िका	४२३	क्षीणश्वास	१९०	ग्रीण तरंग	१६६
कोणिका	४०४			ग्रहणात्मक क्रिया	४०७
कोणीय क्षेत्र	२३	ग		ग्रामपरमाणु विलयन	२१७
कोरी चक्र	५३	गम्भीर	४९२, ४५१	ग्राहक समूह	११२
कोलाहल	५४७	गम्भीर प्रत्यावर्तित		ग्रैवेयक ग्रन्थि	३९०
कोलेलिक प्लसिट	३२२	क्रियायें	४५५	ग्रैवेयक ग्रन्थिचय	३९१
कोलेष्टरील	२१४, ३२४	गम्भीर शसन	१९०	ग्रैवेयक ग्रन्थिवृद्धि	३९२
कोपगत वायु	१८५	गण्डीय प्रत्यावर्तन	४६१	ग्रैवेयक सावेदनिक	४६५
कोपमय तरणास्थि	१३	गण्डोत्तरिक सूत्र	४६४	ग्रैवेयकीय	३८६
कोषाकुर	१२१	गतिकालीन	४५६	ग्लाइसिन	३२२
		गन्धनाश	४८५		

पृ०	पृ०	पृ०
ग्लायर का छवण ४८०	ज	तरुणास्थि १२
ग्लिसन का भावरण ३१७	जेटिलप्रत्यावर्तन ४५०	तरुणास्थ्यन्तरिक
ग्लुटायायोन ३९८	जरादृष्टि ५१४	विकास २०
ग्वेनीन ३५२	जराहिलानाश ४९८	तात्विक धामिपाम्ल २८२
ग्वैकम परीक्षा ३७४	जवनिकाचक्र ५२९	तात्विक रक्तकणाधिक्य ९९
घ	जाह्य ६६	ताप ५५३
घाटिका ४०४	जानुक गंड ४७८	ताप का नियमन ५५४
घटिका गति ३१३	जान्वीय प्रत्यावर्तन ४५७	तापकिरण ५०४
घातक रक्ताल्पता ९९	जालक तन्तु १२	तापनियामक केन्द्र ५५९
घ्राण ४८२	जालकान्तर्धातवीय १०३	तापनियमन के विकार ५५२
घ्राणमापक यन्त्र ४८६	संस्थान ३५८, ३६४	तापपरीक्षा ३६६
घ्राणमापन ४८५	जालक कोषाणु ३९२	तापमूल्य ४२६
च	जालक क्षेत्र ३७८	तापसंकोच ४९
चतुर्वर्णसिद्धान्त २३२	जिम्नेमिक अम्ल ४८०	तापसंयन्धी परिवर्तन ५०
चमक ५३१	जीवनरसक ३८४	तापक्षय ५५४
चर्वण ३०८	जीवनीय द्रव्य २२९	तापोत्तेजना का
चक्षु ४८७	जीवाणुज किण्व- २७०	सिद्धान्त ५२६
चालनात्मक क्रिया ४०८	करण ११०	तापोत्पत्ति ५९४
चक्षुपसंशोधनात्मक ४९५	जीवाणुनाशक १०७, १०९	तार विद्युद्धारामापक ५८
प्रत्यावर्तन ४५६	जीवाणुमक्षण ४८४	तारामंडल ४९१
चित्रजवनिका ४९५	ज्वलनगन्ध ४८४	तालकुञ्जिका क्रिया २३८
चित्ररासायनिक ५२६	ट	तीव्रघ्राण ४८६
सिद्धान्त ४१३	टॉरिन ३२२, ३६३	तीव्रता ५४२
चित्रिणी ४५१	टैकेमिन ३७९	तीव्रतावधि ५२४
चिरावधिक ४१३	त	तुम्बिका ५३८
चीनांशुक ४८४	तनु जल ४९६	तुरंगपुच्छिका ४१२
चूचुकवर्तुलक ४६०	तन्तु २	तुलनात्मक शारीर
चूपण ४४६	तन्तुवृणा २७३	विधि ४३८
चेष्टा के वेग ४३८	तन्त्र ४०४	वृणा ४७४
चेष्टाक्षेत्र ४१९	तन्त्रीद्वार ४४२	त्रि-ओप-प्यूरिन ३५२
छ		त्रिकोण परसावेदनिक ४६६
छंदप्रत्यावर्तन ३८ अ०		त्रिकोणपिण्डिका ४४२

	पृ०		पृ०		पृ०
त्रिकोणसुरंगा	५४०	दुग्धाम्ल की उत्तम		घ	
त्रिधारा प्रत्यावर्त्तन	५२०	सीमा	६८	धन त्रिधुदणु	२१७
त्रिपत्र कपाट	१३०	दुग्धशर्करावर्त्तक	२६९	धनुर्वक्रगुच्छ	४३४
त्रिषयगुहा	४३२	दूरदृष्टि	५१३	धमनियों	१३४
त्रिवर्ग सिद्धान्त	५३१	दूरश्चरण सिद्धान्त	५४३, ५४६	धमनीसंकोचक	३८९
त्रिशिरष्कीय प्रत्या-		दृष्टिक्षेत्र	५२७	धम्मिलक	४२६
वर्त्तन	४५७	दृष्टिक्षेत्रमापक	५२७	धम्मिलकमस्तिष्काभिग	
त्वचा	५४८	दृष्टिमण्डल	४९७	सूत्र	४३६
त्वचा के परिशिष्ट		दृष्टिमण्डलगन्धनी	४९७	धातुश्चमन	२०६
भाग	५४९	दृष्टिमण्डलविरलेप	५०९	धातुपजनारूपता	१९१
खाची	४७२	दृष्टिमण्डलाधानिका	४९८	धूसर वस्तु	४१७
थ		दृष्टिमण्डलीय विषम		न	
थाइरीग्लैंड	३९१, ३९५	दृष्टि	६१५	नख	५४९
थियोप्रोमीन	३५२	दृष्टिगर्भक	४९५	नखजनयुक्त भाग	२८२
थायोसल्फेट	३६३	दृष्टिवितान	४९२	नखजनरहित भाग	२८२
थायोसाइनेट्स	३६३	दृष्टिवितानविद्युन्माप	५२६	नखजन स्नायुकीकरण	३८७
थीन	३५२	दृष्टिसारिसूत्र	४३६	नखशर्कराजनकोषपति	२८९
थीलॉल	४०१	द्राकन्डिका	४२५	नाडी	३९, १६२
थीलिन	४०१	द्विभोषण्यूरिन	३५२	नाडीकोषाणु	२९
थीम्वोकाइनेज	९३	द्वितीयक संकोच	६०	नाडीगण्ड	४२०
द		द्विदृष्टि	५३४	नाडीतन्तु	२९
दन्तुरकन्दिका	४२५	दिनेत्रदर्शन	५३४	नाडीतन्त्रिका	४१४
दन्त्र	२९	द्विपाक्षिक प्रकाश		नाडीपेशीयन्त्र	४६
दर्शन	५०३	प्रत्यावर्त्तन	४६२, ९१८	नाडीभार	१६०
दर्शनी	५२४	द्विविभाजन	२१९	नाडीसंस्थान	४१७
दशम गण्ड	४६७	द्विशर्करिद्धि	२१२	नाडीसन्धि	४०
दशाकन्दिका	४२३	त्रिशिरष्कीय		नाडीसूत्र	३६
दशाचूडिका	४२३	प्रत्यावर्त्तन	४५७	नाडीस्फन्दमापक यन्त्र	१६५
दानवास्थि	३८८	द्वीपाकार	४७६	नाड्यणु	२९
दीर्घसूत्र	४४४	द्विपत्र कपाट	१३०	नाड्याधार वस्तु	३९
दुग्धाम्ल का निर्माण	५२	द्विधावस्थिक	६९	नाभिनिन्दु	५०५
		द्विधावस्थिक परिवर्तनीय		नासाप्रत्यावर्त्तन	४६१
		विद्युद्धार	५९		

निःस्पन्दन	२२०	नेत्रपार्श्वीय प्रत्यावर्तन	४९१	पर्यागिका	५३७
निःस्पन्दन त्रिकोण	५२७	नेत्रहार्दिक	" १०४	पञ्चतरोग	१९१
निःस्पर्श	१८१	नैदानिक विधि	४३८	पश्चिमगुच्छ	४३५
निःस्पृष्ट इष्टि	५१३	न्यूनतम उत्तेजक	४३	पश्चिम दीर्घगुच्छ	४१५
निःस्पृष्ट विन्दु	५११	न्यूनतम वायु	१८८	पश्चिम पार्श्विका	
निगारण	३०८, ४५०	न्यूनभारिक	२२०	कन्दिका	४२९
निगम्यीय प्रत्यावर्तन	४५५	न्यूनमीन	३८४	पश्चिमपार्श्विकी	
निद्रा	४७४	प		तन्त्रिका	४१५
निमेषप्रत्यावर्तन	४५५, ५२०	पञ्चविन्द	४२५	पश्चिम विन्द	४३३
निम्नतम मृगच्छोपायु	४४५	पटलकन्दिका	४२५	पश्चिम मन्त्रुलुंग	४२३
नियमानुरूप सामान्य		पटलाधारिका		" रसायनीमार्ग	४९०
विषमरष्टि	५१५	तन्त्रिका	४१५	" शृङ्ग	४१४
नियमविच्छेद सामान्य		पटलकला	५१६	" शृङ्गोपायु	४२०
विषम इष्टि	५१५	पटलपूरणी वायु-		" शृङ्गमेतु	४१४
निरण्ट मेदुरिणा	४०१	नटिका	५३८	" मन्त्रुलुङ्ग	५०४
निगमीकरण तत्र	३९९	पटलोल्लसिनी	५३६	पश्चिमान्तरीय	
निरोपत्रन अवरमा	५२	परतन्त्र पेसो	२२	अनुदीर्घसूत्र	४३८
निलय	१८९	परमाणुविरलेपण		पश्चिमान्तिका	
निष्क्रिय रोगप्रमत्ता	११२	विज्ञान	५३२	तन्त्रिका	४१५
नोडलोदितदुर्गन्धी	५२५	परावर्तक विद्युद्धार-		पाचकतण्डन	४५६
नोडलोदितोत्तर किरण	५०४	मापक	५८	पाचन	२३६
नीतिारिका	४१२	परिकनीनक धमनी		पाचनयन्त्र	३०८
नेत्र का दूरविन्दु	५०७	चक्र	४९९	पाचनगमस्थान	२३६
नेत्रगोष्ठक	४८९	परिमैत्रेयक	३९६	पाचित मांसतन्त्र	२६७
नेत्रगण तरल	५००	परिमैत्रेयकीय	३८६	पाइतलीय प्रत्यावर्तन	४९५
नेत्रगण भार	५०२	परितारामण्डल		पाशभाग	३२७
नेत्रगणभार मापक		धमनी चक्र	४९९	पार्श्वपश्चिमान्तरा	
यन्त्र	५०२	परिधिर्य सौत्रिक	१४	आन्तरी	४३३
नेत्रगण भाराधिक्य	५०३	परिहरादिक	४१३	पार्श्वपश्चिमान्तरा बाह्या	४३३
नेत्ररचना	४८७	परिवर्तक	२३६	पार्श्वपूर्वा तन्त्रिका	४१४
नेत्रप्रकृता	५३४	परिवर्तनी श्वेतकण	१०८	पार्श्वमध्या तन्त्रिका	४१५
नेत्रप्रार्माधोदन्वीय		परिमरणगति	३१३		
प्रत्यावर्तन	४६२	परिमरीय	४११		

पृ०	पृ०	पृ०
पौष्टिकतिका तन्त्रिका ४१५	पूर्णप्रत्यावर्तन काल ४५२	पौष्टिकतिका, नियन्त्रण ४४७
पौष्टिककन्दिका ४२९	पूर्णव्यजन १८५	प्यूरिन ३५२
” कोषाणु ४२०	पूर्वगण्डीय सूत्र ४६४	प्रकाश प्रत्यावर्तन ४६२, ५१७, ५१८
” वदिलका सूत्र ४३६	पूर्वज रक्तकण १०२	प्रक्षिप्त सूत्र २७
” दीर्घगुच्छ ४१५	पूर्वपाक्षिकी तन्त्रिका ४१५	प्रच्छन्न धातुपी ४३३
” पिण्ड ४३३	पूर्वमुद्रिका सङ्कोचक ३१०	प्रच्छन्नपिण्डिका ४३३
पिच्छिल २११	पूर्वधावक तत्व २६४	प्रजनन ५६२
पिण्डप्रमन्यिया ५५०	पृष्ठकन्दिका ४२०	” संरयान ५६७
पिण्ड ४३२	पृष्ठपाक्षिकी तन्त्रिका ४१५	प्रतिकटुजनक पदार्थ २२८
पिण्डिकाकुञ्चन ४५८	पृष्ठभार २२४	प्रतिकिण्वतत्व २३८
पित्त ३१८	पेशीकण २३	प्रतिजन ११३
पित्तकोष ३१७	पेशी का रासायनिक ७४	प्रतिविम्बप्राप्ती काच ५२९
पित्तरजक द्रव्य ३२२	सघटन ७४	प्रतिपुरःस्कन्दिन ९५
पित्तलवण ३२१	पेशी की विधि ३७०	प्रतिपेयक टीका ११०
पित्तलवणक २६४, ३१९	पेशीगत शर्कराजन २९१	प्रतिस्कन्दिन ९६
पीतपित्तरजक ३३२	पेशीजाड्य ४३६	प्रत्यावर्तनकाल ४६२
पीतसौत्रिक १५	पेशी सन्तु २१	” रहित कर्मीनक ५१९
पीतस्थितिस्थापक १०	पेशी तरंग ६३	प्रत्यावर्तन वक्र ८२, ४४९
पीयूषप्रमन्य ३९७	” व्यायाम का शरीर ७५	प्रत्यावर्तित छाव २६३
पीयूषरस ३८९	पर प्रभाव ७५	प्रत्यावर्तनात्मक ४४७
पुटक क्षेत्र ३७८	” सङ्कोचन ३८६	नियन्त्रण ४४७
पुर. परिवहिका १४९	” ” भापक ४६	प्रत्यावर्तित क्रिया ४४८
पुरस्कन्दिन ६३	यत्र ४६	” क्रियाओं की वृद्धि ४५३
पुरस्सरण ३१२	” शर्कराजन ५३	प्रत्यावर्तित चेष्टा ८२
पुरापेपित्त ३२३	” अम ६६	प्रभावविरोध ५२८
पुरीपोस्सर्ग ३१५	” सूत्र २३	प्रसरण २१८
पुरुषप्रजनन यन्त्र ५६५	पोषणकप्रमन्य ३८५	प्रसवसहायक अन्तः ४०२
पूतिगन्ध ४८४	” प्रमन्युचय ३८८	प्रसारकाल ४७
पूय ३७४	” वृद्धि ३८७	प्रसार प्रत्यावर्तन ५२०
पूरकपदार्थ ११३	” वृन्तिका ४२३	
पूर्णदीर्घसङ्कोच ६३	पोषणसंवन्धी रक्षा- ६९	
पूर्णधारणा शक्ति १८५	रक्षता ६९	

पृ०	पृ०	पृ०
प्रसार्यता और स्थिति	वृद्धकेन्द्री श्वेतकण १०७	भौतिकतापमूल्य २३७
स्थापकतासम्बन्धी	" कोषाणुधारी १	भौतिक नियमन ५५५
परिवर्तन ५०	" शर्करादि २१२	भ्रूणावरण ५८३
प्रश्नास १८१	बाह्यकण ५३५	भ्रूतोरणिक प्रत्या
प्राकृत नेत्र ५१२	वाह्य कृच्च चक्षिका ४३१	वर्तन ४६१
" श्वसन १९०	वाल अव्ययक ३९७	म
प्रान्तीय नाडीस्थान ४११	" " कोषाणु ३९७	मञ्जा १८
" प्रत्यावर्तन	वाह्य श्वसन १७८	मञ्जरिका ४२२
काल ४५२	विन्दुरेखा २८	मञ्जूपाकोषाणु ४२६
प्रारम्भिक ताप ५१	विलिवर्धन १०५	मण्डलाष्टिका ४९७
प्राविनन ४००	विसवितान ४२७	मण्डलीय दृष्टि ५१५
प्रोलेन प ३८५	घोजकोष ४०१	मधुमेहजनक ३८६
" घी ३८६	घोजकिणपुट ५७३	मन्दघ्राण ४८५
प्लीहा ३२५, ३९९	घोजकोष ५७०	मध्यकण ५३६
फ	बुभुचा ४७३	मध्यदेशीय कोषाणु ४२०
फलगन्ध ४८४	बृहत् एककेन्द्री श्वेत	मध्यम मस्तुलुग ४२२
फास्फेजन ५४	कण १०८	मध्यमा अग्रपिण्ड
फास्फे ३६४	वेन्जोइक अम्ल ३६१	कर्णिका ४४०
फुफ्फुस १८०	वेजिदिन परीक्षा ३७४	मध्यान्तरा ४३३
फुफ्फुसी कपाट १३०	वेनब्रिज प्रत्यावर्तन १७४	" अग्रिमकर्णिका ४३९
फेनिल हाइड्रेजिन	वेनेडिक्ट की परीक्षा ३६९	" पश्चिम " ४३१
परीक्षा ३६९	घोका का क्षेत्र ४४०	मरकैपटन ३६३
फेह्लिंग की परीक्षा ३६८	घोमिक ३८७	मस्तिष्क ४२२, ४२९
व	घोमेन का शरीर	मस्तिष्कगोलार्ध ४२९, ४३२
वस्ति ३३८	सिद्धान्त ३३१	" जन्यनिरोध ४५२
वस्तिस्कोचनी ३३९	ग्रहद्वार सुरगा ४२७, ४२८	" परिसर ४३२, ४३४
वहिरात सारमीकरण २८५	ग्रहमार्ग ४१३	" मूलपिण्ड ४२९
वहिरातुक्त ग्रन्थि ५२७	ग्रहवारि ४१३, ४२०	" मृणालक ४२३, ४२७
वहिरात्रिक गलगड ३९१, ३९४	ग्रहोदबुद्ध्या ४१३	" सिकता ३९७
वहिरुद्बुद्ध ३९७	म	" सेतु ४३२
वहिरुवक् ५४८	मस्मररोचुरश्वेतकण १०८	" सौषुम्निक
	भावनात्मक चेत्याये ८१	सस्थान ४११

पृ०	पृ०	पृ०
मस्तुलुंगपिण्ड ४२२	मूलसूत्रिका ४१२	रचनात्मक ४१६
महाधमनी कपाट १३०	मूत्रोत्सिका ३३७	रचना शारीरविधि ४३८
मांसतत्त्व २१४	मृणालान्तरीय ग्रन्थि ४२८	रक्त ८५
" रक्तक २९१	मृतावकाश १८४	रक्तकण ९६
" विरलेपक २६६	मृत्त्यूत्तर संकोच ४१	रक्तकणनिर्मापक ३८६
" कृष्णवतत्त्व २६६	मेदस ३८७	रक्तकणाधिक्य ९८
" सार २५९, २६६	मेयर सूत्र ३७	रक्तकणिका ११५
मांसतत्त्वौज २५९, २६६	मेयर ओवर्टन सिद्धान्त २२२	रक्तकणिकाल्पता ११५
मातृकापरिवाहिका १८८	" का जलीय सिद्धान्त १४५	रक्त के कार्य ८६
माध्यम नाडीकोपायु ४४९	मेलिनकी परीक्षा ३२४, ३७२	रक्तभार १५७
मानस धान्ध्य ४४२	ग्यूरैक्ताइडकी परीक्षा २५६	रक्तभार मापक यन्त्र १५७
" प्रत्यावर्तन ५१९	य	रक्त रंगजन १०४
" बाधिर्य ४४१	यकृत ३१६	रक्त रक्षक द्रव्य १०३
" रस २५५	यकृतीन ९५	रक्त रक्षक मापकयन्त्र १०१
" विद्युत् प्रत्याव- र्तित क्रिया १७०	यकृदावर्तक २९१	रक्त रस ९१
मारक मात्रा १११	यन्त्र १	रक्त रस का संघटन ९१
मिथ्याप्रत्यावर्तन ४५४	यवदाकर्षावर्तक २६९	रक्त रस निक्षेप ९२
मिथसूत्र ४४४	याकृत अन्तःस्राव ३८७	रक्त वर्ण ११६
मुकुलिका ४२३	" इक्षुमेह २९४	रक्त वहसंस्थान १२८
मुकुलेतर मार्ग ४४६	युगपत् सूत्रयोग ४७	रक्त वायुभारमापक यन्त्र १९६
मुख्य अक्ष ५०५	यूरिक अम्ल ३५२	रक्त विलयन ९६
" कोपायु १९६	यूरिया ३४७	रक्त विलयन शक्ति ११०
मुद्रिका कुहर ३१०	यूरिया मापक ३५०	रक्त विलयक ११०
" द्वार ३११	यूरियेज ३४७	रक्त संवहन १३६
" नली ३१०	यूरोबिलिन १०५	रक्त संवहन क्रम १३७
मूत्रगत प्रक्षेपद्रव्य ३७२	योजक भाग ३९०	रक्त स्कन्दन ९३
मूत्र तत्त्वजनक २७०	यौन ग्रन्थियाँ ४०७	रक्तक्षपता ९९
मूत्र त्याग ३४०	यौन विकासक ३८५	रक्तोपजनाक्षपता १९१
मूत्र पित्तजन ३२३	र	रदरफोर्ड का सिद्धान्त ५४६
मूत्र प्रसेक ३२९	रंगांक १०१	रश्मिकेन्द्र ५०५
मूत्र वहसंस्थान ३२६	रक्तक ३८७	रश्मिकेन्द्रीकरण ५०७

	पृ०		पृ०		पृ०
रस का ग्रहण	४७७	रसिका	११८	वर्तुलकन्दिका	४२५
" " संवहन	४७८	" कोष	१२१	वर्तुलिन	१०३
" गन्ध संज्ञाक्षेत्र	४४२	" ग्रंथियाँ	१२१	वनिक का क्षेत्र	४४१
रसना	४७९	रसिकाणु	११३	वनिक का प्रत्यावर्तन	५१८
रससंज्ञा का वितरण	४७९	रसिकापथ	१२२	वराशिका	४१२
" " संमिश्रण	४८०	" वकाश	१२०, ४८९	वल्लिका	४२८
रसांकुरिका	२६८	" सरधान	१२०	वसाम्रन्थियाँ	६९०
रसों का वर्गीकरण	४०९	" छावक	१२५	वाक्	४०२
राजिल पिण्ड	४२२, ४३०	लांगलीगंड	४६७	" का विकास	४०७
रासायनिक किरण	२०४	लालाग्रन्थि	२४३	" " स्वरूप	४०८
" नियमन	५५४	लाला स्त्राव	४६०	" की उत्पत्ति	४०८
" निरोध	४८२	लालिक कृष्णवत्त		" हय	४४०
" परिवर्तन	३१	'जनक	२४४	" क्षेत्र	४४०
" द्राव	४६३	लालिक पाचन	२४३	वाह्मय पिण्डिका	४४०
रूपसंज्ञा क्षेत्र	४४२	लिङ्गनाश	४९८	वायवीय विनिमय	२०५
" दानभूमि	४४२	लुडविग का भौतिक		वायुकोपसंघात	१८१
" विवेकभूमि	४४२	सिद्धान्त	३३१	वालर का सिद्धान्त	५४७
रूपादानिका	४९५	लोहित रसिकाग्रन्थि	१२२	विकृत नेत्र	५१२
रूपावधि	५२४	व		विकृतशरीर विधि	४३८
रोगक्षम पदार्थ	११३	वक्रताविकार	५१२	विट्नीन	५०१
रोगक्षमता	१०९	वक्रान्तरा	४३३	विद्युत्पेशीसंकोचमाप	५८
रोगनाशक टीका	११०	वक्रोन्मथन के विकार	५१२	विद्युदुत्तेजना का	
रोगोत्पादक	११४	वक्षीय चूषण	१२३	सिद्धान्त	५२६
रोगरा की परीक्षा	३७१	" सांवेदनिक	४६५	विद्युद्द्वारा का सिद्धान्त	५४५
रोम	५४९	वमन	४६०	विद्युद्यन्त्र	५१
रोनिकामय	८	वर्ण	५३१	विद्युद्विश्लेषक	२१७
ल		वर्णदर्शन	५३०	विद्युन्मापक विधि	३०६
लघु एककेन्द्री श्वेतकण	१०७	वर्णदृष्टि	२१५	वियर्ययामक क्रिया	२३८
लवणिका	४२३	वर्णमापक विधि	३०६	विपर्यस्त	५२८
लवली सौपुम्निकी		वर्णविरोध	५२८	विपर्यस्त रासायनिक	
तन्त्रिका	४१४	वर्णाण्ड्य	४४३	क्रिया का सिद्धान्त	५३२
		वर्णाण्ड्यता	५३३		

पृ०	श	पृ०			
विभाजक विद्युद्धार	५७	शङ्ख कोषाणु	४९५	शिक की परीक्षा	३५६
विलम्बित ताप	५१	शङ्खपार्श्वान्तरा	४३३	शिलीन्धाकार	४७५
विलम्बितनिरोपजन ताप	५१	शङ्खिक पिण्ड	४३३	शीतरक्त	५५३
विशद	२१८	शक्तिगुण	३१	शीर्षण्य परसावेदनिक	४६७
विशिष्ट प्रेरकधर्म	२२८	शफरीकन्द	४३०	शुक्रकीटाणु	५६८
विशिष्ट शोषण	३३६	शब्द	४०९	शुक्रकीटाणुओं का	
विश्रामकाल	४५२	" चित्र	४४१	विकास	
विश्रामकालीन	४५६	" चित्रक्षेत्र	४४१	शुक्तिद्वन्द्व	४३०
विश्राम की विद्युद्धार	५७	" दर्पनक्षेत्र	४४२	शुक्लस्रण्ड	३३
विश्रामावस्था	६०	" सङ्काक्षेत्र	४४१	शुक्तिगर्म	४३१
विषम दृष्टि	५१४	शब्दान्ध	४०८	शुक्तिपीठ	४३१
" विमजन		शरीर का रासायनिक		शुभ तरुणारिय	१३
विषाणिका तन्त्रिका	४१४	सङ्कलन	२१०	शुभ वस्तु	४१७
विसारिचित्र	४३५	शर्करा	३६८	शुक्लवृत्ति	४८९
वील की परीक्षा	३५८	शर्करा जनक	२८८	शुक्लकोषाणु	४९५
वृक्ष	३२६	" " रक्षक	२९०	शोणकन्दिका	४२८
शुक्रजन्य इन्जुमेह	२९६	" " विश्लेषक	२९१	शोणजा तन्त्रिका	४१४
शुक्रदेहली	२९३	" " विश्लेषण	२९१	शोषण	२७२
शुक्त परीक्षा	३६६	" जनकोत्पत्ति	२८९	शोषण कामला	३१९
शुद्धिजनकअन्य-साध	३८५	" धिक्व	२९१, २९४	रयामपत्रिका	४२७
शुषण	५६६	" विश्लेषण	२९१	धर्म	४५४
शुषण ग्रन्थि	४००	" सहिष्णुतासीमा	२९४	ध्रुवणदेहली	५४२
शुषणीय प्रत्यावर्तन	४५५	शर्निङ्ग का दवावृद्धि		श्रुतिनिमेषप्रत्यावर्तन	५११
वेणीयन्ध प्रत्यावर्तन	४५०	का सिद्धान्त	५११	श्रुतिशङ्कुक	५३८
वेधजन्य इन्जुमेह	२९४	शलमिका	४२५	श्रोत्र	५३५
वेध का विरोधमास	५०	शक्की	७	श्रोत्रनेत्रीय प्रत्यावर्तन	४६२
वैकारिक विधि	४३८	शक्विक फाठिन्य	७३	श्रोत्रीय प्रत्यावर्तन	४६२
वैद्युत परिवर्तन	५१	शाकतरव	२११	श्लेष्मजनक	२४४
व्यापन	२१५	शारीरिक घोटायें	८०	श्लेष्मल	१०
व्यापनक्रिया	९७	शारीरतापमूल्य	२२७	श्लैष्मिक शोथ	३९१, ३९२
व्यापनभारभाषकयन्त्र	२१९	शारीर सशोधनात्मक		श्वसन क्रिया	१८१
		प्रत्यावर्तन	४९६	श्वसनधारणा शक्ति	१८५

	पृ०		पृ०		पृ०
असन यन्त्र	१७८	संयोजनारमक क्रिया	४०८	सहज	८१
" संस्थान	१७८	संवेदन भूमि	४३०	सहयुक्त	४५०
असनांक	२०८	संव्यूहगाम्भीर्य	५०६	सहयोगारमक	
असित वायुमापक		संव्यूहन	५०३	नियन्त्रण	४४७
यन्त्र	१८४	संशोधनारमक	४५	सहायक आहारतत्त्व	२२९
आसकष्ट	१९०	संस्थान	२	सहायक रक्तसंवहन	१३६
आसलोप	१९०, १९६	सक्रिय रोगक्षमता	११२	सांवेदनिक संस्थान	४११, ४६३
आसावरोध	१९०, १९४	सकेन्द्रक रक्तकण	१०२	साम्यकरण	२७७
आसोत्तेजक	३८४	संश्लिष्ट धातु	१८५	सार्विक धामिपाम्ल	२८२
श्वेतकण	१०६	सदृश	५३८	मान्द्रजल	४९८
श्वेतकणवृद्धि	१०७	सन्तुलनारमक		सान्द्रजलधराकला	४९८
श्वेतकणहाम	१०७	नियन्त्रण	४४७	सान्द्रजलान्तरीया	
श्वेतसारारक्तक	२६९	सन्तुष्टि	५३१	प्रपिका	४९९
श्वेत सौत्रिक	१०	सन्धान दशिका	४९२	सान्तर असन	१९६
श्वेतसौत्रिक तरुणारिथ	१४	सन्धान पेशिका	४९२	सान्तरित	१०
प		" मण्डल	४९२	सान्द्रतामापक	८८
पङ्चगव्यसिद्धान्त	५१२	" घलयिका	४९२	सापेक्ष	४५०
स		सन्धानिका धमनियाँ	४९९	सापेक्ष शोषण	३३६
संकोच का लाभकर		सन्ध्यन्तरिक	१४	सामान्य प्राद्वक	११७
परिणाम	४८, ६०	समाकारिक संकोच	६४	" दायक	११७
संकोच काल	४६	समभारिक संकोच	६४	" पेशीरेखा	४६
" शीलता	४३	समकालिक विरोध	५२८	" प्रत्यावर्तन	४४९
संज्ञा	४७१	समभारिक	२२०	" वायु	१८४
" के वेग	४४३	सम विभजन		साहचर्य क्रिया	५१७
" क्षेत्र	४३८, ४४०	समसामयिक उत्तेजना		सितसेतु	४१४
" दानभूमि	४०४	जन्य निरोध	४५३	सिरागुहिका	४९९
" विवेकभूमि	४४०	सम्मिश्रण	३१२	सिरायें	१३५
सन्धानपेशिकाघात	५२१	संयुज क्षेत्र	४३८, ४४२	सिरालिक ग्रन्थि	१४८
संयुक्तप्रत्यावर्तन	४५०	संयुज सूत्र	४३५	सिरिटिन	३६३
संयुक्तस्थिति	६०	सरलान्तरा	४३३	सिस्टिन्यूरिया	३६३
संयुक्तस्वयंजात		सरला मुकुलतन्त्रिका	४१४	सीता	४३२
नियन्त्रण	४४७	सर्वनिर्देशक	३०७	सीताधारिका तन्त्रिका	४१४
संयोजक कोषाणु	४२०	सर्वाभाव नियम	४८	सीतिका	४३३
" तन्तु	९	सहक्रिपवतत्व	२३७	सुगन्ध	४८४
" सौत्रिक	१४	सहचारी प्रत्यावर्तन	५१९		

	पृ०		पृ०		पृ०
सुर	१४२	स्त्रीप्रजनन यन्त्र	५६९	हिमीन	१०४
सुविधान	४५३	स्त्रीबीज	५७२	हिमेनो मोजन	१०४
सुपुम्नाकांड	४१९	स्त्रीबीज का बीकास		हिमेटिन	१०४, ३२३
सुपुम्ना मूलिका	४१२	और परिपाक	५७६	हिमेटोपॉर्फिरीन	१०५, ३२३
सुपुम्ना शीर्षक	४२३	स्थानीय नृणा	४७४	हिमेटोवायडिन	१०५
सूक्ष्मतापमापकयन्त्र	५०	स्थितिजन्य संकोच	६४	हिमोसिडेरीन	१०३
सूक्ष्मदण्डक	५३९	स्थित्यात्मक प्रत्या-		हिस तवारा संस्थान	१४९
सूत्रकाणु	२४	वर्तित क्रिया	४५१	हृत्कार्यचक्र	१४३
सूत्रतार	२४	स्नेह	२१२, २६६	हृत्केन्द्र	१०३
सूत्रसार	२३	स्नेहसात्मीकरण	३८६	हृत्पेशीसूत्र	२७
सूत्रिका	२३	स्नेहावर्तक	२६९	हृत्पेशीघात	११४
सेतुसूत्र	४३५	स्पर्शसंज्ञाक्षेत्र	४४१	हृदय	१२८
सैलिसिल टेलफोनिक		स्पर्शाङ्कुरिका	५५३	हृदय का पोषण	१३६
अम्ल परीक्षा	३६७	छावक तार	२६३	हृदय के कोष्ठ	१२९
सोडियम ग्लाइको		स्वच्छरेखा	२३	हृदयपथनि	१५२
कॉलेट	३८१	स्वच्छवस्तु व्यूह	४९६	हृदयकुम्भ-यन्त्र	१५६
सोडियम टैरोकालेट	३२१	स्वतन्त्र नाडीमंडल	४६२	हृदयमापक यन्त्र	१४६
सोपानक्रम	४८	स्वतन्त्र पेशियाँ	७८	हृदयत्रिधुन्मापकयन्त्र	१५१
सोमसार	३७९	स्वतंत्र पेशी	२५	हृदयांक	१५६
सौत्रिक तन्तु	९	स्वरतन्त्री	४०४	हृदयाधरिकीय	
सौपजन अवस्था	५२	स्वरयन्त्र	४०२	प्रत्यावर्तन	४५५
स्कन्द	९४	स्वरादानिका	६३९	हृदयोत्तेजक	३८४
स्कन्दनकाल	९३	स्वादकोरक	४७६	हृद्रोधक	१७३
स्कन्दनावस्था	९३	स्वादोङ्कुर	४७५	हृद्धर्धक	१७३
स्कन्दिन	९३	स्वादुकारक	११४	हे की परीक्षा	३७२
स्कन्धीय प्रत्यावर्तन	४५५	स्वाभाविक संकोच	६३	हेन की परीक्षा	३६९
स्टर्कोपिलिन	१०५	स्वेद	५५०	हेमहौज का शैथिल्य	
स्तन्यजनन	३८६	स्वेद ग्रन्थियाँ	५५०	सिद्धान्त	५०८
स्तन्यवर्धक	३८४	हृ		हेमहौज का सिद्धान्त	५४३
स्तम्भाकार	७	हरित पिच्छरजक	३२२	हेसार की परीक्षा	३६६
स्तम्भाकार क्षेत्र	३७८	हाइड्रोविलिसयीन	१८५	हेम्यर्गर की प्रतिक्रिया	२०२
स्तराकार सौत्रिक	१४	हिप्पूरिक अम्ल	३६१	होमोजेन्टिसिक अम्ल	३६३
		हिप्पूरिकेज	३६१	इस्व सूत्र	४४४

INDEX

A

Abdominal reflex	45*	Adipose tissue	11
Abdominal respiration	183	Adrenaline	379
Abdominal sympathetic	466	Adrenotropic	386
Abnormal reflex	451	Adsorption	222, 225
Absolute polycythæ-mia	99	Aerobic phase	52
Absorption	272	Afferent	37
Absorption jaundice	319	Afferent impulses	442
Accommodation	507	Afferent root cells	35
Accommodation reflex	462	After-images	528
Accommodation or		Agglutinin	115
Convergence reflex	517	Albumin	365
Acetone	370	Alimentary Glycosuria	368
Achroo-dextrin	253	Alkaline tide	26, 345
Acid-base equilibrium	303	Alkalosis	298
Acid metaprotein	262	Alkali reserve	302
Acidophil	385, 109	Alkaptonuria	363
Acidosis	54, 298	All or none phenomena	48, 154
Acoustic images	547	Alveolar air	185
Acromegaly	388	Alveoli	121
Actinic rays	504	Amboceptors	92
Actions	80	Ametropic eye	512
Active immunity	112	Amino-acetic acid	361
Adamkiewicz centre	551	Amino-hypoxathine	352
Adaptation	486	Amino-nitrogen	281
Addison	99	Amino-purine	352
Addison's anaemia	99	Ammonia	359
Adendritic	33	Amnion	583
Adenine	352	Amorphous	372
Adenyl pyrophosphate	55	Amphophils	109

Augmentation	453	Bicuspid valve	130
Augmentory	80	Binocular vision	534
Auricle	129	Bipolar	34
Auricular fibrillation	156	Bromic hormone	387
Auricular fibres	132, 156	Bladder	328
Auriculo-ventricular bundle		Blood	85
or bundle of His	132	Blood groups	116
Auriculo-Ventricular node	132	Blood platelets	115
Auro-palpebral reflex	521	Blood pressure	157
Auscultatory method	157	Bowman's capsule	327
Autocoids	377	Brain	422
Automatic	81	" sand	397
Automatin	150	Brightness contrasts	528
Automatinogen	150	Broca's convolution	406
Autolysis	286	Buffer	301
Axial ametropia	512	Bundle of helweg	414
Axon	29, 33	" of His	28, 151
Ayer's theory	545	Burch's theory	532

B

Bacterial fermentation	270
Bacteriolysins	110, 115
Basal ganglia	429
Basket cells	426
Basophilic	385
Basophils	108
Benedict's test	367
Beneficial effect of contraction	48, 60
Benzidin test	374
Benzoic acid	361
Bilirubin	105, 322
Biliverdin	105, 322
Biceps reflex	457

C

Cadaveric Rigidity	73
Caffeine	352
Calcarine fissure	433
Calcium oxalate	372
Callosal fissure	433
Canaliculi	18
Canal of petat	497
Cauda equina	412
Caudate nucleus	430
Capillary electrometer	58
Capsular cataract	493
Carbohydrate	211
Carboxy-haemoglobin	190

Amylo-dextrin	253	Apolar	3
Anacrotic wave	166	Appetite	47
Anaemia	99	Appendages of the skin	54
Anaerobic phase	53	Apraxia	43
Angular type	439	Aqueduct of sylvius	42
Anisocoria	523	Agueous humour	49
Ankle clonus	458	Arachnoid	41
Ankle jerk	457	Areas of Cohnheim	2
An-ions	217	Areolar	1
Anal reflex	455	Arginase	28
Angstrom unit	504	Argyll-robertson pupil	51
Anoxaemia	191	Arteria centralis retinae	49
Anosmatic	485	Arteroe rectae	32
Anosmia	"	Articular	1
Anoxia	191	Arytenoid cartilage	40
Anterior cornu	414	Asexual	56
Anterior ground handle	"	Asphyxia	194, 19
Anterior horn cells	420	Assimilation	
Anterior lobe	385	Associated act or synkinesis	51
Anterior spinothalamic tract	414	Associated automatic control	44
Anterior white commissure	"	Association areas	438, 44
Antero-lateral	413	Association fibres	37, 43
Anteromedian	"	Association mechanism	40
Anti-enzymes	228	Astigmatism	51
Antigen	113	Attraction sphere	
Antiketogenic	228	Audito-oculogyric reflex	16
Anti-prothrombin	95	Audito-psychic area	44
Antithrombin	96	Audito-word area	44
Antitoxin	113	Auditory aphasia	41
Aortic valve	130	Auditory area	7
Apnoea	190, 196	Auditory ossicles	53
Apocodeine	381	Auditory radiation fibres	43
Apocrine glands	550	Auditory reflex	46

Augmentation	453	Bicuspid valve	130
Augmentory	80	Binocular vision	534
Auricle	129	Bipolar	34
Auricular fibrillation	156	Bromic hormone	387
Auricular fibres	132, 156	Bladder	328
Auriculo-ventricular bundle		Blood	85
or bundle of His	132	Blood groups	116
Auriculo-Ventricular node	132	Blood platelets	115
Auro-palpebral reflex	521	Blood pressure	157
Auscultatory method	157	Bowman's capsule	327
Autocoids	377	Brain	422
Automatic	81	, sand	397
Automatin	150	Brightness contrasts	528
Automatinogen	150	Broca's convolution	406
Autolysis	286	Buffer	301
Axial ametropia	512	Bundle of helweg	414
Axon	29, 33	, of His	28, 151
Ayer's theory	545	Burch's theory	532
B		C	
Bacterial fermentation	270	Cadaveric Rigidity	73
Bacteriolysins	110, 115	Caffeine	252
Basal ganglia	429	Calcarine fissure	432
Basket cells	426	Calcium oxalate	372
Basophilic	385	Callosal fissure	432
Basophils	103	Canaliculi	18
Benedict's test	367	Canal of petri	497
Beneficial effect of contraction	48, 60	Cauda equina	412
Benzidin test	374	Caudate nucleus	430
Benzoic acid	361	Capillary electrometer	58
Bilirubin	105, 322	Capsular cataract	498
Biliverdin	105, 322	Carbohydrate	211
Biceps reflex	457	Carboxy-haemoglobin	190

Cardiac	22	Cerebral inhibition	451
Cardiac centre	173	Cerebral peduncles	422
Cardiac cycle	143	Cerebro-spinal fluid	413, 420
" fibres	27	Cerebrospinal system	411
" index	156	Cerebrum	422
Cardio-acceleratory	173	Ceruminous glands	550
" inhibitory	173	Cervical enlargement	412
Cardiasin	384	" sympathetic	465
Cardiometer	146	Chalons	377
Carotid sinus	188	Changes in chemical condition	45, 5
Cartilage	12	Changes in electrical condition	45, 56
Cartilagin	384	" in extensibility & elasticity	45, 50
Carwardyne's saccharometer	269	" in form	45
Castration obesity	401	Changes in temperature	5,
Casts	365	Chemical	44, 232
Cataract	498	Chemical composition of the	
Cathode ray tube	58	body	310
Cell	1	" composition of muscle	74
Cells of golgi type II	426	" inhibition	452
" type II of golgi	35	" regulation	554
Cellular respiration	206	" secretion	263
"	13	Cheyne stokes respiration	196
Central canal	413	Chief cells	396
Central fissure	433	Chloride shift	202
" nervous system	411	Cholecystokinin	319
" reflex time	452	Cholesterol	214
Centriole	3	Chorda tympani	246
Centrosome	3	Choroid	429
Cephalin	93	" plexus	423
Cerebello-cerebral fibres	476	Chromatic aberration	515
Cerebellum	423, 425, 429	Chromatoplasm	32
Cerebral cortex	432 434	Chromophil cell	385
Cerebral hemispheres	429, 432		

Chromoplasm	5	Columnar	7
Chromosomes	564	Columns	414
Chyle	118	Comma tract	415
Cilia	8	Commisural	37
Ciliated	7	' » fibres	435
Ciliary body	192	Compact layer	15
Cilio-spinal centre	516	Complement	113
Cilio-spinal reflex	520	Complemental air	184
Cingulum	435	Complementary	530
Circular fibres of muller	509	Complete tetanus	63
Circular sulcus	433	Complex reflex	450
Circulation of blood	136	Conditioned reflex	84
Circulatory system	2	Conduction	556
Clarke's column cells	420	Conductivity	41, 154
Clava	423	Cone of origin	33
Clinical & pathological method	376	Conjugated proteins	215
Clot	94	Conjunctival reflex	461
Coagulation of blood	93	Conjunctivo-mandibular reflex	462
" phase	"	Connecting fibrocartilage	14
Cochlea	538	Connective	6
Co-enzymes	237	" tissue	9
Collaterals	33	Consensual light reflex	462, 518
Collateral circulation	136	Constant current	45
" fissure	433	Contractility	41
Colloids	218	Contraction period	46
Colloidal state	237	" phase	93
Colour blindness	533	Contracture	66, 436
Colour contrasts	528	Conus medullaris	412
Colour index	101	Convection	556
Colour vision	530	Converging power	508
Colourimetric method	306	Convolutions	432
Column of burdach	415	Convulsive reflex	450
" of goll	"	Coordinated reflex	450

Differential	336	Electrolytes	217
Diffusion	218	Electro-cardiogram	151
Digestion	236	Electrocardiograph	151
Digestive system	2	Electrometric method	306
Dilator reflex	520	Electromyogram	58
Diphase Variation current	58	Electroretinogram	526
Diplopia	534	Emergency light reflex	462, 519
Dioxy-purine	352	Emmetropic eye	512
Digestive system	236	Emulsification	213
Direct division	562	Endocrine organs	375
Direct pyramidal tract	414	Endoderm	579
Distributing cells	35	Endogenous	349, 353
Dobies line	23	" cell formation	562
Dorsal nucleus	420	" metabolism	284
Dorsal spinocerebellar tract	415	Endomysium	22
Dorsolateral tract	415	Endoneurium	39
Downstroke	163	Endplates	40
Du Bois reymond induction		Enteroceptive	443, 450
Coil	45	Enzymes	236
Du Bois Reymond's theory	57	Eosinophile	108
Ductus arteriosus	139	Epicritic	443
Ductless glands	275	Epidermis	548
Ductus venosus	139	Epidural space	413
Duramater	412	Epigastric reflex	435
Dyspnoea	190	Epimysium	22
Ear	525	Epineurium	39
Eccrine glands	550	Epiphyseal cartilage	20
Ectoderm	572	Epithelial	6
Effector mechanism	408	" tissue	6
Efferent	37	Erector pili	549
Efferent impulses	446	Errors of refraction	511
Efferent root cells	35	Erythroblasts	102
Electrical	44	Erythrocytes	96

Erythroextrin	353	F	
Erythropoietic	386	Facilitation	453
Esbach's albuminometer	367	Fallopian tubes	569
" reagent	"	Faradic current	45
" test	"	Far point	507
Essential	282	Fasciculi	22
" contractile substance	23	Fasciculus uncinatus	415
Essential pressure	160	" gracilis	"
Eupnoea	190	Fat	212
Eustachian tube	538	Fatigue	66
Evaporation	556	Fat metabolism hormone	386
Ewald's acoustic image or sound		Fehling's test	368
pattern theory	547	Fertilisation	577
Excitability	4, 154	Fibrils	23
Excretion	5	Fibrin ferment	93
Excretory system	2	Fibrous tissue	9
Exogenous	353	Fibrum	94
" metabolism	285	Field of vision	527
Exophthalmic goitre	391, 394	Fillet	428
Expiration	181	Filtration	220
External auditory meatus	535	" angle	501
External capsule	431	Filum terminale	412
" ear	535	First convoluted tubule	327
" filum	412	Fissure of rolando	423
" geniculate body	429	" " sylvius	"
" parieto-occipital fissure	433	Flouren's theory	426
" respiration	178	Focal distance of the lens	504
Exteroceptive	443, 450	Foetal circulation	585
Extra-pyramidal path	446	Foetal heart	43
Extra systole	155	Folin's creatinine co-efficient	357
Eye	487	Food	225
Eyeball	489	Foramen ovale	139
		Fore-brain	422

Formation of speech	407	Glycogenesis	"
Frequency	163	Glycogenolysis	291
Frontal bundle fibres	436	Glycogen-sparer	290
Frontal eye area	440	Glycolysis	291
" lobe	433	Glyconeogenesis	289
Fuel	282	Glycose	288
G		Glycosuria	293
Galactose	288	Gmelin's test	372
Galvanic current	45	Goblet cells	18
Galvanometer	51	Golgi type II cells	420
Glandular system	2	Gonads	400
Glauber's salt	479	Gonadotropic	385
Glaucoma	503	Graafian follicles	388, 371
Ganglion	420	Grammolecular solution	217
" trunci vagi	467	Granulous type	439
Gaseous exchange in lungs	205	Grey commissures	413
Gastric digestion	254	" matter	411
Gastro colic reflex	315	" substance	533
Gemenetion	562	Growth	4
Genital system	560	Growth-promoting hormones	385
Gerhardt's test	371	Guaiacum test	374
Germinal cells	563	Guanine	352
Glisson's capsule	317	Gustatory cells	477
Globin	103	Gustatory pore	"
Globalicidal power	110	Gymnemic acid	480
Globus pallidus	431	Gyrus	423
Glomerulus	327	H	
Glossopharyngeal nerve	246	Haemal lymph glands	122
Glottis	405	Haematin	104
Glucosazone	369	Haematocrit	87
Glucose	368	Haematoidin	105
Glutathione	52, 398	Haematoporphyrin	103
Gluteal reflex	453	Haemin	104
Glycogen	289	Haemochromogen	104
Glycogenase	291		

Haemoglobin	103	Higher reflex	451
Haemoglobinometer	101	Highest sensory neurons	446
Haemolysins	110, 115	Hilum	326
Haemolysis	96	Hind brain	423
Haemosiderin	103	Hippocampal commissure	435
Hair bulbs	549	Hippuric acid	361
" cuticle	"	Hippuricase	361
" follicles	"	Hirodin	95
Hain's test	369	His tawara system	149
Haldane smith method	90	Homogentisic acid	363
Hamberger's reaction	202	Homoiothermal	553
Hammerslag's method	87	Homotypical	563
Haptophor groups	113	Hormones	377
Hay's test	372	Hue or colour	531
Heart	128	Hunger	473
" beat	154	Hyaline	13
Heart-lung preparation	156	Hyaloid canal	499
Heart-sound	152	" membrane	498
Heat-regulating centre	539	Hydrobilirubin	103
Heat rigor	49	Hydrogen-ion-concentration	305
" -stroke	552	Hyperglycaemia	291, 294
" test	369	Hypermetropia	513
" value	226	Hyperpituitarism	387, 388
Heidenhain's theory	125	Hyperpnoea	190
Hellar's test	366	Hyperthyroidism	392
Helmholtz relaxation theory	508	Hypertonic	220
Hemispheres	425	Hypogastric nerves	340
Henle's loop	327	Hypopituitarism	388
Henzen's line	23	Hypopnoea	190
Heparin	95	Hypothalamus	294
Hepatogenic	387	Hypothyroidism	391
Hering's theory	532	Hypotonic	220
Hermann's theory	57	Hypoxanthine	352
Heterotypical	563		

I		Intermedio-lateral group	420
Idio dynamic control	447	Internode	38
Idio muscular contraction	43	Internuclials	449
Immune body	113	Inter peduncular ganglion	428
Immunity	109	Interstitial hormone	403
Incomplete tetanus	63	Internal capsule	131
Indican	363	" ear	535
Indoxyl	"	" filum	412
" sulphate of potassium	"	" geniculate body	429
Induced current	45	" parieto-occipital	
Inexhaustibility	237	" fissure	433
Inferior brachium	429	" respiration	178, 207
Inferior longitudinal bundle	425	Intestino hepatic circulation	322
" peduncles	425	Intra cartilaginous	19
" thoracic respiration	183	" membranous	"
Infra-red rays	504	" ocular fluid	500
Infundibulum	181	" " tension	582
Inhibition by simultaneous stimulation	453	Intrinsic	316
Initial heat	51	Involuntary	22
Insensible perspiration	551	" muscle	25
Inspiration	181	Iodopsin	325
Instinctive	81	Iodothyron	395
Insula	433	Iodothyroglobulin	391
Intensity	542	Iris	491
Intensity threshold	524	" diaphragm	529
Inter-articular	13	Irregular astigmatism	515
Intercalated neurons	449	Irregular breathing	197
" reflex	450	Irregularly angular	30
Inter capillary pressure	126	Irritability	41
Intercellular enzymes	238	Island of Lill	433
Interlobular blood vessels	317	Isometric contractions	64
Intermediary cells	35	Isotonic	220
Intermediate sensory neurons	445	" contractions	64
		Isthmus	390

J		Law of mass action	224
Jaffe's test	"58, "64	Lemniscus	428
Jugular ganglion	467	Length of the lens	504
K		Lens	497
Karyoplasm	5	Lethal dose	111
Katabolic changes	286	Lenticular astigmatism	515
Kathepsins	238	" cataract	498
Kat-ions	217	" nucleus	430
Keith's method	91	Lenticulo-capsular cataract	"
Ketogenic	224, 229	Leucocytosis	107
Ketosis	298, 356	Leucopenia	"
Kidneys	326	Leukoprotease	107
Knee jerk	457	Lid reaction	519
Krause's membrane	23	Light bands	23
Kuhne's sartorius experiment	42	" reflex	462, 518
L		Limbic lobe	433
Lachrymal gland	468	Lingual papillae	475
" reflex	461	Lipotrin	387
Lactic acid	52	Liver	316
" " maximum	68	" diastase	291
Lactosazone	369	Living test tube	91
Lacunae	13, 18	Lobes	432
Ladd-franklin's theory of molecular dissociation	532	Lock and key action	237
Lamellae	18	Longitudinal fibres	509
Langley's ganglion	467	Loudness	408
Large mononuclear	108	Lowest sensory neurones	445
Larynx	402	Ludwig's theory	122
Latent period	46	Lumbar enlargement	412
Lateral cerebral fissure	433	Luminosity or brightness	513
" ground bundle	415	Lymphagogues of the 1st class	125
" lemniscus	136	" " 2nd " "	"
" nucleus	429	Lymphatic glands	121
" spinothalamic tract	415	" system	120
" ventricle	432		

Lymph corpuscle	119	Mesoderm	
Lymphocytes	107, 119	Metabolism	277
Lymphoid tissue	12	Methaemoglobin	106
Lymph path	123	Meyer-overton theory	222
„ spaces	120	Meyer's hydraulic theory	545
Macrosmatic	485	Micro-aero-tonometer	198
Major & minor arterial circles	499	Microsmatic	485
Maltose	253	Micturition	340
Mandibular reflex	460	Mid-brain	422, 427
Manometer	142	Middle column cells	420
Marginal fibrocartilage	14	Middle ear	535
Mast cells	108	Middle peduncles	425
Mastication	308	Mind blindness	442
Matrix of the nail	549	Mind deafness	441
Maximal stimulus	48	Minimal air	185
Membraneform	13	Minimal stimulus	47
Membranous sheath	34	Miotics	521
Mechanical	252	Monophasic	59
mechanical efficiency	65	Monoxo-purine	352
Mechanical stimulus	44	Motor	37
Medulla	378	Motor aphasia	440
Medulla oblongata	423	Motor areas	438
Medullary matter	326	Motorial or kinaesthetic	443
Medullary space	21	Motor speech area	440
Medullary sheath	37	Mountain sickness	191
Medullated nerve fibres	37	Mucinogen	244
Megaloblasts	102	Muoid	10, 372
Melanophoric	387	Mucous	229
Membrana tympani	536	Mucus	272
Membranous urethra	329	Müller's theory	532
Mercaptans	363	Multicellular	1
Meridional fibres	509	Multipolar	34
		Murexide test	356

Muscle corpuscle	23	Nissl's granules	31
Muscle glycogen	53, 291	Nitric oxide haemoglobin	106
Muscle tonus	63	Nitrogen metabolism hormone	387
Muscle-wave	63	Nitrogenous	282
Muscular	6, 338	Nodal point	505
Muscular system	2	Non-medullated nerve fibres	937
Muscular tissue	31	Non-nitrogenous	282
Mydriatics	591	Non-threshold substances	337
Myelin	38	Normal blood pressure	159
Myograph	46	Normal reflex	451
Myopia	513	Normoblasts	103
Myxoedema	391	Nuclear fibrils	5
Myxoedema tetany	393	Nuclear membrane	"
N		Nucleolus	"
Nail groove	549	Nucleus	2, 5
Nasal reflex	461	Nucleus emboliformis	425
Near point	511	Nucleus fastigii	"
Negative after-images	523	Nucleus globosus	"
Negative variation current	59	Nucleus lentis	497
Nerve cells	29	Nutritional anaemia	99
Nerve fibres	29, 36		
Nerve muscle preparation	46		
Nervi erigens	340	Obermeyer's test	361
Nervi nervosum	41	Occipital lobe	433
Nervous	6	Occipito bundle	435
Nervous system	2, 411	Oestrin	"
Nervous tissue	29	Oestriol	401
Neurilemma	38	Oestrone	"
Neurofibrils	30	Olfactometry	489
Neuroglia cells	29	Olivary body	423
Neuroglia fibrelets	"	Oogenesis	576
Neurone	"	Opsonins	114, 115
Neutrophils	109	Optical centre	505

Optic radiation fibres	436	Parietal lobe	433
Orbicular reflex	519	Parosmia	485
Organic albuminuria	365	Pars intermedia	389
Organised	372	Passive immunity	112
Organ of corti	539	Pathogenic	114
Organs	1	Pathological method	376
Ornithine	349	Pavy's method	370
Oxytocin	389	Pelvis	339
Osmosis	97, 219	Penile urethra	339
Osteoblast	18	Penis	566
Osteoclasts	21	Pepsin	262
Osteogenetic cells	19	Peptone	259
Osteogenetic fibres	19	Perichondrium	14
Osteogenetic tissue	18	Perimeter	527
Otic ganglion	467	Perimysium	22
Ostwald's viscosimeter	88	Perineurium	39
Oval bundle	415	Period of Compensation	135
Ovary	570	Periosteum	17
Ovum	572	Peripheral nervous system	411
Oxygen-capacity	200	Peripheral reflex time	452
" saturation	104	Peristalsis	312
Oxyhaemoglobin	105	Permeability	126
Oxyphil cells	396	Pernicious anaemia	99
Oxytocin	402	Pes	427
		Phagocytosis	107
		Pharmacological, biochemical	
		method	377
Pacemaker	148	Pharyngeal thirst	471
Pacinian corpuscles	553	Phasic reflex	451
Palmer reflex	455	Phenyl hydrazin's test	369
Palpatory method	157	Phosphagen	55
Pancreatic juice	262	Phosphocreatine	54
Pancretotropic	386	Photochemical theory	526
Parathyroid hormone	386		
"	396		

Protopathic	445	Recovery heat	51
Protoplasm	2	Red blood corpuscles	96
Provinon	400	Red nucleus	428
Pseudo reflex or axon reflexes	454	Reduced reflex time	452
Psychic blindness	443	Reflective galvanometer	58
Psychic deafness	441	Reflex action	418
Psychic juice	355	Reflex arc	82, 449
Psychoelectric reflex	170	Reflex control	447
Ptyalinogen	244	Reflexive	81
Radio nerve	341	Reflex secretion	263
Pulmonary valve	130	Reflex time	452
Pulse	162	Regular astigmatism against	
Pulse pressure	160	Refracting media	496
Pulvinar	429	Refractory period	60, 155
Punctum proximum	511	Refractory phase	452
Punctum remotum	507	the rule	515
Pupillary reflex	453	Relative polycythaemia	99
Purkinje cells	35	Relaxation period	47
Purkinje's fibres	27, 133	Renal capsule	327
Pus	374	Renal threshold	293
Putamen	431	Reproduction	4
Pyramidal	34	Reserve air	185
Pyramid	423	Residual air	185
Q		Resonance theory	513
Quality	409, 542	Respiratory quotient	208
R		Respiratory system	2, 178
Radiation	556	Retiform body	423
Random	81	Rest phase	143
Ranvier's crosses	39	Reticulocytes	102
Ranvier's nodes	38	Reticulo-endothelial system	103
Reaction phase	93	Retiform tissue	12
Receptor groups	112	Retina	493
mechanisms	407	Retinene	521

Protopathic	443	Recovery heat	51
Protoplasm	2	Red blood corpuscles	96
Provinon	400	Red nucleus	428
Pseudo reflex or axon reflexes	454	Reduced reflex time	452
Psychic blindness	443	Reflective galvanometer	58
Psychic deafness	441	Reflex action	448
Psychic jaundice	255	Reflex arc	82, 449
Psychoelectric reflex	170	Reflex control	447
Ptyalinogen	344	Reflexive	81
Pudic nerve	341	Reflex secretion	263
Pulmonary valve	130	Reflex time	452
Pulse	163	Regular astigmatism against	
Pulse pressure	160	Refracting media	496
Palvinar	429	Refractory period	60, 155
Punctum proximum	511	Refractory phase	452
Punctum remotum	507	the rule	515
Pupillary reflex	453	Relative polycythaemia	99
Purkinje cells	35	Relaxation period	47
Purkinje's fibres	37, 133	Renal capsule	327
Pus	374	Renal threshold	293
Putamen	431	Reproduction	4,
Pyramidal	34	Reserve air	185
Pyramid	423	Residual air	185
	Q	Resonance theory	513
Quality	409, 512	Respiratory quotient	208
	R	Respiratory system	2, 178
Radiation	556	Retiform body	423
Random	81	Rest phase	143
Ranvier's crosses	39	Reticulocytes	102
Ranvier's nodes	38	Reticulo-endothelial system	103
Reaction phase	93	Retiform tissue	12
Receptor groups	112	Retina	493
Receptor mechanism	407	Retinene	524

Skeletal system	2	Static	127
Sleep	470	Static function	427
Small mononuclear	107	Stato-kinetic	456
Smell	483	Stellate cells of kupffer	317
Somatic	44	Stellate-ganglion	464
Somatic cells	563	Stercobilin	[103
Sound pictures	441, 547	Sthenic function	,
Spaces of Fontana	489	Stimulation fatigue	71
Specific dynamic action	228	Stomatolysis	96
Specific stimulus	43	Strabismus	534
Specificity of enzyme action	237	Straight tubule	327
Speech	409	Stratified	7
Spermatogenesis	574	Stratiform fibrocartilage	14
Spermatozoa	568	Strength	163
Spherical	30	Striated	23
Spherical aberration	515	String galvanometer	58
Sphincter vesicæ	329	Strong Nitric acid	366
Sphygmograph	163	Subarachnoid cavity	413
Sphygmomanometer	157	Subdural space	,
Spinal cord	412	Subluxation	509
Spindle shaped	30	Sub-mucous	329
Spinotectal tract	415	Subparietal sulcus	433
Spirometer	183	Substantia gelatinosa centralis	413
Splanchnic	411	Substantia nigra	427
Spleen	325	Succession of twitches	62
Spongy layer	15	Successive contrasts	525
Spontaneous	81	Sudoriferous ducts	550
Squamous	7	Salcomarginal tract	414
Squint	534	Sulph hæmoglobin	106
Stair case phenomenon	48, 155	Summation of effects	60
Stance	456	Summation of stimuli	60
Stapedius	537	Superior brachium	429
Starling's theory	127	Superior longitudinal bundle	435

Skeletal system	2	Static	127
Sleep	470	Static function	427
Small mononuclear	107	Stato-kinetic	456
Smell	462	Stellate cells of kupffer	317
Somatic	44	Stellate-ganglion	464
Somatic cells	563	Stercobilin	105
Sound pictures	441, 547	Sthenic function	"
Spaces of Fontana	489	Stimulation fatigue	71
Specific dynamic action	228	Stomatolysis	96
Specific stimulus	43	Strabismus	534
Specificity of enzyme action	237	Straight tubule	327
Speech	409	Stratified	7
Spermatogenesis	574	Stratiform fibrocartilage	14
Spermatozoa	568	Strength	163
Spherical	30	Striated	22
Spherical aberration	515	String galvanometer	58
Sphinctor vesicae	329	Strong Nitric acid	366
Sphygmograph	165	Subarachnoid cavity	413
Sphygmomanometer	157	Subdural space	"
Spinal cord	412	Subluxation	509
Spindle shaped	30	Sub-mucous	329
Spinotectal tract	415	Subparietal sulcus	433
Spirometer	183	Substantia gelatinosa centralis	413
Splanchnic	411	Substantia nigra	427
Spleen	323	Succession of twitches	62
Spongy layer	15	Successive contrasts	528
Spontaneous	81	Sudoriferous ducts	550
Squamous	7	Sulcomarginal tract	414
Squint	534	Sulph haemoglobin	106
Stair case phenomenon	48, 155	Summation of effects	60
Stance	456	Summation of stimuli	60
Stapedius	537	Superior brachium	429
Starling's theory	127	Superior longitudinal bundle	435

Superior peduncles	425	Testicles	566
Superior thoracic respiration	183	Testes	"
Superficial reflex	451	Tetanus	59
Superficial reticulum	32	Thalamus	422, 429
Superposition	60	Theobromine	352
Supplemental air	185	Theelin	401
Supra-orbital reflex	461	Theelol	"
Suprarenal glands	378	Theine	352
Surface tension	224	Thermal	44
Suspensory ligament	497	Thermopile	50
Sweat glands	550	Theory of electrical stimuli	526
Sympathetic	463	Theory of Helmholtz	545
Sympathetic system	411	Theory of synergic control	427
Synapse	10	Theory of thermal stimuli	526
Synergic or cerebellar control	447	Thermogenesis	554
System	2	Thermolysis	"
Systolic blood pressure	160	Thermotaxis	"
Systole	143	Thiocyanates	363
T			
Tactile corpuscles	553	Thiosulphates	363
Tactile or body-sense area	141	Thirst	474
Tambour	142	Thoracic aspiration	123
Taurine	363	Thoracic sympathetic	465
Taste	475	Threshold of audibility	542
Taste buds	476	Threshold stimulus	485
Taste hair	477	Threshold substances	337
Taste or smell areas	442	Thrombase	93
Telephone theory	546	Thrombin	"
Tecto spinal tract	414	Thrombocytes	116
Tegmentum	428	Thrombogen	93
Temporal lobe	433	Thrombokinas	"
Temporary glycosuria	368	Thrombopenia	116
Tension	164	Thymocyte	397
Tensor tympani	536	Thymus	"

Thyroid cartilage	403		
Thyroid gland	390	Ultraviolet rays	504
Thyrotropic	386	Umbilical arteries	139
Thyroxin	391, 395	Umbilical veins	"
Tidal air	184	Uncinate bundle	435
Time threshold	524	Uni-cellular	1
Tissue respiration	178, 206	Univesal donors	117
Tissues	6	Universal indicator	307
Tonic function	427	Universal recipients	117
Tonic reflex	451	Unipolar	34
Tonometer	502	Unorganised	372
Tonus	80	Unstriated	22
Total capacity	185	Upper lemniscus	435
Total reflex time	452	Upstroke	165
Total ventilation	185	Uraemia	371
Trabeculae	121	Urea	347
Tracts	414	Ureameter	350
Tracts of ascending degeneration	415	Urease	347
Tracts of descending degeneration	415	Ureters	328
Transitional	108	Urethra	329
Triceps reflex	457	Uric acid	352
Trichromatic theory of young Helmholtz	531	Urinary deposits	372
Tricuspid valve	130	Urinary system	326
Trigeminal reflex	520	Uriniferous or convoluted tubules	327
Tri-oxy-purin	352	Urobilin	105
Trophospongium	33	Uterus	561
Tscherning's theory of increased tension	511		
Tuberculum cinerium	423	V	
Type I golgi	34	Vasomotor nervous system	174
		Vasopressin	389
		Vastibulo-spinal tract	414
		Venae rectae	328
		Venae vorticosae	499

Ventricle	129	Volume	164
Ventricular fibres	132	W	
Ventral spinocerebellar tract	415	Weber's paradox	50
Vermis	425	Weir mitchell's theory	426
Vestibule	538	Wernick's area	441
Vestibulo-equilibratory		Wernick's reflex	518
control	447	Waterhammer pulse	166
Visceral reflex	451	Weyl's test	358
Vision	487, 503	White blood corpuscles	106
Visual aphasia	442	White commissure	413
Visual area	,	White fibrocartilage	13
Visual purple	495	White fibrous	10
Visual violet	525	White matter	411
Visuo-psychic area	442	Word blind	408
Visuo-sensory area	,	Word blindness	442
Visuo-word centre	,	Word deafness	441
Vital capacity of lungs	185	X	
Vitamins	229	Xanthine	352
Vitreous humour	498	Y	
Vitrein	501	Yellow elastic	10
Vocal cords	405	Yellow fibrocartilage	13
Voice	402	Z	
Voice production	408	Zona fasciculata	378
Volitional control	447	Zona glomerulosa	,
Volley theory	545	Zona reticularis	"
Voluntary	22	Zonule of zinn	497
Voluntary muscle	,	Zwaardemaker's olfactometer	486
Voluntary inhibition	452	Zygomatic reflex	461
Voluntary tetanus	63	Zymogens	237